



رياضيات الأعمال

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي

الفصل الدراسي الأول

كتاب الطالب

12

فريق التأليف

د. عمر محمد أبو غليون (رئيساً)

يوسف سليمان جرادات

هبة ماهر التميمي

إبراهيم عقلة القادري

نور محمد حسان

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسركم المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوان الآتي:



06-5376262 / 237



06-5376266



P.O.Box: 2088 Amman 11941



@nccdjor



feedback@nccd.gov.jo



www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (0000/00)، تاريخ 0/00/2022 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (0000/00)، تاريخ 0/00/2000 م، بدءاً من العام الدراسي 0000 / 0000 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2025.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 00 - 000 - 0

التحكيم التربوي: أ. د. خالد محمد أبو اللوم

التحكيم العلمي: أ. د. محمد صبح صباجة

التحرير اللغوي: نضال أحمد موسى

التصميم الجرافيكي: رakan محمد السعدي

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسلیحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحدیث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون مُعیناً للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي والمهاري، ومجاراة الأقران في الدول المتقدمة. ولما كان مبحث الرياضيات من أهم المباحث الدراسية التي تُنمي لدى الطلبة مهارات التفكير وحل المشكلات في مختلف الحقول، فقد أُولى المركز مناهجه عنايةً كبيرةً، وأعدها وفق أفضل الطرائق المُتبعة عالمياً على أيدي خبرات أردنية؛ لضمان انسجامها مع القيمة الوطنية الراسخة، وتلبية لحاجات الطلبة.

روعي في إعداد كتاب رياضيات الأعمال أكثر الموضوعات الرياضية أهمية واستخداماً في تخصصات إدارة الأعمال؛ بُعْنَية إعداد طلبة حقل الأعمال لدراسة أيّ من هذه التخصصات في المرحلة الجامعية إعداداً جيداً يتواءم مع مناهج الدول المتقدمة. روعي في إعداد الكتاب أيضاً اشتتماله على مستوى معرفي ومستوى مهاري مناسبين لطلبة الحقول جميعاً في حال اختيار هؤلاء الطلبة دراسة مادة هذا الكتاب. وكذلك حرص على تقديم هذه الموضوعات بطريقة بنائية مُتدرّجة تتيح للطلبة فرصة تعلمها بعمق من دون عناء أو جهد كبيرين.

روعي أيضاً تقديم الموضوعات بطريقة مُنظّمة، وجاذبة، ومُدعّمة بتمثيلات بيانية، ومُزوّدة بإرشادات تُعين الطلبة على مواصلة تعلمهم بسلاسة من دون تعرّض؛ فهي تذكّرهم بالخبرات التعليمية التي اكتسبوها سابقاً، وتساعدهم على ربط الموضوعات الجديدة بعضها ببعض ربطاً وثيقاً، إضافةً إلى صلة كثير من أمثلتها ومسائلها بسيّاقات إدارة الأعمال التي تُحفّز الطلبة على تعلم الرياضيات بشغف، وتجعله ذا معنى.

ولأنَّ كثرة تدريب الطلبة على حلّ المسائل نهجٌ ناجٌّ في ترسیخ المفاهيم الرياضية لديهم وتعزيز طلاقتهم الإجرائية؛ فقد تضمنَ كتاباً الطالب والتمارين عدداً كافياً من التدريبات؛ بهدف توثيق علاقة الطلبة بالكتاب المدرسي، بوصفه مرجعاً موثوقاً ورصيناً يغنينهم عن البحث عن آية مراجع أو مصادر إضافية، ويُحقق العدالة في التعلم.

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب، نُؤمّل أنْ ينال إعجاب طلبتنا وأعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية، ويجعل تعليم الرياضيات وتعلّمها أكثر متعةً وسهولةً، وَيَعِدُ بأنْ نستمر في تطويره في ضوء ما يصلنا من ملاحظات سديدة.

المركز الوطني لتطوير المناهج

قائمة المحتويات

6	الوحدة 1 المصفوفات
8	الدرس 1 مُقدمة في المصفوفات
16	الدرس 2 العمليات على المصفوفات
24	الدرس 3 ضرب المصفوفات
34	الدرس 4 المُحدّدات وقاعدة كريمر
43	الدرس 5 النظير الضريبي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية
54	اختبار نهاية الوحدة

قائمة المحتويات

56	الوحدة ② الخوارزميات ونظرية المُخْطَّطات
58	الدرس 1 الخوارزميات
68	الدرس 2 خوارزميات تعبئة الصندوق
83	الدرس 3 المُخْطَّطات
95	الدرس 4 أنواع خاصة من المُخْطَّطات
107	الدرس 5 مُخْطَّطات أويلر
116	اختبار نهاية الوحدة
120	الوحدة ③ البرمجة الخطية
122	الدرس 1 حل نظام متباينات خطية بمتغيرين بيانياً
130	معمل برمجية جيوجبرا تمثيل نظام متباينات خطية بمتغيرين بيانياً
132	الدرس 2 البرمجة الخطية
139	اختبار نهاية الوحدة

المصفوفات

Matrices

ما أهمية هذه الوحدة؟

تُعد المصفوفات من المفاهيم الأساسية في الرياضيات، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ب مختلف المجالات الرياضية وتطبيقاتها العملية. وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بالمصفوفات، لا سيما بعد استعمالها في عمليات التخزين والتحليل للبيانات الضخمة التي تُشكّل العمود الفقري لكُلّ من الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتشفيير (علم تأمين المعلومات وإخفاءها). كذلك تُمثل المصفوفات أدوات أساسية في مهن إدارة الأعمال، مثل التسويق؛ إذ تُسهم في تحليل بيانات الحملات والمحاسبة، بما يساعد على إدارة البيانات المالية وتفسيرها بفعالية.

سأتعلم في هذه الوحدة:

- مفهوم المصفوفة، وعناصرها، ورتبتها، وأنواعها.
- جمع المصفوفات، وطرحها، وضربها في عدد ثابت، وضرب مصفوفة في أخرى.
- إيجاد محددات مصفوفات مربعة من الرتبة الثانية والرتبة الثالثة.
- حل أنظمة معادلات خطية بمتغيرين باستعمال قاعدة كريمير والنظير الضربي لمصفوفة المعاملات.
- إيجاد النظير الضربي لمصفوفة مربعة من الرتبة الثانية.

تعلّمتُ سابقاً:

- تبسيط مقادير عدديّة.
- خصائص العمليات على الأعداد الحقيقية.
- حل معادلات خطية بمتغير واحد.
- حل أنظمة معادلات خطية بمتغيرين بالحذف والتعويض.
- حل معادلات تربيعية بمتغير واحد.

أستعمل تدريبات (أستعد لدراسة الوحدة) في الصفحات (6 – 10) من كتاب التمارين؛ لمراجعة هذه الموضوعات قبل البدء بدراسة الوحدة.

مُقدمة في المصفوفات

Introduction to Matrices

فكرة الدرس

- تعرُّف المصفوفات، ورتبتها، وعناصرها.
- تنظيم البيانات في مصفوفة لتسهيل عملية تحليلها.
- تمييز المصفوفات المتساوية من غيرها.



المصطلحات



مسألة اليوم



المصفوفة، الرتبة، العنصر، مصفوفة صف، مصفوفة عمود، المصفوفة المُربعة، المصفوفة الصفرية، المصفوفات المتساوية.



سُئلت الأُسر في مدینتين عن مصدر التدفئة الذي تستعمله في فصل الشتاء، ثم سُجّلت النتائج في الجدول المجاور الذي يُبيّن عدد الأُسر التي تستعمل

	الغاز	الكهرباء	الكاكي	أُخرى
المدينة A	3256	1678	4589	1253
المدينة B	4560	978	5874	2564

كل مصدر. كيف يُمكِّن عرض بيانات الجدول بصورة أخرى مُختصرة؟

المصفوفة: عناصرها، ورتبتها

المصفوفة (matrix) هي ترتيب على هيئة مستطيل لأعداد أو مُتغيّرات في صفوف وأعمدة محسوبة بين قوسين من النوع الآتي: [].

تُسمّى كل قيمة في المصفوفة عنصراً (element)، ويرمز إلى المصفوفة بحروف كبيرة، مثل: ...، A , B , C , ...، ويرمز إلى عناصرها بحروف صغيرة، مثل: ...، a , b , c , يُستدلُّ على العنصر في المصفوفة بموقعه الذي يُحدّده كلُّ من الصف والعمود الذي يقع فيه العنصر، ويُكتَب رقم الصف أوّلاً ثمَّ رقم العمود إلى يمين رمز العنصر من الأسفل، فيرمز مثلاً إلى العنصر الواقع في الصف 3 والعمود 2 في المصفوفة A بالرمز a_{32} .

معلومات

يعود تاريخ المصفوفات إلى العصور القديمة، لكنَّ مصطلح (المصفوفة) ظهر عام 1850 م. أما كلمة (matrix) فهي لاتينية، ولها معانٍ عديدة، منها: المكان الذي يتشكّل فيه الشيء أو يتولد.

يوجد العنصر 6 في الصف 4 والعمود 2، ويرمز إليه بالرمز a_{42} .

$$A = \left[\begin{array}{ccc} 3 & 7 & 11 \\ 12 & 5 & 29 \\ 17 & 0 & 11 \\ 4 & 6 & 2 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} 4 \text{ صفوف} \\ 3 \text{ أعمدة} \end{array}$$

الوحدة 1

يمكن وصف المصفوفة بترتيبها (order)؛ فالمصفوفة التي تحوي 3 صفوف و 4 أعمدة يقال
إنّها مصفوفة من الرتبة 4×3

بوجه عام، إذا حوت المصفوفة m من الصفوف، و n من الأعمدة، فإنّها تكون مصفوفة من
الرتبة $n \times m$ ، ويساوي عدد عناصرها ناتج ضرب العددين m ، و n .

لغة الرياضيات

تُقرأ رتبة المصفوفة
على النحو $m \times n$
الآتي: m في n .

مثال 1

أستعمل المصفوفة: $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ للإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما رتبة المصفوفة A ؟

بما أنّ المصفوفة A تحوي 3 صفوف، و 2 عمودين، فإنّ رتبتها هي: 3×2

ما قيمة كُلّ من العنصر a_{32} والعنصر a_{12} ؟

بما أنّ العنصر a_{32} موجود في الصف 3 والعمود 2، فإنّ قيمته هي: 4

بما أنّ العنصر a_{12} موجود في الصف 1 والعمود 2، فإنّ قيمته هي: 5

أين يقع العنصر الذي قيمته -1؟

يقع العنصر الذي قيمته -1 في الصف 2 والعمود 1، ويرمز إليه بالرمز a_{21} .

أتدقّق من فهمي

أستعمل المصفوفة: $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & -3 & -5 \end{bmatrix}$ للإجابة عن الأسئلة الآتية:

(a) ما رتبة المصفوفة B ؟

(b) ما قيمة كُلّ من العنصر b_{24} والعنصر b_{13} ؟

(c) أين يقع العنصر الذي قيمته -3؟

رموز رياضية

يُستعمل الرمز $A_{3 \times 2}$
للدلالة على المصفوفة A
التي رتبتها 3×2

لغة الرياضيات

يُستعمل مصطلح (مدخلات)
أيضاً للتعبير عن عناصر
المصفوفة.

إرشاد

رتبة المصفوفة $m \times n$
هي تعبير، وليس عملية
ضرب. فمثلاً، إذا كانت
رتبة المصفوفة 2×3 ،
فإنّ ذلك لا يعني ضرب
هذين العددين بحيث
يكون الناتج 6

أنواع خاصة من المصفوفات

توجد أسماء خاصة ببعض المصفوفات؛ فالمصفوفة التي تتكون فقط من صف واحد وعدد من الأعمدة تسمى **مصفوفة صف (row matrix)**، مثل المصفوفة: $A = [2 \ 7 \ -4 \ 0]$.

أما المصفوفة التي تتكون من عمود واحد وعدد صفوف فتسمى **مصفوفة عمود**.

$B = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ ، مثل المصفوفة **(column matrix)**، مثل المصفوفة:

وأما المصفوفة التي يتساوى فيها عدد الصفوف وعدد الأعمدة فتسمى **المصفوفة المربعة**.

$C = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 8 \\ 7 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ ، مثل المصفوفة **(square matrix)**، مثل المصفوفة:

وأما المصفوفة التي يكون جميع عناصرها أصفاراً فتسمى **المصفوفة الصفرية (zero matrix)**،

$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ مثل المصفوفة:

المصفوفتان المتساويتان (equal matrices) هما مصفوفتان لهما الرتبة نفسها، وعناصرهما

المُنتَظِرَة متساوية.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

المصفوفتان غير متساويتين؛ لاختلاف رتبتهما.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

المصفوفتان غير متساويتين؛ لعدم تساوي جميع العناصر المُنتَظِرَة فيهما.

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

المصفوفتان متساويتان؛ لأنهما من الرتبة نفسها، وعناصرهما المُنتَظِرَة متساوية.

أتعلم

المصفوفة $[a]$ هي مصفوفة صف وعمود.

أتعلم

يمكن القول إن المصفوفة C مربعة من الرتبة 3.

أتعلم

العناصر المُنتَظِرَة في مصفوفتين هي العناصر التي تقع في الصف والعمود نفسهما. فمثلاً، إذا كانت المصفوفة A والمصفوفة B متساويتين، فإن العنصر a_{ij} في المصفوفة A يُناظِر العنصر b_{ij} في المصفوفة B .

يمكن استعمال مفهوم تساوي المصفوفات لإيجاد قيمة عناصر مجهولة في مصفوفتين متساويتين.

مثال 2

أُحدّد النوع والرتبة لكل مصفوفة مما يأتي:

1) $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

المصفوفة A مصفوفة مُربعة، ورتبتها هي: 2×2

2) $B = [4 \ 5 \ 7]$

المصفوفة B مصفوفة صف، ورتبتها هي: 1×3

3) $C = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}$

المصفوفة C مصفوفة عمود، ورتبتها هي: 4×1

إذا كانت: $\begin{bmatrix} 2 & x+1 \\ 3y+10 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ y & 1 \end{bmatrix}$

$x + 1 = 10$

عنصران مُتّاظران في مصفوفتين مُتساويتين

$x = 9$

طرح 1 من طرفي المعادلة

$3y + 10 = y$

عنصران مُتّاظران في مصفوفتين مُتساويتين

$2y + 10 = 0$

طرح y من طرفي المعادلة

$2y = -10$

طرح 10 من طرفي المعادلة

$y = -5$

قسمة طرفي المعادلة على 2

أتحقق من فهمي

أُحدّد النوع والرتبة لكل مصفوفة مما يأتي:

a) $D = \begin{bmatrix} 2 & 7 & -3 \\ 6 & 4 & 0 \\ 12 & 9 & 5 \end{bmatrix}$

b) $E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

c) $F = [-4 \ 0 \ -2 \ 1 \ 0]$

إذا كانت: $\begin{bmatrix} 3x-2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 2x+4y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 8 \\ 2 & 18 \end{bmatrix}$ (d)

أفكار

أذكر مثلاً على مصفوفة مُربعة صفرية.

تنظيم البيانات في المصفوفات وتحليلها

إنَّ تنظيم البيانات في مصفوفة يُسَهِّل عملية تفسيرها وتحليلها. وقد يُقدِّم مجموع البيانات في صف أو عمود معلومة ذات معنى في بعض المسائل.

مثال 3: من الحياة

	الطول (cm)	الكتلة (kg)	العمر (year)	الصف الدراسي
هديل	135	38	10	5
هبه	155	50	14	9
لانا	145	45	12	6

بيانات: يُبيَّن الجدول المجاور الأطوال والكتل والأعمر والصفوف الدراسية للشقيقات الثلاث هديل وهبه ولانا في إحدى المدارس:

أُرْتِبْ هذِهِ البيانات في مصفوفة رتبتها 3×4 ، بحيث يُمثِّل الطول والكتلة والعمر والصف

الدراسي صفوف المصفوفة.

$$\begin{bmatrix} 135 & 155 & 145 \\ 38 & 50 & 45 \\ 10 & 14 & 12 \\ 5 & 9 & 6 \end{bmatrix}$$

أُفَكَّر

أُعِيدَ كتابة المصفوفة بحيث تكون الكتل مُرتبة ترتيباً تناظرِيًّا.

أَجِدْ مجموع عناصر الصَّفِ الأوَّل، ثُمَّ أُبَيِّنْ مَا يُمثِّلُهُ هذِهِ المجموع (إِنْ كَانَ لَهُ مَعْنَى).

مجموع عناصر الصَّفِ الأوَّل هُو 435، وَهَذَا الْمَجْمُوَّعُ يُمثِّل مجموع أطوال الشقيقات الثلاث.

أَجِدْ مجموع عناصر الصَّفِ الرَّابِع، ثُمَّ أُبَيِّنْ مَا يُمثِّلُهُ هذِهِ المجموع (إِنْ كَانَ لَهُ مَعْنَى).

مجموع عناصر الصَّفِ الرَّابِع هُو 20، وَهَذَا الْمَجْمُوَّعُ لَا يُمثِّل شَيئاً ذَهَابِيًّا.

هل إِيجاد الوَسْطِ الحَسَابِيِّ لِعَنَاصِرِ الصَّفِ الثَّانِي يُقْدِمُ بِيَانَاتَ ذاتِ معْنَى؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

نعم؛ لَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الوَسْطِ الحَسَابِيِّ لِكَتَلِ الشَّقِيقَاتِ الْثَّلَاث.

أَتَذَكَّر

الوَسْطِ الحَسَابِيِّ لِمَجْمُوَّعَةِ مِنِ الْقِيمِ يَسَاوِي نَاتِجِ جَمْعِ الْقِيمِ مَقْسُوماً عَلَى عَدَدِهَا.

الوحدة 1

أتحقق من فهمي

	مؤيد	معارض	محايد
A القرية	800	130	70
B القرية	460	250	40
C القرية	1300	700	200

سياحة: يبيّن الجدول المجاور نتائج استطلاع آراء عيّنات من سُكّان ثلاث قرى متجاورة بخصوص مشروع سياحي يُراد إقامته في موقع يتوَسّط هذه القرى:

(a) أُرتب هذه البيانات في مصفوفة صفوّفها القرى؛ على أن يكون عدد المؤيّدين مرتبًا تصاعديًا.

(b) أجد مجموع عناصر الصف الأوّل، ثمّ أبّين ما يمثّله هذا المجموع (إنْ كان له معنى).

(c) أجد مجموع عناصر العمود الثاني، ثمّ أبّين ما يمثّله هذا المجموع (إنْ كان له معنى).

(d) هل إيجاد الوسط الحسابي لعناصر العمود الثاني يُقدّم بيانات ذات معنى؟ أُبّرر إجابتي.

أتدرب وأحل المسائل

أحدّد رتبة كل مصفوفة مما يأتي:

1 $[6 \ 10]$

2 $\begin{bmatrix} 2 & 5 & -4 \\ 1 & 7 & 3 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

3 $\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \\ -4 \end{bmatrix}$

4 $[10]$

إذا كانت: $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 9 & 8 \\ 7 & -3 & 5 & 12 \end{bmatrix}$ ، فأجد قيمة كل عنصر مما يأتي:

5 a_{31}

6 a_{23}

7 a_{14}

8 أحدّد موقع العنصر الذي قيمته 8 في المصفوفة:

$$.B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 7 & 4 \\ 6 & 8 & 0 \\ 5 & -6 & 9 \end{bmatrix}$$

أُحدّد النوع والرتبة لكل مصفوفة مما يأتي:

9) $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$

10) $A = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$

11) $[0 \ 3 \ 5 \ 2]$

12) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

إذا كانت: $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 4 & z & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & x+2y \\ 3x-11 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$. فأجد قيمة كل من x ، y ، و z .

إذا كانت: $\begin{bmatrix} 9 & x^2 \\ 2-y & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 2x+3 \\ -5 & 10 \end{bmatrix}$. فأجد قيمة كل من x ، y .

	المباريات	التسديدات	الأهداف
سمير	8	15	7
أحمد	11	25	13
فواز	14	20	9

رياضه: يُبيّن الجدول المجاور إنجازات ثلاثة من لاعبي كرة القدم في مباريات دوري الصفوف في إحدى المدارس:

15) أنظم هذه البيانات في المصفوفة S ، بحيث تحوي صفوها إنجازات اللاعبين الثلاثة، ويرتب فيها عدد الأهداف تنازليًّا، ثم أجد قيمة العنصر S_{32} .

16) أجد مجموع عناصر الصف الثاني، ثم أبيّن ما يُمثّل هذا المجموع (إنْ كان له معنى).

17) أجد مجموع عناصر العمود الثالث، ثم أبيّن ما يُمثّل هذا المجموع (إنْ كان له معنى).

الوحدة 1



كهربائيات: تتوّزع 3 مستودعات لإحدى وكالات تجارة الأجهزة الكهربائية في 3 مدن. يوجد في مستودع المدينة الأولى 200 ثلاجة، و380 غسالة، و250 شاشة، و300 مروحة، ويوجد في مستودع المدينة الثانية 160 ثلاجة، و540 غسالة، و290 مروحة، ويوجد في مستودع المدينة الثالثة 120 ثلاجة، و280 غسالة، و400 شاشة، و470 مروحة:

18 أنظم هذه البيانات في مصفوفة تمثل أعمدتها أنواع الأجهزة الكهربائية، ثم أحدد رتبة المصفوفة الناتجة.

19 أجمع عناصر كل صف، ثم أبين ما يمثله هذا المجموع (إن كان له معنى).

20 أجمع عناصر كل عمود، ثم أبين ما يمثله هذا المجموع (إن كان له معنى).

21 أحل المسألة الواردة في بند (مسألة اليوم).

مهارات التفكير العليا



22 تبرير: أبين إذا كانت العبارة الآتية صحيحة دائمًا، أو صحيحة أحياناً، أو غير صحيحة أبداً، ثم أبرر إجابتي.

إذا كان للمصفوفة A والمصفوفة B العدد نفسه من العناصر، فإن $A = B$.

23 مسألة مفتوحة: أنشئ مصفوفة مربعة من الرتبة 3، وأسمّيها A ، بحيث يكون $a_{ij} = a_{ji}$ ، لـ i, j .

24 تبرير: إذا كان عدد عناصر المصفوفة B عدداً أولياً، فماذا يمكن أن تكون رتبتها؟ أبرر إجابتي.

إرشاد: العدد الأولي هو عدد أكبر من 1، وله عاملان فقط، هما: العدد 1، ونفسه.

25 تبرير: إذا كانت المسافة بين إربد وعمّان 88 km، والمسافة بين عمّان والعقبة 324 km، والمسافة بين إربد والعقبة 408 km، فأنشئ مصفوفة رتبتها 3×3 لتمثيل المسافات بين المدن الثلاث، ثم أبرر إجابتي.

26 تحدّ: أكتب المصفوفة B ، حيث: $b_{ij} = 2i - j$ لـ $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ ، $j \in \{1, 2, 3\}$.

27 تحدّ: أجد قيمة كل من x ، y ، و z إذا كانت:

$$\begin{bmatrix} x + 2y & x - y \\ x + y + 3z & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 7 \\ 2 & 10 \end{bmatrix}$$

العمليات على المصفوفات

Operations on Matrices

فكرة الدرس

- جمع المصفوفات، وطرحها، وضربها في عدد ثابت.
- تعرّف خصائص العمليات على المصفوفات.



المصطلحات



مسألة اليوم



تمثيل المصفوفة: $A = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.75 \\ 0.6 & 1 \\ 1.5 & 2.5 \end{bmatrix}$ أسعار البيع (بالدينار) لثلاثة

مشروبات (شاي، قهوة، عصير) بأكواب صغيرة وأخرى كبيرة في أحد الأكشاك. وقد قرر صاحب الكشك رفع الأسعار بما نسبته 20%، نظراً إلى زيادة التكاليف. ما المصفوفة التي تمثل الأسعار الجديدة؟

جمع المصفوفات وطرحها

يمكن جمع مصفوفتين (adding two matrices) أو طرحهما (subtracting two matrices) إذا وفقط إذا كانت لهما الرتبة نفسها، وذلك بجمع العناصر المُتناظرة في المصفوفتين في حالة الجمع، وطرح هذه العناصر في حالة الطرح.

جمع المصفوفات وطرحها

مفهوم أساسى

بالكلمات: إذا كان A, B مصفوفتين من الرتبة $n \times n$, فإن $A + B$ مصفوفة من الرتبة $m \times n$, وكل عنصر فيها هو مجموع العنصرين اللذين يناظرانه في هاتين المصفوفتين. وبالمثل، فإن $A - B$ مصفوفة من الرتبة $n \times n$, وكل عنصر فيها يساوي ناتج طرح العنصرين المُناظرين له في المصفوفة A والمصفوفة B .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{إذا كان:}$$

$$A \pm B = \begin{bmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \cdots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \cdots & a_{2n} \pm b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} \pm b_{m1} & a_{m2} \pm b_{m2} & \cdots & a_{mn} \pm b_{mn} \end{bmatrix}$$

الوحدة 1

مثال 1

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -1 & -5 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 0 \\ -7 & 6 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 7 & 6 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \\ -9 & 1 \end{bmatrix}$$

إذا كان: فأجد ناتج كل ممّا يأتي (إن أمكن):

1) $A + C$

بما أن A و C من الرتبة نفسها (الرتبة 3×2), فإنه يمكن جمعهما.

$$\begin{aligned} A + C &= \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -1 & -5 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 7 & 6 \end{bmatrix} && \text{بالتعميض} \\ &= \begin{bmatrix} 2+3 & 4+(-1) & 6+2 \\ -1+4 & -5+7 & 4+6 \end{bmatrix} && \text{بجمع العناصر المُتناظرة} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & 3 & 8 \\ 3 & 2 & 10 \end{bmatrix} && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

أتعلم

إذا كان: $A = B + C$
فإن: $a_{ij} = b_{ij} + c_{ij}$

2) $A + B$

بما أن A و B من رتبتين مختلفتين، فلا يمكن جمعهما.

3) $B - D$

بما أن B و D من الرتبة نفسها (الرتبة 2×3), فإنه يمكن إيجاد $B - D$.

$$\begin{aligned} B - D &= \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 0 \\ -7 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \\ -9 & 1 \end{bmatrix} && \text{بالتعميض} \\ &= \begin{bmatrix} 5-2 & -2-4 \\ 3-5 & 0-3 \\ -7-(-9) & 6-1 \end{bmatrix} && \text{بطرح العناصر المُتناظرة} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي

أستعمل المصفوفات الواردة في المثال السابق لإيجاد ناتج كل ممّا يأتي (إن أمكن):

a) $C - A$

b) $D + B$

c) $C + D$

ضرب المصفوفة في عدد ثابت

عند ضرب المصفوفة في عدد ثابت (scalar multiplication)، فإن ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في هذا العدد الثابت.

ضرب المصفوفة في عدد ثابت

مفهوم أساسي

بالكلمات: إذا كان A مصفوفة رتبتها $m \times n$ ، وكان k عددًا ثابتاً، فإن kA مصفوفة رتبتها $m \times n$ ، وكل عنصر فيها يساوي العنصر المُناظِر له في المصفوفة A مضروباً في k .

$$إذا كان: A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$بالمعنى: kA = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

مثال 2

$$إذا كان: 5C = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$$

بالتعریض

$$5C = 5 \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$$

بضرب كل عنصر في العدد 5

$$= \begin{bmatrix} 5(-2) & 5(7) \\ 5(3) & 5(4) \\ 5(6) & 5(5) \end{bmatrix}$$

بالتبسيط

$$= \begin{bmatrix} -10 & 35 \\ 15 & 20 \\ 30 & 25 \end{bmatrix}$$

أتعلم

تعلّمتُ سابقاً أنَّ الضرب في عدد صحيح موجب هو جمع متكرّر؛ فإذا كان A مصفوفة، فإنَّ $3A$ يُكافيء $.A+A+A$.

أتحقق من فهمي

إذا كان: $D = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 \\ 7 & -2 & 1 \\ 8 & 10 & 6 \end{bmatrix}$, فأجد كُلّاً ممّا يأتي:

a) $3D$

b) $-2D$

c) $1.5D$

خصائص العمليات على المصفوفات

إنَّ أغلب خصائص العمليات على الأعداد الحقيقية تكون أيضًا صحيحة على المصفوفات. وفي ما يأتي ملخص لهذه الخصائص.

خصائص العمليات على المصفوفات

مفهوم أساسي

إذا كان C, A, B ثالث مصفوفات لها الرتبة نفسها، وكان k, h عددين حقيقيين، فإنَّ:

1. $A + B = B + A$

الخاصية التبديلية لجمع المصفوفات

2. $(A + B) + C = A + (B + C)$

الخاصية التجميعية لجمع المصفوفات

3. $k(A + B) = kA + kB$

خاصية توزيع الضرب في ثابت

يمكن إجراء عمليات متعددة الخطوات على المصفوفات، ويكون ترتيب هذه العمليات مشابهاً لترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية.

أتذكر

المسألة المتعددة الخطوات هي مسألة تحتاج إلى أكثر من عملية رياضية لحلها، مثل: الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة.

مثال 3

إذا كان: $3A + 2B - 5C$, فأجد $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -8 & 1 \end{bmatrix}$

$$3A + 2B - 5C = 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 12 & 5 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -8 & 1 \end{bmatrix}$$

بالتعويض

$$= \begin{bmatrix} 3(1) & 3(2) \\ 3(4) & 3(3) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2(0) & 2(8) \\ 2(12) & 2(5) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5(4) & 5(7) \\ 5(-8) & 5(1) \end{bmatrix}$$

بضرب كل عنصر في الثابت

$$= \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 12 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 16 \\ 24 & 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 20 & 35 \\ -40 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{بالتبسيط}$$

$$= \begin{bmatrix} 3+0-20 & 6+16-35 \\ 12+24-(-40) & 9+10-5 \end{bmatrix} \quad \text{بجمع العناصر المُتناظرة وطرحها}$$

$$= \begin{bmatrix} -17 & -13 \\ 76 & 14 \end{bmatrix} \quad \text{بالتبسيط}$$

أذكّر

أُجري العمليات الحسابية
بحسب أولويات العمليات.

أتحقق من فهمي

إذا كان: $E = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}$, $F = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix}$, $G = [3 \ 0 \ 7]$, $H = [6 \ -4 \ 9]$
ما يأتي (إِنْ أَمْكَنْ):

- a) $4E - 3F$ b) $2G + 6F$ c) $5(G + H)$

يمكن استعمال العمليات على المصفوفات لحل مسائل حياتية.

مثال 4 : من الحياة



تجارة: لدى إحدى الشركات التجارية فرعان في مدينة عمّان، وفرع آخران في مدينة إربد. إذا مثّلت المصفوفة A والمصفوفة B مُعَدّل المبيعات والأرباح اليومية من الأدوات الكهربائية (بمئات الدنانير) في كُلّ من فرعين هاتين المدينتين على الترتيب، فأجد المصفوفة C التي تُمثّل مُعَدّل المبيعات والأرباح الشهرية لفروع الشركة في المدينتين معاً.

$$A = \begin{bmatrix} 56 & 4 \\ 45 & 3.5 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{الأرباح} & \text{المبيعات} \\ \text{عمان 1} & \\ \text{عمان 2} & \end{matrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 48 & 3 \\ 66 & 9 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{الأرباح} & \text{المبيعات} \\ \text{إربد 1} & \\ \text{إربد 2} & \end{matrix}$$

الخطوة 1: أجمع المصفوفة A والمصفوفة B .

$$A + B = \begin{bmatrix} 56 & 4 \\ 45 & 3.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 48 & 3 \\ 66 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{بالتعويض}$$

$$= \begin{bmatrix} 104 & 7 \\ 111 & 12.5 \end{bmatrix} \quad \text{بجمع العناصر المُتناظرة}$$

الوحدة 1

الخطوة 2: أضرب المصفوفة الناتجة من الفرع السابق في 30 (بافتراض أنَّ الشهر 30 يوماً).

$$C = 30(A + B) = 30 \begin{bmatrix} 104 & 7 \\ 111 & 12.5 \end{bmatrix} \quad \text{بضرب } (A+B) \text{ في } 30$$

$$= \begin{bmatrix} 3120 & 210 \\ 3330 & 375 \end{bmatrix} \quad \text{بضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في } 30$$

إذن، المصفوفة C التي تمثل مُعَدَّل المبيعات والأرباح الشهيرية لفروع الشركة في المدينتين

$$\cdot \begin{bmatrix} 3120 & 210 \\ 3330 & 375 \end{bmatrix} \quad \text{معاً بمئات الدنانير هي:}$$

أفكِّر

هل توجد طريقة أخرى لحل المسألة؟

أتحقق من فهمي

زراعة: يملك كل من راشد وحمد مزرعة في الأغوار، ومزرعة أخرى في المفرق. إذا مثلَّت المصفوفة A مُعَدَّل الإنتاج اليومي (بالكيلوغرام) لمزرعتيَّهما في الأغوار من البندورة والباذنجان والفلفل، ومثلَّت المصفوفة B مُعَدَّل الإنتاج اليومي لمزرعتيَّهما في المفرق من الأصناف نفسها، فأجد المصفوفة C التي تمثل مُعَدَّل الإنتاج الأسبوعي (بالكيلوغرام) لمزرعتي راشد وحمد في الموقعين معاً.

$$A = \begin{bmatrix} 200 & 500 & 100 \\ 260 & 430 & 245 \end{bmatrix}, \quad \begin{matrix} \text{بندورة} & \text{باذنجان} & \text{فلفل} \\ \text{راشد} & \text{حمد} \end{matrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 130 & 100 & 300 \\ 240 & 300 & 175 \end{bmatrix}, \quad \begin{matrix} \text{بندورة} & \text{باذنجان} & \text{فلفل} \\ \text{راشد} & \text{حمد} \end{matrix}$$

أتدرب وأحل المسائل

أجد ناتج كل مما يأتي (إِنْ أَمْكِنَ):

1. $\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 4 & 6 \\ 10 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 8 \\ 5 & 0 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 8 \\ 9 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 8 & -2 \\ 5 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 9 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 12 & -3 \\ 22 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6 & -5 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}$

$$5 \quad \begin{bmatrix} 25 & 10 & 13 \\ 0 & 7 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -31 & 26 & -9 \\ 7 & 2 & 12 \end{bmatrix}$$

$$6 \quad [32 \quad -12 \quad 8] - [-6 \quad 43 \quad -7]$$

$$7 \quad 3 \begin{bmatrix} 9 & -2 \\ 4 & 1 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$$

$$8 \quad \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 15 & -21 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}$$

$$9 \quad -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 12 & -32 \\ 9 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

$$10 \quad 2 \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

$$11 \quad -4 \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 6 \\ -2 & 7 & 4 \\ 6 & 3 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 & 6 & 10 \\ 5 & -4 & 1 \\ 8 & -1 & 7 \end{bmatrix} \right)$$

$$12 \quad 2 \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & -1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ -3 & 2 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$$

إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -5 \\ 3 & 2 & 8 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -9 \end{bmatrix}$ ، فأجد كُلّاً مما يأتي (إنْ أمكن):

$$13 \quad 4A + 3B$$

$$14 \quad 2C - 3A$$

$$15 \quad B + 1.5B$$

$$16 \quad 3B + 2C$$

$$17 \quad 2A - C$$

$$18 \quad 4A + 3C$$



رياضة: لدى محل تجهيزات رياضية فرع في مدينة الكرك، وفرع آخر في مدينة الطفيلة. إذا مثلت المصفوفة A عدد البدلات الرياضية التي باعها الفرعان من جميع المقاسات (صغيرة، متوسطة، كبيرة) في شهر نيسان عام 2024 م، ومثلت المصفوفة B عدد البدلات التي باعها الفرعان من المقاسات الثلاثة في شهر نيسان عام 2023 م، فأجد المصفوفة التي تمثل ما باعه كُلّ من الفرعين في الشهرين معاً.

$$A = \begin{bmatrix} 20 & 15 & 10 \\ 12 & 30 & 17 \end{bmatrix}, \quad \begin{matrix} \text{كبير} & \text{متوسط} & \text{صغير} \\ \text{الكرك} & \text{الطفيلة} \end{matrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 18 & 42 & 23 \\ 20 & 25 & 21 \end{bmatrix}, \quad \begin{matrix} \text{كبير} & \text{متوسط} & \text{صغير} \\ \text{الكرك} & \text{الطفيلة} \end{matrix}$$

الوحدة 1

	أجهزة حاسوب	طاولات	مقاعد
المختبر A	15	20	30
المختبر B	20	25	40

20 مدارس: يُبيّن الجدول المجاور محتويات مختبرى الحاسوب في إحدى المدارس عام 2024 م. تُخطط إدارة المدرسة لزيادة هذه المحتويات بما نسبته 40%. أكتب مصفوفة تمثل ما يجب شراؤه للمختبرين، ومصفوفة أخرى تمثل محتويات المختبرين بعد عملية الشراء.

21 أجد قيمة كل من x , y , z التي تتحقق المعادلة الآتية:

$$2 \begin{bmatrix} x & 3 \\ 6 & y \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x & 6 \\ z & -2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} z & 3 \\ 0 & x \end{bmatrix}$$

22 أحل المسالة الواردة في بند (مسألة اليوم).

مهارات التفكير العليا

23 تبرير: أحدد إذا كانت العبارة الآتية صحيحة أحياناً، أو صحيحة دائماً، أو غير صحيحة أبداً، ثم أبرر إجابتي:

إذا كان عدد عناصر المصفوفة A مُساوِياً لعدد عناصر المصفوفة B ، فإنَّه يُمكِّن إيجاد $A + B$.

24اكتشف الخطأ: ما الخطأ في الحل الآتي:

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 11 & 0 \\ 8 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

25 مسألة مفتوحة: أكتب المصفوفتين A , B ، بحيث يكون: $3A + 2B = \begin{bmatrix} 12 & 8 & 10 \\ 6 & -5 & 11 \end{bmatrix}$

26 تحدّ: أجد المصفوفتين X , Y ، اللتين تتحققان المعادلتين الآتتين:

$$X - 2Y = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 9 \end{bmatrix}, 3X + 4Y = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ -31 & 12 \end{bmatrix}$$

ضرب المصفوفات

Multiplying Matrices

فكرة الدرس

- إيجاد ناتج ضرب مصفوفتين.
- تعرُّف خصائص ضرب المصفوفات.



مسألة اليوم

دَوَّنت سلمى في الجدول المجاور عدد ما باعهه في متجرها من أكواب حافظة للحرارة مُتعددة الحجوم (كبيرة، مُتوسطة، صغيرة) في أحد الأيام. كذلك دَوَّنت طريقة بيع هذه الأكواب؛

حجم الكوب	كبير	متوسط	صغير
عبر شبكة الإنترنت	5	4	2
من المتجر	3	5	9

وهي إماً مباشرة من المتجر، وإماً عبر شبكة الإنترنت. إذا كان سعر الكوب الكبير JD 4.5، وسعر الكوب المُتوسط JD 4، وسعر الكوب الصغير JD 3.5، فكيف يُمكِّن استعمال ضرب المصفوفات لإيجاد المبلغ الذي حصلت عليه سلمى من بيع الأكواب بكلتا طرفيتي البيع؟

شروط ضرب المصفوفات

يُمكِّن ضرب مصفوفتين إذا وفقط إذا كان عدد أعمدة المصفوفة الأولى مُساوِيًّا لعدد صفوف المصفوفة الثانية. وعند ضرب المصفوفة A التي رتبتها $m \times n$ في المصفوفة B التي رتبتها

$m \times r$ ، فإنَّ رتبة المصفوفة الناتجة $B \times A$ هي $n \times r$ ،

$$\begin{array}{ccc}
 A & \times & B \\
 m \times n & & n \times r \\
 \uparrow & \uparrow & \uparrow \\
 \text{متساويان} & & \text{متساويان} \\
 \hline
 AB & & r
 \end{array}$$

رموز رياضية

يُمكِّن استعمال أيِّ رمز ممَّا يأتي للدلالة على ضرب المصفوفة A في المصفوفة B ؛ $A \times B$, AB

مثال 1

إذا كانت $A_{2 \times 3}$ ، وكانت $B_{2 \times 2}$ ، وكانت $C_{3 \times 2}$ ، فأُبَيِّن إذا كانت عملية الضرب في كلِّ ممَّا يأتي مُمكِّنة أم لا. وإنْ كانت كذلك، أُحدِّد رتبة مصفوفة الضرب الناتجة:

1 AB

$$\begin{array}{ccc}
 A & \times & B \\
 2 \times 3 & & 2 \times 2 \\
 \uparrow & \uparrow & \uparrow \\
 \text{غير} & & \text{متساوين} \\
 \hline
 \text{متساوين} & & 2
 \end{array}$$

بما أنَّ عدد أعمدة المصفوفة A لا يساوي عدد صفوف المصفوفة B ، فإنَّه لا يُمكِّن إيجاد $A \times B$.

الوحدة 1

2 AC

$$\begin{array}{ccc}
 A & \times & C \\
 2 \times 3 & & 3 \times 2 \\
 \uparrow & \text{متساويان} & \uparrow \\
 & & \text{رتبة} \\
 & & A \times C
 \end{array} = A \times C$$

بما أنَّ عدد أعمدة المصفوفة A يساوي عدد صفوف المصفوفة C ، فإنَّه يُمكن إيجاد AC و تكون رتبتها: 2×2

أفَكَرْ

متى يُمكن ضرب
مصفوفة في نفسها؟

أتحقق من فهمي

إذا كانت $A_{2 \times 2}$ ، وكانت $B_{3 \times 2}$ ، وكانت $C_{2 \times 3}$ ، فأبَيْن إذا كانت عملية الضرب في كلِّ ممَّا يأتي مُمكِنة أم لا. وإنْ كانت كذلك، أُحدِّد رتبة مصفوفة الضرب الناتجة:

a) AB **b) BC** **c) CA**

ضرب المصفوفات

تختلف عملية ضرب مصفوفتين عن عملية جمعهما وطرحهما؛ إذ لا تُضرب العناصر المُتَنَاظِرة في بعضها كما في عملية جمع المصفوفات وطرحها.

ضرب المصفوفات

مفهوم أساسى

إذا كان A مصفوفة من الرتبة $n \times m$ ، وكان B مصفوفة من الرتبة $p \times n$ ، فإنَّ العنصر الواقع في الصف i والعمود j في المصفوفة $A \times B$ يساوي مجموع نواتج ضرب عناصر الصف i من المصفوفة A في العناصر المُنَاظِرة لها في العمود j من المصفوفة B .

بالكلمات:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}$$

بالرموز:

$$c_{ij} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{in} b_{nj}, \text{ حيث: } C = AB = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix}$$

مثال 2

$$AB, B = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \text{، فإذا كان: } A = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 \\ -3 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

أتحقق من إمكانية عملية الضرب.

الخطوة 1:

رتبة المصفوفة A هي 3×2 ، ورتبة المصفوفة B هي 2×3 . وبما أنَّ عدد أعمدة المصفوفة A يساوي عدد صفوف المصفوفة B ، فإنَّه يُمكِّن إيجاد المصفوفة AB ، وتكون رتبتها: 2×2 .

أضرب عناصر الصف الأوَّل من المصفوفة A في عناصر العمود الأوَّل من المصفوفة B بالترتيب، ثمَّ أجمع النواتج، ثمَّ أدون النتيجة في الصف الأوَّل والعمود الأوَّل من المصفوفة AB .

الخطوة 2:

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 \\ -3 & 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 4 + (-5) \times 0 + 4 \times 2 \\ \dots \end{bmatrix}$$

أضرب عناصر الصف الأوَّل من المصفوفة A في عناصر العمود الثاني من المصفوفة B بالترتيب، ثمَّ أجمع النواتج، ثمَّ أدون النتيجة في الصف الأوَّل والعمود الثاني من المصفوفة AB .

الخطوة 3:

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 \\ -3 & 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 1 \times (-5) + (-5) \times (-1) + 4 \times 0 \\ \dots \end{bmatrix}$$

أضرب عناصر الصف الثاني من المصفوفة A في عناصر العمود الأوَّل من المصفوفة B بالترتيب، ثمَّ أجمع النواتج، ثمَّ أدون النتيجة في الصف الثاني والعمود الأوَّل من المصفوفة AB .

الخطوة 4:

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 \\ -3 & 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ -3 \times 4 + 4 \times 0 + 7 \times 2 & \dots \end{bmatrix}$$

الوحدة 1

أَضْرِبِ عِنَاصِرَ الصُّفَفِ الثَّانِيِّ مِنِ الْمَصْفُوفَةِ A فِي عِنَاصِرِ الْعُمُودِ الثَّانِيِّ مِنِ الْمَصْفُوفَةِ B بِالْتَّرْتِيبِ، ثُمَّ أَجْمِعِ النَّوَاطِحِ، ثُمَّ أُدْوِنِ النَّتْيُودُ فِي الصُّفَفِ الثَّانِيِّ وَالْعُمُودِ الثَّانِيِّ مِنِ الْمَصْفُوفَةِ AB .

الخطوة 5:

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 \\ -3 & 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 2 & -3 \times (-5) + 4 \times (-1) + 7 \times 0 \end{bmatrix}$$

إذن، المصفوفة AB الناتجة هي:

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 \\ -3 & 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 2 & 11 \end{bmatrix}$$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

إذا كان: $MN = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$ ، $M = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ (a) فأجد: $.MN$ ، وكان:

إذا كان: $CD = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ ، $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (b) فأجد: $.CD$ ، وكان:

يُمْكِنُ استعمال ضرب المصفوفات في مواقف حياتية مُتَعَدِّدة.

إرشاد

يُمْكِنُ دمج الخطوات (1-4) معاً، ثم كتابة نتيجة الضرب مباشرة من دون وصف العمليات كما في المثال الثالث والمثال الرابع.

معلومة



أمكن لجهاز الحاسوب عام 1997م تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في هزيمته بطل العالم في لعبة الشطرنج غاري كاسباروف. وقد شكل هذا الحدث نقطة تحول في حقل الذكاء الاصطناعي، وأظهر كيف يمكن لأجهزة الحاسوب أن تتفوق على العقل البشري.

مثال 3 : من الحياة

الفريق	ربع	تعادل
A	5	4
B	6	3
C	4	5

شطرنج: تنافست ثلاثة فرق في البطولة النهائية لنادي الشطرنج، وقد دُوِّنَ عدد مَرَّات الفوز والتعادل لهذه الفرق في الجدول المجاور. إذا علمت أنَّ فوز الفريق في المباراة الواحدة يعني حصوله على 3 نقاط، وأنَّ تعادله يعني حصوله على نقطة واحدة، فأستعمل المصفوفات في إيجاد عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق لتحديد الفريق الفائز.

الخطوة 1: أكتب مصفوفة لكلٍ من النتائج والنقاط.

مصفوفة النتائج	مصفوفة النقاط
$M = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$	$N = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

الخطوة 2: أضرب مصفوفة النتائج في مصفوفة النقاط.

$MN = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$	بتعريض المصفوفة M ، والمصفوفة N
$= \begin{bmatrix} 5 \times 3 + 4 \times 1 \\ 6 \times 3 + 3 \times 1 \\ 4 \times 3 + 5 \times 1 \end{bmatrix}$	بضرب المصفوفتين بالتبسيط
$= \begin{bmatrix} 19 \\ 21 \\ 17 \end{bmatrix}$	

إذن، تمثل $\begin{bmatrix} 19 \\ 21 \\ 17 \end{bmatrix}$ مصفوفة النقاط التي حصل عليها كل فريق؛ ما يعني أنَّ الفريق A أحرز 19 نقطة، والفريق B أحرز 21 نقطة، والفريق C أحرز 17 نقطة.

ومن ثَمَّ، فإنَّ الفريق B هو الفريق الفائز؛ لأنَّه حصل على أكبر عدد من النقاط.

أتحقق من فهمي

الفريق	ربح	تعادل	خسارة
A	1	0	3
B	3	1	0
C	1	1	2

كرة قدم: يُبيّن الجدول المجاور نتائج 3 فرق لكرة القدم بعدما لعب كلٌ منها 4 مباريات. إذا علمتُ أنَّ فوز الفريق في المباراة الواحدة يعني حصوله على 3 نقاط، وأنَّ تعادله يعني حصوله على نقطة واحدة، وأنَّ خسارته يعني عدم حصوله على أيِّ نقاط، فأستعمل المصفوفات في إيجاد عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق

لتحديد الفريق الفائز.

خصائص ضرب المصفوفات

يتحقق ضرب المصفوفات بعض خصائص ضرب الأعداد الحقيقة. وفي ما يأتي بعض خصائص الضرب التي تتحقق في المصفوفات.

خصائص ضرب المصفوفات

مفهوم أساسي

تُعدُّ الخصائص الآتية صحيحة لأيٌّ ثلاثة مصفوفات: R, S, T ، وأيٌّ عدد حقيقي c ؛ شرط أن تكون عمليتا الجمع والضرب معرفتين في جميع الحالات الآتية:

$$1. (RS)T = R(ST)$$

خاصية التجميع لضرب المصفوفات

$$2. c(RS) = (cR)S = R(cT)$$

خاصية التجميع لضرب المصفوفات في عدد حقيقي

$$3. R(S + T) = RS + RT$$

خاصية توزيع ضرب المصفوفات على جمعها من اليسار

$$4. (R + S)T = RT + ST$$

خاصية توزيع ضرب المصفوفات على جمعها من اليمين

أتعلم

الخاصية التبديلية لا تتحقق في ضرب المصفوفات؛ أي إنّ $BA \neq AB$ حيث A و B مصفوفتان. بالرغم من ذلك، فقد توجد حالات خاصة لمصفوفتين A و B تكون $AB = BA$ فيها.

مثال 4

إذا كان: $P = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $R = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ مما يأتي:

$$1. P(Q + R)$$

$$P(Q+R) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \left(\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

بتعويض المصفوفات
 R, Q ، و P

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

بجمع المصفوفة Q ، والمصفوفة R

$$= \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

بالضرب، والتبسيط

أتعلم

أعيد حلَّ الفرع 1 من المثال 5 بطريقة أخرى، ثم أقارِن بين الإجابتين.

2 $k(PQ)$

$$k(PQ) = 3 \times \left(\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right)$$

بتعويض المصفوفة P والمصفوفة Q ، والثابت k

$$= 3 \times \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

بضرب المصفوفة Q ، والمصفوفة R

$$= \begin{bmatrix} 18 & 24 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}$$

بضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في 3

أتعلم

أعيد حل الفرع 2 من المثال 5 بطريقة أخرى، ثم أقارن بين الإجابتين.

3 $(PQ)R$

$$(PQ)R = \left(\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right) \times \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

بتعويض المصفوفات P و R ، و Q

$$= \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

بضرب المصفوفة Q ، والمصفوفة P

$$= \begin{bmatrix} 32 & -4 \\ 8 & -2 \end{bmatrix}$$

بضرب المصفوفة الناتجة في المصفوفة R ، والتبسيط

أفكّر

هل $PQ = QP$ ؟ أبّرر إجابتي.

أتحقق من فهمي

إذا كان: $m = -4$, $F = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, $G = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $H = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

مّا يأتي:

a) $(F+G)H$

b) $(FG)H$

c) $G(mH)$



إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0.5 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & -1.5 & -1 \\ 0.5 & 0 & 2 \\ 1.5 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, فأيّن إذا كانت

عملية الضرب في كلٌ مما يأتي ممكّنة أم لا. وإنْ كانت كذلك، أُحدّد رتبة مصفوفة الضرب الناتجة:

1 AB

2 BC

3 DC

4 BA

5 CD

6 BB

7 CB

8 BCD

إذا كان: $AB = C$, وكانت رتبة المصفوفة A هي: 3×4 , ورتبة المصفوفة C هي: 5×3 , فما رتبة المصفوفة B ؟ 9

أجد ناتج كلٌ مما يأتي (إنْ أمكن):

10 $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

11 $\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \times [2 \ 5 \ 3]$

12 $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 5 \\ 4 & 7 & 2 \end{bmatrix}$

13 $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

14 $[8 \ 10 \ -7] \times \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}$

15 $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 9 & -5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -5 & 6 & -4 \\ 0 & 6 & -3 \end{bmatrix}$

16 $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \times [-1 \ 4]$

17 $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & -14 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$

18 $\left(\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \right)^2$

19 $\left(\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \right)^2$

إرشاد: إذا كان A مصفوفة، وكان n عدداً صحيحاً موجباً، فإنَّ A^n مصفوفة تُعبّر عن ضرب A في نفسها n مرّة.

	الطراز X	الطراز XD	الطراز R
المدينة A	12	10	0
المدينة B	4	4	20
المدينة C	8	9	12

20 صناعة سيارات: تتوزع 3 مصانع لإحدى شركات صناعة

السيارات في 3 مدن، ويبين الجدول المجاور عدد ما يُتّجه كل مصنع يومياً من 3 طرازات للسيارات. إذا كان ربح الشركة في كل سيارة من الطراز X هو JD1000، ومن

الطراز XD هو JD 2000، ومن الطراز R هو JD1500، فأستعمل ضرب المصفوفات في إيجاد ربح كل مصنع يومياً من جميع طرازات السيارات (بافتراض أن جميع السيارات المُنتَجة مبيعة).

$$. AB = AC, A = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \quad 21 \quad \text{إذا كان:}$$

$$. \text{إذا كان: } P = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 9 & -5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

22 $(QR)P$

23 $n(PQ)$

24 $R(PQ)$

25 $(nR)P$

$$. \text{إذا كان: } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ x & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ y & 4 \end{bmatrix}, \text{ حيث } x, y \text{ عددين صحيحان موجبان، فأجد:}$$

26 $.x, y \text{ بدلالة } AB$

27 $.x, y \text{ بدلالة } BA$

28 $. \text{أصغر قيمة صحيحة موجبة لـ } x, \text{ و } y \text{ التي تجعل } AB = BA = \text{لـ } .$

الوحدة 1

مُكَسَّرات: يُعَبِّئُ مَحْمُص خليطًا من المُكَسَّرات والفواكه المُجفَّفة في نوعين من الأكياس كما في الجدول الآيس، ويُيَسِّرُ الجدول الآيس عدد وحدات البروتين والكربوهيدرات والدهون في الغرام الواحد من المُكَسَّرات والفواكه المُجفَّفة. أستعمل ضرب المصفوفات لإيجاد عدد وحدات البروتين والكربوهيدرات والدهون في كل نوع.

	مُكَسَّرات (g)	فواكه مُجفَّفة (g)
الكيس 1	150	150
الكيس 2	200	100

	بروتين	كربوهيدرات	دهون
مُكَسَّرات	20	21	52
فواكه مُجفَّفة	3	65	1

أَحْلُّ الْمَسْأَلَة الْوَارَدَة فِي بَنْد (مَسْأَلَة الْيَوْم). 30

مهارات التفكير العليا

اكتشف الخطأ: حَسَبَت كُلُّ مِنْ رَنَا وَعَبِيرَ العَنْصَر c_{23} فِي الْمَسْفُوفَة: 31

كما يأتي:

إجابة رنا

$$c_{23} = -8 - 18 + 20 \\ = -6$$

إجابة عبير

$$c_{23} = 12 - 8 - 18 \\ = -14$$

أَيُّهُمَا إجابتُهَا صَحِيحة؟ أُبَرِّرُ إجابتِي.

تَبَرِّير: إِذَا كَانَ A, B مَسْفُوفَتَيْن مُرْبَعَتَيْن مِنَ الرَّتْبَةِ n ، فَلِمَاذَا $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ 32

مسألة مفتوحة: أَكْتُبِ الْمَسْفُوفَتَيْن A, B غَيْرِ الصَّفَرِيَتَيْن، بِحِيثِ يَكُون $AB = BA$ 33

تَحْدِيد: أَجِدْ قِيمَةً كُلَّ مِنْ e, f, g, h الَّتِي تَجْعَلُ الْمَعَادِلَةَ الْآتِيَةَ صَحِيحةً: 34

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 12 \\ 6 & 15 \end{bmatrix}$$

المُحدّدات وقاعدة كريمر

Determinants and Cramer's Rule

فكرة الدرس

- حساب مُحدّدات مصفوفات مُربّعة من الرتبة الثانية والرتبة الثالثة.
- استعمال قاعدة كريمر لحل أنظمة مُكونة من معادلتين خطّيين بمتغيرين.
- حساب مساحة مُثلث عُلِّمت إحداثيات رؤوسه باستعمال المُحدّدات.



المصطلحات



المُحدّدة، القُطْرُ الرئيسي، مُحدّدة الدرجة الثانية، مُحدّدة الدرجة الثالثة، مصفوفة المعاملات، قاعدة كريمر.

مسألة اليوم



يُطلق اسم المُثلث الذهبي على واحدة من أهم الوجهات السياحية في جنوب الأردن، وهي المنطقة التي تضم مدينة العقبة ومدينة البتراء ووادي رم. إذا كانت إحداثيات المناطق الثلاث على خريطة للمملكة في مستوى إحداثي، وحدتها 1 km، هي: (0, 0) للعقبة، و(56, 116) للبتراء، و(6, 50) لوادي رم، فاستعمل المُحدّدات لحساب مساحة المُثلث الذي رؤوسه هذه المواقع الثلاثة.

المُحدّدات

المُحدّدة (determinant) للمصفوفة المُربّعة A هي عدد حقيقي يرتبط بالمصفوفة A ، ويرمز إليه بالرمز $|A|$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 & -8 \\ 9 & 8 & 10 \\ -4 & -6 & 7 \end{bmatrix}$$

القطْرُ الرئيسي

يُطلق على مجموعة العناصر المُمتدّة من الزاوية اليسرى العلوية إلى الزاوية اليمنى السفلية في المصفوفة اسم القُطْرُ الرئيسي للمصفوفة (main diagonal).

أتعلم

للمُحدّدة استعمالات عِدّة في الجبر والهندسة، إذ تُستعمل في حل أنظمة المعادلات الخطّية، وحساب مساحة بعض الأشكال الهندسية.

للقُطْر الرئيسي دور أساسى في إيجاد مُحدّدة مصفوفة من الرتبة 2×2 . وفي ما يأتي طريقة إيجاد مُحدّدة المصفوفة ذات الرتبة 2×2 ، أو ما يُسمى مُحدّدة الدرجة الثانية (second order determinant).

الوحدة 1

مُحدّدة الدرجة الثانية

مفهوم أساسي

بالكلمات: يُرمَز إلى مُحدّدة المصفوفة: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ ، وتساوي قيمتها ناتج

ضرب عنصري القُطْر الرئيسي مطروحاً منه ناتج ضرب عنصري القُطْر الآخر.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad \text{بالرموز:}$$

مثال 1

أجد قيمة كُلٌّ من المُحدّدات الآتية:

1) $\begin{vmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 8 \times 5 - 2 \times 6$$

$$= 28$$

باستعمال مُحدّدة الدرجة الثانية

بالتبسيط

أتذكّر

أُجري العمليات الحسابية
بحسب أولويات
العمليات.

2) $\begin{vmatrix} -2 & 7 \\ -1 & 8 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} -2 & 7 \\ -1 & 8 \end{vmatrix} = -2 \times 8 - (-1) \times 7$$

$$= -9$$

باستعمال مُحدّدة الدرجة الثانية

بالتبسيط

3) $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = -1 \times 6 - (-2) \times 3$$

$$= 0$$

باستعمال مُحدّدة الدرجة الثانية

بالتبسيط

أتحقق من فهمي

أجد قيمة كُلٌّ من المُحدّدات الآتية:

a) $\begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 5 & 20 \\ 2 & 8 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}$

يُطلق على مُحدّدة المصفوفة ذات الرتبة 3×3 اسم **مُحدّدة الدرجة الثالثة** (third order determinant)، ويُمكن حساب قيمتها بتوظيف مُحدّدة الدرجة الثانية كما هو مُبيّن أدناه.

مُحدّدة الدرجة الثالثة

مفهوم أساسي

يمكن إيجاد مُحدّدة المصفوفة: $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ باستعمال الطريتين الآتيتين:

الطريقة 1: باستعمال قاعدة الأقطار.

الخطوة 1: أعيد كتابة العمود الأول والعمود الثاني على يمين المُحدّدة.

$$\begin{array}{|ccc|cc|} \hline a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \\ \hline \end{array}$$

الخطوة 2: أجد ناتج ضرب عناصر القطر الرئيس، وثلاثيات العناصر على المُوازيات الحمراء المُبيّنة، ثم أجد مجموعها الكلي.

$$\begin{array}{|ccc|cc|} \hline a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \\ \hline \end{array}$$

الخطوة 3: أجد ناتج ضرب عناصر القطر الآخر، وثلاثيات العناصر على المُوازيات الزرقاء المُبيّنة، ثم أجد مجموعها الكلي.

الخطوة 4: أجد قيمة المُحدّدة بطرح ناتج الخطوة 3 من ناتج الخطوة 2.

الطريقة 2: باستعمال مُحدّدة المصفوفة 2×2

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

مثال 2

$$\begin{vmatrix} -4 & 3 & 6 \\ 6 & 5 & 1 \\ 1 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

أجد قيمة 2×2 باستعمال قاعدة الأقطار، ثم باستعمال مُحدّدة المصفوفة 2×2 .

الطريقة 1: باستعمال قاعدة الأقطار.

الخطوة 1: أعيد كتابة العمود الأول والعمود الثاني على يمين المُحدّدة.

$$\begin{array}{|ccc|cc|} \hline -4 & 3 & 6 & -4 & 3 \\ 6 & 5 & 1 & 6 & 5 \\ 1 & 6 & 3 & 1 & 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|ccc|cc|} \hline -4 & 3 & 6 & -4 & 3 \\ 6 & 5 & 1 & 6 & 5 \\ 1 & 6 & 3 & 1 & 6 \\ \hline \end{array}$$

أتعلم

مفهوم (المُحدّدات) هو مفهوم واسع يرتبط بالمصفوفات المُربّعة من أيّ رتبة. وفي هذا الكتاب، سيقتصر الحديث فقط على مُحدّدات المصفوفات من الرتبة الثانية والرتبة الثالثة.

أتعلم

يمكن إيجاد $|A|$ باستعمال صيغ أخرى، منها:

$$|A| = -d \begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} + e \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} - f \begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix}$$

$$|A| = g \begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} - h \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} + i \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}$$

$$|A| = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - d \begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} + g \begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix}$$

الوحدة 1

الخطوة 2: أجد ناتج ضرب عناصر الأقطار وموازياتها.

$$-4 \times 5 \times 3 = -60$$

$$6 \times 5 \times 1 = 30$$

$$3 \times 1 \times 1 = 3$$

$$-4 \times 1 \times 6 = -24$$

$$6 \times 6 \times 6 = 216$$

$$3 \times 6 \times 3 = 54$$

الخطوة 3: أجد مجموع نواتج الضرب في كل مجموعة.

$$-60 + 3 + 216 = 159$$

$$30 + (-24) + 54 = 60$$

الخطوة 4: أجد قيمة المُحدّدة بطرح المجموع الثاني من المجموع الأول.

$$159 - 60 = 99$$

إذن، قيمة هذه المُحدّدة هي : 99

الطريقة 2: باستعمال مُحدّدة المصفوفة 2×2

$$\begin{vmatrix} -4 & 3 & 6 \\ 6 & 5 & 1 \\ 1 & 6 & 3 \end{vmatrix} = (-4) \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 6 \end{vmatrix}$$

باستعمال مُحدّدة
الدرجة الثالثة

$$= -4(15-6) - 3(18-1) + 6(36-5)$$

باستعمال مُحدّدة
الدرجة الثانية

$$= 99$$

بالتبسيط

إذن، قيمة هذه المُحدّدة هي : 99

أتحقق من فهمي 

أجد قيمة كل مُحدّدة ممّا يأتي باستعمال قاعدة الأقطار، ثمّ باستعمال مُحدّدة المصفوفة 2×2 :

a)
$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 9 \\ -2 & 3 & 4 \\ -5 & 7 & 2 \end{vmatrix}$$

b)
$$\begin{vmatrix} 0 & -5 & -1 \\ 4 & 1 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

أفكّر

أعيد حلّ المسألة
باستعمال مُحدّدة
المصفوفة 2×2 ، وذلك
باختيار عناصر الصف
الثاني، ثمّ أقارن بين
الإجابتين.

حساب مساحة المثلث باستعمال المحددات

يمكن حساب مساحة مثلث علماً بـ إحداثيات رؤوسه في المستوى الإحداثي باستعمال القاعدة الآتية.


مساحة مثلث مرسوم في المستوى الإحداثي باستعمال المحددات

مفهوم أساسي

مساحة المثلث الذي إحداثيات رؤوسه: $X(x_1, y_1), Y(x_2, y_2), Z(x_3, y_3)$, هي نصف القيمة المطلقة للعدد A , حيث:

$$A = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

إرشاد
تُستعمل القيمة المطلقة للعدد A , لأن المساحة لا تكون سالبة.



مثال 3: من الحياة

خرائط: يظهر في المستوى الإحداثي المجاور مُخطط لجزيرة على شكل مثلث. إذا كانت كل وحدة في المستوى الإحداثي تمثل 1 km . فأجد مساحة الجزيرة.

الخطوة 1: أجد قيمة المقدار A .

بعويض

$$x_1 = 0, x_2 = 5, x_3 = 24$$

$$y_1 = 0, y_2 = 16, y_3 = 12$$

أتعلم
لا تتأثر مساحة المثلث باختلاف ترتيب الرؤوس في المحددة، أو بتبادل الصور فيها.

$$A = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 5 & 16 & 1 \\ 24 & 12 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 0(16-12) - 0(5-24) + 1(60-384)$$

باستعمال محددة الدرجة الثالثة

$$= -324$$

بالتبسيط

الخطوة 2: أجد مساحة المثلث (الجزيرة).

$$\text{Area} = \frac{1}{2} |A|$$

صيغة مساحة مثلث مرسوم في المستوى الإحداثي باستعمال المحددات

إرشاد

إذا كانت النقاط الثلاث على استقامة واحدة، فإن $|A| = 0$.

$$= \frac{1}{2} |-324|$$


$$A = -324$$

$$= 162$$

لإيجاد القيمة المطلقة، والتبسيط

أتذكّر

إذا كان b عدداً حقيقياً، فإن $|b|$ هو القيمة المطلقة للعدد b . أمّا إذا كان B مصفوفة مربعة، فإن $|B|$ هو مُحدّدة تلك المصفوفة.



أتحقق من فهمي

خرائط: يظهر في المستوى الإحداثي المجاور إحداثيات كل من مدينة الزرقاء، ومدينة الرمثا، ومدينة المفرق. إذا كانت كل وحدة في المستوى الإحداثي تمثل 10 km ، فأجد مساحة المنطقة التي رؤوسها هذه المدن الثلاث.

حل أنظمة المعادلات والمحددات

يمكن استعمال المحددات لحل أنظمة معادلات خطية بمتغيرين، كل منها مكتوب في صورة: $ax + by = c$. أُنشئ أولاً مصفوفة عناصرها معاملات المتغيرين x و y ، وهي تُسمى **مصفوفة المعاملات** (coefficient matrix)، ثم أحسب مُحدّدتها؛ فإذا كانت المُحدّدة لا تساوي صفرًا، فإنه يوجد حلٌّ وحيد للنظام. أمّا إذا كانت المُحدّدة تساوي صفرًا، فإنما ألا يكون للنظام حلٌّ، وإما أن يكون له عدد لانهائي من الحلول. وفي حال لم تكن قيمة مُحدّدة مصفوفة المعاملات صفرًا، فيمكن استعمال **قاعدة كريمر** (Cramer's rule) لإيجاد حلٌّ النظام كما هو مُبيّن أدناه.

قاعدة كريمر

مفهوم أساسي

إذا كان: $C = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ مصفوفة المعاملات للنظام:

وكان: $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ ، حيث $D \neq 0$ ، فإن حلَّ النظام هو:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{D}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{D}$$

أتعلم

سُمِّيت المُحدّدات بهذا الاسم؛ لأنَّها تُحدّد إذا كان لنظام من المعادلات حلٌّ وحيداً لا.

مثال 4

أَحْلُّ نَسَمَةِ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّ بِاستِعْمَالِ قَاعِدَةِ كَرِيمَرِ (إِنْ أَمْكَنْ).

$$3x + 5y = 1$$

$$2x + y = -4$$

الخطوة 1: أَجِدْ مُحَدَّدَةَ مَصْفُوفَةَ الْمَعَامِلَاتِ.

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

مَصْفُوفَةُ الْمَعَامِلَاتِ

$$D = |C| = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

مُحَدَّدَةُ مَصْفُوفَةِ الْمَعَامِلَاتِ

$$= 3(1) - 2(5) = -7$$

بِالْتَّبَسِيتِ

بِمَا أَنَّ $D \neq 0$, فَإِنَّهُ يَوْجِدُ حَلًّا وَحِيدًا لِهَذَا النَّسَمَةِ.

الخطوة 2: أَجِدْ حَلًّا النَّسَمَةِ بِاستِعْمَالِ قَاعِدَةِ كَرِيمَرِ.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{D}$$

قَاعِدَةُ كَرِيمَرِ

$$= \frac{\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -4 & 1 \end{vmatrix}}{-7}$$

بِالْتَّعْوِيْضِ

$$= \frac{1(1) - (-4)(5)}{-7}$$

بِحَسَابِ الْمُحَدَّدَاتِ

$$= \frac{21}{-7} = -3$$

بِالْتَّبَسِيتِ

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{D}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -4 \end{vmatrix}}{-7}$$

$$= \frac{3(-4) - 2(1)}{-7}$$

$$= \frac{-14}{-7} = 2$$

إِذْن، حَلُّ النَّسَمَةِ هُوَ: $(-3, 2)$.

أَتَحَقَّقُ:

أَتَحَقَّقُ مِنْ صِحَّةِ الْحَلِّ بِالْتَّعْوِيْضِ فِي نَسَمَةِ الْمَعَادِلَاتِ.

الْمَعَادِلَاتُ الْأَصْلِيَّاتُ

$$2x + y = -4$$

$$3x + 5y = 1$$

$$2(-3) + 2 \stackrel{?}{=} -4$$

بِالْتَّعْوِيْضِ

$$3(-3) + 5(2) \stackrel{?}{=} 1$$

$$-6 + 2 \stackrel{?}{=} -4$$

بِالْمُضْرِبِ

$$-9 + 10 \stackrel{?}{=} 1$$

$$-4 = -4 \quad \checkmark$$

بِالْتَّبَسِيتِ

$$1 = 1 \quad \checkmark$$

أَتَذَكَّرُ

تَعْلَمْتُ سَابِقًا ثَلَاثَ طَرَائِقَ (بِيَانِيَّ، بِالْحَذْفِ، بِالْتَّعْوِيْضِ) لِحَلِّ نَسَمَةِ الْمَعَادِلَاتِ مُكَوَّنَ مِنْ مَعَادِلَاتٍ خَطْيَّةٍ.

أَتَعْلَمُ

تَكُونُ مَصْفُوفَةُ الْمَعَامِلَاتِ مِنْ مَعَامِلَاتِ الْمُتَغَيِّرَاتِ عِنْدَ كِتَابَةِ الْمَعَادِلَاتِ بِالصُّورَةِ الْقِيَاسِيَّةِ، وَيُمْثِلُ كُلَّ عَمُودٍ فِيهَا مَعَامِلَاتِ أَحَدِ الْمُتَغَيِّرَاتِ الْمَعَادِلَاتِ.

إِرْشَادٌ

لِلتَّحَقُّقِ مِنْ صِحَّةِ الْحَلِّ، يَجِدْ تَعْوِيْضُ الْقِيمِ فِي الْمَعَادِلَاتِ الْأَصْلِيَّاتِ جَمِيعَهَا.

أتدقّق من فهمي

أحل كل نظام معادلات ممّا يأني باستعمال قاعدة كريمر (إن أمكن):

a)
$$\begin{aligned} -2x + 7y &= 12 \\ x + y &= 3 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 4x - 3y &= 29 \\ 2y + 5x &= -5 \end{aligned}$$

أتدرب وأحل المسائل

أجد قيمة كل من المحددات الآتية:

1
$$\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

2
$$\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -4 & 1 \end{vmatrix}$$

3
$$\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

4
$$\begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

5
$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 5 & 8 & -2 \\ 4 & 7 & 3 \end{vmatrix}$$


6
$$\begin{vmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 6 & 5 & 1 \\ -4 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

7
$$\begin{vmatrix} -6 & -1 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

8
$$\begin{vmatrix} 6 & 0 & 4 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

أجد قيمة كل من المحددات الآتية باستعمال قاعدة الأقطار، ثم باستعمال محددة المصفوفة 2×2 :

أجد مساحة المثلث ABC المرسوم في المستوى الإحداثي أدناه.



- 10 خرائط: يقع منزل خولة عند النقطة $(5, 3)$ على خريطة إحداثية للمدينة، ويقع منزل فدوى عند النقطة $(0, 7)$ ، ويعتبر منزل نهى عند النقطة $(9, 5)$. أجد مساحة المثلث BCD ، علمًا بأنَّ الوحدة الواحدة على الخريطة تمثل 20 m على الأرض.

أحل كل نظام معادلات مما يأتي باستعمال قاعدة كريمر (إِنْ أَمْكِنْ):

11
$$\begin{aligned} x + 5y &= -17 \\ 3x - 4y &= 6 \end{aligned}$$

12
$$\begin{aligned} 2x - 3y &= 29 \\ 6y - 4x &= 12 \end{aligned}$$

13
$$\begin{aligned} 5x - 4y &= 22 \\ 4x + 3y &= -1 \end{aligned}$$

14
$$\begin{aligned} 6x - 7y &= -11 \\ 5x + 4y &= 40 \end{aligned}$$

- 15 ما قيمة c التي تجعل مُحددة مصفوفة المعاملات للنظام الآتي تساوي صفرًا؟

$$\begin{aligned} 2x + y &= 6 \\ cy &= 3 - x \end{aligned}$$

- 16 أحل المسألة الواردة في بند (مسألة اليوم).

مهارات التفكير العليا



مسألة مفتوحة: أكتب مصفوفة مُربعة من الرتبة 2×2 تتحقق الشرط المُعطى في كل مما يأتي:

17 مُحدّدتها تساوي صفرًا.

18 مُحدّدتها تساوي -1 .

19 جميع عناصرها أعداد موجبة، ومُحدّدتها -12 .

- 20 تحد: عند حل نظام من معادلتين بمتغيرين باستعمال قاعدة كريمر، فإنَّ الحل هو: $x = \frac{1}{5}$ و $y = \frac{7}{5}$. ما قيمة كل من a ، b ، و c ؟

النظير الضريبي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية

Inverse Matrix and Systems of Linear Equations

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



• إيجاد النظير الضريبي لمصفوفة من الرتبة 2×2

• كتابة معادلة مصفوفية لنظام من معادلتين خطيتين، وحلّها.

مصفوفة الوحدة، المصفوفة المحايدة، المصفوفة المُنفردة، المصفوفة غير المُنفردة، المعادلة المصفوفية، النظير الضريبي للمصفوفة.



استأجر مُنظّمو رحلة بحرية في خليج العقبة 8 قوارب، بعضها يحمل 4 أشخاص، وبعضها الآخر يحمل 7 أشخاص. إذا كان عدد المشاركين في الرحلة 50 شخصاً، فأستعمل معادلة مصفوفية لإيجاد عدد القوارب المستأجّرة من كل نوع.

مصفوفة الوحدة، ونظير المصفوفة الضريبي

معلوم أنَّ ناتج ضرب أيَّ عدد حقيقي في العدد 1 هو العدد نفسه؛ إذ إنَّ $x(1) = 1(x) = x$ لأيَّ عدد حقيقي x . لذلك يُسمّى العدد 1 عنصراً مُحايداً لعملية ضرب الأعداد الحقيقية.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

كذلك توجد مصفوفة مُربعة تُسمى **مصفوفة الوحدة** (identity matrix)، ويرمز إليها بالرمز I ، ويكون جميع عناصر قطْرها الرئيسي 1، وتكون بقية عناصرها أصفاراً، وتمتاز بخاصية في ضرب المصفوفات تُشبه خاصية العدد 1 في ضرب الأعداد الحقيقية.

يمكِّن التتحقق من أنَّ ناتج ضرب المصفوفة I في أيَّ مصفوفة مُربعة A ، لها نفس رتبة I ، هو المصفوفة A نفسها؛ أيَّ إنَّ:

$$I \times A = A \times I = A$$

أتعلّم

- مصفوفة الوحدة من الرتبة 2×2 هي:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- مصفوفة الوحدة من الرتبة 3×3 هي:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مفهوم أساسى

المصفوفة المُحايدة لعملية ضرب المصفوفات

بالكلمات: مصفوفة الوحدة I هي المصفوفة المُحايدة لعملية ضرب المصفوفات، التي إذا ضربت في أي مصفوفة أخرى من الرتبة نفسها كان ناتج الضرب هو المصفوفة الأخرى نفسها.

بالرموز: لأي مصفوفة مُربعة A ، لها رتبة المصفوفة المُحايدة I نفسها، فإنَّ:

$$I \times A = A \times I = A$$

إذا كانت المصفوفتان A, B مُربعتين من الرتبة نفسها، وكان: $A \times B = B \times A = I$ ، المصفوفة A تُسمى **نظيرًا ضريبيًا** (multiplicative inverse) للمصفوفة B ، وتُسمى المصفوفة B أيضًا **نظيرًا ضريبيًا** للمصفوفة A .

أتعلم

إذا كان A, B مصفوفتين مُربعتين من الرتبة نفسها، وكان $AB = I$ ، فإنَّ $BA = I$.

النظير الضريبي للمصفوفة المُربعة

مفهوم أساسى

النظير الضريبي للمصفوفة المُربعة A هو المصفوفة A^{-1} ، حيث:

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$$

أتعلم

A^{-1} هو رمز للنظير الضريبي للمصفوفة A ، وليس $\frac{1}{A}$.

مثال 1

أبين في كلٍّ مما يأتي إذا كانت كل مصفوفة تمثل نظيرًا ضريبيًا للمصفوفة الأخرى:

1) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

بتعويض المصفوفة A ، والمصفوفة B

$$= \begin{bmatrix} 2(2)+3(-1) & 2(-3)+3(2) \\ 1(2)+2(-1) & 1(-3)+2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 بضرب المصفوفتين، والتبسيط

بما أنَّ $AB = I$ ، فإنَّ كُلًا من المصفوفة A والمصفوفة B تمثل نظيرًا ضريبيًا للأخرى.

أتعلم

إنَّ التعريف الأصلي للتحقق من أنَّ كل مصفوفة تمثل نظيرًا ضريبيًا للمصفوفة الأخرى يُحتمم اختبار أن تكون $AB = I$ ، و $BA = I$. وبما أنَّ تحقق أحد الشرطين يضمن تتحقق الشرط الآخر، فإننا نكتفي فقط باختبار أحد الشرطين.

الوحدة 1

2) $F = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}$

$$FG = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}$$

بتعميض المصفوفة F ، والمصفوفة G

$$= \begin{bmatrix} 6(\frac{3}{4}) + 5(\frac{1}{4}) & 6(\frac{5}{8}) + 5(\frac{3}{8}) \\ 2(\frac{3}{4}) + 3(\frac{1}{4}) & 2(\frac{5}{8}) + 3(\frac{3}{8}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{23}{4} & \frac{45}{8} \\ \frac{9}{4} & \frac{19}{8} \end{bmatrix}$$

بضرب المصفوفتين، والتبسيط

بما أن $I \neq FG$ ، فإن كلاً من المصفوفة F والمصفوفة G لا تمثل نظيرًا ضربيًا للأخرى.

أتحقق من فهمي

أبيّن في كلٍ مما يأتي إذا كانت كل مصفوفة تمثل نظيرًا ضربيًا للمصفوفة الأخرى:

a) $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

b) $C = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2.5 & 1.5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

إيجاد النظير الضريبي لمصفوفة غير مُنفردة من الرتبة 2×2

إذا كانت مُحددة المصفوفة تساوي صفرًا، فلا نظير ضريبيًا لها، وتسُمّى عندئذ مصفوفة مُنفردة (singular matrix). أما المصفوفة التي مُحدّدتها لا تساوي صفرًا، فإن لها نظيرًا ضريبيًا، وتسُمّى عندئذ مصفوفة غير مُنفردة (non-singular matrix).

يمكن إيجاد النظير الضريبي لمصفوفة غير مُنفردة من الرتبة 2×2 ، إذا كانت مُحدّدتها لا تساوي صفرًا كما هو مُبيّن أدناه.

النظير الضريبي لمصفوفة غير مُنفردة من الرتبة 2×2

مفهوم أساسى

بالكلمات: إذا كانت مُحددة المصفوفة A ذات الرتبة 2×2 لا تساوي صفرًا، فإن لها نظيرًا ضريبيًا يمكن

إيجاده باتّباع الخطوات الآتية:

1) تبديل موقع كل من عنصري القطر الرئيس.

2) ضرب عنصري القطر الآخر في -1 .

3) ضرب المصفوفة الناتجة في مقلوب المُحددة، أو $\left(\frac{1}{|A|}\right)$.

بالرموز: إذا كانت: $0 \neq |A|$ ، فإن النظير الضريبي للمصفوفة: $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ هو: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

مثال 2

أُبَيِّنْ إِذَا كَانَتْ كُلُّ مَسْفُوفَةٍ مَمَّا يَأْتِي مُنْفِرِدَةً أَوْ غَيْرَ مُنْفِرِدَةً، ثُمَّ أَجِدُ النَّظِيرَ الضرِبِيَّ لِلمسْفُوفَةِ غَيْرِ الْمُنْفِرِدَةِ:

1) $M = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$

$$|M| = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 10 \end{vmatrix} = 3(10) - 6(5) = 30 - 30$$

باستعمال مُحدَّدة الدرجة الثانية

$$= 0$$

بالتبسيط

بما أَنَّ $|M| = 0$ ، فَإِنَّ المسْفُوفَةَ M مُنْفِرِدَةٌ، وَلَا نَظِيرٌ ضَرِبِيٌّ لِلَّهَا.

2) $F = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$

$$|F| = 4(-2) - (-3)(6) = -8 + 18$$

باستعمال مُحدَّدة الدرجة الثانية

$$= 10$$

بالتبسيط

بما أَنَّ $|F| \neq 0$ ، فَإِنَّ المسْفُوفَةَ F غَيْرُ مُنْفِرِدَةٌ، وَلَهَا نَظِيرٌ ضَرِبِيٌّ، هُوَ: F^{-1} ، وَيُمْكِنُ إِيجادُهِ كَمَا يَأْتِي:

$$F^{-1} = \frac{1}{|F|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

النَّظِيرُ الضرِبِيُّ لِلمسْفُوفَةِ مِنِ الرَّتْبَةِ 2 \times 2

$$= \frac{1}{10} \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

بالتعمير

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

بالتبسيط

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

أُبَيِّنْ إِذَا كَانَتْ كُلُّ مِنَ المسْفُوفَاتِ الَّتِيَةِ مُنْفِرِدَةً أَوْ غَيْرَ مُنْفِرِدَةً، ثُمَّ أَجِدُ النَّظِيرَ الضرِبِيَّ لِغَيْرِ الْمُنْفِرِدَةِ مِنْهَا:

a) $H = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

b) $J = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

c) $K = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ -8 & -7 \end{bmatrix}$

أَفَكَرْ

كِيفُ يُمْكِنِي التَّحْقِيقُ
مِنْ صِحَّةِ إِجَابِيِّيِّ فِي
الْفَرْعَ 2 مِنِ الْمَثَلِ؟
أَبْرُرُ إِجَابِيِّيِّ.

أَفَكَرْ

مَا عَلَاقَةُ الْمَسْفُوفَةِ
؟ K^{-1}
بِالْمَسْفُوفَةِ

المعادلات المصفوفية

أتعلم

سيقتصر هذا الدرس على المعادلة المصفوفية التي تتضمن فقط عملية ضرب المصفوفات؛ أي المعادلة التي صورتها: $AX = B$ ، حيث A, B مصفوفتان معلومتان، و X مصفوفة مجهولة يُراد إيجادها.

المعادلة المصفوفية (matrix equation) هي معادلة تتضمن مصفوفات مجهولة (أو تكون بعض عناصرها مجهولة)، ومصفوفات معلومة، إضافةً إلى عمليات على تلك المصفوفات.

أمّا طريقة حلّ المعادلة المصفوفية: $AX = B$ فتشمل طريقة حلّ المعادلة: $ax = b$ ، حيث a, b, x أعداد حقيقية كما هو مُبيّن أدناه.

معادلة مصفوفية

$$AX = B$$

$A^{-1}(AX) = A^{-1} \times B$ بضرب الطرفين في A^{-1} من اليسار

$(A^{-1} \times A)X = A^{-1} B$ خاصية التجميع

$(I)X = A^{-1} B$ خاصية النظير الضريبي

$X = A^{-1} B$ خاصية الضرب في المصفوفة المحايدة

معادلة جبرية

$$ax = b$$

$\frac{1}{a}(ax) = \frac{1}{a}(b)$ بضرب الطرفين في $\frac{1}{a}$

$(\frac{1}{a} \times a)x = \frac{b}{a}$ خاصية التجميع

$(1)x = \frac{b}{a}$ خاصية النظير الضريبي

$x = \frac{b}{a}$ خاصية العنصر المحايد

أذكّر

النظير الضريبي للعدد الحقيقي a هو العدد $\frac{1}{a}$ ، حيث $a \neq 0$ ، وحاصل ضرب أيّ عدد حقيقي في نظيره الضريبي هو العدد 1، وهو العنصر المحايد لضرب الأعداد الحقيقة.

لحلّ نظام من معادلتين خطّيتين بمتغيرين، أُحولُّهما أوّلاً إلى معادلة مصفوفية صورتها: $AX = B$ ، حيث A مصفوفة معاملات المتغيرين، و X مصفوفة المتغيرات في المعادلتين الخطّيتين، و B مصفوفة الثوابت، فيكون حلّ هذا النظام هو: $X = A^{-1} B$ ؛ شرط أن تكون المصفوفة A غير مُنفردة.

مثال 3

أحلّ نظام المعادلات الآتي باستعمال النظير الضريبي (إنْ أمكن):

$$5x + 3y = 3$$

$$x - 2y = 11$$

الخطوة 1: أكتب المعادلة المصفوفية التي تمثّل هذا النظام.

$$AX = B$$

صيغة المعادلة المصفوفية

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 11 \end{bmatrix}$$

بالتعرّيف

الخطوة 2: أجد مُحدّدة مصفوفة المعاملات.

$$|A| = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 5(-2) - 1(3)$$

باستعمال مُحدّدة الدرجة الثانية

$$= -13$$

بالتبسيط

بما أن $0 \neq |A|$ ، فإنّه يوجد نظير ضربي للمصفوفة A .

أتعلم

الاحظ أنه عند حلّ نظام المعادلات باستعمال قاعدة كريمر أو النظير الضريبي، فإنّ شرط أن تكون $0 \neq |A|$ ضروري.

الخطوة 3: أجد A^{-1} .

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

النظير الضريبي لمصفوفة من الربطة 2×2

$$= \frac{1}{-13} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

بالتعمير

$$= \begin{bmatrix} \frac{2}{13} & \frac{3}{13} \\ \frac{1}{13} & \frac{-5}{13} \end{bmatrix}$$

بالتبسيط

الخطوة 4: أُخُلّ المعادلة المصفوفية باستعمال الصيغة: $X = A^{-1} B$

$$X = A^{-1} B$$

صيغة حلّ المعادلة المصفوفية

$$= \begin{bmatrix} \frac{2}{13} & \frac{3}{13} \\ \frac{1}{13} & \frac{-5}{13} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 11 \end{bmatrix}$$

بالتعمير

$$= \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

بضرب المصفوفتين، والتبسيط

إذن، حلّ هذا النظام هو: $(3, -4)$.

الوحدة 1

أتحقق:

أتحقق من صحة الحل بالتعويض في نظام المعادلات.

$$5x + 3y = 3$$

المعادلة الأصلية

$$x - 2y = 11$$

$$5(3) + 3(-4) = 3$$

$$x = 3, y = -4$$

$$3 - 2(-4) = 11$$

$$15 - 12 = 3$$

بالضرب

$$3 + 8 = 11$$

$$3 = 3$$



بالتبسيط

$$11 = 11$$



أتحقق من فهمي

أحُل نظام المعادلات الآتي باستعمال النظير الضريبي (إن أمكن):

$$3x - y = 13$$

$$3y - 2x = 4$$

يمكن استعمال المعادلات المصفوفية لحل مسائل عملية تؤول إلى نظام ذي معادلتين خطيتين بمتغيرين.



مثال 4 : من الحياة

كيمياء: يعمل يوسف في أحد مختبرات البحوث، وهو يريد تحضير 50 L من محلول حمض الهيدروكلوريك (HCl) بحيث تكون نسبة تركيزه 35%. إذا علمت أن المختبر يحوي من هذا الحمض محلولاً نسبة تركيزه 15%， ومحلولاً آخر نسبة تركيزه 40%， فكم لترًا سيسعّى يوسف من كلا المحلولين؟ أكتب معادلة مصفوفية تمثل المسألة، ثم أحُلها.

أفكار

أحُل نظام المعادلات في المثال 3 باستعمال قاعدة كريم، ثم أتأكد أنَّ الحلَّين مُنطَابِقان.

أفترض أنَّ يوسف سيستعمل x لترًا تركيزها 15%， و y لترًا تركيزها 40%.

الخطوة 1: أكتب نظام المعادلات الذي يمثل هذه المسألة.

- المعادلة الأولى: مجموع الكميتين هو L. 50. إذن، المعادلة التي تُعبّر عن ذلك هي:

$$x + y = 50$$

- المعادلة الثانية: كمية الحمض في x لترًا مضاعفًا إليها كمية الحمض في y لترًا تساوي كمية الحمض في L. 50. إذن، المعادلة التي تُعبّر عن ذلك هي:

$$0.15x + 0.40y = 17.5$$

إذن، نظام المعادلات الذي يُعبّر عن هذه المسألة هو:

$$x + y = 50$$

$$0.15x + 0.40y = 17.5$$

إرشاد

كمية الحمض الموجودة في L 50 هي:
 $50 \times 35\% = 17.5$

الخطوة 2: أكتب المعادلة المصفوفية التي تمثل هذا النظام.

$$AX = B$$

صيغة المعادلة المصفوفية

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.15 & 0.40 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 17.5 \end{bmatrix}$$

بالتعمير

الخطوة 3: أجد مُحددة مصفوفة المعاملات.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0.15 & 0.40 \end{vmatrix} = 1(0.40) - 1(0.15)$$

باستعمال مُحددة الدرجة الثانية

$$= \frac{1}{4}$$

بالتبسيط

بما أنَّ $0 \neq |A|$ ، فإنَّه يوجد نظير ضربي للمصفوفة A .

الخطوة 4: أجد النظير الضريبي A^{-1}

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

النظير الضريبي لمصفوفة من الرتبة 2×2

$$= \frac{1}{\frac{1}{4}} \begin{bmatrix} 0.40 & -1 \\ -0.15 & 1 \end{bmatrix}$$

بالتعمير

$$= \begin{bmatrix} 1.6 & -4 \\ -0.6 & 4 \end{bmatrix}$$

بالتبسيط

الخطوة 5: أحلُّ المعادلة المصفوفية باستعمال الصيغة: $X = A^{-1} B$

$$X = A^{-1} B$$

صيغة حلّ المعادلة المصفوفية

$$= \begin{bmatrix} 1.6 & -4 \\ -0.6 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 50 \\ 17.5 \end{bmatrix}$$

بالتعمير

$$= \begin{bmatrix} 10 \\ 40 \end{bmatrix}$$

بضرب المصفوفتين، والتبسيط

إذن، الحلُّ هو $(10, 40)$ ؛ أي إنَّ يوسف سيستعمل 10 لتر من المحلول الذي تركيزه 15% ، و 40 لتر من المحلول الذي تركيزه 40% لتحقيق هدفه.

أتحقق من فهمي



طهي: يوجد في معمل للحلويات محلولان، تركيز السُّكَّر في أحدهما 12% ، وتركيزه في الآخر 20% . يريد الطاهي تحضير 20 لتر من محلول، تركيز السُّكَّر فيه 15% . كم لترًا سيستعمل الطاهي من كل المحلولين المتوفرين في المعمل؟ أكتب معادلة مصفوفية تمثل المسألة، ثمَّ أحلُّها.



أُبَيِّنُ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي إِذَا كَانَتْ كُلُّ مَسْفُوفَةٍ تُمَثِّلُ نَظِيرًا ضَرِبِيًّا لِلْمَسْفُوفَةِ الْأُخْرِيِّ:

$$1 \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$2 \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$3 \quad L = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$4 \quad G = \begin{bmatrix} -3 & -11 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 1.5 & 5.5 \\ -0.5 & -1.5 \end{bmatrix}$$

أُبَيِّنُ إِذَا كَانَتْ كُلُّ مِنَ الْمَسْفُوفَاتِ الْأَتِيَّةِ مُنْفِرِّدَةً أَوْ غَيْرَ مُنْفِرِّدَةً، ثُمَّ أَجِدُ النَّظِيرَ الضَّرِبِيَّ لِغَيْرِ الْمُنْفِرِّدَةِ مِنْهَا:

$$5 \quad P = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$6 \quad Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$7 \quad S = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$8 \quad V = \begin{bmatrix} 8 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

أَحْلُّ كُلَّاً مِنْ أَنْظَمَةِ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ النَّظِيرِ الضَّرِبِيِّ (إِنْ أَمْكِنَ):

$$9 \quad \begin{aligned} 3x + 5y &= 13 \\ x - 2y &= -3 \end{aligned}$$

$$10 \quad \begin{aligned} -2x + 4y &= 6 \\ x + 2y &= 7 \end{aligned}$$

$$11 \quad \begin{aligned} 5x - 8y &= 31 \\ 2y - 3x &= -13 \end{aligned}$$

$$12 \quad \begin{aligned} x + y &= 20 \\ x - 2y &= -1 \end{aligned}$$

$$13 \quad \begin{aligned} 3x + 2y &= 8 \\ x &= y + 1 \end{aligned}$$

$$14 \quad \begin{aligned} 2x + 7y &= 24 \\ 4x + 13y &= 46 \end{aligned}$$

صَيْدَلَةٌ لَدِي صَيْدَلِيٌّ مَحْلُولَانِ، تَرْكِيزُ الْمَلْحِ فِي أَحَدِهِمَا 2%， وَتَرْكِيزُهُ فِي الْآخَرِ 12%. يَرِيدُ الصَّيْدَلِيُّ تَحْضِيرَ 10 L مِنْ مَحْلُولٍ، تَرْكِيزُ الْمَلْحِ فِيهِ 10%. مَا الْمَعَادِلَةُ الْمَسْفُوفَيَّةُ الَّتِي يَعِنِّي إِسْتِعْمَالُهَا لِتَحْضِيرِ الْكَمِيَّةِ الْمُطَلُّوَةِ مِنَ الْمَحْلُولِ؟ أَكْتُبْ مَعَادِلَةً مَسْفُوفَيَّةً تُمَثِّلُ الْمَسَائِلَةَ، ثُمَّ أَحْلُّهَا.

الوحدة 1



أوراق نقدية: مع سعاد مجموعة من الأوراق النقدية من فئة 10 JD، وفئة 20 JD 16، تبلغ قيمتها الإجمالية 750 JD. إذا علمت أنَّ عدد أوراق فئة العشرين ديناراً يقلُّ عن مثلي عدد أوراق فئة عشرة الدنانير بمقدار 5 أوراق، فأكتب معادلة مصفوفية تُمثل المسألة، ثمَّ أحلُّها لإيجاد عدد أوراق النقد التي مع سعاد من كلتا الفئتين.

ما قيمة x التي تجعل المصفوفة: 17 $\begin{bmatrix} 5 & x \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ مُنفردة؟

ما قيمة a التي تجعل المصفوفة: 18 $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ نظيرًا ضريبيًّا لنفسها؟

إذا كان: 19 $(B + C)^{-1} = A$ ، فأجد المصفوفة C ، بحيث يكون: $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$.

إذا كان A مصفوفة من الربطة 2×2 ، حيث: $A^2 = 2A - 3I$ ، فأثبت أنَّ: 20 $A^3 = A - 6I$.

أحلُّ المسألة الواردة في بند (مسألة اليوم). 21

مهارات التفكير العليا



تبرير: إذا كان: 22 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، وكانت: $a > 0, d > 0, b < 0, c < 0, |A| \neq 0$ ، فهل توجد عناصر سالبة في A^{-1} ؟ أبُرِّر إجابتي.

برهان: إذا كان: 23 $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ ، $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، فأثبت أنَّ: $(AB)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}$.

اكتشف المختلف: أيُّ المصفوفات الآتية مختلفة؟ أبُرِّر إجابتي. 24

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

تحدد: إذا كان: 25 $BA^2 = A$ ، فأجد المصفوفة B التي تتحقق المعادلة: $BA^2 = A$.

اختبار نهاية الوحدة

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كلٌّ مما يأتي:

إذا كان: $C = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & -3 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 9 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ 5
العنصر c_{23} تساوي:

- a) 39 b) 22
c) 25 d) 27

إذا كانت $L_{3 \times 4}$ ، وكانت $M_{5 \times 3}$ ، وكانت $N_{2 \times 5}$ ، فإنَّ رتبة المصفوفة $T = NML$ ، حيث: 6

- a) 2×3 b) 3×5
c) 3×4 d) 2×4

إذا كان: $A = \begin{bmatrix} a-3 & -2 \\ 2 & a+2 \end{bmatrix}$ حيث a عدد ثابت، فأجيب عن

الأسئلة الثلاثة الآتية تباعًا:

أجد مُحدد A بدلالة a . 7

أجد قيمة a التي تجعل المصفوفة A مُنفردة. 8

أجد A^{-1} عندما $a = 3$. 9

إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & 4 \end{bmatrix}$

إذا كان: $C = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ -4 & 1 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ ، فأجد كُلَّا ممَّا يأتي
إإنْ أمكن): 4

- 10) $C(B+D)$ 11) AB
12) $B+C$ 13) $2B-3C$

إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 15 & -8 & 0 \\ 9 & 22 & -4 \\ -3 & 6 & 12 \end{bmatrix}$ 1
يتساوي:

- a) 15 b) -12
c) 5 d) -2

إذا كانت $A_{3 \times 2}$ ، وكانت $B_{2 \times 4}$ ، وكانت $C_{3 \times 2}$ ، فإنَّ العملية التي يُمْكِن إيجادها هي: 2

- a) $A + B$ b) $B + C$
c) $5B - 3C$ d) $(A+C)B$


إذا كانت: $\begin{bmatrix} 4 & x \\ 7 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x-y & 2 \\ 4 & z \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & x-z \end{bmatrix}$ 3
فإنَّ قيمة $(x+y+z)$ تساوي:

- a) 10 b) 19
c) 21 d) 26

إذا كانت: x مصفوفة مُنفردة، فإنَّ قيمة $\begin{bmatrix} -8 & x \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ تساوي: 4

- a) -8 b) -12
c) 6 d) -26

أجد مساحة المثلث الآتي باستعمال المحددات.



20

أحلُّ نظام المعادلات الآتي باستعمال قاعدة كريمر:

$$3x - 2y = 8$$

$$5x + 3y = 13$$

أحلُّ نظام المعادلات الآتي باستعمال النظير الضربي:

$$x - 5y = 14$$

$$3x - 8y = 28$$

إذا كان: $B = \begin{bmatrix} 2 & a \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ ، حيث a عدد ثابت

23

لا يساوي 2، وكان: $B + B^{-1} = I$ ، فأجد قيمة a .

كيمياء: لدى عائشة 3 محليل حمضية، تركيز الحمض في محلول الأول 10%， وتركيزه في محلول الثاني 20%， وتركيزه في محلول الثالث 40%. أكتب معادلة مصفوفية تمثل المسألة، ثم أحلُّها لإيجاد الكميات التي يتعين على عائشة مزجها من محليلات الثلاثة للحصول على 100 mL من محلول حمضي نسبة تركيزه 18%， علمًا بأنَّ الكمية التي سُتُّستعمل من محلول الذي تركيزه 10% تساوي أربعة أمثال ما سُتُّستعمل من محلول الذي تركيزه 40%.

24

$$\cdot \begin{vmatrix} 3 & -7 & 6 \\ 1 & 0 & 8 \\ -2 & 11 & 9 \end{vmatrix} \quad \text{أجد: 14}$$

يُبيِّن الجدول التالي توزيع سُكَّان إحدى البلدات (بالآلاف) بحسب فئات العمر والجنس. أُنظم هذه البيانات في مصفوفة صفوتها فئات الأعمار، ثم أُحدِّد رتبتها.

العمر	الذكور	الإناث
0 - 19	71	66
20 - 39	68	59
40 - 59	32	22
فأكثـر 60	11	14

إذا كان: $A = \begin{bmatrix} x & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 16

. $AB = BA$ يجعل

إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ ، فأجد قيمة كلٌ من الثابت k

. $A^2 + kI = hA$ والثابت h اللذين يجعلان

إذا كانت: $A = [2 \ -2]$, $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ 18
. $BA - 2C^2$ فأجد

. $2X - \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 19
أحلُّ المعادلة:

الخوارزميات ونظرية المُخْطَطات

Algorithms and Graph Theory

ما أهمية هذه الوحدة؟

تؤدي الخوارزميات ونظرية المُخْطَطات دوراً مُهماً في تخصصات الأعمال الحديثة؛ إذ تزود كلّ منهما أصحاب الأعمال المتخصصين بالأدوات اللازمة لفهم الأنظمة المعقدة، وتحفزهم إلى الابتكار، وتمكنّهم من الحفاظ على ميزة تنافسية في أسواق اليوم الديناميكية. فمثلاً، تساعد نظرية المُخْطَطات الشركات على النمذجة وتحليل سلاسل التوريد وعلاقات العملاء؛ ما يتيح للشركات تخصيص الموارد بكفاءة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية. في مقابل ذلك، تُعزّز الخوارزميات عمليات التنبؤ والأتمتة؛ ما يُمكّن الشركات من التكيف بسرعة مع تغيّرات السوق.



سأتعلم في هذه الوحدة:

- الخوارزميات، وتطبيقاتها.
- خوارزميات تعبئة الصندوق، واستعمالها لإيجاد حلّ الأمثل لمسألة تعبيئة.
- المُخطّط، ومُكوّناته، وبعض التعريفات الأساسية المُتعلّقة به، وبعض أنواعه الخاصة.
- مصفوفة الجوار، ومصفوفة الوزن، واستعمالهما للتعبير عن الروابط في المُخطّطات.
- تحديد إذا كان المُخطّط المعطى أويلريّاً، أو شبه أويلري، أو غير ذلك.

تعلّمتُ سابقاً:

- إيجاد الوسط الحسابي لبيانات مفردة.
- المصفوفات: مفهومها، وعناصرها، ورتبتها، وأنواعها، وكيفية تنظيم البيانات فيها.
- حلّ المسألة باستخدام استراتيجية التخمين والتحقق.
- حلّ المعادلات الخطية بمتغير واحد.

أستعمل تدريبات (أستعد لدراسة الوحدة) في الصفحتين (20) و(21) من كتاب التمارين؛ لمراجعة هذه الموضوعات قبل البدء بدراسة الوحدة.

الخوارزميات

Algorithm

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



$$\begin{array}{r}
 13 \\
 \times 325 \\
 \hline
 1950
 \end{array}$$

- تعُرف خوارزميات مُعطاة بالكلمات والرموز، وتطبيقاتها.
- تعُرف خوارزمية مُخطط سَير العمليات، وتطبيقاتها.
- الخوارزمية، الطريقة شبه الرمزية، جدول التتّبع، مُخططات سَير العمليات.
- كيف يمكن التعبير بطريقة مُنظمة عن خطوات ضرب أيّ عدد من ثلاثة منازل في أيّ عدد من منزلة واحدة؟ هل توجد أكثر من طريقة لذلك؟

الخوارزميات المكتوبة بالكلمات

تعلّمتُ في مبحث المهارات الرقمية أنَّ **الخوارزمية** (algorithm) مجموعة من التعليمات أو الخطوات المُنظمة التي تُحدّد كيفية حل مشكلة مُعينة. كذلك تعلّمتُ العديد من الخوارزميات في مبحث الرياضيات، مثل ضرب عددين يتكونُ كُلّ منهما من متّنين، أو جمع كسرين غير مُتشابهين، أو إيجاد الوسيط لمجموعة من البيانات.

تُوجَد طرائق عِدَّة لكتابية الخوارزمية، منها طريقة الكلمات؛ وهي وصف للخوارزمية بجمل (خطوات) مُتسلِّلة من دون استعمال أيّ رموز في هذه الجمل. وبيّن المثال الآتي كيف يمكن تطبيق خوارزمية مكتوبة بالكلمات.

أتعلّم

تطبيق الخوارزمية يعني تطبيق خطواتها واحدة تلو الأخرى على مدخلة ما.

مثال 1

تُستعمل الخوارزمية الآتية لتحديد إذا كان العدد يقبل القسمة على 11 أم لا:

- أجمع الأرقام التي في الموضع الفردية من العدد.
- أجمع الأرقams التي في الموضع الزوجية من العدد.
- أجد الفرق المُطلَق بين المجموعتين في الخطوتين السابقتين.
- إذا كان الفرق المطلَق 0 أو يقبل القسمة على 11، فإنَّ العدد يقبل القسمة على 11، وإلا فإنه لا يقبل القسمة على 11.

أتذَّكر

الفرق المطلَق يعني طرح العدد الأصغر من العدد الأكبر.

الوحدة 2

أُطْبِقُ الخوارزمية السابقة لبيان إذا كان كل عدد ممّا يأتي قبل القسمة على 11 أم لا:

1 86416

1. $6 + 4 + 8 = 18$

أجمع الأرقام التي في المواقع الفردية

2. $1 + 6 = 7$

أجمع الأرقام التي في المواقع الزوجية

3. $18 - 7 = 11$

أجد الفرق المطلوب

يقبل العدد 86416 القسمة على 11؛ لأنَّ العدد 11 (الفرق المطلوب بين المجموعين) يقبل

القسمة على 11

2 78532

1. $2 + 5 + 7 = 14$

أجمع الأرقام التي في المواقع الفردية

2. $3 + 8 = 11$

أجمع الأرقام التي في المواقع الزوجية

3. $14 - 11 = 3$

أجد الفرق المطلوب

لا يقبل العدد 78532 القسمة على 11؛ لأنَّ العدد 3 (الفرق المطلوب بين المجموعين) لا يقبل

القسمة على 11

أتحقق من فهمي

أُطْبِقُ الخوارزمية في المثال السابق لبيان إذا كان كل عدد ممّا يأتي قبل القسمة على 11 أم لا:

a) 9768

b) 734852

الخوارزميات المكتوبة بطريقة شبه رمزية

تُكتَبُ الخوارزمية أيضًا باستعمال **الطريقة شبه الرمزية** (pseudocode)، وفيها توصَّفُ الخوارزمية بخطوات مُتسلسلة مُرْقَمة تتضمَّن العديد من الرموز. غير أنَّ تُتبَعُ الخوارزمية المكتوبة بهذه الطريقة يكون صعبًا في بعض الأحيان، ويحتاج إلى تنظيم؛ لذا يُمْكِن استعمال **جدول التتبع** (trace table) لتدوين القيمة الناتجة من كل خطوة أثناء تطبيق الخوارزمية.

أتعلَّم

العدد 86416 هو المُدخلة التي تُطبَّقُ عليها الخوارزمية.

أتذَكَّر

تُعَدُّ الطريقة شبه الرمزية في كتابة الخوارزميات سهلة ومتاحة لأغلب الخوارزميات.

مثال 2

أتَّمِلُ الخوارزمية الآتية المكتوبة بالطريقة شبه الرمزية، ثُمَّ أُجِيبُ عن كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1. Let $n = 1, A = 1$.
2. Print A .
3. Let $B = A + 2$.
4. Print B .
5. Let $n = n + 1, A = B$.
6. If $n < 4$, go to step 3.
7. If $n = 4$, Stop.

أَعْلَم

لِإِنشَاءِ جُدُولٍ تَتَّبِعُ
لِخوارزمية شَبَهِ رَمْزِيَّة،
فَإِنَّنِي أَضْعِفُ عَمَوْدًا لِكُلِّ
مُتَغَيِّرٍ وَرَدَ ذِكْرَهُ فِي
الخوارزمية، إِضَافَةً إِلَيْهِ
عَمَوْدَ رَقْمِ الْخَطْوَةِ، وَعَمَوْدَ
نَوْاتِحِ الْأَمْرِ (Print).

1

أُطْبِقُ الْخوارزمية بِاسْتِعْمَالِ جُدُولٍ تَتَّبِعُ لِإِيجادِ مُخْرَجَاتِهَا.

step	n	A	B	Print
1	1	1		
2				1
3			3	
4				3
5	2	3		
6→3			5	
4				5
5	3	5		
6→3			7	
4				7
5	4	7		
6→7				Stop

أَعْلَم

إِنَّ مَا كُتِبَ فِي الْخَطْوَةِ
الْخَامِسَةَ مِنْ هَذِهِ
الخوارزمية لَا يُعَدُّ مَعَادِلَة،
وَإِنَّمَا يُمْثِلُ تَعْلِيمَاتٍ.
فَمُثَلًاً: $n = n + 1$ تَعْنِي
إِضَافَةَ 1 إِلَى قِيمَةِ n مِنْ
الْخَطْوَةِ السَّابِقَةِ، فِي حِينَ
 $A = B$ تَعْنِي أَنَّ قِيمَةَ A
تَسَاوِي الْقِيمَةِ الْحَالِيَّةِ لِ B .

مُخَرَّجَاتُ الْخوارزمية هِي: 1, 3, 5, 7

2

أَصْفُ مُخَرَّجَاتُ الْخوارزمية.

تُمْثِلُ مُخَرَّجَاتُ الْخوارزمية الْأَعْدَادُ الْفَرْدِيَّةُ الْمَوْجِيَّةُ الَّتِي تَقْلُّ عَنِ الْعَدْدِ 9

أَعْلَم

مُخَرَّجَاتُ الْخوارزمية هِي
المُخَرَّجَاتُ النَّاتِجَةُ مِنْ
(Print).

أتحقق من فهمي

أتَأْمَلُ الخوارزمية الآتية المكتوبة بالطريقة شبه الرمزية، ثُمَّ أُجِيبُ عن كُلِّ مَا يَأْتِي:

1. Let $n = 1, A=1, B=n+A$.
2. Print B .
3. Let $C = B + 2$.
4. Print C .
5. Let $n = n + 1, B = C$.
6. If $n < 5$, go to step 3.
7. If $n = 5$, Stop.

(a) أُطْبِقُ الخوارزمية باستعمال جدول التَّتَّبع لإِيجاد مُخْرَجَاتِهَا.

(b) أَصِفْ مُخْرَجَاتِ الخوارزمية.

الخوارزميات المُمَثَّلة بِمُخَطَّطَاتِ سَيْرِ الْعَمَلِيَّاتِ


يُمْكِنُ أَيْضًا تمثيل الخوارزمية باستعمال **مُخَطَّطِ سَيْرِ الْعَمَلِيَّاتِ** (flow chart)؛ وهو مُخَطَّطٌ يتكونُ من أشكال هندسية مُرْتَبَطة بِأَسْهُمْ وَخَطُوطٌ تُصِفُّ خطواتِ الخوارزمية وَسَيْرِ الْعَمَلِيَّاتِ فِيهَا.

بِوْجَهِ عَامِ، تُسْتَعْمَلُ الأَشْكَالُ (الصَّنَادِيقُ) الْآتِيَّةُ لِلدلَالَةِ عَلَى خطواتِ مُحدَّدةٍ فِي الخوارزمية:



مثال 3

أتَّمِلُ الخوارزمية الآتية المُمثَّلة بِمُخْطَطٍ سَيِّرِ العمليات، ثُمَّ أُجِيبُ عن كُلِّ مَا يَأْتِي:



أُطْبِقُ الخوارزمية باستعمال جدول التَّتَّبع لِإيجاد مُخَرَّجَاتِها.

n	A	Print	Is $n > 7$?
1			
2	8	8	no
3	12	12	no
4	16	16	no
5	20	20	no
6	24	24	no
7	28	28	no
8	32	32	yes

مُخَرَّجَاتُ الخوارزمية هِي: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32

أَعْلَم

يَعْمَلُ n فِي الخوارزمية بِوَصْفِهِ عَدَادًا، وَهُوَ عَدَادٌ يُضْمَنُ اكْتِمَالَ الخوارزمية.
الْأَحْظَى أَنَّ الخوارزمية تَكْتُمَ عِنْدَمَا $n = 8$.

أَعْلَم

يَحْتَوِي صَنْدُوقُ الْقَرَارِ عَلَى سُؤَالٍ إِجَابَتِهِ نَعَمٌ (Yes) أَوْ لَا (No).

أَصِفُّ مُخَرَّجَاتَ الخوارزمية.

تُمَثِّلُ مُخَرَّجَاتُ الخوارزمية مُضَاعِفَاتُ العَدَدِ 4، الَّتِي تَزِيدُ عَلَى أَوْ تَسَاوِي 8، وَتَقْلُّعَنْ 36

أتدقّق من فهمي

أفترض أنَّ العملية في الصندوق الرابع من مُخطَّط سير العمليات الوارد في المثال السابق هي: “Let $A = 2n$ ”， ثمَّ أُجِّيب عن كُلِّ ممَّا يأتي:

(a) أُطِّبِّخ الخوارزمية باستعمال جدول التَّسْتُّع لإيجاد مُخَرَّجاتها.


(b) أُصِّف مُخَرَّجات الخوارزمية.

تُوجَد استعمالات رياضية للخوارزميات أكْثَرَ تَعْقِيدًا من تلك التي نوَقَّشت في المثال السابق، مثل: تحديد إِذَا كان لمعادلة تربيعية حلول حقيقية أم لا، وإيجاد هذه الحلول.

مثال 4

تُسْتَعْمَلُ الخوارزمية الآتية لإيجاد الجذور الحقيقية لمعادلة التربيعية: $ax^2 + bx + c = 0$.

أُطِّبِّقُ الخوارزمية، ثمَّ أُحدِّدُ المُخَرَّج لِكُلِّ من المعادلات التربيعية التالية:



أتعلَّم

تُسْتَعْمَلُ كلمة (Input) للدلالة على أمر إدخال المعطيات.

أتذَكَّر

القانون العام لحلَّ المعادلة التربيعية: $ax^2 + bx + c = 0$ حيث:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

وتحتَلُّف طبيعة الناتج، لأنَّ $\Delta = b^2 - 4ac$ المُمِيز قد يكون عدَّاً موجَّاً، أو عدَّاً سالِبَاً، أو صَفَرَاً.

1) $x^2 + 7x + 15 = 0$

a	b	c	d	$d < 0?$
1	7	15	-11	Yes

أذكّر

إذا كانت قيمة الممّيز موجبةً، فإنّه يوجد حلان حقيقيان للمعادلة التربيعية. أمّا إذا كانت قيمة الممّيز صفرًا، فإنّه يوجد حلٌ حقيقي واحد للمعادلة التربيعية. وإذا كانت قيمة الممّيز سالبة، فلا توجد للمعادلة التربيعية حلولٌ حقيقية.

2) $2x^2 + 20x + 32 = 0$

a	b	c	d	$d < 0?$	$d = 0?$	x_1	x_2
2	20	32	144	No	No	-8	-2

المُخرج: $x_1 = -8, x_2 = -2$.

3) $4x^2 - 16x + 16 = 0$

a	b	c	d	$d < 0?$	$d = 0?$	x
4	-16	16	0	No	Yes	2

المُخرج: $x = 2$.

أتحقق من فهمي

أطبق الخوارزمية الواردة في المثال السابق، ثم أُحدّد المُخرج لـ كلٍّ من المعادلات التربيعية الآتية:

a) $x^2 + 4x - 12 = 0$

b) $3x^2 + 8x + 15 = 0$

c) $2x^2 + 12x + 18 = 0$

أتدرب وأؤلّل المسائل

تُستعمل الخوارزمية الآتية لتحديد إذا كان العدد يقبل القسمة على 12 أم لا:

1. أجمع أرقام العدد.

إذا كان المجموع في الخطوة الأولى يقبل القسمة على 3، فإنّي أنتقل إلى الخطوة الثالثة، وإلا فإنّ العدد لا يقبل القسمة على 12

إذا كان العدد المُكوّن من أول رقمين في العدد (آحاد العدد وعشّراته) يقبل القسمة على 4، فإنّ العدد يقبل القسمة على 12، وإلا فإنه لا يقبل القسمة على 12

الوحدة 2

أُطْبَقُ الْخَوَارِزْمِيَّةُ السَّابِقَةُ لِتَحْدِيدِ إِذَا كَانَ كُلُّ عَدْدٍ مَّا يَأْتِي يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ عَلَى 12 أَمْ لَا:

1 7104

2 3248940

3 5762

4 81456

تُسْعَمِلُ الْخَوَارِزْمِيَّةُ الْأَتِيَّةُ لِتَحْدِيدِ إِذَا كَانَ الْعَدْدُ الْكَلِيُّ سَعِيدًا أَمْ لَا:

.1 أَجِدُ مُرَبَّعَاتَ أَرْقَامِ الْعَدْدِ.

.2 أَجِدُ مُجْمُوعَ مُرَبَّعَاتِ أَرْقَامِ الْعَدْدِ.

.3 أَضِعُ مُجْمُوعَ مُرَبَّعَاتِ أَرْقَامِ الْعَدْدِ بَدَلًا مِنَ الْعَدْدِ نَفْسَهُ.

.4 أَسْتَمِرُ فِي تَكْرَارِ الْخَطْبَةِ الْأُولَى وَالْخَطْبَةِ الثَّانِيَةِ لِكُلِّ نَاتِحٍ حَتَّى أَحْصِلَ عَلَى مُجْمُوعٍ مِنْ مُنْزَلَةِ وَاحِدَةٍ؛ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمُجْمُوعُ 1، كَانَ الْعَدْدُ سَعِيدًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا الْمُجْمُوعُ 4، فَيَكُونُ الْعَدْدُ وَقْتَنِيَّ غَيْرَ سَعِيدٍ.

أُطْبَقُ الْخَوَارِزْمِيَّةُ السَّابِقَةُ لِتَحْدِيدِ إِذَا كَانَ كُلُّ عَدْدٍ مَّا يَأْتِي سَعِيدًا أَمْ لَا:

5 19

6 42

7 49

8 25

أَتَأْمَلُ الْخَوَارِزْمِيَّةَ الْمَجَاوِرَةَ، ثُمَّ أَجِبُ عَنِ السُّؤَالَيْنِ الْأَتَيْنِ:

1. Let $n = 0, x = 0, y = 1$.
2. Let $x = x + 1, y = yx$.
3. Print y .
4. Let $n = n + 1$.
5. If $n < 4$, go to step 2.
6. If $n = 4$, Stop.

أُطْبَقُ الْخَوَارِزْمِيَّةُ بِاسْتِعْمَالِ جُدُولِ التَّتْبُعِ لِإِيْجَادِ مُخْرَجَاتِهَا.

أَصِفُّ مُخْرَجَاتِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ.

9


10

أَتَأْمَلُ الْخَوَارِزْمِيَّةَ الْمَجَاوِرَةَ الْمُمَثَّلَةَ بِمُخْطَطٍ سَيِّرِ الْعَمَلِيَّاتِ، ثُمَّ أَجِبُ عَنِ السُّؤَالَيْنِ الْأَتَيْنِ:

أَصِفُّ الْإِسْتِخْدَامِ الْرِّيَاضِيِّ لِهَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ.

11


أُطْبَقُ الْخَوَارِزْمِيَّةُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْأَتَيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ جُدُولِ التَّتْبُعِ لِإِيْجَادِ مُخْرَجٍ كُلِّ مِنْهَا:



a) $M1 = 48, M2 = 52, M3 = 46, M4 = 49$

b) $M1 = 71, M2 = 85, M3 = 62, M4 = 45$

أتَأْمَلُ الْخَوَارِزْمِيَّةِ الْمُجَاوِرَةِ الْمُمَثَّلَةِ بِمُخْطَطٍ سَيِّرِ الْعَمَلِيَّاتِ، ثُمَّ أُجِيبُ عَنِ السُّؤَالِيْنِ الْأَتَيْنِ:




13) أَصِفِ الْاسْتِخْدَامِ الْرِّيَاضِيِّ لِهَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ.

14) أَطْبِقِ الْخَوَارِزْمِيَّةَ عَلَى الْعَدَدَيْنِ الْأَتَيْنِ بِاسْتِعْمَالِ جَدْوَلِ التَّتْبِعِ لِإِيجَادِ مُخْرَجٍ كُلِّ مِنْهُمَا:

a) $n = 24$


b) $n = 16$



أتَأْمَلُ الْخَوَارِزْمِيَّةِ الْمُجَاوِرَةِ الْمُمَثَّلَةِ بِمُخْطَطٍ سَيِّرِ الْعَمَلِيَّاتِ، ثُمَّ أُجِيبُ عَنِ السُّؤَالِيْنِ الْأَتَيْنِ:

15) أَطْبِقِ الْخَوَارِزْمِيَّةَ بِاسْتِعْمَالِ جَدْوَلِ التَّتْبِعِ لِإِيجَادِ مُخْرَجَاتِهَا.


16) أَصِفِ مُخْرَجَاتِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ.



تبرير: أتمّل الخوارزمية المجاورة المُمثّلة بِمُخْطَطٍ سَيْرِ العمليات، ثمَّ أُجِيبُ عن السُّؤالين الآتَيْنَ:

أُطْبِقُ الخوارزمية باستعمال جدول التَّتَّبع لإيجاد مُخَرَّجاتِها. 17

أَصِفُّ مُخَرَّجاتِ الخوارزمية، ثمَّ أُبَرِّرُ إجابتِي. 18



تحْدِيد: أتمّلُ الخوارزمية المجاورة المُمثّلة بِمُخْطَطٍ سَيْرِ العمليات، ثمَّ أُجِيبُ عن السُّؤالين الآتَيْنَ:

أُطْبِقُ الخوارزمية باستعمال جدول التَّتَّبع عندما $A = 27, B = 4$. 19

أَصِفُّ مَا يَتَحَقَّقُ مِنْ تَطْبِيقِ هَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ. 20

خوارزميات تعبئة الصندوق

Bin-Packing Algorithms

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم




يرغب مدرب في صالة رياضية أن يرتب على رفوف الأثقال المبنية كتلها (بالكيلوغرام) في ما يلي، علماً بأنّه يمكن لكل رف منها أن يحمل 40 kg في الحد الأقصى. كيف يمكن للمدرب أن يرتب الأثقال باستعمال أقل عدد من الرفوف؟

18	16	24	16	20	10	12	8	16	12	10	4	12	6	10
----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	---	----	---	----

خوارزميات تعبئة الصندوق

إذا كان لدى n من العلب التي لها المقطع العرضي نفسه (مستطيل عرضه x ، وطوله y ، لكن ارتفاعاتها مُتفاوتة كما يظهر في الشكل التالي، وأردت تعبئتها في صناديق، عرض كل منها x ، وطول كل منها y ، وارتفاعاتها متساوية، فكيف يمكنني فعل ذلك باستعمال أقل عدد ممكّن من الصناديق؟



تُسمى المسألة السابقة مسألة تعبئة الصندوق، ويمكن حلّها باستعمال ما يُسمى **خوارزميات تعبئة الصناديق** (bin-packing algorithms).

يُستعمل هذا النوع من الخوارزميات في حلّ كثير من المسائل الحياتية التي تتطوّي على المبدأ نفسه، مثل: تنظيم صناديق البضائع وترتيبها داخل حاويات الشحن، وتحميل البضائع في

الوحدة 2

شاحنات عليها قيود في الكتلة، وتخزين ملفات بيانات مختلفة الحجم في عدد من الأقراص المدمجة.

تمثل الخطوة الأولى لحل مسألة تعبئة الصندوق في إيجاد الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة كما هو مبين في المثال الآتي.

مثال 1

يراد تعبئة العلب (المعطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كل منها 10 وحدات طول، علماً بأن للعب والصناديق المقطع العرضي نفسه. أجد الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العلب.

5 7 3 5 6 2 4 4 7 4

الخطوة 1: أجد مجموع ارتفاعات العلب.

$$5 + 7 + 3 + 5 + 6 + 2 + 4 + 4 + 7 + 4 = 47$$

بجمع ارتفاعات العلب

الخطوة 2: أقسِم مجموع ارتفاعات العلب على ارتفاع الصندوق الواحد.

$$\frac{47}{10} = 4.7$$

بقسمة مجموع ارتفاعات العلب على ارتفاع الصندوق الواحد

≈ 5

بتقريب الناتج إلى الأعلى

إذن، الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العلب هو 5 صناديق.

أتعلم

الأحظ أننا نجد بهذه الطريقة الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العلب، لكن هذا العدد قد لا يكون كافياً من الناحية العملية.

أفكّر

لماذا يقرّب الناتج إلى الأعلى؟ أبّر إجابتي.

أتحقق من فهمي

يراد تعبئة العلب (المعطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كل منها وحدة طول واحدة، علماً بأن للعب والصناديق المقطع العرضي نفسه. أجد الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العلب.

0.5 0.7 0.5 0.2 0.4 0.2 0.5 0.1 0.6

خوارزمية الملاعمة الأولى

توجد خوارزميات عديدة لحل مسألة تعبئة الصندوق، منها **خوارزمية الملاعمة الأولى** (first-fit algorithm). وفي ما يأتي بيان لخطوات هذه الخوارزمية.

خوارزمية الملاعمة الأولى

خوارزمية

- يمكن حل مسائل تعبئة الصندوق باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- إيجاد الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة.
 - اتباع ترتيب العناصر (العلب) المعطى في المسألة.
 - وضع كل عنصر في أول صندوق متواافق يتسع له، بدءاً بالصندوق الأول في كل مرّة.
 - في حال لم يتسع أي صندوق للعنصر الذي يُراد وضعه، فإنّه يجب إضافة صندوق آخر.

أتعلم

إذا كان عدد الصناديق المُتوافرة (التي حصلت عليها) مُساوياً للحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة، فهذا يعني أنّني توصلت إلى الحل الأمثل.

مثال 2

يراد تعبئة العلب (المعطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كل منها 1.5 وحدة طول. إذا علمت أن للعلب والصناديق المقطع العرضي نفسه، فأجيب عن الأسئلة التالية تباعاً:

0.8 0.6 0.5 0.7 0.9 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6

1 أستعمل خوارزمية الملاعمة الأولى لتعبئة العلب في الصناديق، ثم أحدد عدد الصناديق اللازمة لذلك.

الخطوة 1: أجد الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العلب.

$$0.8 + 0.6 + 0.5 + 0.7 + 0.9 + 0.4 + 0.3 + 0.6 + 0.5 + 0.6 = 5.9$$

بإيجاد مجموع ارتفاعات العلب

$$\frac{5.9}{1.5} = 3.93$$

بقسمة مجموع ارتفاعات العلب على ارتفاع الصندوق الواحد

≈ 4

بتقريب الناتج إلى الأعلى

إذن، الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العلب هو 4 صناديق.

الوحدة 2

الخطوة 2: أضع كل علبة في أول صندوق متواافق يُتسَع لها، بدءاً بالصندوق الأول في كل مرة، وألتزم ترتيب العناصر في المسألة.

B1: 0.8, 0.6

علب الصندوق الأول

B2: 0.5, 0.7, 0.3

علب الصندوق الثاني

B3: 0.9, 0.4

علب الصندوق الثالث

B4: 0.6, 0.5


علب الصندوق الرابع

B5: 0.6

علب الصندوق الخامس

إذن، عدد الصناديق الالزامية لتعبئة العلب باستعمال الملاعمة الأولى هو 5 صناديق.

الدعم البياني:



يُبيّن الشكل المجاور ترتيب العلب في الصناديق الخمسة.

الاحظ من الشكل أنَّ ارتفاع العلب في أيٍ من الصناديق لم يتجاوز 1.5 وحدة طول.

أشاهد المقطع المرئي (الفيديو) في الرمز الآتي:



هل توصلت إلى الحل الأمثل لهذه المسألة؟ أُبَرِّر إجابتي.

2

لا؛ لأنَّ عدد الصناديق المستعملة في هذا الحل يزيد على الحد الأدنى من عدد الصناديق الالزامية.

أجد الارتفاع المهدور في الصناديق جميعها.

3

لإيجاد الارتفاع المهدور في الصناديق جميعها، أُحدِّد أولاً الارتفاع المهدور في كل صندوق، ثمَّ أجمع قيم الارتفاعات المهدورة جميعها:

$$0.1 + 0.2 + 0.4 + 0.9 = 1.6$$

مجموع الارتفاعات المهدورة من الصناديق

إذن، هُدر 1.6 وحدة طول في الصناديق جميعها.

أتعلم

يمكن إيجاد الارتفاع المهدور بطريقة أخرى، تتمثل في طرح مجموع ارتفاعات العلب من حاصل ضرب عدد الصناديق المستعملة في التعبئة في ارتفاع الصندوق الواحد كالتالي:
 $5 \times 1.5 - 5.9 = 1.6$

أنتَّقَقْ من فهّمي

يُراد تعبئة العَلَب (المُعطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كل منها 20 وحدة طول. إذا علمت أنَّ للعَلَب والصناديق المقطع العرضي نفسه، فأُجب عن الأسئلة التالية تباعاً:

11 2 15 5 6 17 7

(a) أَسْتَعْمَلْ خوارزمية المُلَاءَمَةِ الْأُولَى لتعبئة العَلَب في الصناديق، ثُمَّ أَحْدَدْ عدَدَ الصناديق اللازمَةَ لِذَلِكَ.

(b) هل توصَّلْتَ إِلَى الْحَلِّ الْأَمْثَلِ لِهَذِهِ الْمُسَأَّلَةِ؟ أَبْرِرْ إِجَابَتِي.

(c) أَجِدْ الارتفاعَ المُهَدَّرَ فِي الصناديقِ جَمِيعِهَا.

خوارزمية المُلَاءَمَةِ الْأُولَى الْمُتَنَاقِصَة

تعلَّمْتُ في المثال السابق حلَّ مسائل تعبئة الصندوق باستعمال خوارزمية المُلَاءَمَةِ الْأُولَى، ولكنَّ تَوْجِدُ خوارزميةً أُخْرَى يُمْكِنُ استعمالُهَا لِحَلِّ هَذِهِ الْمُسَأَّلَةِ، هي خوارزمية المُلَاءَمَةِ الْأُولَى الْمُتَنَاقِصَة (first-fit decreasing algorithm)، التي تبدأ بترتيب مقاسات العناصر المُعْطَاة (ارتفاعات العَلَبِ مثلاً) ترتيباً تنازلياً، ثُمَّ تطبيق خوارزمية المُلَاءَمَةِ الْأُولَى لتعبئة العناصر في الصناديق كما هو مُبَيَّن أدناه.

خوارزمية المُلَاءَمَةِ الْأُولَى الْمُتَنَاقِصَة

خوارزمية

يُمْكِنُ حلَّ مسائل تعبئة الصندوق باستعمال خوارزمية المُلَاءَمَةِ الْأُولَى الْمُتَنَاقِصَةِ، وذلك باتِّباع الخطوتَيْنِ الآتَيْتَيْنِ:

1 ترتيب مقاسات العناصر تنازلياً.

2 تطبيق خوارزمية المُلَاءَمَةِ الْأُولَى على العناصر التي أُعِيدَ ترتيب مقاساتها.

أتَذَكَّرُ

إنَّ تَسْمِيَةَ مسائل تعبئة الصندوق بهذا الاسم لا يعني بالضرورة أنَّها جمِيعاً تتضمَّنْ ملْءَ صناديق بعَلَبِ أَصْغَرِ مِنْهَا، وإنَّما يعني أنَّها تقومُ على المبدأ نفسه؛ لذا استُعْمِلَتْ كلمة (العناصر) بدَلَّاً منَ الكلمة (العَلَب) في صندوق (الخوارزمية المجاورة).

مثال 3

يراد تعبئة العلب (المعطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كل منها وحدتان. إذا علمت أن للعلب والصناديق المقطع العرضي نفسه، فأجيب عن الأسئلة التالية تباعاً:

0.6 1.5 1.6 0.2 0.4 0.5 0.7 0.1 0.9 0.3

1
أستعمل خوارزمية الملاعمة الأولى المتناظرة لتعبئة العلب في الصناديق، ثم أحدد عدد الصناديق اللازمة لذلك.

الخطوة 1: أجد الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العلب.

$$0.6 + 1.5 + 1.6 + 0.2 + 0.4 + 0.5 + 0.7 + 0.1 + 0.9 + 0.3 = 6.8$$

يأيجاد مجموع
ارتفاعات العلب

$$\frac{6.8}{2} = 3.4$$

بقسمة مجموع ارتفاعات العلب
على ارتفاع الصندوق الواحد

≈ 4

بتقريب الناتج إلى الأعلى

إذن، الحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العلب هو 4 صناديق.

الخطوة 2: أرتّب ارتفاعات العلب ترتيباً تنازليًّا.

1.6 1.5 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

الخطوة 3: أطبق خوارزمية الملاعمة الأولى على ارتفاعات العلب التي أعيد ترتيب مقاساتها.

B1: 1.6, 0.4

علب الصندوق الأول

B2: 1.5, 0.5

علب الصندوق الثاني

B3: 0.9, 0.7, 0.3, 0.1

علب الصندوق الثالث


B4: 0.6, 0.2

علب الصندوق الرابع

إذن، عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العلب باستعمال الملاعمة الأولى المتناظرة هو 4 صناديق.

أفكّر

أحل المثال 3 باستعمال
خوارزمية الملاعمة
الأولى، ثم أقارن بين
الحلين.



الدعم البياني:

يُبيّن الشكل المجاور ترتيب الصناديق الأربع.

أشاهد المقطع المرئي
(الفيديو) في الرمز الآتي:



2 هل توصلت إلى الحل الأمثل لهذه المسألة؟ أُبّرر إجابتي.
نعم؛ لأنّ عدد الصناديق المستعملة في هذا الحل مُساوٍ للحد الأدنى من عدد الصناديق الازمة.

3 أجد الارتفاع المهدور في الصناديق جميعها.

أُلاحظ عدم وجود ارتفاعات مهدورة إلّا في الصندوق الأخير، وهو ارتفاع يساوي 1.2 وحدة طول.

أتحقق من فهمي

استعمل خوارزمية الملاعمة الأولى المُتناقصة لإعادة حل المسألة الواردة في المثال الثاني، وأُحدّد إذا كان الحل الناتج هو الحل الأمثل أم لا، وأجد مجموع الارتفاعات المهدورة في الصناديق جميعها، ثم أقارن الحل الذي توصلت إليه بالحل الناتج باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى.

أتعلم

بوجه عام، يكون الحل الناتج من استعمال خوارزمية الملاعمة الأولى المُتناقصة أفضل منه عند استعمال خوارزمية الملاعمة الأولى، لكن ذلك لا يعني بالضرورة التوصل إلى الحل الأمثل دائمًا.

خوارزمية الصندوق الكامل

أُلاحظ أنّ الخوارزميتين اللتين تعلّمتُهما في المثالين السابقين لحل مسائل تعبئة الصندوق تشتّرطان التزام الترتيب المعطى أو الترتيب التنازلي لمقاسات العناصر. ولكن ثمة خوارزمية ثالثة يُمكن استعمالها لحل مسائل تعبئة الصندوق من دون الالتزام بأي ترتيب لمقاسات العناصر، وهي خوارزمية الصندوق الكامل (full-bin packing algorithm).

الوحدة 2

تبدأ هذه الخوارزمية باختيار العناصر التي يمكن دمجها معًا لملء الصندوق كاملاً بصرف النظر عن ترتيب مقاساتها، ثم تبعة العناصر المتبقية باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى.

خوارزمية الصندوق الكامل

خوارزمية

يمكن حل مسائل تبعة الصندوق باستعمال خوارزمية الصندوق الكامل، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

1. إيجاد الحد الأدنى من عدد الصناديق الالزمه.

2. البحث عن العناصر التي يمكن أن تملأ صندوقاً كاملاً، ثم تبعتها أوّلاً.

3. تطبيق خوارزمية الملاعمة الأولى على العناصر المتبقية.

أتعلم

بوجه عام، يكون الحل الناتج من استعمال خوارزمية الصندوق الكامل أفضل منه عند استعمال خوارزمية الملاعمة الأولى أو الملاعمة الأولى المتناقصة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة التوصل إلى الحل الأمثل دائمًا.

مثال 4

يراد تبعة العلّب (المعطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كل منها 17 وحدة طول. إذا علمت أن للعلّب والصناديق المقطع العرضي نفسه، فأجيب عن السؤالين التاليين تباعاً:

3 4 5.2 4.4 4.3 5.6 4.6 4.7 3.2 4.8 5.3 4.1

1 أستعمل خوارزمية الصندوق الكامل لتبعة العلّب في الصناديق، ثم أحدد عدد الصناديق الالزمه لذلك.

الخطوة 1: أجed الحد الأدنى من عدد الصناديق الالزمه لتبعة العلّب.

$$3 + 4 + 5.2 + 4.4 + 4.3 + 5.6 + 4.6 + 4.7 + 3.2 + 4.8 + 5.3 + 4.1 = 53.2$$

بإيجاد مجموع ارتفاعات العلّب

$$\frac{53.2}{17} = 3.129$$

بقسمة مجموع ارتفاعات العلّب على ارتفاع الصندوق الواحد

≈ 4

بتقريب الناتج إلى الأعلى

إذن، الحد الأدنى من عدد الصناديق الالزمه لتبعة العلّب هو 4 صناديق.

الخطوة 2: أطبق خوارزمية الصندوق الكامل.

B1: 3, 4, 4.7, 5.3

علّب الصندوق الأول

B2: 4.4, 4.6, 3.2, 4.8

علّب الصندوق الثاني


B3: 5.2, 4.3, 5.6

ألعاب الصندوق الثالث

B4: 4.1

ألعاب الصندوق الرابع

إذن، عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العُلَب باستعمال خوارزمية الصندوق الكامل هو 4 صناديق.




الدعم البياني:

يُبيّن الشكل المجاور ترتيب العُلَب في الصناديق الأربع.

أتعلّم

ألاحظ أنَّ الذي مُلِئَ أولاً هو الصندوق الأوَّل والصندوق الثاني، ثمَّ استعملت خوارزمية الملاعمة الأولى لمُلئ الصندوق الثالث والصندوق الرابع.

أشاهد المقطع المرئي (الفيديو) في الرمز الآتي:



هل توصلت إلى الحل الأمثل لهذه المسألة؟ أبْرُر إجابتي.

نعم؛ لأنَّ عدد الصناديق المستعملة في هذا الحل مُساوٍ للحد الأدنى من عدد الصناديق اللازمة.

أتحقّق من فهمي

استعمل خوارزمية الصندوق الكامل لإعادة حل المسألة الواردة في المثال الثالث، وأحدّد إذا كان الحل الناتج هو الحل الأمثل أم لا، ثمَّ أقارِن الحل الذي توصلت إليه بالحل الناتج باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى المُنْتَاقِصة.

خوارزميات تعبئة الصندوق

ملخص المفهوم

سلبياتها	إيجابياتها	اسم الخوارزمية
عدم تقديم حل جيد في أغلب الأحيان.	سهولة التطبيق.	خوارزمية الملاعمة الأولى.
قد لا تُقدم الحل الأمثل.	سهولة التطبيق.	خوارزمية الملاعمة الأولى المُنْتَاقِصة.
قد لا تُقدم الحل الأمثل.	تقديم حل جيد نوعاً ما بوجه عام.	خوارزمية الصندوق الكامل.
من الصعب تطبيقها إذا كان عدد العناصر كبيراً جدًا، وكانت مقاساتها قيَّماً عشريةً.	تقديم حل جيد بوجه عام.	

الوحدة 2

يمكن توظيف خوارزميات التعبئة في العديد من التطبيقات الحياتية التي تهدف إلى تقليل أكبر قدر من الهدر في المساحات والأطوال.



مثال 5 : من الحياة

32 45 17 23 38 28 16 9 12 10

أجد الحد الأدنى من عدد لفّات القماش الكبيرة اللازمة لقص قطع القماش.

$$32 + 45 + 17 + 23 + 38 + 28 + 16 + 9 + 12 + 10 = 230$$

بإيجاد مجموع أطوال

قطع القماش

بقسمة مجموع أطوال قطع القماش
على طول اللفة الكبيرة الواحدة

≈ 4

بتقريب الناتج إلى الأعلى

إذن، الحد الأدنى من عدد لفّات القماش الكبيرة اللازمة لقص قطع القماش هو 4 لفّات.

أحدّد كيف تُقص قطع القماش باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى، ثمّ أحدّد عدد اللفّات
اللزامية لذلك باستعمال هذه الخوارزمية، ثمّ أجد طول الجزء المهدور من القماش.

B1: 32, 17, 9

قطع القماش التي سُقص من اللفة الأولى

B2: 45, 12

قطع القماش التي سُقص من اللفة الثانية

B3: 23, 28

قطع القماش التي سُقص من اللفة الثالثة

B4: 38, 16

قطع القماش التي سُقص من اللفة الرابعة

B5: 10

قطع القماش التي سُقص من اللفة الخامسة

إذن، عدد اللفّات اللازمة لقص قطع القماش ذات الأطوال المُعطاة باستعمال خوارزمية
الملاعمة الأولى هو 5 لفّات قماش كبيرة.

أتعلم

الجزء المهدر من كل لفة هو طول اللفة الكلية (60 m) مطروحاً منه مجموع قطع القماش التي يُراد قصُّها من تلك اللفة. فمثلاً، الجزء المهدر من اللفة الأولى هو: $60 - (32 + 17 + 9) = 2$

لإيجاد طول الجزء المهدر من القماش، أُحدّد أولاً طول الجزء المهدر من كل لفة كبيرة، ثمّ أجمع أطوال الأجزاء المهدرة:

$$\text{مجموع أطوال الأجزاء المهدرة من لفّات القماش الكبيرة} = 2 + 3 + 9 + 6 + 50 = 70$$

إذن، طول الجزء المهدر من القماش هو 70 m

أُحدّد كيف تُقصُّ قطع القماش باستعمال خوارزمية الصندوق الكامل، ثمّ أُحدّد عدد اللفّات اللازمة لذلك باستعمال هذه الخوارزمية، ثمّ أجد طول الجزء المهدر من القماش.

3

قطع القماش التي ستُقصُّ من اللفة الأولى

$$B1: 32, 28$$

قطع القماش التي ستُقصُّ من اللفة الثانية

$$B2: 38, 12, 10$$

قطع القماش التي ستُقصُّ من اللفة الثالثة

$$B3: 45, 9$$

قطع القماش التي ستُقصُّ من اللفة الرابعة

إذن، عدد اللفّات اللازمة لقصّ قطع القماش ذات الأطوال المُعطاة باستعمال خوارزمية الصندوق الكامل هو 4 لفّات قماش كبيرة.

لإيجاد طول الجزء المهدر من القماش، أُحدّد أولاً طول الجزء المهدر من كل لفة كبيرة، ثمّ أجمع أطوال الأجزاء المهدرة:

$$6 + 4 = 10$$

مجموع أطوال الأجزاء المهدرة من لفّات القماش الكبيرة

إذن، طول الجزء المهدر من القماش هو 10 m

أيُّ الخوارزميتين توصلتُ بها إلى الحلّ الأمثل؟ أُبرّر إجابتي.

4

توصّلتُ إلى الحلّ الأمثل باستعمال خوارزمية الصندوق الكامل؛ لأنّ عدد لفّات القماش الذي حصرّته من تطبيقها مساوٍ للحدّ الأدنى من عدد اللفّات اللازمة.

أتعلم

اللاحظ أنَّ كمية القماش التي أهدرت باستعمال خوارزمية الملاعنة الأولى تزيد على كمية القماش التي أهدرت باستعمال خوارزمية الصندوق الكامل بمقدار 60 m؛ لذا يُعدُّ قصُّ قطع القماش في هذه المسألة باستعمال خوارزمية الصندوق الكامل أفضل.

الوحدة 2

أتحقق من فهمي



تَخْرِيزِ الْبَيَانَاتِ: فِي مَا يَأْتِي سَاعَات٩ مَلَفَاتٌ حَاسُوبِيَّةٌ (بِالْجِيْجَابِيَّتِ) يُرَادُ حَفْظُهَا فِي أَقْرَاصٍ تَخْرِيزٍ، سَعَةٌ كُلُّ مِنْهَا 100 جِيْجَابَيْتٌ:

29 52 73 87 74 47 38 61 41

(a) أَجِدُ الْحَدَّ الْأَدْنِيَّ مِنْ عَدْدِ أَقْرَاصِ التَّخْرِيزِ الْلَّازِمَةِ لِحَفْظِ الْمَلَفَاتِ.

(b) أَحَدِّدُ كِيفَ تُحَفَّظُ الْمَلَفَاتُ فِي الأَقْرَاصِ بِاسْتِعْمَالِ خَوَارِزْمِيَّةِ الْمُلَاءَمَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أَحَدِّدُ عَدْدِ الأَقْرَاصِ الْلَّازِمَةِ لِذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ، ثُمَّ أَجِدُ مَسَاحَةَ التَّخْرِيزِ الْمَهْدُورَةِ فِي الأَقْرَاصِ.

(c) أَحَدِّدُ كِيفَ تُحَفَّظُ الْمَلَفَاتُ فِي الأَقْرَاصِ بِاسْتِعْمَالِ خَوَارِزْمِيَّةِ الصَّنْدُوقِ الْكَامِلِ، ثُمَّ أَحَدِّدُ عَدْدِ الأَقْرَاصِ الْلَّازِمَةِ لِذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ، ثُمَّ أَجِدُ مَسَاحَةَ التَّخْرِيزِ الْمَهْدُورَةِ فِي الأَقْرَاصِ.

(d) أَيُّ الْخَوَارِزْمِيَّينِ تَوَصَّلْتُ بِهَا إِلَى الْحَلِّ الْأَمْثَلِ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِيِّيِّ.

أتدرب وأصلل المسائل

يُرَادُ تَبَعِيَّةُ الْعُلَبِ (الْمُعْطَى ارْتِفَاعَاهُ فِي مَا يَلِي) فِي صَنَادِيقِ، ارْتِفَاعٌ كُلُّ مِنْهَا 5 وَحدَاتٍ طَوْلٌ. إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ لِلْعُلَبِ وَالصَّنَادِيقِ الْمُقْطَعِ الْعَرْضِيِّ نَفْسَهُ، فَأُجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَّةِ تِبَاعًا:

1.8 1.4 2.6 1.6 2.8 0.9 3.1 0.8 1.2 2.4 0.6

1 أَسْتِعْمَلُ خَوَارِزْمِيَّةِ الْمُلَاءَمَةِ الْأُولَى لِتَبَعِيَّةِ الْعُلَبِ فِي الصَّنَادِيقِ، ثُمَّ أَحَدِّدُ عَدْدِ الصَّنَادِيقِ الْلَّازِمَةِ لِذَلِكَ.

2 هَلُ الْحَلُّ النَّاتِجُ فِي السُّؤَالِ السَّابِقِ هُوَ الْحَلُّ الْأَمْثَلُ لِهَذِهِ الْمَسَأَلَةِ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِيِّيِّ.

3 أَجِدُ الْأَرْتِفَاعَ الْمَهْدُورَ فِي الصَّنَادِيقِ جَمِيعَهَا.

يُراد تبعة العَلَب (المُعْطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كُلٌ منها 60 وحدة طول. إذا علمتُ أنَّ للعَلَب والصناديق المقطع العرضي نفسه، فأُجيب عن الأسئلة التالية تباعًا:

31 10 38 45 19 47 35 28 12

- 4 أستعمل خوارزمية الملاعمة الأولى المُنْتَاقِصَة لتبعة العَلَب في الصناديق، ثمَّ أُحدِّد عدد الصناديق اللازمَة لذَلِك.
- 5 هل الْحُلُّ الناتج في السؤال السابق هو الْحُلُّ الأمثل لهذه المسألة؟ أُبَرِّر إجابتي.
- 6 أجِد الارتفاع المهدور في الصناديق جميعها.

يُراد تبعة العَلَب (المُعْطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كُلٌ منها 65 وحدة طول. إذا علمتُ أنَّ للعَلَب والصناديق المقطع العرضي نفسه، فأُجيب عن الأسئلة التالية تباعًا:

42 21 15 16 35 10 31 11 27 39

- 7 أستعمل خوارزمية الصندوق الكامل لتبعة العَلَب في الصناديق، ثمَّ أُحدِّد عدد الصناديق اللازمَة لذَلِك.
- 8 هل الْحُلُّ الناتج في السؤال السابق هو الْحُلُّ الأمثل لهذه المسألة؟ أُبَرِّر إجابتي.
- 9 أجِد الارتفاع المهدور في الصناديق جميعها.

شحن: في ما يأتي كتل 7 أجهزة (بالكيلوغرام) يُراد شحنها في صناديق؛ على أَلَّا تتجاوز كتلة الصندوق الواحد 60 kg:

41 28 42 31 36 32 29

- 10 أجِد الحدَّ الأدنى من عدد الصناديق اللازمَة لشحن الأجهزة.
- 11 أُحدِّد كيف تُوزَّع الأجهزة على الصناديق باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى، ثمَّ أُحدِّد عدد الصناديق اللازمَة لذلك باستعمال هذه الخوارزمية.
- 12 أُحدِّد كيف تُوزَّع الأجهزة على الصناديق باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى المُنْتَاقِصَة، ثمَّ أُحدِّد عدد الصناديق اللازمَة لذلك باستعمال هذه الخوارزمية.
- 13 أُحدِّد كيف تُوزَّع الأجهزة على الصناديق باستعمال خوارزمية الصندوق الكامل، ثمَّ أُحدِّد عدد الصناديق اللازمَة لذلك باستعمال هذه الخوارزمية.
- 14 أيُّ الخوارزميات توصلَتُ بها إلى الْحُلُّ الأمثل؟ أُبَرِّر إجابتي.

الوحدة 2



أَسْلَاكٌ نَحَاسِيَّةٌ: فِي مَا يَأْتِي أَطْوَالٌ (بِالسْتِيْمِيْر) لـ 10 قطع يُرَادُ فَصُّهَا مِنْ أَسْلَاكٌ نَحَاسِيَّةٌ، طُولُ كُلٌّ مِنْهَا 1 m:

59 45 18 55 47 11 63 17 15 14

أُحَدِّد كَيْفَ تُقْصُّ الْقُطْعُ بِاسْتِعْمَالِ خَوَارِزْمِيَّةِ الْمُلَاءَمَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أُحَدِّدُ عَدْدَ الْأَسْلَاكِ الْلَّازِمَةَ لِذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ، ثُمَّ أَجِدُ طُولَ الْجَزْءِ الْمَهْدُورِ مِنَ الْأَسْلَاكِ جَمِيعَهَا. 15

أُحَدِّد كَيْفَ تُقْصُّ الْقُطْعُ بِاسْتِعْمَالِ خَوَارِزْمِيَّةِ الْمُلَاءَمَةِ الْأُولَى الْمُتَنَاقِصَةِ، ثُمَّ أُحَدِّدُ عَدْدَ الْأَسْلَاكِ الْلَّازِمَةَ لِذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ، ثُمَّ أَجِدُ طُولَ الْجَزْءِ الْمَهْدُورِ مِنَ الْأَسْلَاكِ جَمِيعَهَا. 16

أُحَدِّد كَيْفَ تُقْصُّ الْقُطْعُ بِاسْتِعْمَالِ خَوَارِزْمِيَّةِ الصِّنْدُوقِ الْكَامِلِ، ثُمَّ أُحَدِّدُ عَدْدَ الْأَسْلَاكِ الْلَّازِمَةَ لِذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ، ثُمَّ أَجِدُ طُولَ الْجَزْءِ الْمَهْدُورِ مِنَ الْأَسْلَاكِ جَمِيعَهَا. 17

أَيُّ الْخَوَارِزْمِيَّاتِ تَوَصَّلَتْ بِهَا إِلَى الْحَلِّ الْأَمْثَلِ؟ أَبْرُرُ إِجَابِيَّ. 18

أَثْقَالٌ: أَعُودُ إِلَى الْمَسَأَةِ الْوَارِدَةِ فِي بَنْدِ (مَسَأَةُ الْيَوْمِ)، ثُمَّ أُجِيبُ عَنِ الْمَسَأَةِ الْأَتِيَّةِ تَبَاعًا:

أُحَدِّدُ كَيْفَ تُرَتَّبُ الْأَثْقَالُ عَلَى الرُّفُوفِ بِاسْتِعْمَالِ خَوَارِزْمِيَّةِ الْمُلَاءَمَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أُحَدِّدُ عَدْدَ الرُّفُوفِ الْلَّازِمَةِ لِذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ.

أُحَدِّدُ كَيْفَ تُرَتَّبُ الْأَثْقَالُ عَلَى الرُّفُوفِ بِاسْتِعْمَالِ خَوَارِزْمِيَّةِ الْمُلَاءَمَةِ الْأُولَى الْمُتَنَاقِصَةِ، ثُمَّ أُحَدِّدُ عَدْدَ الرُّفُوفِ الْلَّازِمَةِ لِذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ.

أُحَدِّدُ كَيْفَ تُرَتَّبُ الْأَثْقَالُ عَلَى الرُّفُوفِ بِاسْتِعْمَالِ خَوَارِزْمِيَّةِ الصِّنْدُوقِ الْكَامِلِ، ثُمَّ أُحَدِّدُ عَدْدَ الرُّفُوفِ الْلَّازِمَةِ لِذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ.



تبرير: في ما يأتي أطوال 8 قطع خشبية (بالستيمتر) تلزم لصنع خزانة صغيرة، ويراد قصها من ألواح خشبية:

20 35 50 60 20 70 75 20

22 تتوفر ألواح خشبية، طول كل منها 1 m، وسعرها 3 JD. أستعمل خوارزمية الملاعمة الأولى المُنناقصة لتحديد كيف تُقصُ القطع الخشبية من الألواح، ثم أجد التكلفة الكلية لصنع الخزانة باستعمال هذه الخوارزمية، ثم أحسب الكمية المهدورة من الخشب.

23 تتوفر ألواح خشبية، طول كل منها 1.5 m، وسعرها 4 JD. أستعمل خوارزمية الملاعمة الأولى المُنناقصة لتحديد كيف تُقصُ القطع الخشبية من هذه الألواح، ثم أجد التكلفة الكلية لصنع الخزانة باستعمال هذه الخوارزمية، ثم أحسب الكمية المهدورة من الخشب.

24 أيُّ الخوارزميتين يُمكِّن استعمالها لصنع الخزانة بتكلفة أقل؟ أُبَرِّر إجابتي.

25 ما أقل تكلفة لصنع الخزانة إذاً أمكن استعمال الألواح التي طولها 1 m والألواح التي طولها 1.5 m معًا؟ أُبَرِّر إجابتي.

تحلٌّ: في ما يأتي كتل 9 حقائب سفر (بالكيلوغرام) يُراد نقلها في حاويات، وُيمكِّن لـ كل منها أن تحمل كتلة إجمالية أقصاها 50 kg:

24 14 8 x 19 25 6 17 9

إذا علِمْتُ أنَّ كتلة إحدى الحقائب لم تُفْسِنْ قياساً دقيقاً، ولتكن x كيلوغراماً، حيث $23 \leq x < 19$ ، فأُجِيب عن الأسئلة الآتية تباعاً:

26 أُحدِّد كيف تُوزَّع الحقائب على الحاويات باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى.

27 أُحدِّد الطريقيتين المُمكِّتين لتوزيع الحقائب على الحاويات باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى المُنناقصة.

28 أُحدِّد القيمة (القيَمَ) المُمكِّنة للمُتغيَّر x في كلٍّ من الطريقيتين المُشار إليهما في السؤال السابق بعد توزيع الحقائب باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى المُنناقصة.



المُخَطَّطات


Graphs

فكرة الدرس



- تعُرف المُخَطَّط، ومُكُوِّناته، وبعض التعريفات الأساسية المتعلقة به.
- إيجاد درجة كل رأس من رؤوس مُخَطَّط مُعطى، وتعُرف العلاقة بين درجات الرؤوس وعدد الحافات، واستعمالها لحل المسائل.

مُخَطَّط، رأس، حافة، مُخَطَّط موزون، نظرية المُخَطَّطات، المسار، مجموعة الرؤوس، مجموعة الحافات، مجموعة الدرجات، درجة الرأس، ممشى، ممر، طريق، دارة، دارة هاملتون، دارة أويلر، حلقة، حافات متعددة.



يُبيّن الشكل المجاور 4 مناطق في مدينة، يفصل بينها نهر متفرّع، وقد أُنْشِئت 7 جسور بين تلك المناطق. هل يُمْكِن زيارة المناطق الأربع جميعها، بَدْءاً بإحداها؛ شرط عبور الجسور السبعة جميعها وعدم عبور أي جسر منها مَرَّتين، ثُمَّ العودة إلى نقطة البداية؟

المصطلحات




مسألة اليوم



المُخَطَّطات

تنطوي العديد من المواقف الحياتية على روابط بين أشخاص أو أماكن أو أشياء مختلفة. فمثلاً، ترتبط المدن بعضها بعضها عبر الطرق، وتتصل أجهزة الحاسوب بعضها بعضها عبر شبكات الإنترنت، ويُمْكِن التعبير عن كلٍّ من هذه الروابط بتمثيل بياني يُسمى **المُخَطَّط**



(graph)؛ وهو وسيلة تُظْهِر كيف ترتبط الأشياء المختلفة بصريًّا، بحيث يُعبَّر عن هذه الأشياء بعقدٍ يُسمى **الرؤوس** (vertices)، ويعُبَّر عن الرابط بين الرؤوس (إنْ وُجدت) بخطوط (أو منحنيات) متصلة يُسمى **الحافات** (edges) كما يُظْهِر في الشكل المجاور.

أتعلَّم

تقاطع حافتين في المُخَطَّط لا يُمْثِل رأساً.

نظرية المُخطّطات (graph theory) هي تسمية لفرع من فروع الرياضيات يعني بدراسة المُخطّطات.

مثال 1: من الحياة

الباص السريع: أتأمل الشكل الآتي الذي يُبيّن شبكة الباص السريع داخل مدينة عمان، ثم أجب عن الأسئلة التالية تباعاً:



يُعدُّ مشروع الباص السريع أول نظام نقل عام حديث لمدينة عمان، وهو يمتاز بالسرعة والمومنة والكفاءة والأمان والدقة في المواعيد؛ ما يُوفر كثيراً من الوقت والجهد. وقد أُفرِد لهذا المشروع مسارات خاصة تسير عليها حافلات كبيرة تُقدّم خدمات متميزة للركاب.

1

هل يُعدُّ الشكل السابق مُخطّطاً؟ أُبّرِر إجابتي.

نعم؛ لأنَّه يحتوي على رؤوس، وعلى حافات بين بعض هذه الرؤوس.

2

أُصِف ما تُمثّله كُلُّ من الرؤوس والحافات في المُخطّط؟


تُمثّل الرؤوس المَحَطّات التي يتوقف عندها الباص السريع، وتُمثّل الحافات مسارات الباص السريع بين المَحَطّات.

3

أُحدِّد المَحَطّات التي سيمُرُّ بها الباص في رحلة من مُجَمَّع المَحَطة إلى حدائق الملك عبد الله.

المَحَطّات التي سيمُرُّ بها الباص أثناء الرحلة هي: مستشفى الأمير حمزة، وتقاطع طارق، ومجَمَّع الشمال، ودُوّار المدينة الرياضية.

أتحقق من فهمي



طيران: أتأمل الشكل المجاور الذي يُبيّن المسارات الجوية التي تتبعها طائرات إحدى شركات الطيران، ثم أُجيب عن الأسئلة الآتية تباعاً:

(a) هل يُعدُّ الشكل المجاور مُخططاً؟

(b) أُصِف ما تُمثِّله كُلُّ من الرؤوس والحافات في المُخطَّط.

(c) أُحدِّد المَحَطَّات التي سَتَمُرُّ بها إحدى الطائرات التابعة للشركة في رحلة من الرأس M_1 إلى الرأس M_6 (أذْكُر حَلَّيْن مُخْتَلِفَيْن).

المُخطَّطات الموزوَّنة

يُطَلَّقُ على المُخطَّط الذي يَحْوي قيمَة مُقْتَرِنة بكل حافة من حافاته اسم **المُخطَّط الموزوَّن** (weighted graph)، وَتُمثِّلُ هذه القيَم مُقايسٍ عدِيدٍ، مثل: المسافة، والتَّكْلِفَة، والزَّمْن.

يُمْكِن استعمال المُخطَّطات الموزوَّنة لحلّ العدِيد من المسائل الحياتية والعلمية، مثل تحديد المسار الذي يُمْكِن به الوصول من موقع إلى آخر في إحدى المدن عبر أقصر مسار مُمُكِن، أو بأقل تكلفة مُمُكِنة. وبلغة المُخطَّطات، فإنَّ المسار (route) من الرأس A إلى الرأس B هو مجموعة من الحافات، تبدأ بالرأس A ، وتنتهي بالرأس B ، وقد يتكرَّر في المسار أيُّ من الرؤوس والحافات.

لغة الرياضيات


يُطَلَّق على القيمة المُقْتَرِنة بالحافة اسم وزن الحافة.

لغة الرياضيات

يُطَلَّقُ أيضًا على المسار اسم الممشى.

لغة الرياضيات

المسار المباشر بين رأسين في مُخطَّط هو الحافة بين هذين الرأسين (إنْ وُجِدَت).



مثال 2 : من الحياة

طرق: يُبيّن الشكل المجاور مُخطَّطًا للطرق الرئيسية في إحدى المدن، وَيُمثِّلُ العدَّد على كل حافَة المسافة (بالكيلومترات) بين كل منطقتين في المدينة:

أتعلم

طول المسار هو مجموع أوزان حافاته.

أجد طول المسار المباشر بين المنطقة F والمنطقة C .


طول المسار المباشر بين هاتين المنطقتين هو: 2 km

أحد أقصر مسار بين المنطقة A والمنطقة D .

لتحديد أقصر مسار بين هاتين المنطقتين، أحدد أولاً جميع المسارات التي تصل بينهما، وأجد طول كل منها، ثم أحدد أقصر مسار بين هذه المسارات:

المسار	طول المسار (بالكيلومترات)
$ABCD$	$3 + 5 + 5 = 13 \text{ km}$
$AFED$	$4 + 6 + 9 = 19 \text{ km}$
$AFCD$	$4 + 2 + 5 = 11 \text{ km}$
$ABCDEF$	$3 + 5 + 2 + 6 + 9 = 25 \text{ km}$

إذن، أقصر مسار بين المنطقة A والمنطقة D هو $AFCD$ ، وطوله 11 km



أتحقق من فهمي

طرق: يبيّن الشكل المجاور مخططاً للطرق الرئيسية بين مجموعة من المدن، ويُمثل العدد على كل حافة الزمن (بالساعات) الذي تستغرقه سيارة في قطع المسافة بين كل مدينتين:

(a) أحدد الزمن الذي تستغرقه السيارة في قطع المسار المباشر بين المدينة B والمدينة E .

(b) أحدد أقل زمن تستغرقه السيارة في الوصول من المدينة A إلى المدينة F ، والمسار الذي تبعه في هذه الرحلة.

أتعلم


من غير المنطقي النظر في المسارات التي تحوي حافات مكررة في المثال 2

أتعلم

بوجه عام، لا تُرسم المخطّطات الموزونة وفق تناوب دقيق بين القيم المُقترنة بالحافات؛ فقد تبدو حافتان متساويتين في الطول، في حين أنهما تقرنان بقيمتي مختلفتين.

رؤوس المُخطّط وحافاته


في ما يأتي بعض التعريفات الأساسية الخاصة بنظرية المُخطّطات:



- **مجموعة الرؤوس** (vertices set): مجموعة تحوي جميع رؤوس المُخطّط. فمثلاً، مجموعة رؤوس المُخطّط R المجاور هي: (A, B, C, E) .
- **مجموعة الحافات** (edges set): مجموعة تحوي جميع حافات المُخطّط. فمثلاً، مجموعة حافات المُخطّط R المجاور هي: (AB, AE, BC, BE, CE) , حيث يُعبّر الرمز AB مثلاً عن الحافة بين الرأس A والرأس B .
- **درجة الرأس** (degree of the vertex): عدد يُعبر عن عدد الحافات التي تلتقي عند الرأس. فمثلاً، درجة الرأس A في المُخطّط R أعلاه هي 2، ودرجة الرأس B في المُخطّط نفسه هي 3.

- **مجموعة الدرجات** (degree set): مجموعة تحوي جميع درجات رؤوس المُخطّط. فمثلاً، مجموعة الدرجات للمُخطّط R أعلاه هي:

$$\deg R = (2, 2, 3, 3)$$



أتأمل المُخطّط R المجاور، ثم أجيّب عن كلّ ممّا يأتي:

- أُحدّد مجموعة الرؤوس ومجموعة الحافات.
- مجموعة الرؤوس هي: (E, F, G, H, L) .
- مجموعة الحافات هي: (EL, EH, EG, FH) .

أتعلّم

إذا كانت درجة الرأس عدداً زوجياً، فإنّها تُسمّى درجة زوجية، أمّا إذا كانت عدداً فردياً، فإنّها تُسمّى درجة فردية. فمثلاً، للرأس B في المُخطّط R المجاور درجة فردية، وللرأس C فيه درجة زوجية.

رموز رياضية

يُرمز إلى مجموعة درجات المُخطّط R ، $\deg R$ أعلاه بالرمز \deg ، علمًا بأنّ \deg اختصار الكلمة الإنجليزية (degree) التي تعني الدرجة.

مثال 3

أفكّر

هل تُعد نقطة تقاطع الحافة FH مع الحافة EG رأساً؟ أبّر إجابتي.

أُحدّد درجة كل رأس، ونوعها.

2

الرأس	الدرجة	نوع الدرجة
E	3	فردية
F	1	فردية
G	1	فردية
H	2	زوجية
L	1	فردية

أتعلّم

الحافة بين الرأس L والرأس E تُكتب EL أو $.LE$.

أُحدّد مجموع درجات المُخْطَط.

3

$$\deg R = (1, 1, 1, 2, 3)$$


أتحقق من فهمي

أتَأْمَلُ المُخْطَط G المجاور، ثُمَّ أُجِيبُ عن كُلِّ مَا يَأْتِي:

(a) أُحدّد مجموع رؤوس ومجموع الحافات.

(b) أُحدّد درجة كل رأس، ونوعها.

(c) أُحدّد مجموع درجات المُخْطَط.



المُخْطَط G

مجموع درجات رؤوس المُخْطَط

يُمْكِنُ أَيْضًا إِيجاد مجموع درجات رؤوس أي مُخْطَطٍ إِذَا عُلِمَ عَدْدُ حَافَاتِهِ، وَذَلِكَ بِضَرِبِ عَدْدِ حَافَاتِهِ فِي 2؛ لَأَنَّ كُلَّ حَافَةٍ تَرْتَبِطُ بِرَأْسَيْنِ.

مجموع درجات رؤوس المُخْطَط

مفهوم أساسى

إِذَا كَانَ لِمُخْطَطٍ n مِنَ الرُّؤُوسِ، وَ E مِنَ الْحَافَاتِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ إِيجاد مجموع درجات رؤوس هذا المُخْطَطٍ باسْتِعْمَالِ الْعَلَاقَةِ الْأَتَى:

$$\sum_{k=1}^n (\deg V_k) = 2E$$


حيث $\deg V_k$ درجة الرأس V_k .

أُفَكِّر

نتيجةً لمفهوم الأساسي المجاور؛ فإنَّ عَدْدَ الرُّؤُوسِ ذَاتِ الْدَرْجَةِ الفردية يَجِبُ أَنْ يَكُونَ زُوْجِيًّا أَوْ 0، لِمَاذَا؟

الوحدة 2

مثال 4



أجد مجموع درجات رؤوس المُنْخَطَط المجاور.

1

للمُنْخَطَط المجاور 10 حفافات؛ لذا يمكن إيجاد مجموع درجات رؤوسه كالتالي:

$$\sum_{k=1}^n (\deg V_k) = 2E$$

علاقة مجموع درجات رؤوس المُنْخَطَط

$$\sum_{k=1}^7 (\deg V_k) = 2(10)$$

بتعويض $n = 7, E = 10$

$$= 20$$

بالتبسيط

إذن، مجموع درجات رؤوس المُنْخَطَط هو: 20

2. $x, 2x, 2x-1, x+1, x+1, x^2-1$ مُنْخَطَط له 6 رؤوس و 9 حفافات، ودرجات رؤوسه هي:

أجد قيمة المُنْغِير x .

$$\sum_{k=1}^n (\deg V_k) = 2E$$

علاقة مجموع درجات رؤوس المُنْخَطَط

$$x + 2x + 2x - 1 + x + 1 + x + 1 + x^2 - 1 = 2(9)$$

بتعويض

$$x^2 + 7x = 18$$

بالتبسيط

$$x^2 + 7x - 18 = 0$$

طرح 18 من طرفي المعادلة

$$(x + 9)(x - 2) = 0$$

بالتحليل


باستعمال خاصية الضرب الصفرى

$$x = -9$$

$$x = 2$$

بحل كل معادلة

بما أن x يمثل درجة أحد الرؤوس، فإنه من غير الممكِّن أن يكون x سالبًا. إذن: $x = 2$.




اتحقق من فهمي


(a) أجد مجموع درجات رؤوس المُخطّط المجاور.

(b) مُخطّط له 5 رؤوس و 6 حافات، ودرجات رؤوسه هي: $x, x^2 + 2, 3x - 1, 3x, 2x + 1$. أجد قيمة المُتغيّر x .


الممثى والممر والطريق والدارة والحلقة في المُخطّط




• **الممثى (walk):** سلسلة من الحافات في المُخطّط، تمثّل فيها نهاية كل حافة ببداية حافة أخرى، ما عدا الحافة الأخيرة. فمثلاً، ممثى $ABCEBA$ في المُخطّط المجاور.




• **الممر (trail):** ممثى لا تتكرّر فيه أيُّ حافة، ويُمكن أن تتكرّر فيه الرؤوس. فمثلاً، $EABEC$ ممر في المُخطّط المجاور.



• **الطريق (path):** ممر لا يتكرّر فيه أيُّ رأس. فمثلاً، $EABC$ طريق في المُخطّط المجاور.



• **الدارة (circuit):** ممر رأس بدايته هو نفسه رأس نهايته، ولا يتكرّر فيه أيُّ رأس، ما عدا رأس البداية ورأس النهاية. فمثلاً، $ABEA$ دارة في المُخطّط المجاور.



• **دارة هامiltonون (Hamiltonian circuit):** دارة تحوي جميع رؤوس المُخطّط. فمثلاً، $ABCEA$ دارة هامiltonون في المُخطّط المجاور.

أتعلم

يمكن تكرار الحافات والرؤوس في الممثى. فمثلاً، في الممثى $ABCEBA$ تكرّرت الحافة AB (أو BA).

أتعلم


لا يُشترط في في أيِّ من الممثى، أو الطريق، أو الممر، أو الدارة أن يحوي جميع رؤوس المُخطّط.

أتعلم

لا تتكرّر أيُّ حافة في الدارة، ولا في الطريق.

الوحدة 2


• دارة أويلر (Eulerian circuit): ممر رأس بدايته هو نفسه رأس نهايته، وهو يشمل



جميع حافات المُخطّط من دون تكرار. فمثلاً، دارة $ABCDECA$ دارة أويلر في المُخطّط المجاور.

أتعلم


درجة الرأس E في هذه الحالة هي 5؛ لأنَّ الحلقة تُعدُّ حافة في كلا الاتجاهين.



• الحلقة (loop): حافة تبدأ بالرأس نفسه، وتنتهي به. فمثلاً، حلقة EE في المُخطّط المجاور.


أتعلم

عند تحديد مجموعة الحافات في المُخطّط المجاور، يجب ذكر EC مرتين؛ نظراً إلى وجود حافتين تربطان بين الرأس E والرأس C .



• الحافات المُتعدّدة (multiple edges): حافتان أو مجموعة من الحافات التي تربط زوجاً من الرؤوس. فمثلاً، الحافات المُتعدّدة في المُخطّط المجاور تربط بين الرأس E والرأس C .

مثال 5



أتَأْمَلُ المُخطّط المجاور، ثُمَّ أُحدِّدُ فيه ممَّى لا يُمثِّل ممَّا، وممَّا لا يُمثِّل طرِيقاً، وطريقاً، ودَارَةً، ودَارَةً هاميلتون (إنْ وُجِدت)، ودَارَةً أُويْلَر (إنْ وُجِدت).

• ممَّى لا يُمثِّل ممَّا: $POMNOP$.

• ممَّا لا يُمثِّل طرِيقاً: $MLPOMP$.

• طرِيق: $MLPO$.

• دَارَة: $LMOPL$.

• دَارَة هاميلتون: $LMNOPL$.

• دَارَةً أُويْلَر: لا يُمكِّن إيجاد دَارَةً أُويْلَر في هذا المُخطّط.


أتعلم

$POMNOP$ في المثال المجاور ليس ممَّا؛ لأنَّ الحافة OP تكرَّرت فيه.

أتعلم


إذا كانت درجة كل رأس من رؤوس المُخطّط زوجيَّة، وكان يوجد ممَّا بين أيِّ رأسين في المُخطّط، فإنَّ المُخطّط يحتوي على دَارَةً أُويْلَر.

أتحقق من فهمي



أتَأْمَلُ الْمُخْطَطَ الْمُجاوِرَ، ثُمَّ أُحْدِدُ فِيهِ مُمْشَى لَا يُمْثِلُ مَمْرَّاً، وَمَمْرَّاً لَا يُمْثِلُ طَرِيقًا، وَطَرِيقًا، وَدَارَةً، وَدَارَةً هَامِلْتُونَ (إِنْ وُجِدَتْ)، وَدَارَةً أُوْبِلْرَ (إِنْ وُجِدَتْ).

أتدرب وأحل المسائل




أتَأْمَلُ الشَّكْلَ الْمُجاوِرَ الَّذِي يُبَيِّنُ عَلَاقَاتَ الصَّدَاقَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بَيْنَ مَجْمُوعَةِ الْفَتَيَاتِ فِي أَحَدِ مَوَاقِعِ التَّوَاصِلِ الْإِجْتِمَاعِيِّ، ثُمَّ أُجَبِّ عَنْ كُلِّ مَا يَأْتِي:

1 هل يُعَدُّ الشَّكْلُ الْمُجاوِرُ مُخْطَطًا؟

2 أَصِفْ مَا تُمْثِلُهُ كُلُّ مِنَ الرَّؤُوسِ وَالْحَافَاتِ فِي الْمُخْطَطِ.

3 كم صديقة لـلانا في هذا الموقع؟

4 مَنِ الصَّدِيقَاتُ الْمُشْتَرَكَاتُ بَيْنَ عَبِيرَ وَدَانِيَةَ؟




منْدُوبُ مُبَيِّعَاتٍ: يُبَيِّنُ الشَّكْلُ الْمُجاوِرُ مُخْطَطًا لِتَكْلِيفَةِ تَنْقُلِ مُنْدُوبِ مُبَيِّعَاتٍ بَيْنَ مَجْمُوعَةِ الْمُحَافَظَاتِ الْأَرْدِنِيَّةِ لِلْتَّرْوِيجِ لِمُنْتَجٍ جَدِيدٍ، حِيثُ يُمْثِلُ الْعَدْدُ عَلَى كُلِّ حَافَّةٍ التَّكْلِيفَةَ بِالْدِينَارِ لِلتَّنْقُلِ بَيْنَ كُلِّ مَحَافَظَتَيْنِ:

5 أَجِدْ تَكْلِيفَةَ ذَهَابِ مُنْدُوبِ المُبَيِّعَاتِ فِي مَسَارِ مُبَاشِرٍ مِنِ الْمُحَافَظَةِ A إِلَى الْمُحَافَظَةِ B، ثُمَّ إِلَى الْمُحَافَظَةِ C.

6 أَحْدِدْ أَقْلَى تَكْلِيفَةَ لِلذَّهَابِ مِنِ الْمُحَافَظَةِ B إِلَى الْمُحَافَظَةِ D، ثُمَّ أَحْدِدْ الْمَسَارَ الَّذِي اتَّخَذَهُ لِذَلِكَ.

الوحدة 2




أتأمل المُخطّط المجاور، ثم أجيّب عن كُلّ ممّا يأتي:

7 أُحدّد مجموعة الرؤوس ومجموعة الحافات.


8 أُحدّد درجة كل رأس، ونوعها.

9 أُحدّد مجموعة الدرجات للمُخطّط.



أجد مجموع درجات رؤوس المُخطّط المجاور.

10




أتأمل المُخطّط المجاور، ثم أجيّب عن كُلّ ممّا يأتي:

12 أُحدّد مجموعة الرؤوس ومجموعة الحافات.

13 أُحدّد درجة كل رأس، ونوعها.

14 أُحدّد في المُخطّط ممثّي لا يُمثّل ممراً، وممراً لا يُمثّل طریقاً، وطريقاً، ودارةً، ودارة هامiltonون (إن وجدت)، ودارة اویلر (إن وجدت).




أتأمل المُخطّط المجاور، ثم أحدّد فيه:

15 ممثّي لا يُمثّل ممراً.

16 ممراً لا يُمثّل طریقاً.

17 خمسة طرق من B إلى D.

18 دارةً.




طرق: يُبيّن الشكل المجاور مُخططاً للطرق الرئيسية التي تصل بين مجموعة من المناطق في إحدى المدن، ويُمثّل العدد على كل حافة المسافة (بالكيلومتر) بين كل منطقتين:

19) أُحدّد طول أقصر مسار بين المنطقة A والمنطقة Z ، ثم أُحدّد المسار الذي اتّخذته لذلك.

20) أجد دارة تبدأ بالرأس B ، وتنتهي به، ثم أجد طولها بالكيلومتر.

21) أجد دارة هامilton، ثم أجد طولها بالكيلومتر.



حسور: يُبيّن الشكل المجاور مُخططاً للمسألة الواردة في بند (مسألة اليوم).
أستعين بالمُخطّط وما تعلّمته في هذا الدرس عن دارة أويلر للإجابة عن المسألة، ثم أُبّرر إجابتي.

مهارات التفكير العليا

مسألة مفتوحة: أرسم مُخططاً يُحقق الوصف المُعطى في كلٍّ مما يأتي:

23) يتضمّن المُخطّط 4 رؤوس، و6 حافات.


24) يتضمّن المُخطّط 5 رؤوس، و8 حافات، وحلقة واحدة.

25) يتضمّن المُخطّط 4 رؤوس درجاتها فردية، ورأساً درجته زوجية.

26) يتضمّن المُخطّط 3 رؤوس درجة كلٍّ منها 2، ورأسيين درجة كلٍّ منهما 1

27) يتضمّن المُخطّط رأسيين درجة كلٍّ منهما 2، ورأساً درجته 3، ورأساً درجته 1

28) يتضمّن المُخطّط 4 رؤوس درجة كلٍّ منها 5، و3 رؤوس درجة كلٍّ منها 2



تحدد: أتأمّل المُخطّط المجاور، ثم أُجيب عن السؤالين الآتيين:

29) أُحدّد دارة هامilton في المُخطّط.

30) أُحدّد دارة أويلر في المُخطّط.

أنواع خاصة من المُخَطَّطات

Special Types of Graphs

- تُعرَّف أنواع خاصة من المُخَطَّطات، مثل: المُخَطَّط الكامل، والشجرة، والشجرة الشاملة.
- تُعرَّف مصفوفة الجوار، واستعمالها للتعبير عن الروابط في المُخَطَّطات.
- تُعرَّف مصفوفة الوزن، واستعمالها لتمثيل العلاقات بين الرؤوس في مُخَطَّط موزون.


فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



يُبيّن المُخَطَّط المجاور طريقة توصيل عدد من مصايد الإلارة (S) والقواطع (P) والمُقايس (T) في غرفة:

- ماذا يُشَيِّه المُخَطَّط الناتج؟
- هل يُمْكِن تمثيل المُخَطَّط بأكثر من طريقة؟

تعرَّفتُ في الدرس السابق مفهوم المُخَطَّط ومُكوِّناته وبعض التعريفات الأساسية المتعلقة به، وسأتعرَّف في هذا الدرس بعض الأنواع الخاصة من المُخَطَّطات.


المُخَطَّط البسيط، والمُخَطَّط المتصل، والمُخَطَّط الجزئي

يُطلَق على المُخَطَّط الذي لا تُوجَد فيَه حلقة أو حافات مُتعدِّدة اسم **المُخَطَّط البسيط** (simple graph).


أتذَّكَّر

الطريق هو ممر لا يتكرَّر فيَه أُيُّ رأس.


أمَّا **المُخَطَّط المتصل** (connected graph) فهو مُخَطَّط يمتَاز بِوُجُود طرِيق يصل بين كل رأسين من رؤُوسه. أنظر الشكل الآتي الذي يُبيّن مُخَطَّطًا متصلًا ومُخَطَّطًا آخر غير متصل.



مُخَطَّط متصل




مُخَطَّط غير متصل




المُخْطَط R


وأَمَّا المُخْطَط الْجَزِئِي (subgraph) من مُخْطَط ما فهو مُخْطَط تَتَمَمُّي جميع رؤُوسه وحافاته إلى هذا المُخْطَط. فِي مَا يَأْتِي مُخْطَطات جَزِئِيَّةٌ مِنَ المُخْطَط R الْمُبَيَّنٍ فِي الشَّكْلِ الْمُجاوِرِ.



المُخْطَط الْجَزِئِي 1




المُخْطَط الْجَزِئِي 2



المُخْطَط الْجَزِئِي 3

أَتَعْلَم

لَا يُشَرَّطُ فِي المُخْطَطِ الْجَزِئِي أَنْ يَكُونَ مَتَّصِلاً.



أَتَأْمَلُ المُخْطَطَ الْمُجاوِرَ، ثُمَّ أُجِبُّ عَنْ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:


1 هل المُخْطَط بَسِيِّطٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

نعم؛ لَأَنَّهُ لَا يَحْوِي حَلَقَاتٍ أَوْ حَافَاتٍ مُتَعَدِّدَة.


2 هل المُخْطَط مَتَّصِلٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

نعم؛ لَأَنَّهُ يُمْكِنُ إِيجَادُ طَرِيقٍ يَصِلُّ بَيْنَ كُلِّ رَأْسَيْنِ مِنْ رُؤُوسِهِ.

3 أَرْسِمْ مُخْطَطَيْنِ جَزِئِيَّيْنِ مِنَ المُخْطَطِ.



المُخْطَط الْجَزِئِي 1




المُخْطَط الْجَزِئِي 2

أَتَذَكَّرُ

الحَلَقَةُ هِي حَافَةٌ تَبْدُأُ عَنْ الرَّأْسِ نَفْسِهِ، وَتَتَهْيَيْ بِهِ. أَمَّا الْحَافَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ فَهِيَ تُعبِّرُ عَنْ وُجُودِ أَكْثَرِ مِنْ حَافَةٍ بَيْنِ رَأْسَيْنِ.

أتدقّق من فهمي



أتَأْمَلُ الْمُخْطَطَ الْمَجَاوِرَ، ثُمَّ
أُجِيبُ عَنْ كُلِّ مَا يَأْتِي:

(a) هل المُخْطَطُ بَسِيْطٌ؟ أَبْرُرُ
إِجَابِيَّ.


(b) هل المُخْطَطُ مَتَّصِلٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابِيَّ.

(c) أَرْسِمْ مُخْطَطَيْنِ جَزَئِيْنِ مِنْ الْمُخْطَطِ.


أتذَكَّرُ

المُخْطَطُ الْبَسِيْطُ هُو
مُخْطَطٌ لَا تَوْجُدُ فِيهِ حَلْقَةٌ
أَوْ حَافَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ.


المُخْطَطُ الْكَامِلُ (complete graph) هو مُخْطَطٌ بَسِيْطٌ يَتَصَلُّ كُلُّ رَأْسٍ فِيهِ بِحَافَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُرْمَزُ إِلَيْهِ الْمُخْطَطُ الْكَامِلُ الَّذِي يَحْوِي n مِنْ الرَّؤُوسِ بِالرَّمْزِ K_n . أَنْظُرِ الشَّكْلَ الْأَتَى الَّذِي يُبَيِّنُ الْمُخْطَطَ K_4 وَالْمُخْطَطَ K_5 .



وَأَمَّا الْمُخْطَطُ الْبَسِيْطُ الَّذِي عَدْ رَؤُوسِهِ مُسَاوٍ لِعَدْ رَؤُوسِ الْمُخْطَطِ الْبَسِيْطِ G ، وَلِيَكُنْ n ، الَّذِي تَكُونُ مَجْمُوعَةُ حَافَاتِهِ هِيَ جَمِيعُ الْحَافَاتِ الْمُوْجَدَةِ فِي الْمُخْطَطِ K_n وَغَيْرِ الْمُوْجَدَةِ فِي الْمُخْطَطِ G ، فَيُسَمَّى **المُخْطَطُ الْمُكَمَّلُ** (the complement graph) لِلْمُخْطَطِ G ، وُرْمَزُ إِلَيْهِ بِالرَّمْزِ \bar{G} . أَنْظُرِ الشَّكْلَ الْأَتَى الَّذِي يُبَيِّنُ الْمُخْطَطَ G وَالْمُخْطَطَ الْمُكَمَّلَ لِهِ \bar{G} .



المُخْطَطُ G



الْمُخْطَطُ الْمُكَمَّلُ لِلْمُخْطَطِ G \bar{G}


أَتَعْلَمُ

إِذَا أَضَفْنَا حَافَاتَ الْمُخْطَطِ الْمُكَمَّلِ لِلْمُخْطَطِ نَفْسَهُ، فَإِنَّهُ يَتَجَزَّعُ مُخْطَطٌ كَامِلٌ.


مثال 2

1


أُحدِّد المُخْطَطُ الْكَاملُ مِمَّا يَأْتِي، وَأُسْمِيْهُ بِالرَّمْوْزِ، ثُمَّ أَبْرُرُ إِجَابِيَّ.




(A)



(B)



(C)




(D)

المُخْطَطُ الْكَاملُ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الْمُخْطَطَاتِ هُوَ الْمُخْطَطُ C؛ لَأَنَّ كُلَّ رَأْسٍ مِنْ رَؤُوسِهِ مُتَصَلِّبُ بِحَافَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطُ. وَيُرَمِّزُ إِلَيْهِ هَذَا الْمُخْطَطُ بِالرَّمْوْزِ K_5 . أَمَّا الْمُخْطَطُ A فَهُوَ غَيْرُ كَامِلٍ؛ لَأَنَّهُ مُخْطَطٌ غَيْرٌ بِسِيِّطٍ؛ إِذَا يَتَّسِعُ رَأْسٌ مِنْ رَؤُوسِهِ بِحَافَيْنِ. وَأَمَّا الْمُخْطَطَانِ B وَD فَهُمَا لَيْسَا كَامِلَيْنِ؛ لَأَنَّ فِيهِمَا رَؤُوسًا غَيْرَ مُتَصَلِّبَ بِحَافَاتِ.


أَرْسِمُ \bar{R} لِلْمُخْطَطِ R الْمُجَاوِرِ.

2



المُخْطَطُ R

يُبَيِّنُ الشَّكَلُ الْأَتَى الْمُخْطَطَ \bar{R} الْمُكَمِّلُ لِلْمُخْطَطِ R الْمُجَاوِرِ.




المُخْطَطُ \bar{R}

أَتَعْلَمُ


لِرَسْمِ \bar{R} لِلْمُخْطَطِ R الْمُجَاوِرِ، أَبْدِأُ بِرَسْمِ K_5 ، ثُمَّ أَحْذِفُ مِنْهُ جَمِيعَ الْحَافَاتِ الْمُوْجَوَّدةِ فِي R.

أَتَنْتَقِّقُ مِنْ فَهْمِي


(a) أُحدِّدُ الْمُخْطَطُ الْكَاملُ مِمَّا يَأْتِي، وَأُسْمِيْهُ بِالرَّمْوْزِ، ثُمَّ أَبْرُرُ إِجَابِيَّ.




(A)




(B)



(C)



(D)




(b) أرسم \overline{R} للمُخطّط المجاور.

الشجرة، والشجرة الشاملة

يُطلق على المُخطّط المتصل الذي لا يحوي أي دارة اسم **الشجرة** (tree).

في ما يأتي ثلاثة مُخطّطات يُعدُّ كل منها شجرة:




أتذكّر
الدارة هي ممرٌّ رأسُ بدايته هو نفسه رأس نهايته، ولا يتكرّر فيه رأس آخر أكثر من مَرَّة واحدة.


لغة الرياضيات

توجد أسماء أخرى عديدة للشجرة الشاملة، أكثرها شهرة: شجرة الانتشار، وشجرة الامتداد، والشجرة المُغطّية.

تُسمّى الشجرة T **شجرة شاملة** (spanning tree) للمُخطّط المتصل G إذا كانت T مُخطّطاً جزئياً من G ، وتحوي جميع رؤوسه كما هو مُبيّن في الشكل الآتي.





الشجرة T شجرة شاملة للمُخطّط G .



أرسم شجرتين شاملتين للمُخطّط المجاور.

يمكن رسم شجرتين شاملتين للمُخطّط المجاور


كما يأتي:



أتعلّم

يمكن رسم أشجار شاملة عديدة للمُخطّط. كذلك يمكن للشجرة الشاملة أن تكون شجرة شاملة لأكثر من مُخطّط.

أتحقق من فهمي



أرسم شجرتين شاملتين للمُخْطَط المجاور.

أتعلم

الشجرة الشاملة هي شجرة؛ لذا ينبغي أن تكون متصلة، وألا تحوي أي دارة.

أصغر شجرة شاملة

تعلمتُ في المثال السابق إيجاد أشجار شاملة لمُخْطَط متصل. ولكن، كيف يمكن إيجاد أصغر شجرة شاملة للمُخْطَط المتصل الموزون؟

يمكن إيجاد أصغر شجرة شاملة للمُخْطَط المتصل الموزون باستعمال خوارزمية برایم

(Prim's algorithm)، التي يمكن بها تحديد أقصر طريقة وأسرعها لربط جميع الرؤوس في المُخْطَط المتصل الموزون، بحيث يكون مجموع أوزان الحافات في هذه الشجرة شاملة أقل ما يمكن.

خوارزمية برایم

خوارزمية

يمكن إيجاد أصغر شجرة شاملة لمُخْطَط متصل موزون باستعمال خوارزمية برایم، وذلك باتباع الخطوات الآتية:


- 1 اختيار أي رأس في المُخْطَط لبدء رسم (إنشاء) الشجرة.
- 2 تحديد أقل حافة وزناً تربط بين رأس موجود في الشجرة ورأس لم يُضاف بعد إلى الشجرة. وفي حال وجود حافات عديدة لها الوزن نفسه، فإنه يمكن اختيار أي منها. وإذا شكلت الحافة دارة، فإنها لا تضاف إلى الشجرة.
- 3 تكرار الخطوة الثانية حتى تكتمل إضافة جميع الرؤوس، ويتم ربطها بالشجرة.
- 4 كتابة الحافات المضافة إلى الشجرة بالترتيب.

أتعلم

مفهوم (أصغر شجرة شاملة) مرتبط فقط بالمُخْطَطات الموزونة.

الوحدة 2


مثال 4 : من الحياة




أكبال كهربائية: يُبيّن الشكل المجاور مخططاً لأكبال كهربائية تربط بين محطّات التوزيع في إحدى المناطق. وفيه يُمثّل العدد على كل حافّة طول الكُبْل (بالكيلومترات) بين كل محطّتين في المنطقة:

استعمل خوارزمية برايم لإيجاد أصغر شجرة شاملة للمخطّط، ثمّ أكتب الحافات التي أُضيفت إلى الشجرة بالترتيب.


2. أحّدد أقل حافّة وزنًا مُرتبطة بالرأس A ، وهي AD ، ثمّ أُضيفها إلى الشجرة.




4. أُضيف الحافّة BC إلى الشجرة؛ لأنّها أقل حافّة وزنًا بين الحافات المُرتبطة بالرؤوس: A, D, B, C التي أُضيفت إلى الشجرة أصلًا.




6. أُضيف الحافّة EF إلى الشجرة.




1. اختار أيّ رأس في المخطّط لبدء رسم (إنشاء) الشجرة الشاملة، ولتكن الرأس A .



3. أُضيف الحافّة DB إلى الشجرة؛ لأنّها أقل حافّة وزنًا بين الحافات المُرتبطة بالرأس A والرأس D اللذين أُضيفا إلى الشجرة أصلًا.



5. أُضيف الحافّة DE إلى الشجرة؛ لأنّها أقل حافّة وزنًا بين الحافات المُرتبطة بالرؤوس: C, A, D, B التي أُضيفت إلى الشجرة أصلًا.



بما أنّه تمّ ربط جميع رؤوس المخطّط معًا، فإنّ ذلك يعني رسم (إنشاء) أصغر شجرة شاملة.


الحافات التي أُضيفت إلى الشجرة الشاملة بالترتيب هي: AD, DB, BC, DE, EF :

أستعمل إجابة السؤال السابق لإيجاد أقل طول من الأكبال يلزم لربط جميع المحطّات في المنطقة. لإيجاد أقل طول للأكبال، أجد الوزن الكلي للشجرة الشاملة الناتجة في السؤال السابق، وذلك بجمع أوزان الحافات في الشجرة كما يأتي:

$$5 + 1 + 2 + 4 + 2 = 14$$

إذن، أقل طول من الأكبال يلزم لربط جميع المحطّات في المنطقة هو: 14 km

أتحقق من فهمي



أنابيب مياه: يُبيّن الشكل المجاور مخططاً لشبكة أنابيب مياه تصل بين المحطّات الرئيسية في إحدى المدن. وفيه يُمثّل العدد على كل حافّة طول الأنابيب (بالكيلومتر) بين كل محطّتين في المدينة:

(a) أستعمل خوارزمية برايم لإيجاد أصغر شجرة شاملة للمخطّط، ثمّ أكتب الحافات التي أضيفت إليها بالترتيب.

(b) أستعمل إجابة السؤال السابق لإيجاد أقل طول من الأنابيب يلزم لربط جميع المحطّات في المدينة.


تمثيل المخطّطات باستعمال المصفوفات

تعرّفتُ في الدرس السابق أنَّ المخطّط تمثيل بياني يُستعمل للتعبير عن روابط بين أشياء باستعمال رؤوس وحافات. ولكنُ يُمكِّن أيضًا التعبير عن هذه الروابط باستعمال المصفوفات. فمثلاً، يُمكِّن التعبير عن المخطّطات غير الموزونة باستعمال **مصفوفة الجوار** (adjacency matrix)؛ وهي مصفوفة مُربّعة رتبتها $n \times n$ ، ومُدخلاتها عدد الحافات التي تربط بين كل رأسين في المخطّط، إضافةً إلى عدد الحافات التي تربط الرؤوس بنفسها (الحلقات). أمّا المخطّطات الموزونة فيُمكِّن التعبير عنها باستعمال **مصفوفة الوزن** (weight matrix)؛ وهي مصفوفة مُربّعة رتبتها $n \times n$ ، ومُدخلاتها أوزان الحافات التي تربط بين كل رأسين في المخطّط، إضافةً إلى أوزان الحافات التي تربط الرؤوس بنفسها (الحلقات).

أتعلم

يُمثّل n في رتبة المصفوفة عدد رؤوس المخطّط، ويُمثّل كل صف وكل عمود في المصفوفة رأساً من رؤوس المخطّط.


مثال 5



أمثل المُخْطَط المجاور بمصفوفة الجوار.

- بما أن المُخْطَط يحوي 4 رؤوس، فإن رتبة المصفوفة هي 4×4 .
- أكتب أسماء الرؤوس فوق الأعمدة وجانب الصفوف لتسهيل الحل، ثم أملأ مدخلات المصفوفة بعدد الحافات بين كل رأسين من الصفوف والأعمدة.


	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>A</i>	0	1	0	0
<i>B</i>	1	2	1	1
<i>C</i>	0	1	0	2
<i>D</i>	0	1	2	0




أمثل المُخْطَط الموزون المجاور بمصفوفة الوزن.

- بما أن المُخْطَط يحوي 4 رؤوس، فإن رتبة المصفوفة هي 4×4 .
- أكتب أسماء الرؤوس فوق الأعمدة وجانب الصفوف لتسهيل الحل، ثم أملأ مدخلات المصفوفة بأوزان الحافات بين كل رأسين من الصفوف والأعمدة.

	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>W</i>
<i>X</i>	-	4	5	3
<i>Y</i>	4	-	1	-
<i>Z</i>	5	1	-	2
<i>W</i>	3	-	2	-



(a) أمثل المُخْطَط الآتي بمصفوفة الجوار.



(b) أمثل المُخْطَط الآتي بمصفوفة الجوار.

أتعلم

الاحظ أن المدخلة 0 تدل على عدم اتصال الرأسين في مصفوفة الجوار، وأن المدخلة 2 تشير إلى الحلقة؛ لأنّه يمكن عدّها حافة في كلا الاتجاهين.

أتعلم


الاحظ أن العنصر الموجود في الصف *i* والعمود *j* من مصفوفة الجوار هو نفسه العنصر الموجود في الصف *j* والعمود *i*.

أتعلم

يُستعمل الرمز - في مصفوفة الوزن للدلالة على عدم اتصال الرأسين في المُخْطَط.

أفكّر

- ما دلالة مجموع مدخلات كل صف في مصفوفة الجوار؟
- ما دلالة مجموع كل عمود في مصفوفة الجوار؟



أتَأَمَّلُ الْمُخْطَطَ الْمُجاوِرِ، ثُمَّ أُجِيبُ عَنْ كُلِّ مَا يَأْتِي:


1 هل المُخْطَطُ بِسِيطٍ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

2 هل المُخْطَطُ مُتَصَلٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

3 هل المُخْطَطُ كَامِلٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

4 أَرْسِمْ مُخْطَطَيْنِ جَزَئِيْنِ مِنْ الْمُخْطَطِ.

5 أَرْسِمْ شَجَرَةً شَامِلَةً لِلْمُخْطَطِ.







أتَأَمَّلُ الْمُخْطَطَ الْمُجاوِرِ، ثُمَّ أُجِيبُ عَنْ كُلِّ مَا يَأْتِي:

6 هل المُخْطَطُ بِسِيطٍ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

7 هل المُخْطَطُ مُتَصَلٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.




8 أَرْسِمْ مُخْطَطَيْنِ جَزَئِيْنِ مِنْ الْمُخْطَطِ.

9 أُحَدِّدُ الْمُخْطَطَ الْكَامِلَ مَا يَأْتِي، وَأُسَمِّيَّهُ بِالرَّمْزَ، ثُمَّ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.



الوحدة 2

أرسم المُخْطَط المُكْمَل لـكُلٌّ من المُخْطَطات الآتية:





إنترنت: يُبيّن الشكل المجاور مُخْطَطًا لشبكة إنترنت تصل بين مجموعة من الحواسيب في إحدى المكتبات العامة. وفيه يُمثّل العدد على كل حافة طول الكَبْل (بالمتر) بين كل جهازي حاسوب في المكتبة. أجب عن السؤالين الآتيين تباعًا:



12 أستعمل خوارزمية برايم لإيجاد أصغر شجرة شاملة للمُخْطَط، ثم أكتب الحافات التي أُضِيفَت إلى الشجرة بالترتيب.

13 أستعمل إجابة السؤال السابق لإيجاد أقل تكلفة تلزم لربط جميع الحواسيب في المكتبة، علماً بأنَّ تكلفة تمديد المتر الواحد من الكَبْل JD 3.

أُمِّل كل مُخْطَط ممَّا يأتي بمصفوفة الجوار:



أُمِّل كل مُخْطَط ممَّا يأتي بمصفوفة الوزن:



18

أرسم المُخطّط المُمثّل في مصفوفة الجوار الآتية.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

19

تُمثّل مصفوفة الوزن الآتية أطوال أنابيب المياه (بالمتر) التي تصل بين المرشّات في إحدى المزارع. أرسم المُخطّط الموزون الذي تُمثّله المصفوفة.

$$\begin{bmatrix} - & 11 & 4 & - & - & - \\ 11 & - & - & 8 & - & - \\ 4 & - & - & 9 & - & 10 \\ - & 8 & 9 & - & 7 & - \\ - & - & - & 7 & - & 9 \\ - & - & 10 & - & 9 & - \end{bmatrix}$$

مهارات التفكير العليا 


مسألة مفتوحة: أرسم كُلّاً ممّا يأتي:

20 مُخطّط كامل، عدد رؤوسه 7


21 مُخطّط متصل، عدد رؤوسه 6، ودرجة كُلّ منها 3

22 مُخطّط بسيط، غير متصل، عدد رؤوسه 6، ودرجة كُلّ منها 2

23 تبرير: أرسم المُخطّط المُكمل للمُخطّط المجاور، ثم أبّرّ إجابتي.



24 تحدي: أرسم جميع الأشجار الشاملة التي يُمكّن أن تنتج من المُخطّط الآتي:



مُخْطَطات أُويلر

Euler Graphs

فكرة الدرس




المصطلحات



مسألة اليوم



- ٠ تحديد إذا كان المُخْطَط المعطى أُويلريًا، أو شبه أُويلري، أو غير ذلك.
- ٠ تُعرف خوارزمية فحص المسار، واستعمالها لإيجاد أقصر مسار في مُخْطَط متصل موزون يشمل كل حافة في المُخْطَط مَرَّة واحدة على الأقل، وينتهي بالرأس نفسه الذي ينتهي به.
- ٠ مُخْطَط أُويلري، مُخْطَط شبه أُويلري، المسار الأُويلري، خوارزمية فحص المسار الأُويلري.





يُبيّن الشكل المجاور مُخْطَطًا للمسارات التي تسلكها سيارة البريد بين 9 مواقع تابعة لإحدى الشركات، ويعبر العدد على كل حافةٍ تكلفة الوقود (بالدينار) الذي تستهلكه السيارة بين كل موقعين. أُحدّد مسارًا يبدأ بالمنطقة A ، وينتهي بها، ويشمل كل حافة في المُخْطَط، بحيث تستهلك السيارة أقل كمية من الوقود إذا سلكت هذا المسار.

المُخْطَط الأُويلري، والمُخْطَط شبه الأُويلري

تعَرَّفْتُ سابقًا أنَّ دارة أُويلر ممرٌّ رأسٌ بدايته هو نفسه رأس نهايته، وأنَّه يشمل جميع حافات المُخْطَط من دون تكرار. وفي حال كان المُخْطَط المتصل يحتوي على دارة أُويلر، فإنَّه يُسمَّى المُخْطَط الأُويلري (Eulerian graph).

أمَّا المُخْطَط المتصل الذي يحوي ممرًا يشمل جميع حافاته من دون تكرار، ورأس بدايته مختلف عن رأس نهايته، فيُسمَّى المُخْطَط شبه الأُويلري (semi-Eulerian graph).

في ما يأتي مثال على مُخْطَط أُويلري، ومثال آخر على مُخْطَط شبه أُويلري.



أتذَّكَر

الممر هو ممشي لا تكرر فيه أيُّ حافة، ويمكِّن أنْ تكرر في الرؤوس.

أفَكَرْ

هل تحتوي دارة أُويلر بالضرورة على جميع رؤوس المُخْطَط؟ أُبَرِّرْ إجابتي.

يصعب أحياناً تمييز **المُخْطَطُ الأوَيلِري** من غيره عن طريق النظر إليه فقط. وفي هذه الحالة،
يمكن الاستعانة بالنظرية الآتية:

المُخْطَطُ الأوَيلِري

نظريّة




- إذا كان **المُخْطَطُ متصلًا**، ودرجة كل رأس من رؤوسه زوجية، فإنّه يكون **أوَيلِريًّا**.
- أما إذا كان **المُخْطَطُ متصلًا**، ويحوي رأسين فقط، درجة كلّ منهما فردية، فإنّه يكون شبه **أوَيلِريًّا**.
- إذا كان عدد الرؤوس ذات الدرجة الفردية في **المُخْطَط** أكثر من رأسين، فإنّ **المُخْطَط** لا يكون **أوَيلِريًّا**، ولا شبه **أوَيلِريًّا**.
- إذا لم يكن **المُخْطَطُ متصلًا**، فإنّه لا يكون **أوَيلِريًّا**، ولا شبه **أوَيلِريًّا**.

سُمِّيَ **المُخْطَطُ الأوَيلِري** بهذا الاسم نسبةً إلى مُكتشفه عالم الرياضيات السويسري ليونارد أوَيلِر الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي، ووضع نظرية **المُخْطَطات**.

مثال 1

أتَأْمَلُ كُلَّ مُخْطَطٍ ممَّا يَأْتِي، ثُمَّ أُحَدِّدُ إِذَا كَانَ أَوَيلِرِيًّا، أَوْ شَبَهَ أَوَيلِرِيًّا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.



أتعلّم

من المستحيل أن يكون **المُخْطَطُ أوَيلِرِيًّا** وشَبَهَ **أَوَيلِرِيًّا** في الوقت نفسه.

الخطوة 1: أُحَدِّدُ إِذَا كَانَ **المُخْطَطُ متصلًا** أَمْ لَا.

الخطوة 2: أُحَدِّدُ درجة كُلَّ رأس من رؤوس **المُخْطَط**، ونوعها.


الرأس	الدرجة	نوع الدرجة
A	4	زوجية
B	4	زوجية
C	2	زوجية
D	4	زوجية
E	2	زوجية
F	2	زوجية

الخطوة 3: أُحدّد نوع المُخطّط استناداً إلى درجات الرؤوس.

بما أنَّ جميع درجات رؤوس المُخطّط زوجية، فإنَّ المُخطّط أويلري.

أُفكِّر

أُحدّد دارة أويلر من المُخطّط.



2

الخطوة 1: أُحدّد إذا كان المُخطّط متصل أم لا.

المُخطّط متصل، إذن يُمكِّن البحث في نوعه (أويلري، أو شبه أويلري، أو غير ذلك).

الخطوة 2: أُحدّد درجة كل رأس من رؤوس المُخطّط، ونوعها.

الرأس	الدرجة	نوع الدرجة
N	2	زوجية
P	3	فردية
Q	2	زوجية
R	2	زوجية
S	3	فردية
T	2	زوجية

الخطوة 3: أُحدّد نوع المُخطّط استناداً إلى درجات الرؤوس.

بما أنَّه يوجد رأسان فقط، درجة كُلٌّ منهما فردية، فإنَّ المُخطّط شبه أويلري.

أُفكِّر


أُحدّد ممَّا شبه أويلري من المُخطّط.

أتعلّم


عندما نتحدَّث عن المُخطّطات الأويلرية أو المُخطّطات شبه الأويلرية، فإنَّنا نهتمُ فقط بالمُخطّطات المتصلة. فمثلاً، المُخطّط الآتي يحوي دارة أويلر، لكنَّه ليس مُخطّطاً أويلريًّا؛ لأنَّه غير متصل.



a)



b)



إيجاد طول أقصر مسار في مُخطّط أويلاّري أو مُخطّط شبه أويلاّري

المسار الأويلاّري (Eulerian route) هو مسار في المُخطّط يشمل كل حافة في المُخطّط

مرة واحدة على الأقل، ويدأ بالرأس نفسه الذي ينتهي به. يمكن استعمال خوارزمية فحص


المسار الأويلاّري (Eulerian route inspection algorithm) لإيجاد طول أقصر مسار

أويلاّري في مُخطّط متصل موزون. أمّا إذا كان المُخطّط أويلاّريًا، فإنّ أقصر مسار أويلاّري فيه يكون دارة أويلاّري، وهو مسار يتضمّن جميع حافات المُخطّط، ويدأ بالرأس نفسه الذي ينتهي به. ومن ثمّ، فإنّ طول أقصر مسار أويلاّري يساوي الوزن الكلّي للمُخطّط. وأمّا إذا كان المُخطّط شبه أويلاّري، فإنّ طول أقصر مسار أويلاّري فيه يكون الوزن الكلّي للمُخطّط، مضافًا إليه مجموع أطوال حافات أقصر طريق بين الرأسين اللذين درجتهما فردية؛ وذلك لضمان البدء بنفس الرأس والانتهاء به.

أتذكّر

الطريق ممر لا يتكرّر فيه أيُّ رأس.

مثال 2



أجد طول أقصر مسار أويلاّري في المُخطّط الموزون المجاور، يبدأ بالرأس F ، وينتهي به.


الاِلّاحظ من المُخطّط أنَّ درجة كل رأس من رؤوسه زوجية؛ ما يعني أنَّ المُخطّط أويلاّري. ومنه، فإنَّ طول أقصر مسار أويلاّري في المُخطّط يساوي الوزن الكلّي للمُخطّط.

$$7 + 1 + 2 + 6 + 3 + 4 + 5 = 28$$

إذن، طول أقصر مسار أويلاّري في المُخطّط، يبدأ بالرأس F ، وينتهي به، هو: 28 وحدة.

أتعلّم

الوزن الكلّي للمُخطّط الموزون هو مجموع أوزان جميع حافاته.




أجد طول أقصر مسار أويلاّري في المُخطّط الموزون المجاور، يبدأ بالرأس E ، وينتهي به.

الاِلّاحظ من المُخطّط وجود رأسين فقط ، درجة كلّ منهما فردية؛ ما يعني أنَّ المُخطّط شبه أويلاّري.

الوحدة 2

أتعلم

إن إضافة الوزن 5 و 9 لا تعني أننا أضفنا حافات جديدة إلى المخطط، وإنما تعني أن المسار قد احتوى على هاتين الحافتين مكررتين حتى يتمكن من البدء بنفس الرأس والانتهاء به.



الخطوة 1: أكّر أطوال حافات أقصر طريق بين الرأسين اللذين درجتهما فردية في المخطط.

الرأسان اللذان درجتهما فردية هما: C و A ، وأقصر طريق يصل بينهما هو: ABC ; لذا أكّر حافات هذا الطريق في المخطط كما في الشكل المجاور.


الخطوة 2: أجد الوزن الكلي للمخطط الناتج.

$$3 + 9 + 9 + 5 + 5 + 16 + 13 + 4 + 8 + 11 + 4 = 87$$


إذن، طول أقصر مسار أويلري في المخطط، يبدأ بالرأس F ، وينتهي به، هو: 87 وحدة.

أتحقق من فهمي

يمكن للمسار الأويلري أن يشمل الحافة أكثر من مرّة، ولكن يجب أن يبدأ بالرأس نفسه الذي ينتهي به.



(a) أجد طول أقصر مسار أويلري في المخطط الموزون المجاور، يبدأ بالرأس D ، وينتهي به، ويشمل كل حافة من حفاته.



(b) أجد طول أقصر مسار أويلري في المخطط الموزون المجاور، يبدأ بالرأس F ، وينتهي به، ويشمل كل حافة من حفاته.

إيجاد طول أقصر مسار أويلري في مخطط متصل غير أويلري ولا شبه أويلري

تعلّمتُ في المثال السابق استعمال خوارزمية فحص المسار الأويلري لإيجاد طول أقصر مسار أويلري في مخطط أويلري أو مخطط شبه أويلري. والآن سأتعلّم كيف يمكن إيجاد طول أقصر مسار أويلري في مخطط غير أويلري ولا شبه أويلري.

أتعلم

عندما نتحدّث عن المسار الأويلري، فإنّنا نهتمُ فقط بالمخططات المتصلة؛ فإذا لم يكن المخطط متصلة، فإنه لا يحوي مساراً أويلرياً.

خوارزمية

خوارزمية فحص المسار الأولي للمُختَطَّات غير الأولية ولا شبه الأولية

يمكن إيجاد طول أقصر مسار أولي في مُختَطَّ متصل غير أولي ولا شبه أولي

باستعمال خوارزمية فحص المسار، وذلك باتّباع الخطوات الآتية:


1 تحديد الرؤوس ذات الدرجات الفردية في المُختَطَّ.

2 تحديد الطرائق المختلفة لإضافة حافات بين الرؤوس ذات الدرجات الفردية (حتى تصبح درجات جميع الرؤوس زوجية)، ثم إيجاد مجموع أوزان الحافات المضافة في كل طريقة.

3 اختيار الطريقة التي أضيفت فيها حافات إلى المُختَطَّ وزنها أقل ما يمكن، ثم إضافة هذه الحافات إلى المُختَطَّ.

4 إيجاد الوزن الكلي للمُختَطَّ الناتج الذي يساوي طول أقصر مسار أولي في المُختَطَّ.

مثال 3 : من الحياة



أنباب رٰيٰ: يُبيّن الشكل المجاور مُختَطَّا لأنابيب كبيرة تصل بين النقاط الرئيسة في إحدى المزارع. وفيه يُمثّل العدد على كل حافة طول الأنابيب (بالمتر) بين كل نقطتين. يُراد تنظيف الأنابيب من الداخل بآلية تحوي خرطوماً رفيعاً مرنّاً في مقدّمه أداة لضخ الماء بضغط عالٍ في اتجاه الجدران الداخلية لأنابيب الكبيرة لتنظيفها من الداخل. إذا علمت أنّه يمكن إدخال الخرطوم في النقطة B وإخراجه منها فقط، فاجد أقل طول من الخرطوم يلزم لتنظيف جميع الأنابيب الكبيرة في المزرعة.

بما أنّه لا يمكن إدخال الخرطوم إلا في الرأس B وإخراجه من هذا الرأس فقط، وبما أنّه يجب تنظيف جميع الأنابيب، فإنّه يمكن استعمال خوارزمية فحص المسار الأولي لإيجاد أقصر طول لازم من الخرطوم (أقصر مسار يحوي جميع حافات المُختَطَّ).

اللّاحظ من المُختَطَّ وجود أكثر من رأسين، درجة كلّ منها فردية؛ ما يعني أنّ المُختَطَّ ليس أولرياً ولا شبه أولي.

الخطوة 1: أحّدد الرؤوس ذات الدرجات الفردية في المُختَطَّ.

الرؤوس ذات الدرجات الفردية في المُختَطَّ هي: B, C, E, G.

معلومة




آلية تنظيف الأنابيب هي جهاز كهربائي مزود بأنابيب مرن ذي رأس معدني دوار، يعمل على ضخ الماء بضغط عالٍ في جميع الاتجاهات. سُتَعْمَل هذه الآلة بفعالية لتنظيف أنابيب مياه الري وإزالة الانسدادات في أنظمة الصرف الصحي.

الوحدة 2

الخطوة 2: أُحدّد الطرائق المختلفة لإضافة حافات بين الرؤوس ذات الدرجات الفردية لتصبح جميع الرؤوس ذات درجات زوجية، ثم أجد مجموع أوزان الحافات المضافة في كل طريقة.

	الحافات المضافة	مجموع أوزان الحافات المضافة
الطريقة الأولى	BC, GE	$9 + 13 = 22$
الطريقة الثانية	BG, CE	$7 + 17 = 24$
الطريقة الثالثة	BE, CG	$20 + 15 = 35$

ملحوظة: طول الحافة CE المضافة في الطريقة الثانية يساوي مجموع طولي الحافتين CD و DE بحيث يكون طول المسار بين هذين الرأسين أقصر ما يمكن، وطول الحافة BE المضافة في الطريقة الثالثة يساوي مجموع طولي الحافتين GE و BG .



الخطوة 3: أختار الطريقة التي أُضفت فيها حافات إلى المُخطّط وزنها أقل ما يمكن، ثم أُضيف هذه الحافات إلى المُخطّط.


الطريقة التي أُضفت فيها حافات إلى المُخطّط وزنها أقل ما يمكن هي الطريقة الأولى؛ لذا أكّر حافات هذه الطريقة في المُخطّط كما في الشكل المجاور.

الخطوة 4: أجد الوزن الكلي للمُخطّط الناتج.

$$8 + 9 + 9 + 8 + 9 + 7 + 11 + 2 + 7 + 15 + 13 = 111$$

إذن، أقل طول من الخرطوم يلزم لتنظيف جميع الأنابيب الكبيرة في المزرعة هو: 111 m





أتحقق من فهمي





طرق: يبيّن الشكل المجاور مُخطّطاً للطرق الرئيسة بين مجموعة من المناطق. وفيه يُمثّل العدد على كل حافة المسافة (بالكيلومتر) بين كل منطقتين. أجد طول أقصر مسار يبدأ بالمنطقة A ، وينتهي بها، ويشمل كل حافة في المُخطّط.




أتأمل كل مخطط مما يأتي، ثم أحدد إذا كان أويلريًا، أو شبه أويلري، أو غير ذلك:




6 أجد طول أقصر مسار أويلري في المخطط الموزون الآتي، يبدأ بالرأس B ، وينتهي به.



7 طرق: يُبيّن الشكل التالي مخططاً للطرق الرئيسية بين مجموعة من المدن. وفيه يُمثل العدد على كل حافة المسافة (بالكيلومتر) بين كل مديتين. أجد طول أقصر مسار أويلري يبدأ بالمدينة A ، وينتهي بها.



الوحدة 2



أتفاق: يُبيّن الشكل المجاور مُخطّطاً لأنفاق تصريف مياه الأمطار في إحدى المدن. وفيه يُمثّل العدد على كل حافة طول النفق بالكيلومتر. إذا علمت أنَّ الفريق الهندسي المسؤول عن صيانة الأنفاق يرغب في فحصها قبل حلول فصل الشتاء للتحقُّق من عدم انسدادها، وأنَّه يتَعَيَّن على الفريق المرور بكل نفق مَرَّة واحدة على الأقل، وأنَّه سيدأ مهمته من الرأس A ، وينتهي به؛ فأجد طول أقصر مسار يُمكِّن أنْ يمرَّ به الفريق لإنجاز مهمته.

8

أحلُّ المسألة الواردة في بند (مسألة اليوم).



مهارات التفكير العليا

اكتشف الخطأ: قالت سلمى: "إنَّ أيَّ مُخطّط كامل K_n ، حيث $2 < n$ ، هو مُخطّط أويلري". أكتشف الخطأ في قول سلمى، ثمَّ أصْحِّحه.


	A	B	C	D	E
A	0	1	0	1	1
B	1	0	1	0	1
C	0	1	0	0	1
D	1	0	0	0	1
E	1	1	1	1	0


تبرير: أتَأْمَل مصفوفة الجوار المجاور التي تُمثّل مُخطّطاً غير موزون، ثمَّ أجيِّب عن السؤالين الآتيين تباعاً من دون رسم المُخطّط:

هل المُخطّط متصل؟ أُبَرِّر إجابتي.

هل المُخطّط أويلري، أو شبه أويلري، أو غير ذلك؟ أُبَرِّر إجابتي.


تحدّ: يُبيّن الشكل التالي مُخطّطاً موزوناً يُمثّل المسافات بين مجموعة من المناطق بالكيلومتر. إذا كان طول أقصر مسار في المُخطّط باستعمال خوارزمية فحص المسار هو 100 km، فأجد قيمة الثابت الحقيقى x .






- 3 الذي يمثل مخططًا جزئيًّا من المخطط المجاور هو:


a)




b)




c)



d)



- 4 الذي يمثل مرأة في المخطط الآتي هو:




a) ABCDCB

b) ABCDFCBA

c) ABCFGA

d) ABCDECB

- 5 مجموع درجات رؤوس المخطط الآتي يساوي:



a) 18


b) 20

c) 22

d) 24

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كلٍّ مما يأتي:

- 1 إحدى التالية تمثل وصفاً لمخرجات الخوارزمية الآتية:



(a) الأعداد من 1 إلى 5

(b) العدد a مكررًا 5 مرات.

(c) الأعداد من 1 إلى 4

(d) العدد a مكررًا 4 مرات.

- 2 يُراد تعبئة العُلَب (المُعطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كلٍّ منها 19 وحدة طول. إذا علمتُ أنَّ للعلَب والصناديق المقطع العرضي نفسه، فإنَّ عدد الصناديق اللازمة لتعبئته العُلَب باستعمال خوارزمية المُلائمة الأولى هو:


11 2 15 5 6 17 7 12

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6



أتأمل الخوارزمية المجاورة الممثلة بمخطط سير العمليات، ثم أجي布 عن كل مما يأتي:





أطبق الخوارزمية 9
باستعمال جدول التتبع
لإيجاد مخرجها.

أصف مخرج 10
الخوارزمية.


أطبق الخوارزمية الآتية باستعمال جدول التتابع لإيجاد مخرجاتها عندما $P = 400, R = 5, T = 3$ 11

1. Input P, R, T .
2. Let $A = P, K = 0$.
3. Let $K = K + 1$.
4. Let $I = (A \times R) / 100$.
5. Let $A = A + I$.
6. If $K < T$, go to step 3.
7. Let $M = A / (12 \times T)$.
8. Print M .
9. Stop.

6) الذي يمثل شجرة في ما يأتي هو:







7) إذا كان وزن أصغر شجرة شاملة للمخطط الآتي، تمر بالحافة التي وزنها k , هو 33، فإن قيمة الثابت k تساوي:



- a) 1 b) 2 c) 4 d) 5

8) المخطط الأولي من المخططات الآتية هو:




17 أستعمل خوارزمية الملاعمة الأولى المُتناقصة لتبعة العُلَب في الصناديق، ثم أُحدِّد عدد الصناديق الازمة لذلك، ثم أجد مقدار الارتفاع المهدور من الصناديق جميعها.

18 أستعمل خوارزمية الصندوق الكامل لتبعة العُلَب في الصناديق، ثم أُحدِّد عدد الصناديق الازمة لذلك، ثم أجد مقدار الارتفاع المهدور من الصناديق جميعها.

19 أيُّ الخوارزميات توصلتُ بها إلى الحل الأمثل؟ أبُرِّر إجابتي.

أتأمل المُخطَّط الآتي، ثم أُجِّيب عن كُلِّ ممَّا يلي:



20 أُحدِّد مجموعة الرؤوس ومجموعة الحافات.

21 أُحدِّد درجة كل رأس، ونوعها.

22 أُحدِّد مجموعة الدرجات للمُخطَّط.

23 أرسم مُخطَّطين جزئيين من المُخطَّط.

24 أُحدِّد من المُخطَّط ممَّا لا يُمثِّل ممَّا، وممَّا لا يُمثِّل طریقاً، وطریقاً، ودارةً، ودارة هاملتون تبدأ بالرأس A ، ودارة أويلر (إن وُجدت).

25 هل المُخطَّط متصل؟ أبُرِّر إجابتي.

26 هل المُخطَّط بسيط؟ أبُرِّر إجابتي.

شحن: في ما يأتي كتل 10 صناديق (بالكيلوغرام) يُراد نقلها في شاحنات، ويُمكِّن لـكُلِّ منها أنْ تحمل كتلة إجمالية أقصاها 300 kg:

175 135 210 105 150 60 20 70 125

12 أُحدِّد كيف تُوزَّع الصناديق على الشاحنات باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى، ثم أُحدِّد عدد الشاحنات الازمة لذلك باستعمال هذه الخوارزمية.

13 أُحدِّد كيف تُوزَّع الصناديق على الشاحنات باستعمال خوارزمية الملاعمة الأولى المُتناقصة، ثم أُحدِّد عدد الشاحنات الازمة لذلك باستعمال هذه الخوارزمية.

14 أُحدِّد كيف تُوزَّع الصناديق على الشاحنات باستعمال خوارزمية الصندوق الكامل، ثم أُحدِّد عدد الشاحنات الازمة لذلك باستعمال هذه الخوارزمية.


15 أيُّ الخوارزميات توصلتُ بها إلى الحل الأمثل؟ أبُرِّر إجابتي.

يُراد تبعة العُلَب (المعطى ارتفاعاتها في ما يلي) في صناديق، ارتفاع كُلِّ منها 5 وحدات طول. إذا علمتُ أنَّ للعُلَب والصناديق المقطع العرضي نفسه، فأُجِّيب عن الأسئلة التالية تباعاً:

2.6 0.8 2.1 1.2 0.9 1.7 2.3 0.3 1.8 2.7

16 أستعمل خوارزمية الملاعمة الأولى لتبعة العُلَب في الصناديق، ثم أُحدِّد عدد الصناديق الازمة لذلك، ثم أجد مقدار الارتفاع المهدور من الصناديق جميعها.


أمثل المُنْخَطَطَ الآتي بمصفوفة الجوار.



32

أرسم شجرتين للمُنْخَطَطَ.


أمثل المُنْخَطَطَ الآتي بمصفوفة الوزن.



33


أرسم شجرتين شاملتين للمُنْخَطَطَ.

يُبيّن المُنْخَطَطَ الموزون التالي أطوال الطرق التي تصل بين مجموعة من المناطق في إحدى المدن بالكيلومتر. أجد طول أقصر مسار أويليري يبدأ بالمنطقة A ، وينتهي بها.



34


يُبيّن الشكل الآتي مُنْخَطَطًا لـ 6 منازل في إحدى القرى. وفيه يُمثل العدد على كل حافة المسافة (بالمتر) بين كل منازل:



أجد طول المسار المباشر بين المنزل E والمنزل D .

أحدّد طول أقصر مسار بين المنزل B والمنزل D ، والمسار الذي اتخذته لذلك.

يُبيّن المُنْخَطَطَ الموزون التالي أطوال الطرق التي تصل بين مجموعة من المناطق في إحدى المدن بالكيلومتر. أستعمل خوارزمية برايم لإيجاد أصغر شجرة شاملة للمُنْخَطَطَ، ثم أكتب الحافات التي أضيفت إلى الشجرة بالترتيب.



البرمجة الخطّية

Linear Programming

الوحدة
3

ما أهمية هذه الوحدة؟

طُورت نظرية البرمجة الخطّية في بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939م، واستُعملت لتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية في كثير من المجالات، وقد استفادت منها الشركات التجارية في جنٍي مزيد من الأرباح وتقليل الخسائر، وكذلك جدولة رحلات الطيران، وإنشاء خطوط الهاتف.

سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ▶ حلّ نظام مُكوّن من متباينات خطية بمتغيرين بيانياً.
- ▶ حلّ نظام مُكوّن من متباينات خطية بمتغيرين باستعمال برمجية جيوجبرا.
- ▶ حلّ مسائل حياتية عن البرمجة الخطية.

تعلّمت سابقاً:

- ✓ حلّ متباينة خطية بمتغير واحد، وتمثيلها على خط الأعداد.
- ✓ تمثيل متباينة خطية بمتغيرين في المستوى الإحداثي.
- ✓ حلّ نظام مُكوّن من معادلتين خطيتين بمتغيرين.
- ✓ تمثيل نظام مُكوّن من معادلتين خطيتين بمتغيرين بيانياً.

أستعمل تدريبات (أستعد لدراسة الوحدة) في الصفحات (36-39) من كتاب التمارين؛ لمراجعة هذه الموضوعات قبل البدء بدراسة الوحدة.

حلّ نظام متبادرات خطّية بمتغيرين بيانياً

Solving System of Linear Inequalities in Two Variables Graphically

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



تكلفة غسل السيارة الصغيرة 2 JD.



تكلفة غسل السيارة الكبيرة 3 JD.

حلّ نظام مكوّن من متبادرات خطّية بمتغيرين بيانياً.

نظام المتبادرات الخطّية، مجموعة الحلّ.

قدّم مَحَلٌ لتبديل زيوت السيّارات عرضاً مجاناً لغسل السيّارات. إذا كان الحدّ الأقصى لذلك العرض هو غسل 30 سيّارة يومياً، بتكلفة لا تزيد على 75 JD، فكم سيّارة كبيرة وصغيرة يُمكن غسلها يومياً بحسب هذا العرض؟

يتكون **نظام المتبادرات الخطّية** (system of linear inequalities) من متبادرتين خطّيتين أو أكثر. وُيطلق على مجموعة الأزواج المُرتبة التي تتحقّق جميع المتبادرات اسم **مجموعة الحلّ** (solution set). فمثلاً، يتكون النظام الآتي من ثلاث متبادرات خطّية:

$$x + y < 2$$

المتبادرة الخطّية الأولى

$$-2x + y > -1$$

المتبادرة الخطّية الثانية

$$x - 3y \leq -2$$

المتبادرة الخطّية الثالثة

يُمثّل الزوج المُرتب (2, -1) أحد حلول هذا النظام؛ لأنّه يتحقّق المتبادرات جميعها.

$$-1 + 2 = 1 < 2 \quad \checkmark$$

الزوج المُرتب يتحقّق المتبادرة الخطّية الأولى

$$-2(-1) + 2 = 4 > -1 \quad \checkmark$$

الزوج المُرتب يتحقّق المتبادرة الخطّية الثانية

$$-1 - 3(-1) = -7 \leq -2 \quad \checkmark$$

الزوج المُرتب يتحقّق المتبادرة الخطّية الثالثة

أتعلم

يوجد عدد لا ينتهي من الأزواج المُرتبة التي تتحقّق هذا النظام، وليس (2, -1) فقط.

لغة الرياضيات

تدلّ جملة (الزوج المُرتب يتحقق متبادرة) على أنّ المتبادرة تكون صحيحة عند تعويض هذا الزوج فيها.

لحلّ نظام متبادرات، أُمثّل كل متبادرة فيه بيانياً في المستوى الإحداثي نفسه، ثمّ أظلّ المنطقة المشتركة بين مناطق حلّ المتبادرات جميعها؛ إذ تمثّل هذه المنطقة مجموعة حلّ النظام.

مثال 1

أمثل منطة حل نظام المتباينات الآتي، ثم أتحقق من صحة الحل:


$$4x + 3y \leq 12$$

$$y - 2x < 0$$

الخطوة 1: أمثل المستقيمين الحدوديين.

$$4x + 3y = 12$$

$$y - 2x = 0$$



أمثل بيانياً المستقيمين الحدوديين في المستوى الإحداثي نفسه، واستعمل لونين مختلفين لظليل منطقتي الحل كما في الشكل المجاور.

أذكّر

إذا تضمنت المتباينة رمز $>$ أو رمز $<$ ، فإن المستقيم الحدودي لا يدخل ضمن منطقة الحل، ويكون تمثيله بخط متقطع.

الخطوة 2: أحدد منطة التقاءع بين حلّي المتباينتين.

الأحظ أن حلّ المتباينة: $12 \leq 4x + 3y$ هو المنطقتان A و B ، وأن حلّ المتباينة: $0 < y - 2x$ هو المنطقتان B و C . إذن، المنطقة B المشتركة بين منطقتي حلّ المتباينتين هي منطة حلّ نظام المتباينات.

الخطوة 3: أتحقق من صحة الحل.

أتحقق من صحة الحل باختيار زوج مُرتب يقع في منطة حلّ النظام (المنطقة B ، مثل $(-1, 2)$ ، ثم تعييشه في متباينات النظام جميعها:

$$4x + 3y \leq 12$$

$$4(-1) + 3(2) \stackrel{?}{\leq} 12$$

$$5 \leq 12 \quad \checkmark$$

المتباينة الخطية الأولى

بالتعریض

ناتج التعریض يتحقق المتباينة

$$y - 2x < 0$$

$$-1 - 2(2) \stackrel{?}{<} 0$$

$$-5 < 0 \quad \checkmark$$

المتباينة الخطية الثانية

بالتعریض

ناتج التعریض يتحقق المتباينة

أذكّر

للحصول على صحة الحل، يجب تعويض زوج مُرتب من منطقة الحل في متباينات النظام جميعها.

اتّحّق من فهّمي

أُمِّل مِنْطَقَة حلّ نظام المُتَبَايِنَاتِ الآتِي، ثُمَّ اتّحّق من صِحَّةِ الحلّ:

$$2x - 4y \geq -5$$

$$x + 7y < 7$$

إرشاد: أَسْتَعْمِلُ أَوراقَ الرِّسْمِ الْبَيَانِيِّ الْمُوْجَودَةَ فِي نِهَايَةِ كِتَابِ التَّمَارِينِ.


لَا يَكُونُ لِنَسَمَةِ المُتَبَايِنَاتِ حلّ أَحِيَّاً؛ لِعدَمِ وُجُودِ مِنْطَقَةٍ مُّشَتَّتَةٍ بَيْنِ مِنَاطِقِ حلّ المُتَبَايِنَاتِ الْمُكُوَّنَةِ لَهُ، عَنْدَئِذٍ تَكُونُ مِجْمُوعَةُ الْحَلِّ هِيَ مِجْمُوعَةُ الْخَالِيَّةِ.

مِثَال٢

أُمِّل مِنْطَقَة حلّ نظام المُتَبَايِنَاتِ الآتِي:

$$2x - 4y \leq -2$$

$$x - 2y > 1$$



أُمِّل بِيَانِيًّا الْمَسْتَقِيمَيْنِ الْحَدُودِيْيَيْنِ الْأَتَيْيَيْنِ فِي الْمَسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ نَفْسَهِ:

$$2x - 4y = -2$$

$$x - 2y = 1$$

وَأَسْتَعْمِلُ لَوْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِتَظْلِيلِ مِنْطَقَتِي الْحَلِّ كَمَا فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ.

أُلْاحِظُ أَنَّ حلَّ المُتَبَايِنَةِ: $2x - 4y \leq -2$ هُوَ الْمُنْطَقَةُ A، وَأَنَّ حلَّ المُتَبَايِنَةِ: $x - 2y > 1$ هُوَ الْمُنْطَقَةُ B، وَأَنَّهُ لَا يَوْجُدُ تَقَاطُعًا بَيْنِ مِنْطَقَتَيِّ حلِّ الْمُتَبَايِنَيْنِ. إِذْنًا، مِجْمُوعَةُ الْخَالِيَّةِ \emptyset هِيَ مِنْطَقَةُ حلِّ النَّسَمَةِ.

اتّحّق من فهّمي

أُمِّل مِنْطَقَة حلّ نظام المُتَبَايِنَاتِ الآتِيِّ:

$$5x - 2y < 3$$

$$2.5x - y \geq 2$$

إرشاد: أَسْتَعْمِلُ أَوراقَ الرِّسْمِ الْبَيَانِيِّ الْمُوْجَودَةَ فِي نِهَايَةِ كِتَابِ التَّمَارِينِ.

أَتَذَكَّرُ

يُرَمِّزُ إِلَى المُجْمُوعَةِ الْخَالِيَّةِ بِالرِّمْزِ \emptyset ، أَوِ الرِّمْزِ Ø (تُقَرَأُ: فَايِّ)؛ وَهِيَ مُجْمُوعَةٌ لَا تَحْوِي عَنَاصِرًا.

أَتَعْلَمُ

أَلْاحِظُ مِنْ الْمُتَبَايِنَةِ الْآتِيَّةِ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَنَّ $2x - 4y > 2$ يُنَاقِضُ الْمُتَبَايِنَةَ الْأُولَى $2x - 4y \leq -2$ ، مَا يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَوْجُدُ أَيْ زَوْجٌ مُّرَتَّبٌ يُمْكِنُ أَنْ يُحْقِقَ الْمُتَبَايِنَيْنِ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ.

الوحدة 3

قد يحوي النظام أكثر من متباينتين، عندئذ تكون منطقة الحل هي المنطقة المشتركة بين مناطق حل المتباينات جميعها.


مثال 3

أمثل بيانيًّا منطقة حل نظام المتباينات الآتي:

$$x - y \geq 0$$

$$x + y < 8$$

$$x > 2$$



الخطوة 1: أمثل بيانيًّا المستقيمات الحدودية

الآتية في المستوى الإحداثي نفسه كما في الشكل المجاور:

$$x - y = 0$$

$$x + y = 8$$

$$x = 2$$

الخطوة 2: أحدد منطقة الحل.

أظلل منطقة حل المتباينة: $x + y < 8$ باللون الأزرق، وهي المناطق: A, B, C, D, E, F .

أظلل منطقة حل المتباينة: $x - y \geq 0$ باللون الأخضر، وهي المناطق: B, C, D .

أظلل منطقة حل المتباينة: $x > 2$ باللون الذهري، وهي المناطق: C, D, E, F .

الاِلْهَاظِ أَنَّ المَنَاطِقَ C هِيَ الْمَنَاطِقُ الْمُشَتََّرَةُ بَيْنَ مَنَاطِقَ حَلِّ الْمَتَبَيْنَاتِ الْثَلَاثَةِ، إِذْنَ، هِيَ مَنَاطِقَ حَلِّ النَّسَامِ.

أتعلَّم

إذا تكون نظام المتباينات الخطية بمتغيرين من متباينتين فقط، ولم يكن للنظام حل، فإنَّ هذا يعني بالضرورة أنَّ المستقيمين الحدوديين متوازيان.

غير أنَّ ذلك لا ينطبق على النظام في حال وجود أكثر من متباينتين؛ إذ قد لا تتقاطع مناطق حل المتباينات بالرغم من أنَّ المستقيمات غير متوازية.

أتحقق من فهمي

أمثل بيانيًّا منطقة حل نظام المتباينات الآتي:

$$-3x + 4y \geq 9$$

$$x - 5y > 6$$

$$2x - 5y < -3$$

إرشاد: استعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

تُستعمل أنظمة المتباينات الخطية في عديد من المجالات والتطبيقات الحياتية، ويُمكن بها تحديد القيمة الممكّنة للمتغيّرات وفق شروط محدّدة.

مثال 4 : من الحياة



نحارة: يريد نحّار شراء نوعين من المسامير، ووجد أنّ ثمن الكيلوغرام الواحد من النوع الأول 4 JD، ومن النوع الثاني 6 JD. إذا أراد شراء ما لا يقلّ عن 10 kg من النوعين، بحيث لا يزيد الثمن الكلي على 48 JD، فأجد مقدار ما يمكنه شراؤه من كل نوع.

يوجد في هذه المسألة متغيّران مجهولان هما كمية المسامير من النوع الأول وكمية المسامير من النوع الثاني، وتوجد قيود على هذين المتغيّرين محدّدة بحدّ أدنى للكتلة الكلية لما يشتريه من النوعين، والحد الأعلى لمقدار ما يدفعه للكمّيتين من النوعين.

الخطوة 1: أُعبر عن المسألة جبرياً بنظام من المتباينات الخطية.

أفرض أنّ كتلة المسامير من النوع الأول هي x ، ومن النوع الثاني هي y ، ثم أكتب نظام المتباينات الخطية المرتبط بالشروط الواردة في نص المسألة.

$$x + y \geq 10$$

لاتقلّ الكتلة الكلية لنوعي المسامير عن 10 kg

$$4x + 6y \leq 48$$

لا يزيد الثمن الكلّي لنوعي المسامير عن 48 JD

$$x \geq 0$$

لا يمكن أن تكون كتلة النوع الأول سالبة

$$y \geq 0$$

لا يمكن أن تكون كتلة النوع الثاني سالبة

وبعد تبسيط المتباينة $4x + 6y \leq 48$ بالقسمة على 2، فإنّ نظام المتباينات الذي يُمثل هذه المسألة هو:

$$x + y \geq 10$$

$$2x + 3y \leq 24$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

أتعلم

نحتاج في بعض المسائل الحياتية إلى إضافة الشرطين: $x \geq 0, y \geq 0$ لأنّ قيم المتغيّرات فيها لا يمكن أن تكون سالبة، مثل: الكتلة، والمسافة.

لغة الرياضيات


a على الأكثر تكافيء $x \leq a$ ، و b على الأقل تكافيء $x \geq b$.

الخطوة 2: أمثل نظام المتباينات الخطية بيانياً.

أمثل بيانياً المستقيمين الحدوديين $x + y = 10$, $2x + 3y = 24$ في المستوى الإحداثي نفسه، مقتصرًا الرسم على الربع الأول؛ لأن $x \geq 0, y \geq 0$, ثم أظلل منطقة الحل لكل متباينة.

الخطوة 3: أحدد منطقة الحل.

الاحظ أن مناطق الحل تتقاطع في منطقة مغلقة على شكل مثلث هي منطقة حل النظام، وأن النقاط $(9, 2)$, $(8, 4)$, $(9, 1)$, $(6, 4)$ وغيرها الكثير واقعة في منطقة الحل. فمثلاً، يمكن للتجار شراء 6 kg من النوع الأول و 4 kg من النوع الثاني، أو 9 kg من النوع الأول و 1 kg من النوع الثاني، وهكذا لبقي النقاط الواقعة في منطقة الحل.



أتحقق من فهمي

محميات: يوجد في محمية للحيوانات مجموعة من الغزلان والأيائل، وقد أفاد الموظف الذي

يُشرف على إطعامها والاعتناء بها أنَّ:

- في المحمية 6 حيوانات على الأقل.

- عدد الحيوانات في المحمية لا يزيد على 12 حيواناً.

- عدد الغزلان في المحمية أقل من عدد الأيائل.

- في المحمية اثنين من الغزلان على الأقل.

(a) ما أقل عدد ممكِّن من الأيائل؟

(b) ما أكثر عدد ممكِّن من الغزلان؟

إرشاد: أستعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

أفكِّر

أكتب قائمة تحوي جميع النقاط التي يمكن أن تكون حلولاً ممكِّنة لنظام المتباينات الخطية.



تُعدُّ محمية الغزلان في دين إحدى أكبر المحميات الطبيعية في الأردن.



أمثلّ منطقة حلّ كلّ من أنظمة المتباينات الآتية:

1 $x + 3y > 1$

$5x - y \leq 2$

2 $-3x - 12y > -9$

$x + 4y \geq 5$

3 $x - 11y < 6$

$-2x + 22y > -12$

4 $3x + 5y \leq 1$

$3x + 5y \leq 3$

5 $2x - 7y > 2$

$2x - 7y \leq 2$

6 $13x - y < 11$

$x + y \geq 0$

7 $9x - y < 2$

$x + 3y > -1$

$x - y > -3$

8 $5x - 5y < 2$

$2x - 2y > 1$

$x \geq y$

9 $x \leq y$

$x - 5y < 6$


$10x - y > 3$

إرشاد: أستعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.



10 سياحة: تبلغ تكلفة تذكرة ركوب قارب سياحي دينارين للبالغين، وديناراً واحداً للأطفال، ويُتسع القارب لـ 10 أشخاص على الأكثر. إذا كانت x تمثل عدد البالغين، ولا تمثل عدد الأطفال، فكم شخصاً من البالغين والأطفال قد يوجد على متنه القارب، علمًا بأنَّ رُبْع بيع التذاكر أقل من 12 JD؟

11 نقل جوي: سعر تذكرة الدرجة السياحية للسفر بالطائرة بين مدينتي عمان والعقبة 25 JD، وسعر تذكرة الدرجة الخاصة 50 JD. إذا كان رُبْع بيع التذاكر 1600 JD على الأقل، وبيعت 50 تذكرة على الأكثر، فأجد عدد التذاكر الممكِّن لكل درجة.



12 أظلّل منطقة حلّ النظام الآتي من المتباينات في الشكل المجاور، ثمَّ أكتب جميع حلول النظام الممكِّنة، علمًا بأنَّ y و x عدوان صحيحان موجبان:

$$x + y \geq 5$$

$$4x + 2y \leq 16$$

جامعات: أرادت سامية الالتحاق بجامعة تشرط عقد امتحاني قبول لذلك؛ أحدهما في مبحث الرياضيات، والآخر في مبحث اللغة الإنجليزية، وإحراز ما بين 900 نقطة و1200 نقطة في الامتحانين معًا؛ شرط ألا يقل المجموع في امتحان الرياضيات عن 600 نقطة، وألا يقل المجموع في امتحان اللغة الإنجليزية عن 200 نقطة.

أجد عدد النقاط من مضاعفات المئة، التي يتعين على سامية إحرازها في كل امتحان لُتقبل في الجامعة.

أحل المسألة الواردة في بند (مسألة اليوم). 14

مهارات التفكير العليا



تبرير: أصف منطقة حل نظام المتباينات الآتي من دون تمثيلها بيانياً: 15

$$2x + y \leq 7$$


$$2x + y \geq 7$$

مسألة مفتوحة: أكتب نظامين يتكون كل منهما من متباينتين خطيتين بمتغيرين، بحيث تكون مجموعة الحل:

واقعة في الربع الأول من المستوى الإحداثي. 16

المجموعة الخالية. 17

تحدد: أكتب نظام المتباينات الذي منطقة حلّه هي المنطقة المظللة في التمثيل البياني الآتي: 18



تمثيل نظام متباينات خطية بمتغيرين بيانياً

Graphing System of Linear Inequalities In Two Variables

يمكنني استعمال برمجية جيوجبرا لتمثيل نظام المتباينات الخطية بيانياً في المستوى الإحداثي، وإيجاد منطقة الحل.

مثال

أمثل نظام المتباينات الخطية الآتي بيانياً باستعمال برمجية جيوجبرا، ثم أحدد منطقة الحل:

$$3x + 5y \leq 2$$


$$x + 5y > 4$$

الخطوة 1: تمثيل المتباينة الأولى بيانياً.

أكتب المتباينة الأولى في شريط الإدخال؛ بنقر المفاتيح الآتية:

3 x + 5 y ≤ 2

الاحظ أنَّ برمجية جيوجبرا قد حددت منطقة باللون الأزرق. ماذا تعني هذه المنطقة بالنسبة إلى المتباينة؟




الخطوة 2: تمثيل المتباينة الثانية بيانياً.

أكتب المتباينة الثانية في شريط الإدخال؛ بنقر المفاتيح الآتية:

x + 5 y > 4

الوحدة 3




الخطوة 3: تغيير اللون الأزرق الذي حدّدته ببرمجية جيوجبرا لمنطقة أخرى؛ لتمييزها من منطقة الحلّ الأولى.

أنقر الممتباينة التي يُراد تغيير لون منطقة حلّها على يسار الشاشة، ولتكن الممتباينة الثانية، ثمَّ أنقر الرمز $:$ الذي بجانبها، وأختار (settings)، ثمَّ (color) من القائمة التي ظهرت على يمين الشاشة، ومنها أختار لوناً آخر مثل الأخضر.

الخطوة 4: تفسير المناطق الظاهرة.

الاحظ وجود 4 مناطق: الأولى باللون الأزرق، والثانية باللون الأخضر، والثالثة مزيج من اللونين معًا، والرابعة باللون الأبيض. ماذا تعني كل منطقة؟



الخطوة 5: إظهار منطقة الحلّ بشكل مُفصّل. يمكنني إظهار منطقة الحلّ بشكل مُفصّل عن المناطق الأخرى، وذلك بالضغط على زر اللون المجاور لكل ممتباينة؛ فيختفي عندئذٍ تظليل المنطقة، ثمَّ كتابة الصيغة الآتية في شريط الإدخال: $a \& \& b$ ، حيث تُمثل a و b اسمَيَ المنشقتين المُمثّلتين للممتباينتين؛ فتظهر منطقة الحلّ بشكل مُفصّل كما في الشكل المجاور.

أَتَدْرَكَ



أُمثل كُلًا من أنظمة الممتباينات الخطية الآتية بيانياً باستعمال برمجية جيوجبرا، ثمَّ أحِدّد منطقة الحلّ:

1 $-5x - 2y \geq 3$

$x + y < -3$

3 $x - y \geq 0$

$x + y \leq 0$

2 $0.5x + 7y > -2$

$x < y$

4 $9x - 6y > 8$

$27x - 18y < 1$

البرمجة الخطية

Linear Programming

نمدجة مواقف حياتية بمسألة يمكن حلها باستعمال طريقة البرمجة الخطية بيانياً.

القيود، البرمجة الخطية، منطقة الحلول الممكينة، الاقتران الهدف، الحل الأمثل.

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



B	A	نوع شتلة البندورة
0.3	0.2	الثمن بالدينار
5 kg	4 kg	أقل إنتاج متوقع

دخلت سلمي محلاً لبيع الأشتال، وأرادت شراء نوعين من شتلات البندورة، بما لا يزيد على 4 JD ثمناً لـ 15 شتلة على الأكثر. وقد أظهرت اللوحة المجاورة المعلقة داخل المحل معلومات عن النوعين. كم شتلة ستشتري سلمي من كل نوع لإنتاج أكبر كم ممكن من البندورة؟

البرمجة الخطية (linear programming) هي طريقة تعتمد التمثيل البياني في المستوى

الإحداثي لإيجاد أكبر قيمة ممكينة (قيمة عظمى)، أو أصغر قيمة ممكينة (قيمة صغرى) لاقتران

يُسمى الاقتران الهدف (objective function)، ضمن مجموعة قيود (constraints)،

يُمثل كل منها متباينة خطية. فتتمثل المتباينات الخطية (القيود) تحدّد منطقة حلٍ مشتركة لها

تُسمى منطقة الحلول الممكينة (feasible region)، وفيها تتحقق أكبر قيمة ممكينة أو أصغر

قيمة ممكينة للاقتران الهدف عند رؤوس المُضلّع الذي يُحدّد منطقة الحلول الممكينة.

إرشاد

سيقتصر هذا الدرس فقط على البرمجة الخطية بمتغيرين.

تُعرف البرمجة الخطية بمتغيرين أيضاً بأنّها طريقة البحث عن **الحل الأمثل**

(optimal solution)، وت تكون مسألتها مما يأتي:

1 الاقتران الهدف: يكون في صورة: $P = ax + by$, حيث:


P : اسم الاقتران (مثل الربح).

a, b : عدادان حقيقيان. x, y : متغيران.

2 القيود: نظام من المتباينات الخطية، وهي

تكتب بدلالة المتغيرين y, x , وتحدد

منطقة الحلول الممكينة كما في الشكل المجاور.



الوحدة 3

الحل الأمثل


مفهوم أساسيٌّ

إذا وُجدت قيمة عظمى أو قيمة صغرى للاقتران الهدف، فإنّها تكون عند واحد أو أكثر من رؤوس منطقة الحلول الممكنة.

مثال 1

أجد إحدى النقاط (x, y) التي تجعل الاقتران $P = 3x + 2y$ أكبر ما يمكن ضمن القيود الآتية:

$$\begin{aligned}x - y &\leq 1 \\x + 2y &\leq 4 \\x \geq 0, y \geq 0\end{aligned}$$



الخطوة 1: أمثل القيود بيانياً.

أمثل نظام المتباينات الخطية (القيود) بيانياً، ثم أحدد منطقة الحلول الممكنة، كما في الشكل المجاور.

أتذكّر
المستقيم $x = 0$ هو المحور x نفسه، والمستقيم $y = 0$ هو المحور y نفسه.

الخطوة 2: أحدد رؤوس منطقة الحلول الممكنة.

رؤوس منطقة الحلول الممكنة	$P = 3x + 2y$
$A(0, 0)$	$P = 3(0) + 2(0) = 0$
$B(0, 2)$	$P = 3(0) + 2(2) = 4$
$C(2, 1)$	$P = 3(2) + 2(1) = 8$
$D(1, 0)$	$P = 3(1) + 2(0) = 3$

القيمة العظمى

الخطوة 3: تحديد القيمة العظمى

أو القيمة الصغرى.

الاحظ أنّ أكبر قيمة للاقتران P هي 8، وأنّها تظهر عندما $x = 2, y = 1$

أتحقق من فهمي

أجد إحدى النقاط (x, y) التي تجعل الاقتران $T = 4x + 5y$ أكبر ما يمكن ضمن القيود الآتية:

$$\begin{aligned}x + 2y &\leq 16 \\3x + 2y &\leq 24 \\x \geq 0, y \geq 0\end{aligned}$$

يسعى القائمون على الشركات الصناعية والتجارية ومختلف الأعمال إلى تخفيض الكلفة وزيادة الإنتاجية وتحقيق أكبر ربح ممكِّن، لكنَّ ذلك يخضع لقيود وموَّدَّدات، مثل: التمويل، وعدد العُمَّال، وعدد ساعات العمل، وعوامل العرض والطلب، وغير ذلك من المُتغيِّرات. لحلَّ هذا النوع من المسائل، أستعمل البرمجة الخطية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

صياغة الفرضيات، وكتابة اقتران الهدف الذي يُراد إيجاد قيمته العظمى أو قيمته الصغرى، ثمَّ تحديد القيود.

تمثيل نظام المتبادرات بيانياً، ثمَّ تضليل منطقة الحلول المُمكِّنة.

تحديد إحداثيات رؤوس منطقة الحلول المُمكِّنة، وذلك بإيجاد نقاط تقاطع المستقيمات الحدودية عند تلك الرؤوس.

اختيار القيمة العظمى أو القيمة الصغرى وفقاً لما هو مطلوب في المسألة، وذلك بتعويض إحداثيات الرؤوس في اقتران الهدف.

1

2

3

4



مثال 2: من الحياة

يباع متجر نواعين من أجهزة الحاسوب المحمولة، تكلفة الجهاز الواحد من النوع الأول 250 JD، وتكلفة الجهاز الواحد من النوع الثاني 400 JD. يحقق الجهاز الواحد من النوع الأول ربحاً مقداره 45 JD، في حين يحقق الجهاز الواحد من النوع الثاني ربحاً مقداره 50 JD. قدر صاحب المتجر أنَّ إجمالي الطلب الشهري على الأجهزة لا يتجاوز 250 جهازاً، وبينَ عدم قدرته على استثمار أكثر من 70000 JD في المتجر. كم عدد الأجهزة التي يتَعَيَّن على صاحب المتجر توفيرها للزبائن من كل نوع لتحقيق أكبر ربح ممكِّن؟

الخطوة 1: أُعبر عن كلٌّ من اقتران الهدف والقيود جبرياً.

أفترض أنَّ عدد أجهزة الحاسوب التي سيُوفِّرها صاحب المتجر من النوع الأول هو x ، وأنَّ عدد الأجهزة التي سيُوفِّرها من النوع الثاني هو y . إذا افترضت أنَّ صاحب المتجر سيباع جميع الأجهزة المُتوافِرة لديه، فإنَّ الربح المُتوقَّع هو: $P = 45x + 50y$.


المطلوب أن يكون الربح أكبر ما يُمكِّن ضمن القيود الآتية:

$$250x + 400y \leq 70000, \quad x + y \leq 250, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

أذكر

تُسمَّى المتبادرات $x \geq 0, y \geq 0$ قيوداً أو شروط عدم السالبية، وهما توجدان في مسائل البرمجة الخطية الحياتية بصورة ضمنية.

الوحدة 3



الخطوة 2: أمثلّ القيود بيانيًّا.

أمثلّ نظام المتباينات، ثمّ أظلّل منطقة الحلول الممكّنة كما في الشكل المجاور.

الخطوة 3: أحدّد رؤوس منطقة الحلول الممكّنة، ثمّ أحدّد القيمة العظمى أو القيمة الصغرى.

أحدّد إحداثي كلّ من النقاط: A, B, C, D ، ثمّ أجد قيمة الربح P عند كلّ منها كما في الجدول الآتي:

رؤوس منطقة الحلول الممكّنة	$P = 45x + 50y$
$A(0, 175)$	$P = 45(0) + 50(175) = 8750$
$B(200, 50)$	$P = 45(200) + 50(50) = 11500$
$C(250, 0)$	$P = 45(250) + 50(0) = 11250$
$D(0, 0)$	$P = 45(0) + 50(0) = 0$

القيمة العظمى

الاحظ من الجدول أنَّ أكبر ربح ممكِّن هو 11500 JD، وأنَّ هذا الربح يتحقّق عند بيع 200 جهاز من النوع الأوَّل، و 50 جهازًا من النوع الثاني.

أتعلّم

الاحظ أنَّ منطقة الحلول الممكّنة مُرتبطة فقط بالمُحدّدات، وليس لاقتران الهدف أيُّ علاقة بها.

أتذَّكَر

يمكِّن إيجاد إحداثي نقطة B بحل المعادلتين معًا بطريقة الحذف أو التبديل. كذلك يمكن استعمال برمجية جيوجبرا لإيجاد إحداثي نقطة تقاطع المستقيمين، علمًا بأنَّ النقطة A تمثّل المقطع y للمعادلة الآتية:

$$250x + 400y = 70000$$

أتحقّق من فهمي

يُتّبع مشغل صغير للأثاث المعدني 36 خزانة على الأكثر أسبوعيًّا من نوعين مختلفين: A و B . يبلغ ربح الخزانة الواحدة من النوع A JD 35، ومن النوع B JD 45. إذا كان ما يُباع من النوع A لا يقلُّ عن 3 أمثال ما يُباع من النوع B ، فأجد عدد الخزائن التي يُتّبعها المشغل من كل نوع لتحقيق أكبر ربح ممكِّن.

الاحظ من المثالين السابقين أنَّ منطقة الحلُّ الممكّنة التي تحدّدها القيود كانت محدودة، لكنَّ بعض المسائل الحياتية تتضمّن إيجاد أقل تكلفة ممكِّنة، أو أقل كمية مُستهلكة وغير ذلك، فتكون منطقة الحلُّ عندئِذ غير محدودة؛ لأنَّ قيودها تفرض ذلك.

مثال 3 : من الحياة

	النوع 2	النوع 1
تكلفة الكيس الواحد	JD 12	JD 10
عدد وحدات البروتينات	30	40
عدد وحدات المعادن	20	20
عدد وحدات الفيتامينات	30	10

بالبروتينات والمعادن والفيتامينات. إذا احتاجت الماشية يومياً إلى 150 وحدة من البروتينات، و90 وحدة من المعادن، و60 وحدة من الفيتامينات على الأقل، فكم كيساً من النوع 1 والنوع 2 معاً يمكن أن تستهلكه الماشية بأقل تكلفة ممكِنة؟

الخطوة 1: أصوغ الفرضيات.


أفترض أنَّ عدد الأكياس من النوع 1 هو x ، وأنَّ عدد الأكياس من النوع 2 هو y .

إذا افترضت أنَّ هذه الماشية تستهلك كل ما يُقدَّم لها من النوعين يومياً، فإنَّ التكلفة C هي:

$$T = 10x + 12y$$

المطلوب أنْ تكون التكلفة أقلَّ ما يُمكِّن ضمن القيود الآتية:

$$40x + 30y \geq 150, \quad 20x + 20y \geq 90, \quad 10x + 30y \geq 60, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$



الخطوة 2: أُمِّلِّي القيود ببيانياً.

أُمِّلِّي نظام المتبادرات الخطية، ثمَّ أُظْلِّلِّي منطقة الحلول المُمكِنة كما في الشكل المجاور.

الخطوة 3: أُحدِّدِّي رؤوس منطقة الحلول المُمكِنة.

أُحدِّدِّي إحداثي كلِّ من النقاط: A, B, C, D :

ثُمَّ أُجِدِّي قيمة التكلفة T عند كلِّ منها كما في الجدول الآتي:

رؤوس منطقة الحلول المُمكِنة	$T = 10x + 12y$
$A(0, 5)$	$T = 10(0) + 12(5) = 60$
$B(1.5, 3)$	$T = 10(1.5) + 12(3) = 51$
$C(3.75, 0.75)$	$T = 10(3.75) + 12(0.75) = 46.5$
$D(6, 0)$	$T = 10(6) + 12(0) = 60$

يخلط بعض مُربِّي الماشية نوعين

من العلف للحصول على مزيج ذي تكلفة أقل. وُبَيِّنَ الجدول المجاور تكلفة الكيس الواحد من كل نوع، وعدد الوحدات التي يحويها من البروتينات والمعادن والفيتامينات.

معلومة



يعتمد تسمين الماشية على تغذيتها بخلط مُعدَّ بنسَب مُحدَّدة من الحبوب (مثل: الذرة الصفراء، والشعير)، والتبغ، وقشور الفول، وملح الطعام، والفيتامينات.

أتعلَّم

من غير المنطقي في المسائل الحياتية، مثل المثال 2، البحث عن أكبر قيمة لاقتران الهدف. ففي هذا المثال، لا يُمكِّن إيجاد أكبر قيمة مُمكِنة لاقتران الهدف؛ لأنَّه غير محدود.

الوحدة 3

الخطوة 4: أُحدّد القيمة العظمى أو القيمة الصغرى.

الأِحْظَى من الجدول أَنَّ أَقْلَى تكْلِفَة مُمْكِنَة هي 46.5 JD، وَأَنَّ المَاشِيَة تَسْتَهْلِكُ وَقْتَهُ 3.75 كِيسَ من العَلْفِ 1، وَ0.75 كِيسَ من العَلْفِ 2، لِتَوَفِّيرِ الْحَدِّ الأَدْنِي الَّذِي يَلْزَمُهَا مِنَ الْبَرْوَتِينَاتِ وَالْمَعَادِنِ وَالْفِيَتَامِينَ.

اتَّحَقَّ مِنْ فَهْمِي

	النوع 2	النوع 1
سُعْرَ العَلْبَةِ الْوَاحِدَةِ	JD 0.3	JD 0.25
عَدْدُ السُّعْرَاتِ الْحَرَارِيَّةِ	60	60
عَدْدُ وَحْدَاتِ فيَتَامِينِ A	6	12
عَدْدُ وَحْدَاتِ فيَتَامِينِ C	30	10

وَيَبْيَّنُ الْجَدْوَلُ الْمُجَاوِرُ تَكْلِفَةِ الْعَلْبَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنَ الْأَلْبَانِ، وَعَدْدِ السُّعْرَاتِ الْحَرَارِيَّةِ، وَوَحْدَاتِ فيَتَامِينِ A وَC الَّتِي تَحْوِيَهَا الْعَلْبَةِ الْوَاحِدَةِ. كَمْ عَلْبَةٌ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَهْلِكَهَا يَوْمَيًّا شَخْصٌ يَتَّبِعُ نَظَامَ الْحَمِيمَةِ الْغَذَائِيَّةِ، وَيَرِيدُ تَحْقِيقَ شُرُوطِهَا بِأَقْلَى تَكْلِفَةٍ مَالِيَّةٍ مُمْكِنَةً؟

إِرْشَادٌ: أَسْتَعْمِلُ أُورَاقَ الرَّسْمِ الْبَيَانِيِّ الْمَوْجُودَةِ فِي نَهَايَةِ كِتَابِ التَّمَارِينِ.

مَعْلَوْمَة



أَفَادَتْ بَعْضُ الْدَّرَاسَاتِ أَنَّ جَسْمَ إِلَّا إِنْسَانٍ يَحْتَاجُ إِلَى نَحْوِ 2000 سُعْرَةٍ حَرَارِيَّةٍ يَوْمَيًّا، وَأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرٍ تَبعًا لِعُمْرِ الشَّخْصِ، وَكِتَلِهِ، وَنَوْعِ الْأَنْشِطَةِ وَالْتَّمَارِينِ الَّتِي يَمْارِسُهَا.

أَتَدْرَّبُ وَأَحْلُّ الْمَسَائِلَ

أَجِدُّ إِحْدَاثِيَّ النَّقْطَةِ (y, x) الَّتِي تَجْعَلُ اقْتِرَانَ الْهَدْفِ أَكْبَرَ مَا يُمْكِنُ ضِمْنَ الْقِيُودِ الْمُعْطَاةِ فِي كُلِّ مَمَّا يَأْتِي:

1 $P = 4x + 3y$

$$x + 2y \leq 4$$

$$x - y \leq 1$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

2 $R = 10x + 7y$

$$0 \leq x \leq 60$$

$$0 \leq y \leq 60$$

$$5x + 6y \leq 420$$

3 $Z = 1.5x + y$

$$x + 3y \leq 15$$

$$4x + y \leq 16$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

أَجِدُّ إِحْدَاثِيَّ النَّقْطَةِ (y, x) الَّتِي تَجْعَلُ اقْتِرَانَ الْهَدْفِ أَصْغَرَ مَا يُمْكِنُ ضِمْنَ الْقِيُودِ الْمُعْطَاةِ فِي كُلِّ مَمَّا يَأْتِي:

4 $Q = 4x + 5y$

$$x + y \geq 8$$

$$3x + 5y \geq 30$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

5 $C = 8x + 4y$

$$x + 2y \geq 4$$

$$3x + y \geq 7$$

$$2y - x \geq 7$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

6 $K = 25x + 35y$

$$8x + 9y \leq 7200$$

$$8x + 9y \geq 3600$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$


إِرْشَادٌ: أَسْتَعْمِلُ أُورَاقَ الرَّسْمِ الْبَيَانِيِّ الْمَوْجُودَةِ فِي نَهَايَةِ كِتَابِ التَّمَارِينِ.

7 صناعات: يُتيح أحد المصانع شوكولاتة مغطاة بالفستق، ويجني ربحاً مقداره 1.5 JD عن كل علبة مبيعة، ويُتيح نوعاً آخر منها مغطى بالبندق، ويجني ربحاً مقداره 2 JD عن كل علبة مبيعة. وقد بيّنت دراسة أجراها قسم التسويق في المصنع (بهدف زيادة الربح) أنَّ إنتاج كلا النوعين من الشوكولاتة يجب ألا يزيد على 1200 علبة شهرياً، وأنَّ الطلب على علب الشوكولاتة المغطاة بالبندق لا يزيد على نصف الطلب على علب الشوكولاتة المغطاة بالفستق، وأنَّ عدد علب الشوكولاتة المغطاة بالفستق يجب أن يكون أقل من (أو يساوي) 600 علبة، مضافاً إليها ثلاثة أمثال عدد علب الشوكولاتة المغطاة بالبندق شهرياً. كم علبة شوكولاتة من كل نوع يجب أنْ يُتيح المصنع شهرياً لتحقيق أكبر ربح ممكِّن، مفترضاً بيع الإنتاج كاملاً كل شهر؟

8 دعاية: أراد صلاح طباعة كُتُبٍ ونشرات دعائية لتسويق منتجات مزرعته من العسل الطبيعي، بحيث يحوي الكُتُب الواحد 3 صفحات، وتحوي النشرة الواحدة صفحتين. تبلغ تكلفة طباعة الكُتُب الواحد 0.2 من الدينار، وتكلفة طباعة النشرة الواحدة 0.1 من الدينار. وقد قرر صلاح أنه بحاجة إلى طباعة ما لا يزيد على 600 صفحة، مُمثلاً في 50 كُتُبًياً على الأقل، و150 نشرة على الأقل. كم عدد الكُتُبٍ ونشرات التي يجب طباعتها بحيث تكون التكلفة أقل ما يُمكِّن؟

9 أحل المسألة الواردة في بند (مسألة اليوم).

مهارات التفكير العليا



$$x + 2y \leq 8$$

$$x + y \leq 5$$


$$x \geq 0, y \geq 0$$

10 تبرير: أجد أكبر قيمة ممكِّنة لاقتران الهدف: $P = 5x + 6y$ ضمن منطقة الحلول الممكِّنة التي يُمثلها الشكل المجاور، وأبْرِر إجابتِي، ثمَّ أجد نقاطاً أخرى ضمن منطقة الحل يتحقَّق عندها أكبر قيمة لاقتران الهدف، وأبْرِر إجابتِي.

11 تحدّ: أجد اقتران هدف صورته: $G = ax + by$ ، حيث a, b عددان حقيقيان موجبان، وله أكبر قيمة عند النقطة $(3, 2)$ ، وهي 18، ضمن القيود المجاورة: إرشاد: يوجد أكثر من إجابة.

12 تحدّ: أجد مجموعة قيم n (حيث n عدد صحيح موجب) التي تجعل لاقتران الهدف: $D = 3x + ny$ أكبر قيمة ممكِّنة عند النقطة $(3, 4)$ ، ضمن القيود المجاورة:

نظام المتباينات الذي له التمثيل البياني الآتي هو:



- a) $y \leq 2x + 2$ b) $y \geq 2x + 2$
 c) $y < 2x + 2$ d) $y > 2x + 2$
 $y > -x - 1$ $y < -x - 1$
 $y \leq -x - 1$ $y \leq -x - 1$

5) $x - 8y \leq 9$

$4x + 7y > 3$

6) $12x + 10y > 1$

$-5x - 8y < 2$

$3x + y \geq -6$

أجد جميع الحلول الممكّنة لنظام المتباينات الآتي،

حيث m و n عدّان صحيحان موجّبان:

$m + n > 4$

$3m + 7n \leq 21$

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل ممّا يأتي:

1) الزوج الذي يُمثّل حلّاً لنظام المتباينات الآتي هو:

a) $(3, 2)$

b) $(0, 0)$

c) $(-4, -2)$

d) $(2, 8)$

إذا كان لنظام متباينات خطّية منطقة حلّ محدودة،

رؤوسها هي: $P(0, 2)$, $Q(2, 3)$, $R(4, 2)$, $S(3, 0)$

فإنَّ القيمة العظمى لاقتران الهدف:

تحدد عند الرأس:

a) P

b) Q

c) R

d) S

نظام المتباينات الذي ليس له حلّ هو:

a) $3x + 5y \geq 15$ b) $x + 2y \geq 2$

$2x + 3y \geq 6$ $2x + 4y \leq 0$

c) $4x + 3y \geq 6$ d) $x + y \geq 6$

$4x + 3y \leq 10$ $x + y \geq 3$

8

أجد أكبر قيمة للاقتران: $P = 4x + y$ ضمن القيود الآتية:

$$x + y \leq 50$$

$$3x + y \leq 90$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

9

أجد أصغر قيمة للاقتران: $C = 200x + 500y$ ضمن

القيود الآتية:

$$x + 2y \geq 10$$

$$3x + 4y \leq 24$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

140

تعليم: يعقد مصنع دورة تدريبية لطلبة الهندسة في إحدى الجامعات، بحيث يكون عدد الطالبات المُتدربات x ، وعدد الطالب المُتدربين y ، ولا يقل العدد الإجمالي للطالبات والطالب عن 5، ولا يزيد على 15، ولا يقل عدد الطالب عن نصف عدد الطالبات:

أشرح بالكلمات معنى: $x \geq 2y$. 12

إذا كان عدد الطالبات المُتدربات 6، فما العدد المُمكن للطالب المُتدربين؟ 13

يُنتج مصنع نوعين من القطع المعدنية باستعمال الآلتين A و B معاً. ويبين الجدول التالي الزمن الذي تستغرقه معالجة القطعة الواحدة في كل من الآلتين، ومقدار ربح المصنع من بيع القطعة الواحدة من كل نوع. إذا كان عدد ساعات العمل اليومي للآلة A لا يزيد على 10 h، وعدد ساعات العمل اليومي للآلة B لا يزيد على 6 h، فكم قطعة من كل نوع يجب أن يُنتج المصنع يومياً لتحقيق أكبر ربح مُمكن؟ 14

	القطعة من النوع الثاني	القطعة من النوع الأول
زمن المعالجة في الآلة A	1 h	2 h
زمن المعالجة في الآلة B	1 h	1 h
مقدار الربح	JD 15	JD 10

طرود خيرية: يريده تاجر مواد تموينية تشغيل عدد من العمال يوماً واحداً لتجهيز طرود تباع في شهر رمضان. حدد التاجر أجرة العامل الماهر في هذا اليوم بـ 30 JD، وأجرة العامل المبتدئ بـ 20 JD، لكنه لا يريده أن يُنفق أكثر من 15 عاملًـا ماهراً على تجهيز الطرود. استطاع التاجر إيجاد 18 عاملًـا ماهراً فقط؛ لهذا قرر أن يُشغل عاملًـا ماهراً واحداً على الأقل مقابل كل 3 عمال مبتدئين، علمًا بأن العامل الماهر يُجهز 25 طرداً في الساعة، والعامل المبتدئ يُجهز 18 طرداً في الساعة:

10

أكتب نظام متبادرات يُمثل هذه المعلومات، ثم أمثله

أجد عدد العمال المأهـرة والعـمال المـبـتدـئـين الذين يجب تشغيلـهم لـتجـهـيزـأـكـبـرـعـدـمـمـكـنـمـنـالـطـرـوـدـ.