

المستقيبات المتوازية والعمودية

مخطط الوحدة

11

التوزيع التفصيلي		الوقت	
الوقت		45 دقيقة	90 دقيقة
الوقت		45 دقيقة	90 دقيقة
الوقت		45 دقيقة	90 دقيقة
المعلمات	الأهداف	المفردات الأساسية	
المستقيبات المتوازية والعمودية	• تحديد العلاقة بين مستقيمين أو مستويين • تحديد أزواج الزوايا المتكونة من المستقيبات المتوازية والعمودية	مستقيبات متوازية parallel lines مستويات متوازية parallel planes مستقيبات متقاطعة these lines intersect (transverse) زوايا داخلية interior angles زوايا خارجية exterior angles زوايا داخلية متتالية consecutive interior angles زوايا داخلية/خارجية متبادلة alternate interior/exterior angles زوايا متناظرة corresponding angles	مستقيمات متوازية parallel lines مستويات متوازية parallel planes مستقيبات متقاطعة these lines intersect (transverse) زوايا داخلية interior angles زوايا خارجية exterior angles زوايا داخلية متتالية consecutive interior angles زوايا داخلية/خارجية متبادلة alternate interior/exterior angles زوايا متناظرة corresponding angles
الزوايا والمستقيبات المتوازية	• استخدام النظريات لتحديد العلاقات بين أزواج معينة من الزوايا • استخدام التحليل لإيجاد قياسات الزوايا	مستقيمات متوازية parallel lines مستويات متوازية parallel planes مستقيبات متقاطعة these lines intersect (transverse) زوايا داخلية interior angles زوايا خارجية exterior angles زوايا داخلية متتالية consecutive interior angles زوايا داخلية/خارجية متبادلة alternate interior/exterior angles زوايا متناظرة corresponding angles	مستقيمات متوازية parallel lines مستويات متوازية parallel planes مستقيبات متقاطعة these lines intersect (transverse) زوايا داخلية interior angles زوايا خارجية exterior angles زوايا داخلية متتالية consecutive interior angles زوايا داخلية/خارجية متبادلة alternate interior/exterior angles زوايا متناظرة corresponding angles

الوحدة 11-3 45 دقيقة، 0.5 ساعة 90 دقيقة، 0.5 ساعة	الوحدة 11-3 45 دقيقة، 0.5 ساعة 90 دقيقة، 0.5 ساعة	الوحدة 11-4 45 دقيقة، 0.5 ساعة 90 دقيقة، 0.5 ساعة	الوحدة 11-4 45 دقيقة، 0.5 ساعة 90 دقيقة، 0.5 ساعة
مفاهيم تقنية التمثيل البياني، استكشاف الميل	ميل الخطوط المستقيمة	معادلات الخطوط المستقيمة	مختبر الهندسة، معادلات المتصفات العمودية
- استخدام مائة التفاضل البياني - استكشاف الميل	- إيجاد ميل المستقيمات. - استخدام الميل لتحديد المستقيمات المتوازية والمتعامدة.	- كتابة معادلة مستقيم بناءً على معلومات عن الميل البياني. - عمل المسائل من طريق كتابة المعادلات.	استكشاف الأشكال على مستوى إحداثي
	ميل slope معدل التغير rate of change	صيغة الميل والقطع slope-intercept form صيغة الميل والنقطة point-slope form	
التقويم التكويني اختبار نصف الوحدة			

المستقيمات المتوازية والمتعامدة

مخطط الوحدة

الترتيب	الترتيب	العنوان
45 دقيقة، 90 دقيقة، 0.5 ساعة	45 دقيقة، 90 دقيقة، 0.75 ساعة	الأهداف
المتعامدات والمسافة - إيجاد المسافة بين نقطة ومستقيم. - إيجاد المسافة بين مستقيمين متوازيين.	إثبات توازي المستقيمات - التعرف على أنواع الزوايا التي تتكون مع المستقيمات المتوازية. - إثبات توازي مستقيمين.	
مسافة متساوية equidistant		المفردات الأساسية
التقويم الختامي دليل الدراسة والمراجعة تمرين على الاختبار		

مهارات دراسية

يمكن مساعدة الطلاب على فهم العلاقات في الرياضيات من خلال تطوير خرائط المفاهيم باعتبارها جزءًا من المناقشة التي تتم داخل الصف الدراسي. بعد قراءة الطلاب للدرس 2-11، اكتب على اللوحة "الزوايا المتكافئة من المستقيمتين المتوازيين وقاطع". اسمح للطلاب أن يكملوا خريطة المفاهيم. وشجعهم على رسم رسومات مصاحبة لما يصنعونه. ويمكن للطلاب أن يطوروا خرائط مفاهيم مشابهة كجزء من المناقشات التي تتم داخل الصف الدراسي عن ميول المستقيمتين (الدرس 3-11)، ومعادلات المستقيمتين (الدرس 4-11)، وغيرها من الموضوعات الموجودة في الوحدة 11.



شكر الاستاذ علي خلال استراتيجيات وضعها الطلاب

المستقيمات المتوازية والمتعامدة

التقويم

التشخيص

الاستعداد للوحدة 11 كتاب الطالب

السابق. الحالي. لماذا؟ كتاب الطالب

الحل

بداية الوحدة 11

الاستجابة للتدخل التقويمي كتاب المعلم

بداية كل درس

الوحدة 0 كتاب الطالب

أثناء/بعد كل درس

التدريس المتميز كتاب المعلم
خيارات الواجب المنزلي المتميزة كتاب المعلم

نصف الوحدة

اختبار ما قبل الوحدة

تمرين موجه كتاب الطالب. كل مثال
التحقق من فهمك كتاب الطالب
مسائل مهارات التفكير العليا كتاب الطالب
مراجعة شاملة كتاب الطالب
أمثلة إضافية كتاب المعلم
انتبه! كتاب المعلم
الخطوة 4. التقويم كتاب المعلم

اختبار نصف الوحدة كتاب الطالب

دليل الدراسة والمراجعة للوحدة كتاب الطالب
تمرين على الاختبار كتاب الطالب
تمرين على الاختبار المعياري كتاب الطالب

التقويم التكويني

التقويم التكويني

التقويم الختامي

المستقيمات المتوازية والمتعامدة

التدريس المتمايز

الخيار 3 أعلى من المستوى

في هذه الوحدة، ينظر الطلاب إلى أمثلة عديدة من الحياة اليومية عن الميول والزوايا والقواطع والمستقيمات المتوازية (أبرج خليفة، الأسلاك الكهربائية، إلخ). اجعل الطلاب يختاروا مبنى معماريًا مشهورًا لعمل بحثٍ عليه. ويجب أن يحتوي البحث على معلومات عن موقع المبنى وتاريخه والغرض من إنشائه. وسيستخدم الطلاب هذه المعلومات لابتكار ملصق يعرضونه على الصف الدراسي. ويجب أن يتضمن هذا الملصق ورقة البحث، وصورة للمبنى، ورسماً للمبنى مكتوب عليه العلاقات المتنوعة بين المستقيمات (متوازية، ومتعامدة، ومتقاطعة، ومتخالفة). وقياس ميول المستقيمات، والعلاقات بين الزوايا (داخلية متبادلة، وخارجية متبادلة، ومناظرة، وداخلية متتالية).

الخيار 1 الوصول إلى مستوى المعلمين كافة

طريقة التواصل اطلب من كل طالب كتابة كسرٍ على إحدى بطاقات الخهريسة ليمثل ميل أحد المستقيمات، ثم اطلب من كل طالب أن يتبادل بطاقته مع طالب آخر. وعلى كل طالب أن يكتب ميل مستقيم يكون إما موازيًا أو عموديًا على ميل المستقيم الأول الموجود على بطاقة الطالب الآخر. ثم اطلب من كل طالب أن يعيد البطاقة التي معه إلى صاحبها الأصلي. والذي سيقوم بكتابة العلاقة بين المستقيمين سواء كانا متوازيين أو متعامدين. ثم ينشئ رسماً دقيقًا للمستقيمين.

طريقة التواصل اجعل كل طالب ينشئ رسماً لمستقيمين أو ثلاثة مستقيمات متوازية يقطعها قاطع ويرقم كل زاوية. ثم اطلب منهم أن يصنعوا العلاقة بين كل زوج من الزوايا على أنهما إما زاويتان داخليتان متبادلتان أو خارجيتان متبادلتان أو متناظرتان أو داخليتان متتاليتان ومتتامتان أو متكاملتان.

الخيار 2 قريب من المستوى

ارسم مستقيمين متوازيين وقاطعًا على الأرض. واطلب من كل زوجين من الطلاب أن يثقا في الزوايتين المتطابقتين أو المتكاملتين. وشرح لهم ما إذا كانت الزاويتان متبادلتين داخليتين، أم متبادلتين خارجيتين، وهكذا.

المستقيمات المتوازية والمتعامدة التركيز على محتوى الرياضيات


معاينة درس تلو الآخر

التخطيط الرأسي

11-1 المستقيمات المتوازية والقاطعات

المستقيمات التي تقع في مستوى واحد ولا تتقاطع مع بعضها تُسمى المستقيمات المتوازية. والمستويات التي لا تتقاطع تُسمى المستويات المتوازية. ويُستخدم الرمز $\parallel$ للتعبير عن التوازي. أمّا المستقيمات التي لا تقع في مستوى واحد تُسمى المستقيمات المتخالفة.

المستقيم الذي يقطع مستقيمين أو أكثر في نقاط مختلفة يُسمى القاطع. وينتج عن تقاطع هذه المستقيمات علاقات متنوعة بين الزوايا. فكل تقاطع ينتج عنه أربع زوايا. وكل زاوية لها زاوية متناظرة عند التقاطع الآخر.



- تقع الزوايا الداخلية داخل المستقيمات المتوازية. $\angle 3$ و $\angle 4$ و $\angle 5$ و $\angle 6$
- الزوايا الخارجية تقع خارج المستقيمات المتوازية. $\angle 1$ و $\angle 2$ و $\angle 7$ و $\angle 8$
- تقع الزوايا الداخلية المتبادلة على جانبيين متقابلين من القاطع وداخل المستقيمات المتوازية. $\angle 3$ و $\angle 5$ و $\angle 4$ و $\angle 6$
- تقع الزوايا الخارجية المتبادلة على جانبيين متقابلين من القاطع وخارج المستقيمات المتوازية. $\angle 1$ و $\angle 7$ و $\angle 2$ و $\angle 8$
- الزوايا المتناظرة تقع في الموضع نفسه على المستقيمات المتوازية بالنسبة إلى القاطع. $\angle 1$ و $\angle 5$ و $\angle 2$ و $\angle 6$ و $\angle 3$ و $\angle 7$ و $\angle 4$ و $\angle 8$

11-2 الزوايا والمستقيمات المتوازية

عندما يمر قاطع بمستقيمين متوازيين، فإنّ الزوايا المتناظرة تكون متطابقة. وتسمى هذه المسألة "مسألة الزوايا المتناظرة". وفي هذا الموقف نفسه، تتطابق الزوايا الداخلية المتبادلة وتتطابق الزوايا الخارجية المتبادلة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يكون كل زوج من الزوايا الداخلية المتتالية متكاملة.

تشير نظرية القاطع المتعامد إلى أنه في المستوى، إذا كان القاطع متعامدًا على أحد مستقيمين متوازيين، فإنه يكون متعامدًا أيضًا على المستقيم الآخر. ويستخدم الطلاب معرفتهم بطريقة تكوين القواطع لزوايا متطابقة ومتكاملة في حساب قياسات الزوايا.

قبل الوحدة 11

الموضوعات ذات الصلة

- المقارنة وتوضيح الفرق بين العلاقات الخطية التناسبية وغير التناسبية.
- تعريف الرياضيات وتطبيقها على تجارب من الحياة اليومية، وعلى الأنشطة داخل وخارج المدرسة، ومع التخصصات الأخرى، ومع موضوعات الرياضيات الأخرى.

الموضوعات ذات الصلة

- كتابة معادلات المستقيمات وتمثيلها بيانيًا.

الوحدة 11

الموضوعات ذات الصلة

- وضع تخمينات حول المستقيمات وتحديد مدى صحة هذه التخمينات.
- وضع تخمينات حول الزوايا وتحديد مدى صحة هذه التخمينات.
- استخدام ميول معادلات المستقيمات لاستكشاف العلاقات الهندسية مثل: المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة.
- استخدام أنظمة إحداثية أحادية وثلاثية الأبعاد لتمثيل المستقيمات.


بعد الوحدة 11

الإعداد

- تحديد ورسم التمثيلات البيانية للدوال الأصلية، بما فيها الدوال الخطية.

11-3 ميل المستقيمت

ميل المستقيم هو النسبة بين ارتفاعه الرأسي وامتداده الأفقي.



$$\text{الميل} = \frac{\text{الارتفاع}}{\text{الامتداد}} = \frac{4}{5}$$

لأن المستقيمت المتوازية تكون أزواجاً من الزوايا ذات علاقات خاصة. يمكن استخدام أزواج الزوايا هذه لإثبات توازي المستقيمت. وتتمثل بعض الشروط التي تحقق توازي المستقيمت في:

- زاويتان متناظرتان ومتطابقتان.
- زوايا خارجية متبادلة ومتطابقة.
- زوايا داخلية متبادلة ومتطابقة.
- زوايا داخلية متتالية ومتكاملة.
- مستقيمت متعامدة على نفس المستقيم.

11-6 المتعامدات والمسافة

المسافة من مستقيم إلى نقطة ليست على هذا المستقيم تساوي طول القطعة المستقيمة التي تبدأ من هذه النقطة وتكون متعامدة على هذا المستقيم. وهذه أقصر مسافة من النقطة إلى المستقيم. ويمكن إنشاء قطعة مستقيمة متعامدة باستخدام فرجار ومسطرة تقويم. ويمكن استخدام المسافة لتحديد المستقيمت المتوازية. فيكون المستقيمتان متوازيين في مستوى ما إذا كانا على مسافة واحدة من بعضهما البعض من أي مكان. وعلى مسافة واحدة تعني أن المسافة بين المستقيمتين تكون واحدة دائماً.

لإيجاد المسافة بين مستقيمتين متوازيين. فس طول القطعة المستقيمة المتعامدة التي يقع نقطتا نهايتها على كلا المستقيمتين. ونحتاج إلى أن نجس في مكان واحد فقط لأن المسافة تظل ثابتة. وهذا يعني أيضاً أنه إذا كان المستقيمتان على مسافة واحدة من مستقيم ثالث. فحينها يكون المستقيمتان متوازيين مع بعضهما البعض.

يكون ميل المستقيم الرأسي غير محدد. في حين أن ميل المستقيم الأفقي يساوي صفراً. ويكون للمستقيمتين غير الرأسيتين الميل نفسه إذا كانا متوازيين فقط. ويكون المستقيمتان غير الرأسيتين متعامدتين فقط إذا كان ناتج ضرب ميليهما يساوي -1. وهذا يعني أنه يمكن استخدام الميل في تحديد المستقيمت المتوازية والمتعامدة. ويمكن أيضاً استخدام الميل في تمثيل المستقيمت المتوازية والمتعامدة بيانياً. في المثال الموجود بأعلى الصفحة. سيكون ميل المستقيم العمودي هو $-\frac{5}{4}$ لأن $\frac{4}{5} \left(-\frac{5}{4}\right) = -1$

11-4 معادلات المستقيمت

يخدم هذا الدرس صيغتين أساسيتين لمعادلات المستقيمت. نسمي إحداها بصيغة الميل والمقطع. ونكتب في صورة $y = mx + b$ حيث m هو الميل و b هو المقطع مع المحور الرأسي y . ونسمي الصيغة الثانية بصيغة الميل والنقطة. ونكتب في صورة $y - y_1 = m(x - x_1)$ حيث (x_1, y_1) هما الإحداثيان لأي نقطة تقع على المستقيم.

يمكن كتابة معادلات خطية لحل مسائل من الحياة اليومية. فالميل يمثل غالباً معدلاً للتغير. ويمكن استخدام هذا المعدل لتحديد التكلفة أو معلومات أخرى.

11-5 إثبات توازي المستقيمت

يمكن إثبات توازي المستقيمت عند تحقق شروط معينة خاصة بالزوايا. فإذا قطع قاطع مستقيمتين آخرين في مستوى بحيث تكون الزوايا المتناظرة متطابقة. فحينها يكون المستقيمتان متوازيين. وهذه المسألة تعلق إنشاء المستقيمت المتوازية. ويتم رسم القاطع عبر نقطة معينة ليقطع مستقيماً محدداً. ونصبح النقطة المحددة رأساً لإنشاء زاوية متطابقة مع الزاوية المتكونة من خلال المستقيم والقاطع. وباستخدام فرجار ومسطرة تقويم. انسخ الزاوية المعطاة. وستكون النتيجة عبارة عن زوج من المستقيمت المتوازية المخطوطة بقاطع. ويقودنا هذا الإنشاء إلى مسألة التوازي التي تنص على أنه: إذا علم مستقيم ونقطة لا تقع على هذا المستقيم. فحينها لا بد من وجود مستقيم واحد فقط يمر عبر هذه النقطة ويكون موازياً للمستقيم المعطى.

المستقيّات المتوازية والمعامدة

مشروع الوحدة

وظيفة المستقيّات في الإنشاء

المستقيّات المتوازية والمعامدة يستخدم الطّلاب ما تعلّموه عن المستقيّات المتوازية والمعامدة لتكوين روابط في بناء التّجزيات

سيخوم الطّلاب بإجراء بحث عن تصميم جسر حولدن حيث (أو جسر البوابة الذهبية) في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك لمعرفة مدى الدور المهم الذي تلعبه المستقيّات المتوازية والمعامدة في التصميم الهندسي.

أسئلة للبحث والمناقشة:

- كم عدد مناطق الجسر المختلفة التي توضح أمثلة عن المستقيّات المتوازية والمعامدة؟ احتفظ بالقائمة المتعلقة بذلك لمناقشات أخرى.
- كيف يمكنك إثبات أن خطوط الكابلات التي تدعم طريق الجسر متوازية؟ كيف يمكنك إثبات أن هذه الخطوط معامدة على سطح الطريق؟
- هل تستطيع إيجاد قطع المسك الضفيرة التي تتقاطع مع الدعامات المتوازية التي تكوّن حارة الطريق؟ كيف يمكنك إثبات توازيها؟
- اكتب تقريرًا عن بحثك ونتائج لغرضها على الحصف الدراسي.

لماذا؟

الإشارات والهندسة يستخدم المهندسون المهندسين والباحثون والهندسون المستقيّات المتوازية والمعامدة لتصميم السكك والآلات والمركبات.

الحالي

في هذه الوحدة سوف نتعلّم:

- تحديد وتثبيت علاقات الزوايا التي تتكوّن من مستقيّات متوازية وقاطع
- استخدام السيل لتحليل مستقيم وكثافة معاملاته
- إيجاد المسافة بين خطين ومستقيم وبين مستقيّين متوازيين.

السابق

تمتدّ دروسنا عن المستقيّات والزوايا وكثافة الزوايا الهندسية.

المفردات الأساسية قدّم المفردات الأساسية في الوحدة متبقًا النظام التالي.

تعريف: المستقيّات المتوازية هي مستقيّات في مستوى واحد وغير متقاطعة.

مثال: السطور المرسومة على ورقة دفتر تكون متوازية.

أسئلة: صواب أم خطأ؟ إذا كانت السطور الموجودة في ورقة دفتر متوازية، فهي إذاً لا بد أن تكون في مستوى واحد. صواب أم خطأ؟ إذا كانت السطور الموجودة في ورقة دفتر في مستوى واحد، فهي إذاً لا بد أن تكون متوازية. خطأ ما الشيء الذي يمكن أن يكون مثلاً على مستقيّات في مستوى واحد ولكنها غير متوازية؟ الإجابة: السطور الخطوط المتقاطعة المرسومة على ورقة دفتر.

إجابة إضافية (ص. 641)

3. نعم، فالنقطتان C و D يقعان في المستوى CBD

الأسئلة الأساسية

- كيف يمكنك تحديد ما إذا كان المستقيمان متوازيين أم متعامدين؟ الإجابة النموذجية: إذا كان المستقيمان يتخلفهما مستقيم ثالث، فيمكنك تحليل العلاقات بين الزوايا الناتجة، وإذا كانا على المستوى الإحداثي، فيمكنك إيجاد ميل المستقيمين والمقارنة بينهما.


- كيف يمكن استخدام مفاهيم المستقيمتين المتوازيين والمتعامدين في الحياة اليومية؟ الإجابة النموذجية: تُستخدم المستقيمتين المتوازيين والمتعامدين في الإنشاءات والهندسة المعمارية لبناء الطرق والجسور ذات الجوانب المتوازية والمياني الرأسية. وتستخدم هذه المفاهيم أيضًا في الفنون لإنشاء الصورة الخادعة للعمق.

الاستعداد للوحدة

خيار الكتاب المدرسي أجب عن التدريب السريع أدناه. عد إلى المراجعة السريعة للمساعدة.

تدريب سريع

ارجع إلى الشكل لتحديد كل مما يلي.



1. كم عدد المستويات الموضحة في هذا الشكل؟ 4

2. عيّن ثلاث نقاط تقع على خط واحد. A و F و D


3. هل النقطتان C و D متحدتان المستوى؟ اشرح. انظر الهامش.

4. التصوير الفوتوغرافي نلتقط رنا صورة لأصدقائنا. إذا قامت بضبط مستوى الحامل الثلاثي على الأرض، فهل ستكون قاعدة كل من أرجل الحامل الثلاث على مستوى واحد؟ نعم

مراجعة سريعة

مثال 1 (مستخدم في الدرس 11-1)

ارجع إلى الشكل.




a. كم عدد المستويات الموضحة في هذا الشكل؟ ستة مستويات: المستوى FGLK والمستوى JHMP والمستوى FKPJ والمستوى GLMH والمستوى FGJH والمستوى KLMP

b. عيّن ثلاث نقاط تقع على خط واحد. النقاط M و O و H تقع على خط واحد.

c. هل النقاط F و K و J تقع على مستوى واحد؟ اشرح. نعم، النقاط F و K و J تقع جميعها في المستوى FKPJ.

مثال 2 (مستخدم في الدرسين 11-2 و 11-5)

أوجد $m\angle 1$



اجمع.
يشط.

$$m\angle 1 + 37 + 90 = 180$$

$$m\angle 1 = 53$$

مثال 3 (مستخدم في الدروس من 11-3 إلى 11-6)

أوجد قيمة x في $a + 8 = b(x - 7)$ إذا كان $a = 12$ و $b = 3$

$$a + 8 = b(x - 7)$$

$$12 + 8 = 3(x - 7)$$

$$20 = 3x - 21$$

$$90 = 3x$$

$$x = 9$$

اكتب المعادلة.


$$a = 12 \quad b = 3$$

يشط.

اجمع.

اقسو.

أوجد قياس كل زاوية.



$$5. \angle 1 \quad 113$$

$$6. \angle 2 \quad 128$$

$$7. \angle 3 \quad 90$$

$$8. \angle 4 \quad 52$$

أوجد قيمة x للقيم المعطاة لكل من a و b.

$$9. a + 8 = -4(x - b) \text{ حيث } a = 8, b = 3$$

$$10. b = 3x + 4a \text{ حيث } a = -9, b = 12$$

$$11. \frac{a+2}{b+13} = 5x \text{ حيث } a = 18, b = -1$$

12. لعبة الجولف على ملعب مصغر في ملعب جولف مصغر. يتم تقديم آيس كريم بسعر 1 AED مع كل جولة يتم حجزها من اللعبة. فإذا تناول كل من خمسة أصدقاء قطعة آيس كريم واحدة بعد ممارسة لعبة الجولف وكان إجمالي ما دفعوه 30 AED، فكم تبلغ تكلفة جولة الجولف الواحدة؟ 5 AED

مخرجات منظّم الدراسة

مطلوبات ديننا زاويك

التركيز يكتب الطلاب ملاحظات عن المستقيمتين المتوازيتين والمتعامدة.

التدريس يحتاج الطلاب إلى بطاقات دراسية. سواء أكانت بطاقات فهرسة مقاس A7 أم صفحات من ورق الدفتر مقطّعة إلى أجزاء مرتّبة الشكل.

وأثناء دراستهم للمستقيمتين المتوازيتين والفواصل. اطلب منهم تصميم رسم تخطيطي على أحد جوانب البطاقة وكثافة وصف لما رسموه على الجانب الآخر. احتفظ بطاقات المستقيمتين المتوازيتين في جيب المظوية المناسب. استمر أيضًا في الشرح عبر الوحدة وفي عمل بطاقات للمستقيمتين المتعامدة.

وقت الاستخدام استخدام الأجزاء المناسبة أثناء تناول الطلاب لكل درس في هذه الوحدة. ويمكن للطلاب إضافة إلى جزء المفردات أثناء كل درس.

من أجل مطلوبات أكثر قوة ومتانة. اطلب من الطلاب إضافة ورق مقوى وغطيه ليكون غلافًا قبل تدريس وقطع الورقة مقاس A3.

البداية في هذه الوحدة

سوف تتعلم عدة مفاهيم ومهارات ومفردات جديدة خلال دراستك الوحدة 11. ولكي تستعد، حدد المفردات المهمة ونظم مواردك. يمكنك العودة إلى الوحدة 0 لمراجعة المهارات المطلوبة.

مفردات جديدة


- مستقيمتين متوازيتين (parallel lines)
- مستقيمتين متخالفتين (skew lines)
- مستويات متوازيتين (parallel planes)
- قاطع (transversal)
- زاوية داخلية (interior angles)
- زاوية خارجية (exterior angles)
- زاوية متناظرة (corresponding angles)
- ميل (slope)
- معدل التغير (rate of change)
- صيغة الميل والمقطع (slope-intercept form)
- صيغة النقطة والميل (point-slope form)
- مسافة متساوية (equidistant)

مراجعة المفردات

الزوايا المتطابقة هما زاويتان لهما نفس القياس

المتعامد مستقيمتان أو قطعتان مستقيمتان أو شعاعان يتقاطعان لتكوين زاوية قائمة

الزاويتان المتقابلتان بالرأس زاويتان غير متجاورتين تشكلان مستقيمتين متقاطعتين



مخرجات منظّم الدراسة

المستقيمتين المتوازيتين والمتعامدة اصنع هذه المظوية لمساعدتك على تنظيم ملاحظاتك على الوحدة 11 بشأن العلاقات بين المستقيمتين. ابدأ بورقة مقاس A3 وست بطاقات فهرسة.



1 اظم بالطول حوالي 7 cm من الأسفل



2 اظم الورقة لثلاثة أثلاث



3 افتح ورتب الحواف في أحد الجوانب لتكون ثلاثة جيوب



4 اكتب على الجيوب كما هو موضح. ضع بطاقتي فهرسة في كل جيب

1 التركيز

التخطيط الرأسي

قبل الدرس 11-1 استخدام العلاقات بين القطعة المستقيمة والزوايا لإثبات النظريات.

الدرس 11-1 تحديد العلاقة بين مستقيمين أو مستويين. ذكر أزواج الزوايا الناتجة عن المستقيمتين المتوازيين والخطوط.

بعد الدرس 11-1 استخدام ميول معادلات المستقيمتين لاستكشاف العلاقات الهندسية. بما في ذلك المستقيمتين المتوازيين والمستقيمتين المتعامدة.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

كَلِّف الطلاب براءة القسم **لماذا؟** الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

هل تُظهر الأشياء أكبر من حجمها الحقيقي في مقدمة غرفة إيمان أم في جزئها الخلفي؟ في المقدمة


كيف تُظهر المستقيمتين المائلتين الأشياء أكبر أو أصغر من حجمها الحقيقي؟ الإجابة النموذجية: تتغير المسافة بين المستقيمتين. فعندما تقترب المستقيمتين من بعضهما، تُظهر الأشياء الواقعة بينها بحجم أكبر. وعندما تبعد عن بعضهما، تُظهر الأشياء بحجم أصغر.

11-1 المستقيمتين المتوازيين والمتقاطعة

لماذا؟

الحالي

السابق



في غرفة إيمان. يُحتمل أن هناك شخصاً يقف في الركن الأيمن أكثر حجماً بكثير من شخص يقف في الركن الأيسر. من خلال ثقب أمامي يُنظر منه، يُظهر الجدران الأمامي والخلفي متوازيين. بينما هما في الحقيقة مائلان. ويظهر السقف والأرضية أفقيتين. بينما هما في الحقيقة مائلان.


1 تحديد العلاقات بين مستقيمين أو مستويين.
2 تعيين أزواج الزوايا المتكونة من المستقيمتين المتوازيين والمنقاطعات.

1 استخدام العلاقات بين الزوايا والقطع المستقيمة لإثبات النظريات.

1 العلاقات بين المستقيمتين والمستويين في تصميم غرفة إيمان المذكورة أعلاه، يتم استخدام مستقيمتين متقاطعة ومتوازيين ومتعامدة. إضافة إلى مستويات متقاطعة ومتوازيين. لعمل خدمة بحرية.

المفاهيم الأساسية: التوازي والتخالف

يتم استخدام الأسهم لتبين أن المستقيمتين متوازيين.



المستقيمتين المتوازيين هي مستقيمتان متحدة المستوى غير متقاطعة.

مثال $\overline{JK} \parallel \overline{LM}$

المستقيمتين المتخالفتين هي مستقيمتان غير متقاطعة وليست متحدة المستوى.


مثال المستقيمتين m و n مستقيمتان متخالفتان.

المستويات المتوازيين هي مستويان غير متقاطعة. مثال المستويان A و B مستويان متوازيان.

$\overline{JK} \parallel \overline{LM}$ يُقرأ كما يلي: المستقيمة JK يوازي المستقيمة LM .

إذا كانت القطع المستقيمة أو الشعاعات متضمنة في المستقيمتين المتوازيين أو المتخالفتين، تكون القطع المستقيمة أو الشعاعات متوازيين أو متخالفتين.

مثال 1 من الحياة اليومية: تحديد العلاقات المتوازيين والمتخالفتين



حدد كل ما يلي باستخدام قطعة الجبن أدناه.


a. كل القطع المستقيمة المتوازيين مع $\overline{JP}$ $\overline{KQ}$ و $\overline{LR}$

b. قطعة مستقيمة متخالفين مع $\overline{KL}$ $\overline{PQ}$ أو $\overline{PR}$

c. مستوى متوازي مع المستوى PQR

المستوى JKL هو المستوى الوحيد المتوازي مع المستوى PQR .


جوانب جديدة
parallel lines
skew lines
parallel planes
transversal
interior angles
exterior angles
consecutive interior
alternate interior
interior
exterior
corresponding angles
بات في الرياضيات
مبدأ المسائل المتشابهة في حلها
ربما تم معالجة والتعليق على طريقة
الأمرين.



- تمرين موجّه
- حدد كلاً مما يلي باستخدام المكعب الموضح:
- 1A. كل القطع المستقيمة المتخالفة مع $\overline{BC}$ $\overline{AF}, \overline{DE}, \overline{FG}, \overline{HE}$
- 1B. قطعة مستقيمة متوازية مع $\overline{AB}, \overline{CD}, \overline{EH}$ أو $\overline{FG}$
- 1C. كل المستويات المتوازية مع المستوى ABG DCH

انتبه!

المستوي BCF هو مستوي متوازي مع AD في مكعب. هذا يعني أن BC متوازي مع AD في المستوى BCF .



2 العلاقات بين أزواج الزوايا المتقاطعة المستقيمة التي يقطع مستقيمان أو أكثر على مستوى واحد عند نقطتين مختلفتين يسمى **قاطعاً** في الرسم التخطيطي أدناه. المستقيم l يقطع قاطعاً للمستقيمين p و q . لاحظ أن المستقيم l يتكوّن ثنائي زوايا مع المستقيمين p و q . وهذه الزوايا وأزواج محددة منها يتم تسميتها بأسماء خاصة.

المفهوم الأساسي العلاقات بين أزواج الزوايا المتقاطعة	
أربع زوايا داخلية تقع في المنطقة بين المستقيمين p و q	$\angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6$
أربع زوايا خارجية تقع في السطحتين اللتين ليستا بين المستقيمين p و q	$\angle 1, \angle 2, \angle 7, \angle 8$
الزوايا الداخلية المتبادلة هي الزوايا التي تقع على نفس الضلع من القاطع l	$\angle 3, \angle 5, \angle 4, \angle 6$
الزوايا الداخلية المتبادلة هي الزوايا الداخلية غير المتجاورة التي تقع على الأضلاع المتبادلة للقاطع l	$\angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6$
الزوايا الخارجية المتبادلة هي الزوايا الخارجية غير المتجاورة التي تقع على الأضلاع المتبادلة للقاطع l	$\angle 1, \angle 2, \angle 7, \angle 8$
الزوايا المتناظرة تقع على نفس الضلع للقاطع l وعلى نفس الضلع للمستقيمين p و q	$\angle 1, \angle 5, \angle 2, \angle 6$ و $\angle 3, \angle 7, \angle 4, \angle 8$

قراءة في الرياضيات

الزوايا الداخلية لنفس الضلع الزوايا الداخلية المتبادلة لنفس الضلع أيضاً الزوايا الداخلية لنفس الضلع

العلاقات بين المستقيمتين والمستويات


المثال 1 يوضح طريقة تحديد العلاقات بين المستويات المتوازية. وعلى الطلاب أن يكونوا قادرين على تحديد المستوى في الرسم وكذا كل المستويات المتوازية له.

التقويم التكويني

استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين موجّه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمعاهيم.

مثال إضافي

1 حدد كلاً مما يلي باستخدام الصندوق أدناه.




- a. كل القطع المستقيمة المتوازية مع القطعة المستقيمة $\overline{BC}$ $\overline{AD}, \overline{EH}, \overline{FG}$
- b. قطعة مستقيمة متخالفة مع $\overline{EH}$ $\overline{AB}, \overline{CD}, \overline{BG}$ أو $\overline{CF}$
- c. مستوى متوازي مع المستوى ABG المستوى CDE

2 العلاقات بين أزواج الزوايا المتقاطعة

المثال 2 يوضح طريقة تحديد العلاقات بين الزوايا من خلال مجموعة من المستقيمتين المتوازيين التي يقطعها مستقيم قاطع. ويوضح المثال 3 طريقة تحديد مجموعات من المستقيمتين يقطع كلاً منها قاطعٌ معلوم.

مثال 2 تصنيف العلاقات بين أزواج الزوايا

ارجع إلى الشكل أدناه. صنّف العلاقة بين كل زوج من الزوايا باعتبارها زوايا داخلية متبادلة أو زوايا خارجية متبادلة أو زوايا متناظرة أو زوايا داخلية متتالية.



- a. $\angle 1, \angle 5$ خارجية متبادلة
- b. $\angle 2, \angle 6$ داخلية متبادلة
- c. $\angle 2, \angle 4$ متناظرة
- d. $\angle 2, \angle 6$ داخلية متبادلة

تمرين موجّه

- 2A. $\angle 3, \angle 7$ 2B. $\angle 5, \angle 7$ 2C. $\angle 4, \angle 8$ 2D. $\angle 2, \angle 3$

التدريس باستخدام التكنولوجيا


اللوحة التفاعلية البيضاء ارسم شكلاً ثلاثي الأبعاد على اللوحة (مثل منشور مستطيل أو هرم مربع). اختر بعض الطلاب للتوجه إلى اللوحة ومن ثم وضع علامات مميزة على الحواف المتوازية لبعضها البعض.

انتبه!

القطع المستقيمة عندما تريد أن تقرر ما إذا كانت القطع المستقيمة متقاطعة، لا تعدد المستقيمتين لتقرر إذا ما كانت ستتقاطع إذا استمرت لمسافة أكبر. فالقطع المستقيمة أطوالها ثابتة.

أشكال إضافية

2 ارجع إلى الشكل أدناه. وصّف العلاقة بين كل زوج من الزوايا على أنها إما داخلية متبادلة أو خارجية متبادلة أو متناظرة أو زوايا داخلية متتالية.




a. $\angle 2$ و $\angle 6$ متناظرتان.

b. $\angle 1$ و $\angle 7$ خارجيتان متبادلتان.

c. $\angle 3$ و $\angle 8$ داخليتان متتاليتان.

d. $\angle 3$ و $\angle 5$ داخليتان متبادلتان.

3 محطة الحافلات الشكل الموضح أمامك هو ممرات محطة حافلات. حدّد الفاصل الذي يربط بين كل زوج من الزوايا في هذا الشكل. ثم صنف العلاقة بين كل زوج من الزوايا.



a. $\angle 1$ و $\angle 2$ متناظرتان.


b. $\angle 2$ و $\angle 3$ داخليتان متبادلتان.

c. $\angle 4$ و $\angle 5$ داخليتان متتاليتان.

إرشاد للمعلمين الجدد


القواطع. ارسّم الشكل المبين أدناه. اذكر الطلاب أن أي واحد من هذه

المستقيمتين الثلاثة يمكن أن يكون قاطعاً لأن كل واحد منهم يقطع المستقيمتين الأخريين. وضح هذا المفهوم من خلال تحديد العلاقات المتنوعة بين الزوايا.



عندما يمكن أن يكون أكثر من مستقيم واحد قاطعاً. حدّد أولاً الفاصل لزوج معطى من الزوايا من خلال تحديد موقع المستقيم الواصل بين رؤوس الزوايا.

مثال 3 تحديد المتقاطعات وتصنيف أزواج الزوايا



حدد القاطع الواصل بين كل زوج من الزوايا في الصورة. ثم صنف العلاقة بين كل زوج من الزوايا.

a. $\angle 1$ و $\angle 3$

القاطع الواصل بين $\angle 1$ و $\angle 3$ هو المستقيم d. هذه زوايا خارجية متبادلة.

b. $\angle 2$ و $\angle 5$

القاطع الواصل بين $\angle 2$ و $\angle 5$ هو المستقيم k. هذه زوايا داخلية متتالية.

c. $\angle 2$ و $\angle 6$

القاطع الواصل بين $\angle 2$ و $\angle 6$ هو المستقيم f. هذه زوايا متناظرة.

تبرين موجه

3A. $\angle 3$ و $\angle 5$


3B. $\angle 2$ و $\angle 8$

3C. $\angle 5$ و $\angle 7$

3D. $\angle 2$ و $\angle 9$

نصيحة دراسية

مثال خارج عن التعريف في الشكل أدناه. المستقيم c ليس قاطعاً للمستقيمين d و e. حيث أن المستقيم c يقطع المستقيمين d و e في نقطة واحدة فقط.



3A. المستقيم i

خارجية متبادلة

3B. المستقيم e

داخلية متبادلة

3C. المستقيم k

متناظرة

3D. المستقيم e

داخلية متناظرة

التحقّق من فهمك

مثال 1 ارجع إلى الشكل في اليسار لتحديد كل

ما يلي.

4a. المستوى

ABCD

1. مستوى متوازي مع المستوى TUV ZWX

2. قطعة مستقيمة متخالفة مع TS التي تضم النقطتين W و WZ

3. كل القطع المستقيمة المتوازية مع SV و YX و TU و ZW

المستوى BCHG

المستوى DCHE

4. أشكال وتصميمات استخدم الرسم التخطيطي

لتسمية التخزين المؤقتة جزئياً الموضحة لتحديد كل ما يلي.

a. عيّّن ثلاثة أزواج من المستويات المتوازية.

b. عيّّن ثلاث قطع مستقيمة متوازية مع DE.

c. عيّّن قطعتين مستقيمتين متوازيتين مع FE.

d. عيّّن زوجين من القطع المستقيمة المتخالفة.

4b. $\overline{BG}$ و $\overline{CH}$

4c. الإجابة

النموذجية: $\overline{BC}$ و $\overline{AD}$

4d. الإجابة

النموذجية: $\overline{JK}$ و $\overline{BG}$ و $\overline{CH}$

مثال 2

صنف العلاقة بين كل زوج من الزوايا باعتبارها زوايا داخلية متبادلة أو زوايا خارجية متبادلة أو زوايا متناظرة أو زوايا داخلية متتالية.

متناظرة $\angle 2$ و $\angle 4$

داخلية متتالية $\angle 6$ و $\angle 7$

داخلية

متبادلة

$\angle 1$ و $\angle 8$

$\angle 2$ و $\angle 3$

$\angle 5$ و $\angle 6$

التدريس المتميّز

طريقة التواصل نظّم الطلاب للعمل في مجموعات صغيرة. وأعطهم أشكالاً تمثّل مستقيمتين وقواطع واحطلب منهم أن يلعبوا لعبة التخمين. إذ يفكر أحد الطلاب في زاوية ما ويعطي زملائه مفاتيح حل عن علاقة الزاوية بالزوايا الأخرى مستخدماً مفردات الدرس. ويستخدم الطلاب الآخرون مفاتيح الحل لتخمين الزاوية.

44a. $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ، المسافة بين القطعتين المستقيمتين واحد من أي مكان على القطعة المستقيمة.

38. متوازيان FG , $F'G'$


39. متخالفان، ج، هـ

40. PH , PC متقاطعان


متوازن بیان ۴۱. ۲۴۱, ۲۴۲

42. EF , EC متخالفان

43. $\sqrt{25}$, $\sqrt{49}$ **مطلقا طمان**



4. ما العلاقة بين $\overline{AB}$ و $\overline{CD}$ في المستطيل $ABCD$ ؟
 5. ما العلاقة بين $\overline{MN}$ و $\overline{AC}$ في المستطيل $ABCD$ ؟
 6. ما العلاقة بين $\overline{MN}$ و $\overline{CD}$ في المستطيل $ABCD$ ؟



السلام المتحركة للذات السلام المتحركة من درجات من حلقه دارة به تحريكها باستخدام مولود
بسط الدرجات عند أعلى وأسفل وهذه السبع توافر بسبع وسبع كذا جدول للسلام والخروج منه



٤. ما العلاقة بين سطح درجات الصاعدة متوازية

د. باءة الله بين سطح المرجحين عند قمة البحر المحذر **متحدة المستوى**

c. ما العلاقة بين سطح التدرجات في الجزء المحفور من السلم المتحرك و سطح التدرجات عند أسفل السلم المتحرك؟ **متخالفة**

45. مسألة غير محددة الإجابة المستوى P يحتوي على المستقيمين d و b المستقيم c يقطع المستوى P عند نقطة A المستقيمان d و c متوازيان والمستقيمان d و b متوازيان والمستقيمان b و c غير متوازيين. اشرح شكلًا مسبقًا إلى هذا الوصف. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

47. تحدد الفرض أن الخط A, S, C موجودة بالمنسوب P . وأن الخط D, E, F موجودة بالمنسوب Q بهذه المنسوبة الخطية D, F و E, F يتقاطع مع المنسوب P المنسوبة B هذه الخطتين A, E و B . انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

48. أحياناً: $\overline{AB}$ إما متخالف أو متوازٍ مع $\overline{CD}$ لأن المستقيمتين لن تقاطعا أبداً وغير متحدة المستوى.

٥. عدم رصنا الخطيئة مثل هذه الحالة

b. ما العلاقة بين المستويين P و Q متوازيان

c. ما العلاقة بين المستطيقين mn و $m'n'$ متخالفتان

التبرير: المستوى X والمستوى Y متوازيان، والمستوى Z يتقاطع مع المستويين X والمستقيم $\overline{AB}$ موجود في المستويين X والمستقيم $\overline{CD}$ موجود في المستويين Y والمستقيم $\overline{EF}$ موجود في المستوي Z ، حدد إذا كانت كل عبارة صحيحة أم خطأ أم أحياناً أم ليست صحيحة مطلقاً، اشرح.

49. أحيانا: $\overrightarrow{AB}$ يتقاطع


49. $\overline{AB}$ متساوی $\overline{EF}$

مع $\overline{EF}$ استاذًا إلى موقع تقاطع المستويات.

انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

تمرين على الاختبار المعياري


53. إجابة قصيرة: عيّن إحداثيات النقاط التي تمثل تقاطع الخط x و y في التمثيل البياني الموضح أدناه $(0, 4)$, $(-6, 0)$



54. SAT/ACT: قِيمَا يَلِي. الخيار الذي لا يساوي 485 هو، C


- A $(3 \times 100) + (4 \times 10) + 145$
 B $(3 \times 100) + (18 \times 10) + 5$
 C $(4 \times 100) + (8 \times 10) + 15$
 D $(4 \times 100) + (6 \times 10) + 25$
 E $(4 \times 100) + (5 \times 10) + 35$

51. أتي من أزواج الزوايا التالية تعذر زوايا خارجية متبادلة؟ B



- $\angle 10$ و $\angle 2$ C
 $\angle 9$ و $\angle 5$ D
 $\angle 5$ و $\angle 1$ A
 $\angle 6$ و $\angle 2$ B

52. ما قياس $\angle XYZ$ ؟ H



4 التقويم

بطاقة التحقق من استيعاب الطلاب أثناء مفادرة الطلاب لحجرة الصف. اطلب منهم أن يحددوا المستقيمتين المتقاطعتين في الصف. ويصنفوا أزواج الزوايا الناتجة عن تقاطع مستقيم قاطع مع مستقيمين آخرين.

إجابة إضافية

58. المعطيات: $\overline{ZX} \cong \overline{WY}$

A هي نقطة منتصف $\overline{WY}$

A هي نقطة منتصف $\overline{ZX}$

المطلوب إثباته: $\overline{WA} \cong \overline{ZA}$

البرهان:

العبارة (المبررات)

1. $\overline{WY} \cong \overline{ZX}$

A هي نقطة منتصف $\overline{WY}$

A هي نقطة منتصف $\overline{ZX}$ (معطيات)

2. $WY = ZX$ (تعريف القطع المستقيمة)

3. $WA = AY$, $ZA = AX$ (تعريف نقطة المنتصف)

4. $WY = WA + AY$, $ZX = ZA + AX$ (مسألة جمع القطع المستقيمة)

5. $WA + AY = ZA + AX$ (بالتعويض)

6. $WA + WA = ZA + ZA$ (بالتعويض)

7. $2WA = 2ZA$ (بالتعويض)


8. $WA = ZA$ (خاصية القسمة)

9. $\overline{WA} \cong \overline{ZA}$ (تعريف القطع المستقيمة)


مراجعة شاملة

أوجد قياس جميع الزوايا المرقمة.


55. $m\angle 9 = 2x - 4$,
 $m\angle 10 = 2x + 4$



56. $m\angle 11 = 4x$,
 $m\angle 12 = 2x - 6$




57. $m\angle 19 = 100 + 20x$, $m\angle 19 = 140$,
 $m\angle 20 = 20x$, $m\angle 20 = 40$




58. البرهان أثبت ما يلي.

المعطيات: $\overline{WY} \cong \overline{ZX}$
 A هي نقطة منتصف $\overline{WY}$
 A هي نقطة منتصف $\overline{ZX}$
 المطلوب: $\overline{WA} \cong \overline{ZA}$



مراجعة المهارات

أوجد x .



102



التدريس المتميز OL BL

التوسع: قدّم للطلاب رسماً مثل الرسم الموجود على اليسار. اطلب منهم تسمية كل زاوية وتحديد أزواج الزوايا الداخلية المتبادلة، والزوايا المتناظرة، وهكذا. أخبرهم. أثناء استعدادهم للبدء في دراسة موضوع حول البراهين. أنه من المهم أن يفهموا المفاهيم الأساسية المقدمة في هذا الدرس فهنا جيداً.



مختبر برامج الهندسة الزوايا والمستقيمات المتوازية

11-2

يتم استخدام لوح التمثيل البياني (Geometer Sketchpad®) لتحديد الزوايا
المكونة من مستقيمين متوازيين وقاطع.

1 التركيز

الهدف استخدام برنامج Geometer's Sketchpad لاستكشاف الزوايا المكونة من خلال مستقيمين متوازيين وقاطع.

المواد

• أجهزة كمبيوتر بها برنامج Geometer's Sketchpad

نصيحة للتدريس

وضح للطلاب طريقة سحب ونقل المستقيمات بحيث يتقاطع المستقيم القاطع مع المستقيمات المتوازية.

2 التدريس

العمل بشكل مستقل أو في مجموعات ثنائية

كلّف الطلاب بالعمل بمفردهم أو في مجموعات ثنائية متنوعة القدرات. ثم اطلب من الطلاب أن يكملوا النشاط والتمرينين 1 و 2. ناقش مع طلاب الصف كيف يفكرون بشأن تغير العلاقات بين الزوايا عند دوران القاطع. وناقش معهم أيضًا العلاقات المحتملة بين الزوايا الناتجة عن القاطع المتعامد على أحد المستقيمات. ثم كلّفهم بإنهاء التمارين لاختبار صحة فرضياتهم.

تمرين اطلب من الطلاب إكمال التمرينين 3 و 4.

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمارين 1-4 لتقويم مدى فهم الطلاب للعلاقات بين الزوايا الناتجة عن قطع مستقيم قاطع لمستقيمين متوازيين.

النشاط المستقيمات المتوازية مع وجود قاطع

1 ارسم مستقيماً.

ارسم نقطتين وسّهما F و G . ثم استخدم أداة رسم المستقيمات لرسم المستقيم FG .

2 ارسم مستقيماً متوازيًا.

ارسم نقطة خارج المستقيم FG وسّهما بالحرف J . حدد FG والنقطة J . ثم حدد الخيار Parallel Line (خط متوازي) من قائمة Construct (إنشاء). ارسم نقطة وسّهما K على هذا المستقيم المتوازي.

3 ارسم قاطعًا.

ارسم نقطة وسّهما A على المستقيم FG ونقطة B على المستقيم JK . حدد النقطتين A و B ثم حدد الخيار Line (مستقيم) من قائمة Construct (إنشاء). لرسم قاطع AB ثم ارسم نقطتين وسّهما C و D على القاطع AB كما هو موضح.

4 قس كل زاوية.

قس جميع الزوايا الثمانية المكونة من هذه المستقيمات. على سبيل المثال، حدد النقطتين F و A . ثم النقطة C . وحدد الخيار Angle (زاوية) من قائمة Measure (قياس). لإيجاد $m\angle FAC$.



حلّ النتائج 1-2. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

زاوية	القياس الأول	$\angle FAC$	$\angle CAG$	$\angle GAB$	$\angle FAB$	$\angle JBA$	$\angle ABK$	$\angle KBD$	$\angle JBD$
	114	66	114	66	66	114	66	114	66

- اسحب النقطة C أو النقطة D لتحريك القاطع AB بحيث يقطع المستقيمين المتوازيين عند زاوية مختلفة. أصف بالجدول صفاً جدولاً للقياسات الناتجة. ثم سأل في القياسات الجديدة. كرر تلك الخطوات حتى تكمل جدولك بصغوف بيانات قياس ثلاثة. واربعة. وخامسة.
- باستخدام الزوايا المدرجة في الجدول، حدد وصف العلاقة بين كل أزواج الزوايا ذات الأسماء الخاصة التالية. ثم اكتب تخميناً بصيغة "إذا كان - إذا" من كل زوج من الزوايا عندما يتكوّن من أي مستقيمين متوازيين تقاطع معهما قاطع.
- مشاطرة. b . داخلية متبادلة. c . خارجية متبادلة. d . داخلية متتالية.
- اسحب النقطة C أو النقطة D بحيث يكون قياس أي من الزوايا هو 90° . $a-b$. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.
- ماذا تلاحظ بالنسبة لقياسات الزوايا الأخرى؟
- عشّن فرضية بالنسبة لقاطع متعامد على أحد المستقيمين المتوازيين.

من العملي إلى النظري

قدّم لطلابك نموذجاً به مستقيمان يقطعهما قاطع إلى جانب قياسات الزوايا. اطلب من الطلاب توضيح ما إذا كان المستقيمان متوازيين.

11-2 الزوايا والمستقيمات المتوازية

لماذا؟

التحليل

السابق



يستخدم عمال الإنشاءات والبناء عادة سقالة لتصوم. يوفر هذا الهيكل الدعم والوصول إلى المناطق المرتفعة. الخاطف f الموضح يوفر دعماً هيكلياً لمسطحي العمل المتوازيين.

1 استخدام النظريات لتحديد العلاقات بين أزواج معينة من الزوايا

2 استخدام الجبر لإيجاد قياسات الزوايا.

• نعلمت كيفية تسمية أزواج الزوايا المتكونة من المستقيمتين المتوازيين مع القواطع.

1 التركيز

التخطيط الرأسي

قبل الدرس 11-2 تحديد العلاقات بين مستقيمتين أو مستويين. تسمية أزواج الزوايا الناتجة عن مستقيمتين متوازيين وقواطع.


الدرس 11-2 استخدام النظريات في تحديد العلاقات بين أزواج محددة من الزوايا. استخدام الجبر لإيجاد قياسات الزوايا.

بعد الدرس 11-2 استخدام مبادئ معادلات المستقيمتين لاستكشاف العلاقات الهندسية. بما في ذلك المستقيمتين المتوازيين والمستقيمتين المتعامدة.

1 المستقيمتين المتوازيين وأزواج الزوايا في الصورة. المستقيم f قاطع للمستقيمتين a و b . ولتد $\angle 1$ و $\angle 2$ زاويتين متناظرتين. بما أن المستقيمتين a و b متوازيان. فهناك علاقة خاصة بين أزواج الزوايا المتناظرة.

ممارسات في الرياضيات
فهم طبيعة المسائل والمتابعة
في حلها.
بناء فرضيات عملية والتعليق
على طريقة استنتاج الآخرين.


المسألة 11.1 مسألة الزوايا المتناظرة



إذا قطع قاطع مستقيمتين متوازيين، يكون كل زوج من الزوايا المتناظرة متطابقاً.

أمثلة $\angle 1 \cong \angle 3$ و $\angle 2 \cong \angle 4$ و $\angle 5 \cong \angle 7$ و $\angle 6 \cong \angle 8$

مثال 1 استخدام مسألة الزوايا المتناظرة



في الشكل، $m\angle 5 = 72$. أوجد قياس كل زاوية. اذكر أي مسألة (مسئمتان) استخدمتها.

- a. $\angle 4$
- $\angle 4 \cong \angle 5$ مسألة الزوايا المتناظرة
- $m\angle 4 = m\angle 5$ تحديد الزوايا المتطابقة
- $m\angle 4 = 72$ تعويض
- b. $\angle 2$
- $\angle 2 \cong \angle 4$ نظرية الزوايا المتناظرة بالرأس
- $\angle 4 \cong \angle 5$ مسألة الزوايا المتناظرة
- $\angle 2 \cong \angle 5$ خاصية التبعدي في النطاق
- $m\angle 2 = m\angle 5$ تحديد الزوايا المتطابقة
- $m\angle 2 = 72$ تعويض

تمرين موجه 1A-1C. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

في الشكل، افترض أن $m\angle 8 = 105$. أوجد قياس كل زاوية. اذكر أي مسألة (مسئمتان) أو نظرية (نظرية) استخدمتها.

- 1A. $\angle 1$ 1B. $\angle 2$ 1C. $\angle 3$

في المثال 1، إن $\angle 2$ و $\angle 5$ زاويتان خارجيتان متبادلتان متطابقتان. بقرن هذا المثال وغيره من أمثلة النظريات التالية عن أزواج الزوايا الأخرى المتكونة من مستقيمتين متوازيين بقطعهما قاطع.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

كلف الطلاب بقراءة القسم لماذا؟ الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

- ما الأشكال التي تكوّن السقالة؟ مثلثات ومستطيلات
- هل المنصات تكون متوازية أم متعامدة على بعضها البعض؟ متوازية
- كم عدد القواطع الموجودة في مستوى واحد من السقالة؟ 6

1 المستقيمتان المتوازيتان وأزواج الزوايا


المثالان 1 و 2 يوضحان طريقة تحديد قياس زاوية عند تقديم مستقيمتين متوازيتين بقطعهما قاطع وقياس زاوية واحدة

التقويم التكويني

استخدم النماذج الواردة في القسم "تمرين موجه" مع كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم

مثال إضافي

1 في الشكل الموضح، $m\angle 11 = 51$ أوجد قياس كل زاوية أذكر المسألة (أو النظرية) التي استخدمتها



a. $m\angle 15 = 51$ ، مسـألة الزوايا المتناظرة

b. $m\angle 16 = 51$ ، نظرية الزوايا المتعاقبة بالرأس، ومسـألة الزوايا المتناظرة

التدريس باستخدام التكنولوجيا

نظام إجابة الطلاب اعرض أمام الطلاب رسماً تخطيطياً لمستقيمتين متوازيتين وقاطع لهما رَقَم الزوايا من 1 إلى 8. اختر إحدى الزوايا واطلب من الطلاب تحديد رقم إحدى الزوايا الداخلية المتبادلة. كثر هذا النشاط واطلب من الطلاب تحديد الزوايا الخارجية المتبادلة، والزوايا المتعاقبة بالرأس، والزوايا المتكاملة

نظريات المستقيمتان المتوازيتان وأزواج الزوايا




11.1 نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة إذا قطع قاطع

مستقيمتين متوازيتين، فإنَّ يكون

كل زوج من الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقاً

أمثلة $\angle 1 \cong \angle 4$ و $\angle 2 \cong \angle 3$



11.2 نظرية الزوايا الخارجية المتبادلة إذا قطع قاطع

مستقيمتين متوازيتين، فإنَّ يكون كل زوج

من الزوايا الخارجية المتبادلة متكافئاً

أمثلة $\angle 1$ و $\angle 2$ متكافئان

$\angle 3$ و $\angle 4$ متكافئان



11.3 نظرية الزوايا الخارجية المتبادلة إذا قطع قاطع

مستقيمتين متوازيتين فإنَّ يكون


كل زوج من الزوايا الخارجية المتبادلة متطابقاً

أمثلة $\angle 1 \cong \angle 5$ و $\angle 6 \cong \angle 7$ و $\angle 8 \cong \angle 2$

سوف يقوم باسناد التمرينين 11.2 و 11.3 من جدول التمرينين 30 و 35 على الترتيب

نظراً لأنه يتم قبول بعض المسائل دون إثبات، يمكنك استخدام مسألة الزوايا المتناظرة لإثبات كل من النظريات أعلاه.

إثبات نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة



المعطيات: $a \parallel b$

يُتطلب قاطعاً لكل من a و b .

المطلوب: $\angle 3 \cong \angle 5$ و $\angle 4 \cong \angle 6$

فترة الإثبات: علم أن $a \parallel b$ قطعها القاطع f

وحسب مسألة الزوايا المتناظرة، تكون الزوايا المتناظرة

متطابقة. لذلك $\angle 2 \cong \angle 4$ و $\angle 6 \cong \angle 8$ كذلك $\angle 5 \cong \angle 3$

و $\angle 4 \cong \angle 6$ لأن الزوايا المتعاقبة بالرأس متطابقة وبالتالي.

$\angle 4 \cong \angle 5$ و $\angle 3 \cong \angle 6$ حيث إن نطاق الزوايا متطابق.

مثال 2 من الحياة اليومية استخدام النظريات مع المستقيمتان المتوازيتان



التخطيط المجتمعي يمر ريدنغ وطريق جدول كريك المائي

هما شارعان متوازيان يتقاطعان مع طريق المنتزه

على طول الجانب الغربي لمنتزه وندل

إذا كان $m\angle 1 = 118$ فأوجد $m\angle 2$.

مسألة الزوايا الداخلية المتبادلة

محدد الزوايا المتطابقة

التدوين

$\angle 2 \cong \angle 1$

$m\angle 2 = m\angle 1$

$m\angle 2 = 118$

2A. 80° : نظرية المتكاملات، الزوايا الخارجية المتبادلة

تمرين موجه 2B. 70° : الزوايا الخارجية المتبادلة

التخطيط المجتمعي ارجع إلى الرسم التخطيطي أعلاه لإيجاد قياس كل زاوية.

أذكر أي مسألة (مسائل) أو نظرية (نظريات) استخدمتها.

2A. إذا كان $m\angle 1 = 100$ فأوجد $m\angle 4$.

2B. إذا كان $m\angle 3 = 70$ فأوجد $m\angle 4$.

نصيحة دراسية
العلاقات بين الزوايا تُعدّ من أهمّ المفاهيم في الهندسة. تأكد من فهمك لهذه العلاقات جيداً، حيث أنها تُستخدم في العديد من المسائل الهندسية. تأكد من فهمك للعلاقات بين الزوايا المتناظرة والزوايا المتعاقبة بالرأس والزوايا المتكاملة.


الربط بالحياة اليومية
نحتاج بعض المدن إلى أن تخطط لشوارعها في تخطيط الجديده بزاوية 60° على كل من

التدريس المتمايز

المعلمون بالطريقة الحسية الحركية استخدم شريطاً لاصقاً لإنشاء مستقيمتين متوازيين وقاطع لهما على الأرض. واطلب من كل اثنين من الطلاب أن يثقا في الزوايتين المتطابقتين أو المتكاملتين. واطلب منهما توضيح ما إذا كانت الزاويتان متبادلتين داخليتين، أم متبادلتين خارجيتين، أم متناظرتين، أم متناظرتين داخليتين.

2 الجبر وقياسات الزوايا يمكن استخدام علاقات خاصة بين الزوايا التي تكونت من مستقيمين متوازيين وقاطع لإيجاد قيم غير معروفة.

مثال 3 إيجاد قيم المتغيرات



a. إذا كان $m\angle 1 = 85$ و $m\angle 4 = 2x - 17$ فأوجد x .

$\angle 3 \cong \angle 1$ نظرية الزوايا المتطابقة بالرأس
 $m\angle 3 = m\angle 1$ تحديد الزوايا المتطابقة
 $m\angle 3 = 85$ تعويض


نظرًا لأن المستقيمين r و s متوازيين، تكون الزاويتان $\angle 3$ و $\angle 4$ متكاملتين حسب نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة.

$m\angle 3 + m\angle 4 = 180$ تحديد الزوايا المتكاملة
 $85 + 2x - 17 = 180$ تعويض
 $2x + 68 = 180$ بسط
 $2x = 112$ اطرح 68 من كل طرف
 $x = 56$ اقسم كل طرف على 2

b. أوجد y إذا كان $m\angle 7 = 7y + 6$ و $m\angle 3 = 4y + 30$.

$\angle 3 \cong \angle 7$ نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة
 $m\angle 3 = m\angle 7$ تحديد الزوايا المتطابقة
 $4y + 30 = 7y + 6$ تعويض
 $30 = 3y + 6$ اطرح 4y من كل طرف
 $24 = 3y$ اطرح 6 من كل طرف
 $8 = y$ اقسم كل طرف على 3


تمرين موجه 3A-3B. انظر الهامش.



3A. إذا كان $m\angle 7 = 5x - 13$ و $m\angle 2 = 4x + 7$ فأوجد x .
 3B. أوجد y إذا كان $m\angle 3 = 3y - 2$ و $m\angle 5 = 68$.

توجد علاقة خاصة عندما يكون قاطع مستقيمين متوازيين عبارة عن مستقيم متعامد.

النظرية 11.4 نظرية القاطع المتعامد



في أي مستوى، إذا وجد مستقيم متعامدًا على أحد مستقيمين متوازيين، فإن هذا المستقيم يكون متعامدًا على المستقيم المتوازي الثاني.
 أمثلة: إذا كان المستقيم a || المستقيم b والمستقيم a $\perp$ المستقيم t ، إذا كان المستقيم b $\perp$ المستقيم t .

سوف نشأت النظرية 11.4 في التمرين 37.

652 | الدرس 11-2 | الزوايا والمستقيمتان المتوازيتان


إجابات إضافية (تمرين موجه)

3B. بما أن المستقيمين k و l متوازيين، فإن الزاويتين $\angle 5$ و $\angle 3$ متكاملتان حسب نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة.
 تعريف الزوايا المتكاملة
 $m\angle 5 + m\angle 3 = 180$
 $68 + 3y - 2 = 180$ بالتعويض
 $3y + 66 = 180$ بالتحويل لأبسط صورة
 $3y = 114$ بطرح 66 من الطرفين
 $y = 38$ بقسمة كل طرف على 3

3A. بما أن المستقيمين k و l متوازيين، فإن الزاويتين $\angle 7$ و $\angle 2$ متطابقتان حسب نظرية الزوايا الخارجية المتبادلة.
 تعريف التطابق
 $m\angle 2 = m\angle 7$
 $4x + 7 = 5x - 13$ بالتعويض
 $4x + 20 = 5x$ بإضافة 13 إلى الطرفين
 $20 = x$ بطرح 4x من الطرفين

مثال إضافي

2 بلاط الأرضية يمثل الرسم التخطيطي التالي بلاط الأرضية في منزل هالة. وإذا علمت أن $m\angle 2 = 125$ ، فأوجد $m\angle 3$.




2 الجبر وقياسات الزوايا

المثال 3 يستخدم تعبيرًا جبريًا ليمثل قياس الزاوية. فعلى الطلاب أن يكون لديهم القدرة على إيجاد حل المتغير جبريًا، ثم تعويض الحل بالمتغير في التعبير الجبري لإيجاد قياس الزاوية بعد ذلك.

مثال إضافي

3 الجبر استخدم الشكل الموضح أدناه لإيجاد المتغير المشار إليه. اشرح استنتاجك.



a. إذا علمت أن $m\angle 5 = 2x - 10$ و $m\angle 7 = x + 15$ فأوجد x .
 25، مسئلة الزوايا المتناظرة
 b. أوجد y إذا علمت أن $m\angle 6 = 4(y - 25)$ و $m\angle 8 = 4y$.
 35، نظرية الزوايا المتبادلة الخارجية.
 ونظرية الزوايا المتكاملة.

انتبه!

قياسات الزوايا انظر بنمعة إلى المعلومات المتاحة أمامك لتحديد ما إذا كانت الزوايا متطابقة أم متكاملة.

652 | الدرس 11-2 | الزوايا والمستقيمتان المتوازيتان

3 التمرين

التقويم التكويني


استخدم التمارين 1-10 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

إجابات إضافية

1. $m\angle 4 = 85$ الزوايا المتناظرة متطابقة.
2. $m\angle 6 = 85$ الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة.
3. $m\angle 7 = 95$ الزاويتان 2 و 7 زاويتان متكاملتان.
4. $m\angle 4 = 110$ الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة.
5. $m\angle 3 = 70$ الزاويتان الداخليتان الواقعتان على نفس جهة القاطع متكاملتان.
6. $m\angle 1 = 70$ الزوايا المتقابلة بالرأس متطابقة.
7. $x = 115$ زاويتان متكاملتان؛ $y = 115$ الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة.
8. $x = 108$ الزوايا الخارجية المتبادلة متطابقة.
9. $x = 55$ الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة.
10. $m\angle 4 = 23$ الزوايا المتناظرة متطابقة.
11. $m\angle 3 = 23$ الزوايا المتقابلة بالرأس متطابقة.
12. $m\angle 12 = 157$ زاويتان متكاملتان.
13. $m\angle 8 = 23$ الزوايا المتقابلة بالرأس متطابقة.
14. $m\angle 6 = 17$ الزوايا المتناظرة متطابقة.
15. $m\angle 2 = 140$ الزوايا 1 و 2 و 3 تكون زاوية مستقيمة.
16. $m\angle 10 = 163$ زاويتان متكاملتان.
17. $m\angle 5 = 140$ الزوايا المتقابلة بالرأس متطابقة.
18. $m\angle 1 = 17$ الزوايا المتقابلة بالرأس متطابقة.
22. الزاويتان 1 و 4 متكاملتان لأن الزاوية التي تتكامل مع إحدى زاويتين متطابقتين تتكامل مع الزاوية المتطابقة الأخرى.

التحقق من فهمك



في الشكل، $m\angle 2 = 85$. أوجد قياس كل زاوية. اذكر أي مسلمة (مسلمات) أو نظرية (نظريات) استخدمتها. 1-3. انظر الهامش.

1. $\angle 4$
2. $\angle 6$
3. $\angle 7$





في الشكل، $m\angle 6 = 110$. أوجد قياس كل زاوية. 4-6. انظر الهامش. اذكر أي مسلمة (مسلمات) أو نظرية (نظريات) استخدمتها.

4. $\angle 4$
5. $\angle 3$
6. $\angle 1$



أوجد قيمة المتغير (المتغيرات) في كل شكل. اشرح استنتاجك. 7-9. انظر الهامش.



التمرين وحل المسائل



في الشكل، $m\angle 11 = 23$ و $m\angle 14 = 17$. أوجد قياس 10-18. انظر الهامش. كل زاوية. اذكر أي مسلمة (مسلمات) أو نظرية (نظريات) استخدمتها.

10. $\angle 4$
11. $\angle 3$
12. $\angle 12$
13. $\angle 8$
14. $\angle 6$
15. $\angle 2$
16. $\angle 10$
17. $\angle 5$
18. $\angle 1$

جهاز استقبال إشارات القمر الصناعي تجتمع الأطباق اللاقطة لإشارات التليدزيون الإشارة من طريق توجيه الإشعاع القادم من القمر الصناعي إلى جهاز استقبال موضوع في بؤرة الطبق اللاقطة للإشارة. افترض أن أشعة الإشعاع القادم من القمر الصناعي متوازية. حدد العلاقة بين كل زوج من الزوايا وشرح استنتاجك.



19. الزاويتان 1 و 2 متطابقتان لأن الزوايا المتناظرة تكون متطابقة.
20. الزاويتان 1 و 3 متطابقتان لأن الزوايا المتناظرة تكون متطابقة.
12. الزاويتان 2 و 4 متكاملتان لأنهما تكونان زوجاً خطياً.
22. انظر الهامش.

19. $\angle 1$ و $\angle 2$
20. $\angle 1$ و $\angle 3$
21. $\angle 2$ و $\angle 4$
22. $\angle 1$ و $\angle 4$

653

خيارات الواجب المنزلي المتميزة

المستوى	الواجب	خيار اليومين
AL مبتدئ	11-26, 42-44, 46-58	42-44, زوجي 12-26, 46, 51-58
OL أساسي	30-44, 46, 58, فردي 11-29	27-44, 46, 51-58
BL متقدم	(اختياري) 27-55, 56-58	

إجابات إضافية








23-28. انظر ملحق إجابات الوحدة 11 للاطلاع على التوضيحات.

23. $x = 51, y = 117$
 24. $x = 39, y = 41$
 25. $x = 42$
 26. $x = 43, y = 18$
 27. $x = 60, y = 14$
 28. $x = 70, y = 33$

30. الزاويتان 2 و 7 متطابقتان. الزاوية الداخلية المتبادلة تكون متطابقة.
 31. الزاويتان 3 و 7 متطابقتان. الزاوية المتناظرة تكون متطابقة.
 32. الزاويتان 4 و 5 متطابقتان. الزاوية المتناظرة بالرأس تكون متطابقة.
 33. الزاويتان 5 و 6 متتامتان. الزاويتان اللتان تكونان زاوية قائمة تكونان متتامتين.

أوجد قيمة المتغير (المتغيرات) في كل شكل. اشرح استنتاجك.

23-28. انظر الهامش.



29. البرهان اسخ وأكمل إثبات النظرية 11.2.
 المعطيات: $m \parallel n$ و ℓ يمشل قاطعاً.
 المطلوب: الزاويتان $\angle 1$ و $\angle 2$ متكاملتان. والزاويتان $\angle 3$ و $\angle 4$ متكاملتان.
 البرهان: $m \parallel n$ و ℓ يمشل قاطعاً.

المعطيات	البرهان
a. معطيات تحديد الزوج الخطي	a. ?
b. إذا شكلت زاويتان زوجاً خطياً، إذاً تكونان متكاملتين.	b. $\angle 1$ و $\angle 3$ تكونان زوجاً خطياً
c. نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة	c. $\angle 2$ و $\angle 4$ تكونان زوجاً خطياً
d. كدبة النقطتين	d. $\angle 1 \cong \angle 4, \angle 2 \cong \angle 3$
e. التعميم	e. $m\angle 1 = m\angle 4, m\angle 2 = m\angle 3$
f. ?	f. ?

1. $\angle 1$ و $\angle 2$ متكاملتان $\angle 3$ و $\angle 4$ متكاملتان


التخزين عند الحاجة إلى الوصول للرفوف الصناعية من أي جانب. يتم توفير دعم إضافي على الجانب بأجزاء متقاطعة. حدد العلاقة بين كل زوج من الزوايا و اشرح استنتاجك.

30. $\angle 2$ و $\angle 7$
 31. $\angle 3$ و $\angle 7$
 32. $\angle 4$ و $\angle 5$
 33. $\angle 5$ و $\angle 6$

34. الإثبات اكتب إثباتاً من عمودين لنظرية الزوايا الخارجية المتبادلة. (النظرية 11.3)
 انظر ملحق إجابات الوحدة 11

35. الجسور راجع الرسم التخطيطي الموضح على اليسار ليهكل جسر الدعامتان الأفقيتان للجسر متوازيان. B-C. انظر ملحق إجابات الوحدة 11

- a. اكتب تخميناً عن الزوايا زوجية الترفيم. اشرح استنتاجك.
 b. اكتب تخميناً عن الزوايا فردية الترفيم. اشرح استنتاجك.
 c. اكتب تخميناً عن أي زوج من الزوايا تكون إحدى زاويتي فردية الترفيم والأخرى زوجية الترفيم. اشرح استنتاجك.




٤ التقويم

حصاد الأمس من خلال العمل في مجموعات صغيرة. اطلب من الطلاب تناوب الأدوار في وصف كيف ساعدتهم درس المستقيبات المتوازية والفواصل في التعرف على العلاقات بين الزوايا. بحيث يقدم كل طالب هذا الوصف لمجموعته.

تبرين على الاختبار المعياري


47. إجابة مختصرة إذا كان $m \parallel n$ إذا أي العبارات التالية لا بد من أن تكون صحيحة؟ I و II



- I. $\angle 3$ و $\angle 6$ زاويتان داخليتان متبادلتان.
II. $\angle 4$ و $\angle 6$ زاويتان داخليتان متناظرتان.
III. $\angle 1$ و $\angle 7$ زاويتان خارجيتان متبادلتان.

48. الجبر إذا كان $x = -2 + -6$ ، إذا $x = 17 - 2$
A -13 D 13
B -4 E 21
C 9

45. افترض أن $\angle 4$ و $\angle 5$ تكونان زوجاً حتمياً. إذا كان $m\angle 1 = 2x$ و $m\angle 2 = 3x - 20$ و $m\angle 3 = x - 4$ فما هو $m\angle 3$ ؟
C



- A 26° C 30°
B 28° D 32°

46. SAT/ACT برسي مزارع دجاجنا وأمسنا. فإذا كان إجمالي رؤوس الطيور والحيوانات لديه 120 رأساً في إجمالي 300 متر. فكم يكون عدد الدجاج لدى المزارع؟
J

- F 60 H 80
G 70 J 90

مراجعة شاملة


49. الطياران تم تعيين مستوى ارتفاع الطائرات اعتماداً على اتجاه طيرانها. فإذا كانت طائرة تطير تجاه الشمال الغربي عند ارتفاع 10,500 متر وتطير طائرة أخرى تجاه الشرق عند ارتفاع 7,500 متر. فصف نوع المستقيبات المتكونة بمسارات الطيارتين. اشرح استنتاجك.
مستقيبات متخالفة: تطير الطيارتان في اتجاهين مختلفين وعلى ارتفاعين مختلفين.

استخدم العبارة المغطاة لإيجاد قياس كل زاوية مرقمة.

52. $m\angle 4 = 32$
 $m\angle 3 = 90$ ، و $m\angle 5 = 58$




51. $\angle 6$ و $\angle 8$ زاويتان متناظرتان
 $m\angle 8 = 47$



$m\angle 6 = 43$ و $m\angle 7 = 90$

50. $\angle 1$ و $\angle 2$ تكونان زوجاً حتمياً
 $m\angle 2 = 67$ ، و



$m\angle 1 = 113$

مراجعة المهارات

حوّل كل تعبير لأبسط صورة.

53. $\frac{8-5}{4-2} \cdot \frac{1}{2}$

54. $\frac{-5-2}{4-7} \cdot \frac{7}{3}$

55. $\frac{-11-4}{12-(-9)} \cdot \frac{5}{7}$

58. $\frac{8-17}{12-(-3)} \cdot \frac{3}{5}$



مختبر تقنية التمثيل البياني استكشاف الميل

11-3

1 التركيز

الهدف استخدام حاسبة التمثيل البياني لاستكشاف الميل.

المواد

- حاسبات تمثيل بياني مع جهاز تجميع بيانات

2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

نظم الطلاب في مجموعات متنوعة القدرات. اطلب منهم إكمال النشاط.

بعد إكمال الطلاب للنشاط، ناقش معهم التجربة التي كان بها الميل أكثر انحدارًا والأسباب المحتملة لذلك. واسألهم عن كيف أن الاختلاف في معدل التغير يرتبط بالتغيرات في الميول. اشرح لهم أن حساب التفاضل والتكامل قائم على دراسة التغيرات الحادثة في معدل التغير.

تمرين اطلب من الطلاب إكمال التمارين من 1 إلى 5.

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمارين من 1 إلى 5 لتقويم ما إذا كان الطلاب يفهمون العلاقات بين الميل ومعدل التغير.

من العملي إلى النظري

أعط الطلاب ورقة تمثيل بياني إحدائي ليرسموا عليها مستقيمين. أحدهما له ميل سالب والآخر له ميل موجب. اطلب منهم تبادل الأوراق مع زملائهم وإيجاد الميل ومعادلة المستقيمتين.

يطلق على معدل التغير في مستوى انحدار مستقيم مصطلح "الميل". يمكن استخدام الميل لاستكشاف العلاقة بين كميات بالحياة الواقعية.

إعداد التجربة

- صل جهاز تجميع بيانات بحاسبة التمثيل البياني. مع الجهاز على مكتب أو منضدة بحيث يمكن قراءة حركة شخص سائر.
- ضع علامات على الأرض على مسافتين بعدد متر واحد و 6 أمتار عن الجهاز.

النشاط

الخطوة 1: اجعل أحد أعضاء المجموعة يقف على العلامة التي على بعد متر وعندما يقوم عضو آخر من المجموعة بالضغط على الزر لبدء تجميع البيانات، ينبغي أن يتحرك السائر بعيدًا عن الجهاز بخطى ثابتة ببطء.

الخطوة 2: توقف عن تجميع البيانات عندما يتخطى السائر العلامة التي على بعد 6 أمتار. احفظ هذه البيانات باسم التجربة 1.

الخطوة 3: كرر التجربة، مع السير بخطى أسرع. احفظ هذه البيانات باسم التجربة 2.

الخطوة 4: لإجراء التجربة 3 كرر التجربة ولكن بالسير البطيء تجاه جهاز تجميع البيانات.

الخطوة 5: كرر التجربة، مع السير بسرعة تجاه الجهاز. احفظ هذه البيانات باسم التجربة 4.

حلل النتائج 1-5. انظر الهامش.

- قارن وبين الفرق بين التمثيل البياني للتجربتين 1 و 2 ما مدى تشابه التمثيل البياني للتجربتين 1 و 13؟
- استخدم خاصية التتبع بالحاسبة لإيجاد إحداثيات نقطتين على كل تمثيل بياني. سجل الإحداثيات في جدول مثل الجدول الموضح. ثم استخدم النقاط لإيجاد ميل المستقيم.
- قارن وبين الفرق بين الميل للتجربتين 1 و 2. ما مدى تشابه الميل للتجربتين 1 و 2 مع الميل للتجربتين 3 و 4؟
- يوضح ميل المستقيم معدل التغير في الكميات التي تمثلها قيمتا x و y الذي لم تتغيره بواسطة معدل التغير في هذه التجربة؟
- التخمين كيف سيبدو التمثيل البياني إذا قمت بتجميع بيانات أثناء وقوف الشخص السائر دون حركة؟ استخدم جهاز تجميع البيانات للتحقق من تخمينك.

التجربة	النقطة A (x_1, y_1)	النقطة B (x_2, y_2)	الميل $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
1			
2			
3			
4			

إجابات إضافية

- الإجابة النموذجية: التمثيل البياني للتجربة 1 ليس منحدرًا كالتمثيل البياني للتجربة 2 والتمثيل البياني للتجربة 3 ليس منحدرًا كالتمثيل البياني للتجربة 4. ولكن التمثيل البياني للتجربة 1 يميل إلى أعلى من اليسار إلى اليمين والتمثيل البياني للتجربة 3 يميل إلى أسفل من اليسار إلى اليمين.
- راجع عمل الطلاب.
- الإجابة النموذجية: الميل في التجربة 2 أكبر من الميل في التجربة 1. والميلان في التجربة 1 و 2 موجبان والميلان في التجربة 3 و 4 سالبان.
- يمثل الميل معدل التغير في موقع الشخص الماشي بالنسبة لجهاز تجميع البيانات. والذي هو سرعة الشخص الماشي.
- ميل التمثيل البياني سيساوي 0. إذا سيكون التمثيل البياني عبارة عن مستقيم أفقي.

3-11 ميول الخطوط المستقيمة

السابق: الحالي: لماذا؟

استخدمت خواص الخطوط المستقيمة المتوازية لتحديد الزوايا المتطابقة.

1 إيجاد ميول الخطوط المستقيمة.

2 استخدام الميل لتحديد الخطوط المستقيمة المتوازية والمتعامدة.

تُعدّ منتجات التزلج تقديرات لمسارات التزلج الخاصة بها وفقًا لمدى صعوبتها. ومن العوامل الأساسية في تحديد هذا التقييم انحدار المسار أو درجة ميله. ينخفض المسار الذي له درجة ميل بقيمة 6% أو $\frac{6}{100}$ بمقدار 6 أمتار رأسياً لكل 100 متر يتم قطعها رأسياً خلال التزلج.

والمسارات الأسهل، المميزة بعلامة ● لها ميول تتراوح ما بين 6% و 25%. بينما المسارات الأصعب، المميزة بعلامة ♦ أو ♦♦، فلها ميول بمقدار 40% أو أكثر.

1 ميل المستقيم يتم توضيح انحدار أو ميل خطية بنسبة ارتفاع الهضبة الرأسية إلى امتدادها الأفقي. وفي الجبر، تعلمت أن ميل المستقيم في المستوى الإحداثي يمكن حسابه باستخدام أي نقطتين على المستقيم.

المفهوم الأساسي ميل المستقيم

في المستوى الإحداثي، ميل المستقيم هو نسبة التغير بطول المحور y إلى التغير بطول المحور x بين أي نقطتين على المستقيم.

الميل m للمستقيم الذي يحتوي على نقطتين (x_1, y_1) و (x_2, y_2) محدد من خلال الصيغة:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

حيث $x_1 \neq x_2$.

الارتفاع
الامتداد الأفقي

مثال 1 إيجاد ميل المستقيم

أوجد ميل كل مستقيم.

عوض $(-1, -2)$ عن (x_1, y_1) و $(3, 3)$ عن (x_2, y_2) .

قانون الميل

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - (-2)}{3 - (-1)} = \frac{5}{4}$$

تمويض

نفس

المفردات الجديدة

slope ميل
rate of change معدل التغير

ممارسات في الرياضيات

استخدام نماذج الرياضيات.

محاولة إيجاد البنية واستخدامها.

البحث عن التوافق في الاستنتاجات المتكررة والتعبير عن ذلك.

1 التركيز

التخطيط الرأسي

قبل الدرس 11-3 استخدام خواص المستقيمات المتوازية لتحديد الزوايا المتطابقة.

الدرس 11-3 إيجاد ميول المستقيمات. استخدام الميل لتحديد المستقيمات المتوازية والمتعامدة.

بعد الدرس 11-3 وضع صياغة للتخمينات المتعلقة بخواص المضلعات وسماتها وأجزائها المكونة واختيارها.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

كَلِّف الطلاب بقراءة القسم **لماذا؟** الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

■ ما مستوى صعوبة ميل بدرجة 13%؟ هو الأسهل

■ إذا كان هناك مسار له ميل بدرجة 20%. فكم مترًا ينخفض هذا المسار لكل 100 متر يقطعها؟ 20 مترًا

■ هل يمكن لميل مسار التزلج أن يكون بدرجة 90%؟ الإجابة النموذجية: لا، فهذا سيكون شديد الانحدار.

1 ميل المستقيم


المثال 1 يوضح طريقة استخدام النسبة بين الارتفاع الرأسي والامتداد الأفقي لإيجاد ميل المستقيم. فالجزءان c و d يمثلان مستقيمتين ميلها يساوي صغراً ومستقيمتين لها ميل غير مُحدد.

التقويم التكويني


استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين موجّه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.

مثال إضافي


1 أوجد ميل كل مستقيم.




-4 أو $-\frac{8}{2}$



$-\frac{7}{0}$ أو غير محدد



$\frac{7}{8}$



0 أو $\frac{0}{8}$


مؤس $(-2, 3)$ عن (x_1, y_1) و
مؤس $(1, -3)$ عن (x_2, y_2)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-3 - 3}{1 - (-2)} = \frac{-6}{3} = -2$$

قانون الميل

تبويض

حول لأبسط صورة




مؤس $(-4, -3)$ عن (x_1, y_1) و
مؤس $(3, -3)$ عن (x_2, y_2)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-3 - (-3)}{3 - (-4)} = \frac{0}{7} = 0$$

قانون الميل

تبويض

حول لأبسط صورة



مؤس $(2, 1)$ عن (x_1, y_1) و
مؤس $(2, -4)$ عن (x_2, y_2)


$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-4 - 1}{2 - 2} = \frac{-5}{0}$$

قانون الميل

تبويض

حول لأبسط صورة

هذا الميل غير محدد.



تمرين موجّه 1A. $\frac{1}{3}$ 1B. $-\frac{1}{14}$

1A. الخط المستقيم الذي يحتوي على $(6, -2)$ و $(-3, -5)$.
1B. الخط المستقيم الذي يحتوي على $(8, -3)$ و $(-6, -2)$.
1C. الخط المستقيم الذي يحتوي على $(4, 2)$ و $(4, -3)$.
1D. الخط المستقيم الذي يحتوي على $(4, 3)$ و $(-3, 3)$.
غير محدد

قصة دراسية

على $-\frac{5}{0}$ محدد لأنه عدد ينقسم صفره في 0. وعلى النتيجة $-\frac{5}{0}$ وبما أن جميع مع أي عدد، فإن جميع د المسومة على 0 سيكون ل غير محدد، وكذلك، جميع وط المستقيمة الرأسية لها غير محدد.

يوضح المثال 1 مختلف الأنواع الأربعة للميل.

ملخص المفهوم تصنيف الميل

الميل غير المحدد	الميل الصفري	الميل السالب	الميل الموجب

يمكن تفسير الميل على أنه معدل التغير. إذ أنه يصف كيفية تغير كمية y تبعاً لكمية x . ويمكن استخدام ميل المستقيم لتحديد إحداثيات أي نقطة على المستقيم.

659

التركيز على محتوى الرياضيات

صفة الميل طالما يتم وضع الإحداثيات المأخوذة من زوج مرتّب واحد في صيغة الميل بنفس الترتيب، فإن قيمة الميل لن تتغير. في المثال 1b، اطلب من الطلاب أن يتنبّوا أن ميل المستقيم $\overleftrightarrow{LM}$ لن يتغير إذا استخدموا الأزواج المرتبة في ترتيب معكوس.

$$m = \frac{3 - (-3)}{-2 - 1} = \frac{6}{-3} = -2 \quad \overleftrightarrow{LM} \text{ ميل المستقيم}$$

مثال إضافي

2 الترفيه في عام 2000.

وصلت المبيعات السنوية لأحد منتجي معدات التجهيز إلى 48.9 مليون AED وفي عام 2005. وصل إجمالي المبيعات إلى 85.9 مليون AED. فإذا زادت المبيعات بنفس المعدل، فما إجمالي المبيعات في 2015؟ حوالي 159.9 مليون AED



مهمة من الحياة اليومية

المسجد الحوي يتخطى المسجد الحوي من التناثر وساعد الركاب في الجلوس في معادهم وحل أمتعتهم وتوضيح كيفية استخدام معدات الطوارئ وأجهزتها بلمح الحاصل على شهادة التلمذة التتويج. ولدى شركات الطيران دائما ما تحصل المرشدين الذين يتقدمون لامتياز أو أكثر من يحملون شهادات حاصفة

إرشاد للمعلمين الجدد

الاستنتاج المنطقي كلف الطلاب برسم مستقيم على ورقة تمثيل بياني (عبر نقطتين) له ميل موجب. وميل سالب. وميل يساوي صفراً. وميل غير محدد. ثم اطلب منهم إيجاد ميل كل مستقيم. ثم اطلب منهم بعد ذلك أن يشرحوا طريقة التحديد البصري لميل مستقيم. وما إذا كان موجباً أم سالباً أم يساوي صفراً أم غير محدد.


التدريس باستخدام التكنولوجيا

المدة اطلب من الطلاب كتابة تدوينة تشرح طريقة إيجاد ميل مستقيم. اطلب منهم وصف كيف يساعد الميل في وصف مظهر المستقيم.

مثال 2 من الحياة اليومية استخدام الميل في صورة معدل التغير

السر طيار بطير بطائرة من أبوظبي إلى مدينة الكويت. بعد 0.5 ساعة. تصل الطائرة إلى ارتفاع مناسب للطيران وهي على بعد 620 كيلومتراً من مدينة الكويت. بعد نصف ساعة. تصبح الطائرة على بعد 450 كيلومتراً من مدينة الكويت. فكم كانت تبعد الطائرة عن مدينة الكويت بعد 1.25 ساعة من الإقلاع؟

النهم استخدم البيانات المعطاة لعمل تمثيل بياني للمستقيم الذي يمثل المسافة من مدينة الكويت بوحدة الكيلومترات في صورة دالة لإيجاد الزمن x بالساعات



افترض أن السرعة ثابتة حدد النقطتين (0.5, 620) و (1.0, 450) وارسم خطاً مستقيماً يمر بهما

تردد أن نجد المسافة من مدينة الكويت بعد 1.25 ساعة

من التمثيل البياني. يمكننا تقدير أنه بعد 1.25 ساعة. كانت المسافة أقل من 400 كيلومتر

التخطيط

أوجد ميل المستقيم الممثل بيانياً استخدم معدل التغير هذا في مسافة ابتعاد الطائرة عن مدينة الكويت في الساعة لإيجاد المسافة من مدينة الكويت بعد 1.25 ساعة

الحل

استخدم قانون الميل لإيجاد ميل المستقيم

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{(450 - 620)}{(1.0 - 0.5)} = \frac{-170}{0.5} = -340 \text{ كيلومتراً في الساعة}$$

طارت الطائرة بمتوسط سرعة 340 كيلومتراً في الساعة نزل علامة السالب على تناقص في المسافة بمرور الوقت

استخدم ميل المستقيم ونقطة واحدة معلومة على المستقيم لحساب المسافة y عندما يكون الوقت x هو 1.25

قانون الميل

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad m = -340 \quad x_1 = 0.5 \quad y_1 = 620 \quad x_2 = 1.25 \quad y_2 = ?$$

$$-340 = \frac{y_2 - 620}{1.25 - 0.5}$$

$$-340 = \frac{y_2 - 620}{0.75}$$

$$-255 = y_2 - 620$$

$$365 = y_2$$

وبذلك، فإن المسافة من مدينة الكويت بعد 1.25 ساعة تساوي 365 كيلومتراً

التحقق ما أن 365 قريبة إلى التقدير. فإن إجابتنا منطقية ✓

2B. 150 : تبلغ زيادة عدد الأغاني التي يتم تنزيلها بطريقة قانونية

تدوين

2. تنزيلات الوسائط عبر الإنترنت في عام 2006. تم تنزيل 500 مليون أغنية بطريقة قانونية من الإنترنت وفي عام 2004. تم تنزيل 200 مليون أغنية بطريقة قانونية


A. استخدم البيانات المعطاة لعمل تمثيل بياني للمستقيم الذي يمثل عدد الأغاني التي تم تنزيلها بطريقة قانونية y في صورة دالة للوقت x بوحدة الأعوام. انظر الهامش.

B. أوجد ميل المستقيم. وفسر معناه.

C. إذا استمر هذا الاتجاه بالمعدل ذاته. فكم عدد الأغاني التي سيتم تنزيلها بطريقة قانونية في عام 2020؟ 2.6 مليار أغنية

إجابات إضافية (تمرين موجه)

2A.




انتبه!

إحداثيات سالبة أخبر الطلاب أن ينبغيهم عند حساب ميل النقاط التي تحتوي على إحداثيات سالبة. وعليهم كتابة صيغة الميل كاملة. والتعويض عن الإحداثيات، ثم التحويل لأبسط صورة.

2 المستقيمات المتوازية والمتعامدة يمكنك استخدام ميل مستقيمين لتحديد ما إذا كان المستقيمان متوازيين أم متعامدين. المستقيمان ذوَا الميل الواحد متوازيان.

المستقيمات المتوازية والمتعامدة



11.2 ميل المستقيمات المتوازية لا يكون لمستقيمين غير رأسيين الميل ذاته إلا في حالة أن يكونا متوازيين. فجميع المستقيمات الرأسية متوازية.

مثال المستقيمان المتوازيان l ولهما الميل ذاته، 4.

11.3 ميل المستقيمات المتعامدة لا يتعامد مستقيمان غير رأسيين إلا إذا كان ناتج ضرب ميلهما يساوي -1. المستقيم الرأسى والمستقيم الأفقي متعامدان.

مثال المستقيم m والمستقيم p ناتج ضرب الميلين $= -\frac{1}{4} \times 4 = -1$

مثال 3 تحديد العلاقة بين المستقيمتين

اذكر ما إذا كان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ متوازيين أم متعامدين. أم ليس أي منهما بالنسبة لـ $A(1, 1)$ و $D(6, 1)$ و $C(3, 2)$ و $B(-1, -5)$. مثل كل مستقيم بيانيًا للتحقق من إجابتك.

الحل: أوجد الميل لكل مستقيم.


$$\text{ميل } \overrightarrow{AB} = \frac{-5-1}{-1-1} = \frac{-6}{-2} = 3 \quad \text{ميل } \overrightarrow{CD} = \frac{2-1}{3-1} = \frac{1}{2}$$

الحل: 2 اذكر العلاقة. إن وجدت. بين المستقيمتين.

المستقيمان ليس لهما ميل واحد. إذاً فهما غير متوازيين. ولتحديد ما إذا كان المستقيمان متعامدين أم لا. أوجد ناتج ضرب ميلهما.

$$\text{ناتج ضرب ميل } \overrightarrow{AB} \text{ و } \overrightarrow{CD} = 3 \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2} \neq -1$$

بما أن ناتج ضرب ميلهما يساوي -1. فإن المستقيم $\overrightarrow{AB}$ متعامد على المستقيم $\overrightarrow{CD}$.



التحقق عندما نُثَلّ المستقيمان بيانيًا، يبدو أنهما يتقاطعان ويشكلان أربع زوايا قائمة. ✓

تمرين موجّه

اذكر ما إذا كان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ متوازيين أم متعامدين. أم ليس أي منهما. مثل كل مستقيم بيانيًا للتحقق من إجابتك.

- 3A. $A(14, 13)$, $B(-11, 0)$, $C(-3, 7)$, $D(-4, -5)$ 3A-3B. انظر الهامش.

661


2 المستقيمات المتوازية والمتعامدة

المثال 3 يوضح طريقة تحديد ما إذا كانت المستقيمات متوازية أم متعامدة أم لا شيء مما سبق. ووضح المثال 4 طريقة استخدام الميل في تمثيل المستقيم بيانيًا.

مثال إضافي

3 حدّد ما إذا كان $\overrightarrow{HJ}$ و $\overrightarrow{FG}$ مستقيمين متوازيين أم متعامدين أم ليس أيًّا منهما بالنسبة للمعطيات:


$F(1, -3)$ و $G(-2, -1)$ و $H(5, 0)$ و $J(6, 3)$. مثل كل مستقيم بيانيًا لإثبات صحة إجابتك.




ليس أيًّا منهما

إجابات إضافية (تمرين موجّه)

3A. ليس أيًّا منهما



3B. متوازيان




نصيحة دراسية


ميل المستقيمتين المتعامدتين إذا كان للمستقيم l ميل $\frac{a}{b}$ فإن ميل المستقيم المتعامد على المستقيم l يساوي $-\frac{b}{a}$. إذ أن $\frac{a}{b} \left(-\frac{b}{a} \right) = -1$

مثال إضافي


4. مثل بيانياً المستقيم الذي يحتوي على $Q(5, 1)$ ومتوازٍ مع المستقيم MN الذي به $M(-2, 4)$ و $N(2, 1)$.



إجابة إضافية (تمرين موجّه)



إجابات إضافية




5-8. انظر ملحق إجابات الوحدة 11 للاطلاع على التمثيلات البيانية.

5. متعامدان
6. ليس أياً منهما
7. متوازيان
8. متعامدان

مثال 4: استخدام الميل لتمثيل المستقيم بيانياً

ارسم تمثيلاً بيانياً للمستقيم الذي يمر بالنقطة $A(-3, 0)$ ويتعامد على $\overline{CD}$ مع $C(-2, -3)$ و $D(2, 0)$.



ميل $\overline{CD}$ يساوي $\frac{0 - (-3)}{2 - (-2)} = \frac{3}{4}$ ما أن $-\frac{4}{3}$ فإن ميل المستقيم

المتعامد على $\overline{CD}$ يمر بالنقطة A يساوي $-\frac{4}{3}$ أو $-\frac{4}{3}$

لتمثيل المستقيم بيانياً. ابدأ عند النقطة A . انتقل إلى الأسفل 4 وحدات ثم إلى اليمين 3 وحدات. حدد النقطة B وارسم $\overline{AB}$.




تمرين موجّه

4. ارسم تمثيلاً بيانياً للمستقيم الذي يتضمن $P(0, 1)$ ويتعامد على $\overline{QR}$ مع $Q(-6, -2)$ و $R(0, -6)$. انظر الهامش.

التحقق من فهمك

مثال 1

أوجد ميل كل مستقيم.



غير محدد


4. علم النباتات نبات الكشت عبارة عن كرمة سريعة النمو توجد في جنوب الولايات المتحدة. يبلغ الطول المبدئي لكرمة الكشت 0.5 متر. وبعد سبعة أيام، يصبح طول النبات 4 أمتار.

a. مثل بيانياً المستقيم الذي يمثل طول النبات بمرور الوقت. انظر الهامش.

b. ما الميل في تمثيلك البياني؟ ما الذي يمثل $\frac{1}{2}$ ؟ ينمو النبات 0.5 m في اليوم.

c. بافتراض أن معدل النمو للنبات مستمر، فكم سيكون طول النبات بعد 15 يوماً؟ 8 m

مثال 2



اذكر ما إذا كان $\overline{WX}$ و $\overline{YZ}$ متوازيين أم متعامدين أم ليس أي منهما. مثل كل خط بيانياً للتحقق من إجابتك. 5-8. انظر الهامش.

6. $W(1, 3)$, $X(-2, -5)$, $Y(-6, -2)$, $Z(8, 3)$

8. $W(1, -3)$, $X(0, 2)$, $Y(-2, 0)$, $Z(8, 2)$

مثال 4

5. $W(2, 4)$, $X(4, 5)$, $Y(4, 1)$, $Z(8, -7)$

7. $W(-7, 6)$, $X(-6, 9)$, $Y(6, 3)$, $Z(3, -6)$

9-11. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

9. يمر بالنقطة $A(3, -4)$. موازاً $\overline{BC}$ مع $B(2, 4)$ و $C(5, 6)$

10. الميل = 3. ويمر بالنقطة $A(-1, 4)$

11. يمر بالنقطة $P(7, 3)$. بالتعامد على $\overline{LN}$ مع $L(-2, -3)$ و $N(-1, 5)$

662 | الدرس 11-3 | ميل المحطوط المستقيمة

التدريس المتمايز

إذا واجه الطلاب صعوبة في تذكر معاني قيم الميول.

إذا فاطلب منهم أداء أغنية بسيطة عن المستقيمات المختلفة التي لها ميل موجب أو سالب أو صفري أو غير محدد.


3 التمرين

التقويم التكويني


استخدم التمارين من 1 إلى 11 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

26a.



27a.



28-33. انظر ملحق إجابات الوحدة 11 للاطلاع على التمثيلات البيانية.

28. متوازيان

29. متوازيان


30. ليس أيًا منهما

31. متعامدان


32. متعامدان

33. ليس أيًا منهما


12.



13.




14.




$\frac{6}{7}$

$-\frac{3}{7}$


15.



16.



17.



8

$-\frac{4}{5}$

غير محدد

حدد ميل المستقيم الذي يحتوي على النقاط المعطاة.

18. $C(3, 1), D(-2, 1)$ O

19. $E(5, -1), F(2, -4)$ 1

20. $G(-4, 3), H(-4, 7)$ غير محدد

21. $J(7, -3), K(-8, -3)$ O

22. $L(8, -3), M(-4, -12)$ $\frac{3}{4}$

23. $P(-3, -5), Q(-3, -1)$ غير محدد

24. $R(2, -6), S(-6, 5)$ $-\frac{11}{8}$

25. $T(-6, -11), V(-12, -10)$ $-\frac{1}{6}$

مثال 2

26. تمثيل النماذج في عام 2004. شارك 8 ملايين أمريكي فوق سن 7 سنوات في مسابقة ركوب الدراجات في الجبال. وفي عام 2006، شارك 8.5 ملايين.

a. ارسم تمثيلًا بيانيًا لتوضيح عدد المشاركين في مسابقة ركوب الدراجات في الجبال بناءً على التغيير في المشاركة من عام 2004 إلى 2006. انظر التمام.

b. حسب البيانات، ما معدل الزيادة كل عام للمراصة؟ 250,000 فرد في العام

c. إذا استمرت المشاركة بالمعدل ذاته، فكم ستكون المشاركة في عام 2013 بالتقريب إلى أقرب 10,000 10,250,000

27. المعرفة العالية افترض أن مشغل MP3 يتكلف 499 AED في عام 2003 و 249.99 AED في عام 2009.

a. مثل بيانيًا اتجاه المستقيم لتوقع سعر مشغل MP3 من عام 2003 حتى 2009. انظر التمام.

b. حسب البيانات، كم سينخفض السعر في العام؟ 41.50 AED

c. إذا استمر الاتجاه، فكم ستكون تكلفة مشغل MP3 في عام 2013؟ 84 AED

حدد ما إذا كان $\overline{AB}$ و $\overline{CD}$ متوازيين أم متعامدين أم غير ذلك. مثل كل خط بيانيًا للتحقق من إجابتك. 28-33. انظر التمام.

مثال 3

28. $A(1, 5), B(4, 4), C(9, -10), D(-6, -5)$

29. $A(-6, -9), B(8, 19), C(0, -4), D(2, 0)$

30. $A(4, 2), B(-3, 1), C(6, 0), D(-10, 8)$

31. $A(8, -2), B(4, -1), C(3, 11), D(-2, -9)$

32. $A(8, 4), B(4, 3), C(4, -9), D(2, -1)$

33. $A(4, -2), B(-2, -8), C(4, 6), D(8, 5)$

663

خيارات الواجب المنزلي المتمايزة

المستوى	الواجب	خيار اليومين
AL مبتدئ	12-39, 52-55, 57-72	12-38, 52-55, 57, 62-72
OL أساسي	13-49, 50-55, 57-72	12-39, 58-61
BL متقدم	40-72	40-55, 57, 26-27

انتبه!

تحليل الخطأ في التمرين 53.
يجب أن يراجع الطلاب ترتيب الأزواج المرتبة. وموضع x و y في البسط والمقام. وعلامات العمليات في الصيغة.

40d. الإجابة النموذجية: نعم؛ نظرًا لزيادة عدد الحضور باستمرار، فسوف يتيح لهم الأستاذ الجديد استقبال مزيد من المشجعين.

مثل بيانيًا المستقيم الذي يتوافق مع كل حالة. 39-34. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

34. يمر بالنقطة $A(2, -5)$. موازاة $\overleftrightarrow{BC}$ مع $B(1, 3)$ و $C(4, 5)$

35. الميل -2 ويمر بالنقطة $A(-2, -4)$

36. يمر بالنقطة $K(3, 7)$. بالتعاقد على $\overleftrightarrow{LM}$ مع $L(-1, -2)$ و $M(-4, 8)$

37. يمر بالنقطة $X(1, -4)$. موازاة $\overleftrightarrow{YZ}$ مع $Y(5, 2)$ و $Z(-3, -5)$

38. الميل $\frac{2}{3}$. ويمر بالنقطة $A(-5, 4)$

39. يمر بالنقطة $D(-5, -6)$. بالتعاقد على $\overleftrightarrow{FG}$ مع $F(-2, -9)$ و $G(1, -5)$

40. الإحصاءات قبل عدم استاد آر سي إيه دوم. كان الممر الرئيس لفريق إنديانابوليس كولتس. في عام 2001. بلغ عدد الحاضرين 450,746 مشجعًا وفي عام 2005 بلغ الحاضرون 457,373 مشجعًا.

a. ما معدل التغير التفرسي في عدد الحضور من عام 2001 وحتى عام 2005؟ 1657

b. إذا استمر معدل التغير هذا، فتوقع عدد بعدد الحضور لعام 2012. 468,973

c. هل سيستمر عدد الحضور في الزيادة بمعدل غير محدد؟ اشرح.

d. بنى مسؤولو فريق كولتس إستادًا جديدًا الآن وأكبر مساحة. فهل تمتد أن قرارهم كان منطقيًا؟ لماذا أو لماذا لا؟

حدد أي مستقيم يمر بالنقاط المحددة له ميل أكثر انحدارًا.

41. المستقيم 1: $(0, 5)$ و $(6, 1)$ المستقيم 2: $(-4, 10)$ و $(8, -5)$

المستقيم 2: $(-4, 10)$ و $(8, -5)$

42. المستقيم 1: $(0, -4)$ و $(2, 2)$ المستقيم 2: $(4, 5)$ و $(0, -4)$

43. المستقيم 1: $(-9, -4)$ و $(7, 0)$ المستقيم 2: $(-6, 7)$ و $(9, -3)$ المستقيم 3: $(3, 5)$ و $(-9, 9)$

المستقيم 2: $(-6, 7)$ و $(9, -3)$ المستقيم 3: $(3, 5)$ و $(-9, 9)$

45. تمثيل النماذج أعد ولاية ميشيغان مأوى لنوعين مهددين بالانقراض من الأحياء البرية وهما: النسر الأقرع و الذئب الرمادي. يوضح التمثيل البياني تعداد كل نوع في ولاية ميشيغان في عام 1992 و عام 2006.

a. أي نوع منهما كان له معدل تغير أكبر في التعداد؟ النسر الأقرع

b. ارسم تمثيلًا بيانيًا خطيًا يوضح نمو كلا التعدادين. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

c. إذا استمر النوعان في النمو بمعدلاتهما الخاصة، فكم يبلغ تعداد كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا

كل نوع في 2012 ؟ 1189 نسرًا أقرع؛ 494 ذئبًا رماديًا



أوجد قيمة x أو y التي تتوافق مع الحالات المعطاة. ثم مثل المستقيم بيانيًا. 49-46. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

46. المستقيم المار بالنقطتين $(4, -1)$ و $(x, -6)$ له ميل يساوي $-\frac{5}{2}$.

47. المستقيم المار بالنقطتين $(-4, 9)$ و $(4, 3)$ بوازي المستقيم المار بالنقطتين $(-8, 1)$ و $(4, y)$.

48. المستقيم المار بالنقطتين $(8, 7)$ و $(-6, -7)$ متعاقد على المستقيم المار بالنقطتين $(2, 4)$ و $(x, 3)$.

49. المستقيم المار بالنقطتين $(1, -3)$ و $(y, 3)$ بوازي المستقيم المار بالنقطتين $(5, -6)$ و $(y, 9)$.

50. المدارس في عام 2000. كان في مدرسة جيفرسون الثانوية 1125 طالبًا. وفي عام 2006. زاد عدد الطلاب ليصبح 1425 طالبًا. عندما تبيت مدرسة فيرفيو الثانوية في عام 2001. كان لديها 5721 طالبًا. فكم طالبًا التحق بمدرسة فيرفيو الثانوية في عام 2006 إذا زاد عدد الطلاب بالمعدل ذاته مثل مدرسة جيفرسون الثانوية؟ 1525 طالبًا

إجابات إضافية

51a

الزمن (بالساعة)	مسافة السير (بالكيلومتر)	مسافة ركوب الدراجات (بالكيلومتر)
0	0	0
1	35	10
2	7	20
3	10.5	30
4	14	40

51b



51d. الإجابة النموذجية: نعم، يمكنهم القيام بذلك إذا ركبوا دراجاتهم أتا إذا ساروا. فيستغرقون ما يزيد عن الساعتين للسير مسافة ثمانية كيلومترات، إذا قلن وصلوا إلى البيت في الموعد المناسب ولن يمشوا أي وقت في المتجر. أتا إذا ركبوا دراجاتهم، فيصلون إلى هناك في 24 دقيقة. إذا فصوا 30 دقيقة في المتجر و 24 دقيقة في طريقهم إلى المنزل، عندها يكون إجمالي الوقت الذي يستهلكونه يساوي $24 + 30 + 24 = 78$ دقيقة، وهذا يساوي ساعة واحدة و 18 دقيقة.

54a. الإجابة النموذجية: $B(2, 4)$ و $D(10, -4)$

54b. الإجابة النموذجية: ميول المستقيمين AB و DC غير محددة، ولذا فالمستقيمان متوازيان. وميول المستقيمين BC و AD تساوي 0، إذا ففما متوازيان.

51. الموسيقى تريد أماني ومن أن تذهب إلى متجر الموسيقى القريب من منزل أماني بعد المدرسة، ويكنها 51a-b. المشي 3.5 كيلومترات في الساعة أو قيادة الدراجة بسرعة 10 كيلومترات في الساعة. انظر الهامش.

a. ارسم جدولاً لتوضيح المسافة التي يمكن أن تمشيها أماني ومن أو تغطعاها إذا ركبا الدراجة. أخرج الساعات المقطوعة في 0 و 1 و 2 و 3 و 4 ساعات.

b. ارسم تمثيلاً بيانياً لتوضيح المسافة التي يمكن أن تغطعاها أماني ومن بناءً على زمن كل من المشي وركوب الدراجة. احرص على وضع علامات لمحاور تشيك البياني.

c. ما الذي يمثل الميل في تشيك البياني؟ سرعتهم

d. نقول والده أماني إنه لا يمكنهما الذهاب إلا إذا كان بإمكانهما الذهاب إلى متجر الموسيقى والعودة منه في أقل من ساعتين. إذا أردتا قضاء 30 دقيقة على الأقل في متجر الموسيقى وهو بعد عنهما مسافة أربعة كيلومترات فهل يمكنهما ذلك؟ فهل ينبغي لهما المشي أم ركوب دراجتهما؟ اشرح استنتاجك. انظر الهامش.

مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

52. كتابة سؤال يقول زميل في الصف إن جميع الخطوط المستقيمة لها ميل موجب أو سالب. اكتب سؤالاً يمكن من خلاله التحقق من تخمينه. الإجابة النموذجية: ماذا عن الخطوط المستقيمة الرأسية؟

53. تحليل الخطأ: أجب عن كل من أحمد وخالد ميل المستقيمة الذي يمر بالنقطتين $R(-2, 2)$ و $Q(3, 5)$ قول أي منهما على صواب؟ اشرح استنتاجك.

أحمد: طرح خالد إحداثيات x بالترتيب الخطأ.

$$\text{خالد} \\ m = \frac{5-2}{3-(-2)} \\ m = \frac{3}{5}$$

$$\text{أحمد} \\ m = \frac{5-2}{3-(-2)} \\ m = \frac{3}{5}$$

54. التبرير ارسم المربع $ABCD$ على أن تكون الرؤوس المتناظرة عند النقطتين $C(10, 4)$ و $A(-2, -4)$.

a. أوجد رأسين آخرين للمربع وسمهما بالنقطتين B و D .

b. وضح أن $AB \parallel DC$ و $AD \parallel BC$. انظر الهامش.

c. وضح أن قياس كل زاوية داخل المربع تساوي 90.

54c. الإجابة: بما أن ميل المستقيم AB غير محدد وميل المستقيم BC صفر، فإن المستقيمين متعامدان على بعضهما البعض. وبالتالي، فإن المستقيمان AB و BC يشكلان زاوية قائمة بمقياس 90° وينطبق المنطق ذاته على جميع الأضلاع.



برج خليفة



البرج المائل

55. الكتابة في الرياضيات أوضح ميل برج خليفة وبرج بيزا المائل.

56. تحدّد سننعلهم في هذا الدرس أن $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ استخدم البرهان الجبري لتوضيح أن الميل يمكن حسابه باستخدام المعادلة $m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$.

57-56. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

57. الكتابة في الرياضيات أوجد نقطتين إضافيتين تقعان على طول المستقيم ذاته مثل $(-1, 7)$ و $(1, -3)$. أوضح طريقة عامة يمكنك استخدامها لإيجاد مزيد من النقاط على المستقيم من أي نقطة محددة.

665

التدريس الممتياز

التوسع كلف الطلاب بالتمثيل البياني للنقطة $y = x^2$ على مستوى إحداثي. ويمكنهم استخدام حاسبة التمثيل البياني لإنشاء التمثيل البياني. اشرح لهم أن خط المماس يتقاطع مع التمثيل البياني في موضع واحد. اطلب منهم التنبؤ بموقع خط المماس الخاص بدلتهم. واطلب منهم أن يرسموا المستقيم ويتوقعوا ميله. اشرح لهم أنهم سيتعلمون المزيد عن خطوط مماس الدوال عندما يبدأون في دراسة حساب التفاضل والتكامل.

4 التقويم

تعيين مصطلح الرياضيات كلف الطلاب بكتابة فقرة بشرحون فيها طريقة استخدام ميل مستقيمتين لتحديد ما إذا كانا متعامدين.

تبرين على الاختبار المعياري

58. ما ميل المستقيم المتعامد على المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(3, -4)$ و $(-1, 6)$ ؟

A $m = -\frac{5}{2}$

B $m = -1$

C $m = -\frac{2}{5}$

D $m = \frac{2}{5}$

59. إجابة مختصرة مجموعة من 25 بطاقة مخلوبة على وجهها عشوائيًا على منضد. 15 بطاقة ليس مكتوبًا عليها سوى حرف A على وجهها، و 10 بطاقات ليس مكتوبًا عليها سوى حرف B. قلبت عمر بطاقة واحدة، ما احتمالية أن تكون البطاقة مكتوب على وجهها حرف B ؟

60. الجبر تجمع بها الأموال لشراء هدبة بقيمة AED 81 لعمليتها. وقد ساهمت بالفعل بمبلغ AED 24 وسوف تجمع AED 3 من كل طالبة سوف تساهم أيضًا. كم طالبة أخرى يجب أن تشارك ؟

F 3 طالبات

G 9 طالبات

H 21 طالبة

J 91 طالبة



61. SAT/ACT مساحة دائرة تساوي 20π سنتيمترًا مربعًا، فما محيطها ؟

A $\sqrt{5}\pi$ cm


B $2\sqrt{5}\pi$ cm

C $4\sqrt{5}\pi$ cm

D 20π cm

E 40π cm

مراجعة شاملة




في الشكل، إن $a \parallel b$ ، $c \parallel d$ ، و $m\angle 4 = 57$ ، فأوجد قياس كل زاوية.

62. $\angle 5$ 123

64. $\angle 8$ 57

63. $\angle 1$ 123

65. $\angle 10$ 57



راجع الرسم التخطيطي الموجود على اليسار.

66. حدد جميع القطع المستقيمة التي توازي $\overline{BC}$ ، $\overline{EF}$ ، $\overline{QR}$ ، $\overline{TU}$.

67. حدد جميع المستويات التي تتقاطع مع المستوى BCR.

68. حدد جميع القطع المستقيمة المتخالفة مع $\overline{AP}$ ، $\overline{BO}$ ، $\overline{CR}$ ، $\overline{FU}$ ، $\overline{PU}$ ، $\overline{QR}$ ، $\overline{RS}$ ، $\overline{TU}$ ، $\overline{DE}$.

69. $\overline{ABC}$ ، $\overline{ABQ}$ ، $\overline{PQR}$ ، $\overline{CDS}$ ، $\overline{APU}$ ، $\overline{DET}$

69. الإنشاء توجد أربعة بنايات في حرم مدرسة مانسفيلد الثانوية، ولا تبدو ثلاث بنايات منها على مستقيم، فكم عدد الممرات التي ينبغي بناؤها حتى يتصل كل مبنى مباشرة بالمباني الأخرى ؟

مراجعة المهارات

أوجد قيمة y .

70. $3x + y = 5$ $y = -3x + 5$

71. $4x + 2y = 6$ $y = -2x + 3$

72. $4y - 3x = 5$ $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$

اختبار نصف الوحدة

الدروس من 11-1 إلى 11-3

التقويم التكويني

استخدم اختبار نصف الوحدة لتقويم مدى تقدم الطلاب في النصف الأول من الوحدة.

اطلب من الطلاب مراجعة الدرس الموضح للمسائل التي أجابوا عنها بشكل غير صحيح.

مطويات منظم الدراسة

مطويات ديننا زاياك

قبل أن ينتهي الطلاب من اختبار نصف الوحدة، شجّعهم على مراجعة المعلومات التي سجلوها في مطوياتهم.

إجابات إضافية

9. $104; \angle 2 \cong \angle 4$ حسب نظرية الزوايا المتناظرة.
10. $62; \angle 14$ متكاملة مع الزاوية $\angle 15$ حسب نظرية الزوايا الداخلية المتتالية. $\angle 15 \cong \angle 9$ حسب نظرية الزوايا المتقابلة بالرأس. $\angle 14 \cong \angle 10$ حسب نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة.
11. $76; \angle 4 \cong \angle 6$ حسب نظرية الزوايا المتقابلة بالرأس. $\angle 7$ متكاملة مع $\angle 6$ حسب نظرية الزوايا الداخلية المتتالية.

13. أوجد قيمة x . 48




14. نماذج للقطارات تصمم هدى قضيب قطار متوازيين بحيث يمر قضيب ثالث قطرياً عبر القضيبين الآخرين. لكي تُصمم تحويلة بشكل صحيح، نحتاج إلى أن تكون الزاوية بين المسار القطري والجزء العلوي الأيمن من القضيب الثاني ضعف الزاوية التي بين القطر والجزء السفلي الأيمن من القضيب الأول. ما قياس الزاوية التي بين المسار القطري والجزء العلوي الأيمن من القضيب الثاني؟ 120

حدد ما إذا كان $\overleftrightarrow{AB}$ و $\overleftrightarrow{XY}$ متوازيين أم متعامدين أم غير ذلك. مثّل كل مستقيم بيانياً للتحقق من صحة إجابتك.

15. $A(2, 0), B(4, -5), X(-3, 3), Y(-5, 8)$
16. $A(1, 1), B(5, -9), X(4, -10), Y(7, -4)$

أوجد ميل كل مستقيم.



17. المستقيم ℓ $\frac{3}{2}$
18. مستقيم متوازٍ مع m $-\frac{1}{5}$
19. مستقيم متعامد على n $\frac{4}{5}$


20. المبيعات في الجدول أدناه. موضح مبيعات شركة "فون إلكترونيك" في عامي 2008 و 2011.

السنة	المبيعات التقريبية (AED)
2008	240,000
2011	330,000


a. ما معدل التغير في المبيعات التقريبية من 2008 حتى 2011؟ 30,000 AED في العام

b. إذا استمر هذا المعدل في التغير، فماذا نتوقع أن تكون المبيعات التقريبية لعام 2015. 450,000 AED


حدد القاطع الواصل بين كل زوج من الزوايا. ثم صنف العلاقة بين كل زوج من الزوايا باعتبارها زوايا داخلية متبادلة أو زوايا خارجية متبادلة أو زوايا متناظرة أو زوايا داخلية متتالية.



- المستقيم p : زوايا خارجية متبادلة $\angle 3$ و $\angle 6$
- المستقيم s : زوايا داخلية متبادلة $\angle 1$ و $\angle 4$
- المستقيم t : زوايا داخلية متتالية $\angle 7$ و $\angle 5$
- المستقيم r : زوايا خارجية متبادلة $\angle 10$ و $\angle 11$




5. مستوى متوازٍ مع المستوى $FGHE$
6. قطعة مستقيمة متخالفة مع $\overline{GH}$ التي تضم النقطة D $\overline{AD}, \overline{DF}$
7. كل القطع المستقيمة المتوازية مع القطع $\overline{HE}$ و $\overline{GF}$ و $\overline{AD}$ و $\overline{BC}$
8. الاختيار من متعدد أي من المصطلحات التالية يمثل الوصف الأمثل لزوايا $\angle 4$ و $\angle 8$ ؟



- A. متناظرة
- B. خارجية متبادلة
- C. داخلية متبادلة
- D. داخلية متتالية

في الشكل، إذا كان $m\angle 4 = 104$ و $m\angle 8 = 41$ ، أوجد قياس كل زاوية. اذكر أي مستقيمة (مستقيمة أو نظرية (نظريات) قد استخدمتها.



9. $\angle 2$
10. $\angle 9$
11. $\angle 10$
12. $\angle 7$

معادلات المستقيم


11-4

السابق

الحالي

لماذا؟

مراجعة سريعة



على طريق سريع بالقرب من مدينة
هنا شاحنة العفانة الأديس على محور حرك
السرعة المقدر بسرعة 65 كيلو متر
بالساعة لكل ساعة يعمل حركه شلو
مترات أو أقل بالساعة AED 42.50
وهناك رسم إضافي بحجم 2 AED من
كل كيلو متر بالساعة إذا من الشلو
مترات العشرة الأولى بالساعة ويمكن
تطبيق التكلفة الإضافية دور حساب
تكاليف المحطة بواسطة المعادلة
 $C = 42.5 + 2m$

إيجاد ميل
المستقيمت.

1 كتابة معادلة مستقيم
بناءً على معلومات
عن التمثيل البياني
2 حل المسائل عن طريق
كتابة المعادلات

1 التركيز التخطيط الرأسي

قبل الدرس 11-4 التمثيل البياني لمعادلات
المستقيمت وكتابتها في ظل خصائص
معطاة مثل نقطتين، أو نقطة وميل، أو
ميل وتقاطع مع المحور الرأسي y .

الدرس 11-4 كتابة معادلة عن مستقيم في
ظل معلومات معطاة عن التمثيل البياني.
وحل المسائل من خلال كتابة معادلات.

بعد الدرس 11-4 تحديد ورسم
التمثيلات البيانية للدوال الأصلية، بما
فيها الدوال الخطية.

المفردات الجديدة
slope- الميل والنقطة
intercept form
صيغة الميل والنقطة
point-slope form

ممارسات في الرياضيات
استخدام نماذج الرياضيات
البحث عن التوافق في
الاستنتاجات المتكررة والتفسير
عن ذلك

كتابة معادلات للمستقيمت رسماً تتضح من المحور أن معادلة مستقيم غير رأسي يظهر كشكل
مختلفة ولكنها متساوية.

المفهوم الأساسي معادلات المستقيم غير الرأسي

صيغة الميل والنقطة لمعادلة خطية هي
 $y = mx + b$ حيث m هو ميل الخط
و b هو طول التقاطع مع المحور y
صيغة الميل والنقطة لمعادلة خطية هي
 $y - y_1 = m(x - x_1)$
حيث (x_1, y_1) تمثل أي نقطة على المستقيم
و m هو ميل المستقيم

عند عليك بالميل بالإضافة إلى العلم بالتقاطع مع المحور y أو نقطة على مستقيم يمكنك استخدام شكل
الصيغ لكتابة معادلة المستقيم.

مثال 1 الميل والتقاطع مع المحور y

اكتب معادلة بصيغة الميل والنقطة للمستقيم ذي الميل 3 والتقاطع مع المحور
 y بقيمة يساوي -2 ثم مثل المستقيم بيانياً.



صيغة الميل والنقطة
 $m = 3$ $b = -2$
شاهد
 $y = mx + b$
 $y = 3x + (-2)$
 $y = 3x - 2$

مثل نقطة على خط التقاطع مع المحور y -2 استخدم الميل بنية
3 أو $\frac{3}{1}$ لإيجاد نقطة أخرى على بعد 3 وحدات لأعلى
وعلى بعد وحدة واحدة إلى اليمين من التقاطع مع المحور
 y . ثم ارسم المستقيم المار عبر هاتين النقطتين.

تمرين موجّه

1. اكتب معادلة بصيغة الميل والنقطة للمستقيم ذي الميل $-\frac{1}{2}$
وطول التقاطع مع المحور y يساوي 8 ثم مثل المستقيم بيانياً. انظر ملحق إجابات الوحدة 11

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

كلّف الطلاب بقراءة القسم لماذا؟ الوارد
في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

- كم يبلغ سعر تذكرة سفر لمسافة
80 كيلومتراً في الساعة؟ AED 52.50
- ما النقطتان الموجودتان على التمثيل
البياني للمعادلة؟ الإجابة النموذجية:
(10, 42.5), (15, 52.5)
- ما ميل المستقيم؟ 2

1 كتابة معادلة لمستقيمات


الأمثلة 4-1 نوضح طريقة كتابة معادلة خطية باستخدام صيغة الميل والمقطع أو صيغة الميل والنقطة لمستقيم ونفسه. أن يكون الطلاب قادرين على استخدام القيم المعطاة لكتابة معادلة خطية إما بصيغة الميل والمقطع أو بصيغة الميل والنقطة. **المثال 5** يوضح طريقة إيجاد مستقيم متعامد على مستقيم معطى عبر نقطة معطاة.

التقويم التكويني

استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين موجه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.


أمثلة إضافية

1 اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع للمستقيم الذي يبلغ ميله 6 ويتقاطع مع المحور الرأسي y عند -3 . بعد ذلك، مثل المستقيم بيانياً $y = 6x - 3$.




2 اكتب معادلة بصيغة الميل والنقطة للمستقيم بميل يبلغ $-\frac{3}{5}$ ويتضمن النقطة $(-10, 8)$. ثم مثل المستقيم بيانياً.

$$y - 8 = -\frac{3}{5}(x + 10)$$



مثال 2 ميل ونقطة على المستقيم

اكتب معادلة بصيغة الميل والنقطة للمستقيم ذي الميل $-\frac{3}{4}$ والمار بالنقطة $(-2, 5)$. ثم مثل المستقيم بيانياً.



$$\begin{aligned} y - y_1 &= m(x - x_1) \\ y - 5 &= -\frac{3}{4}(x - (-2)) \\ y - 5 &= -\frac{3}{4}(x + 2) \end{aligned}$$

مثل بيانياً النقطة المعطاة $(-2, 5)$. استخدم الميل $-\frac{3}{4}$ أو $-\frac{3}{4}$ لإيجاد نقطة أخرى على بعد 3 وحدات للأسفل و 4 وحدات إلى اليمين. ثم ارسم المستقيم بحيث يمر عبر هاتين النقطتين.

تمرين موجه

2. اكتب معادلة بصيغة الميل والنقطة للمستقيم ذي الميل 4 الذي يمر بالنقطة $(-3, -6)$. ثم مثل المستقيم بيانياً. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

عندما يكون ميل المستقيم غير معروف، فاستخدم نقطتين على المستقيم لحساب قيمة الميل. ثم استخدم صيغة الميل والنقطة أو صيغة الميل والمقطع لكتابة معادلة للمستقيم.

مثال 3 نقطتان

اكتب معادلة للمستقيم المار بكل زوج من النقاط بصيغة الميل والمقطع.

a. $(0, 3)$ و $(-2, -1)$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1 - 3}{-2 - 0} = \frac{-4}{-2} = 2 \text{ أو } 2$$

2. اكتب معادلة للمستقيم.

$$y = mx + b$$

$$y = 2x + 3$$

b. $(-7, 4)$ و $(-4, -4)$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-4 - 4}{-4 - (-7)} = \frac{-8}{3} \text{ أو } -\frac{8}{3}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 4 = -\frac{8}{3}(x - (-7))$$

$$y - 4 = -\frac{8}{3}(x + 7)$$

$$y - 4 = -\frac{8}{3}x - \frac{56}{3}$$

$$y - 4 = -\frac{8}{3}x - \frac{56}{3}$$

$$y = -\frac{8}{3}x - \frac{56}{3} + 4$$

$$y = -\frac{8}{3}x - \frac{44}{3}$$

$$3A. (-2, 4) \text{ و } (8, 10) \quad y = \frac{3}{5}x + \frac{26}{5}$$

$$3B. (-1, 3) \text{ و } (7, 3) \quad y = 3$$

تمرين موجه

استخدم الإحداثيات المعطاة لكتابة معادلة خطية باستخدام صيغة الميل والنقطة أو صيغة الميل والمقطع. ثم ارسم المستقيم.

نصيحة دراسية
المثال 3B. يمكنك أيضاً استخدام صيغة الميل والمقطع ونقطة واحدة لإيجاد التقاطع مع المحور y وكتابة المعادلة.

$$\begin{aligned} y &= mx + b \\ 4 &= -\frac{8}{3}(-7) + b \\ 4 &= \frac{56}{3} + b \\ 4 - \frac{56}{3} &= b \\ b &= -\frac{44}{3} \\ y &= -\frac{8}{3}x - \frac{44}{3} \end{aligned}$$

إرشاد للمعلمين الجدد

استخدام التمثيلات البيانية يواجه بعض الطلاب صعوبة في كتابة المعادلات الخطية باستخدام صيغة الميل والنقطة من المسائل الكلامية. فيجب عليهم تصميم تمثيل بياني به كل محور يمثل متغيرات القيم المعطاة. وتسمح هذه الطريقة للطلاب أن يستعيضوا عن قيم الميل والمقطع.

أمثلة إضافية

3 اكتب معادلة للمستقيم المار عبر كل زوج من النقاط بصيغة الميل والمقطع.

a. $(-2, 0)$ و $(4, 9)$

$$y = \frac{3}{2}x + 3$$

b. $(-1, 3)$ و $(-3, -7)$

$$y = 5x + 8$$

4 اكتب معادلة للمستقيم المار عبر النقطتين $(-2, 5)$ و $(-2, 0)$ باستخدام صيغة الميل والمقطع $y = -2$

5 اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع لمستقيم متعامد على المستقيم $y = \frac{1}{5}x + 2$ المار عبر $(2, 0)$

$$y = -5x + 10$$

الربط بتاريخ الرياضيات

حاسب موهب (1746-1818) قدم موهج صيغة الميل والنقطة لمعادلة المستقيم في ورقة بحثية نشرت في 1784.

مثال 4 مستقيم أفقي

اكتب معادلة للمستقيم المار بالنقطتين $(2, 6)$ و $(5, 6)$ بصيغة الميل والمقطع.

الحل: هذا مستقيم أفقي. $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6 - 6}{5 - 2} = \frac{0}{3} = 0$

الحل: صيغة الميل والنقطة $y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 6 = 0(x - 2)$ $m = -\frac{1}{3}$ $(x_1, y_1) = (-2, 6)$

$y - 6 = 0$ **نقطة**


$y = 6$ **اجمع 6 على كل طرف.**

تمرين موجه $y = 0$

4. اكتب معادلة للمستقيم المار بالنقطتين $(5, 0)$ و $(-1, 0)$ بصيغة الميل والمقطع.

معادلات المستقيمات الأفقية والرأسية لا تحتوي إلا على متغير واحد.

المفاهيم الأساسية معادلات المستقيمات الأفقية والرأسية



معادلة المستقيم الأفقي $y = b$ حيث b هو التقاطع من المحور y للمستقيم.

مثال $y = -3$

معادلة المستقيم الراسي $x = a$ حيث a هو المقطع من المحور x للمستقيم.

مثال $x = -2$

المستقيمات المتوازية غير الرأسية لها ميل متساوية. والمستقيمان غير الرأسين عموديان إذا كان ناتج ضرب ميليهما هو -1 . المستقيمات الرأسية والأفقية متعامدة دائماً على بعضها البعض.

مثال 5 كتابة معادلات للمستقيمات المتوازية أو العمودية

اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع للمستقيم العمودي على $y = -3x + 2$ حيث يمر بالنقطة $(4, 0)$.

ميل $y = -3x + 2$ هو -3 . بحيث يكون ميل مستقيم عمودي عليه هو $\frac{1}{3}$.

صيغة الميل والمقطع $y = mx + b$

$0 = \frac{1}{3}(4) + b$ $m = \frac{1}{3}$ $(x, y) = (4, 0)$

$0 = \frac{4}{3} + b$ **نقطة**

$-\frac{4}{3} = b$ **اطرح $\frac{4}{3}$ من كل طرف.**

إذاً، فالمعادلة هي $y = \frac{1}{3}x + (-\frac{4}{3})$ أو $y = \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}$

تمرين موجه

5. اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع لمستقيم متوازٍ مع $y = -\frac{3}{4}x + 3$ ويحتوي على $(-3, 6)$.

$$y = -\frac{3}{4}x + \frac{15}{4}$$

التدريس المتميز

BL OL AL

النمط المنطقي اشرح للطلاب أنهم عندما يجدون معادلة تمثيل بياني. فعليهم مراجعة عملهم دائماً. ومن خلال العمل المستقل. اطلب من الطلاب النظر إلى الأمثلة الواردة في هذا الدرس والتعويض عن النقاط الموجودة على المستقيم في المعادلة النهائية. ويجب عليهم أن يتحققوا من نتائج التعويض في معادلة حتمية.

لماذا في الرياضيات
نحن نكتب "خطي" ونشير
أنه خط مستقيم والتشبيه
لأنه معادلة خطية بأحد
نقطة معينة

كتابة معادلات لحل المسائل يمكن تمثيل الكثير من مواقف الحياة اليومية استخدام معادلة خطية.

المثال 6 من الحياة اليومية كتابة معادلات خطية

المعرفة المالية تبلغ تكلفة عرض الهاتف الاسلكي الحالية الخاصة بـ مازن. العرض X. مبلغ AED 39.95 لكل شهر نظير إجراء مكالمات غير محدودة و AED 0.05 لكل رسالة نصية. وينكر مازن في التفسير إلى العرض Y الذي يكلف 35 AED لكل شهر نظير إجراء مكالمات غير محدودة بالإضافة إلى مبلغ 0.10 AED لكل رسالة نصية. فأي عرض يقدم له السعر الأفضل؟

الفهم العرض X يكلف 39.95 AED لكل شهر بالإضافة إلى 0.05 AED لكل رسالة نصية. والعرض Y يكلف 35 AED لكل شهر بالإضافة إلى 0.10 AED لكل رسالة نصية. نحتاج إلى مقارنة العرضين لتحديد متى تكون تكلفة أحد العرضين أقل من الآخر.

التخطيط اكتب معادلة لتمثيل التكلفة الشهرية الإجمالية C لكل خطة مقابل الرسائل النصية المرسلة أو المستقبلة. ثم مثل المعادلات بيانياً لمقارنة العرضين.

الحل تبلغ معدلات الزيادة، أو الميل m، في التكاليف الإجمالية C للعرض X و AED 0.10 للعرض Y وعندما يكون عدد الرسائل النصية هو 0. فإن التكلفة الإجمالية هي مجرد الرسوم الشهرية. إذاً، فطول الخط من المحور y هو 39.95 للعرض X و 35 للعرض Y.

$$\begin{array}{lcl} \text{العرض X} & & C = mt + b \\ C = 0.05t + 39.95 & \text{سعر الميل والسعة} & \\ C = 0.10t + 35 & \text{محور y و D} & \end{array}$$

مثل المعادلتين بيانياً على المستوى الإحداثي نفسه.



من التشابه البياني يبدو أنه إذا أرسل مازن أو استقبل أقل من حوالي 100 رسالة نصية، فالعرض Y يقدم السعر الأقل. ولأكثر من 100 رسالة، فإن العرض X هو الأفضل.

التحقق نتحقق من تفهيمك. مقابل 100 رسالة نصية، فالعرض X يكلف $0.05(100) + 39.95 = 44.95$ AED. والعرض Y يكلف $0.10(100) + 35 = 45$ AED. ونعتمد تفهيمك. نجد أنه حين يصل عدد الرسائل إلى 99، فإن كلتي الخطتين تكلف 44.90 AED.

مفردات 6. لعرض X أن السعر للعرض Y كان 44 AED في الشهر و 0.02 AED للرسالة النصية. فأي عرض ستستخدم لمازن السعر الأفضل؟ مثل إحاسبتك. انظر الهامش.

ملاحظة في حل المسائل
دأنا أي سعر هو الأفضل؟
لأنه من أن العرض Y يكلف
بمعدل شهري أقل، فالتكلفة لكل
رسالة نصية أكثر وهذا يجعل
العرض أصعب في المقارنة
بمجرد وعاءنا يمكن أن نوضح
التشابه البياني مقارنة أفضل من
نقطة معينة بصورة خطية

2 كتابة المعادلات لحل المسائل المثال 6 بوضح كيفية حل مسألة من الحياة اليومية باستخدام معادلة خطية.

مثال إضافي

6 تكاليف الإيجار يفرض مجمع شقق سكنية مبلغاً قدره 525 AED في الشهر بالإضافة إلى 750 AED كرسوم للصيانة السنوية.

a. اكتب معادلة تمثل إجمالي تكاليف العام الأول المتمثلة بالحرف A لعدد r من شهور الإيجار.

$$A = 525r + 750$$

b. قارن تكلفة الإيجار السابقة بمجمع آخر يفرض رسماً يبلغ 200 AED كمصاريف للصيانة السنوية بخلاف رسم إيجار شهري يبلغ 600 AED. وإذا كان أحد الأشخاص يتوقع أن يقيم في شقة سكنية لمدة عام واحد، فأي المجمعين يقدم سعراً أفضل؟ المجتبع الأول هو الذي يقدم سعراً أفضل. تبلغ تكلفة العام الواحد 7050 AED مقابل 7400 AED للمجمع الثاني.

التركيز على محتوى الرياضيات


معادلات المستقيمات يمكن كتابة معادلة مستقيم بطرق عديدة مختلفة. فبممكن كتابة صيغة الميل والنقطة من خلال أي نقطة يمر عبرها المستقيم، أو يمكن استخدام صيغة الميل والمقطع. وتكون هذه المعادلات متكافئة باستخدام الخواص الجبرية للتساوي.

إجابة إضافية (تمرين موجه)

$$6. C = 0.05t + 39.95, C = 0.02t + 44$$

بالنسبة لعدد 135 رسالة، الأسعار متساوية. أما بالنسبة لأقل من 135 رسالة، فعرض مازن الحالي يقدم السعر الأدنى. وبالنسبة لعدد أكبر من 135 رسالة، فالعرض البديل يقدم السعر الأدنى.

تكلفة الرسائل النصية




3 التمرين

التقويم التكويني


استخدم التمارين من 1 إلى 12 للتحقق من استيعاب الطلاب.
استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

إجابات إضافية


1. $y = 4x - 3$



2. $y = \frac{1}{2}x - 1$



3. $y = -\frac{2}{3}x + 5$



4-6. انظر ملحق إجابات الوحدة 11 للاطلاع على التمثيلات البيانية.

4. $y + 2 = 5(x - 3)$

5. $y + 3 = \frac{1}{4}(x + 2)$

6. $y - 6 = -4.25(x + 4)$

7. $y = \frac{5}{4}x - 1$

8. $y = 3x - 9$

9. $y = \frac{9}{7}x - \frac{19}{7}$

التحقق من فهمك

مثال 1 اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع للمستقيم ذي الميل المعطى والتقاطع مع المحور y . ثم مثل المستقيم بيانياً. 1-3. انظر الهامش.

1. $m: 2$. التقاطع مع المحور y : -1

2. $m: 4$. التقاطع مع المحور y : -3

3. $m: -\frac{2}{3}$. التقاطع مع المحور y : 5

مثال 2 اكتب معادلة بصيغة الميل والنقطة للمستقيم ذي الميل المعطى الذي يحتوي على النقطة المعطاة. ثم مثل المستقيم بيانياً. 4-6. انظر الهامش.

4. $m = 5$, $(3, -2)$

5. $m = -\frac{1}{4}$, $(-2, -3)$

6. $m = -4.25$, $(-4, 6)$

المثالان 3 و 4 اكتب معادلة للمستقيم المار بكل زوج من النقاط بصيغة الميل والمقطع. 7-9. انظر الهامش.

x	y
0	-1
4	4

x	y
4	3
1	-6

x	y
6	5
-1	-4

مثال 5 10. اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع للمستقيم العمودي على $y = -2x + 6$ حيث يحتوي على $(3, 2)$.

11. اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع للمستقيم المتوازي مع $y = 4x - 5$ حيث يحتوي على $(-1, 5)$.

مثال 6 12. استخدام النماذج: تشترك ياسمين حالياً في النور للصوتيات. وهي خدمة موسيقى على الإنترنت، ولكنها تفكر في التغيير إلى خدمة أخرى على الإنترنت، وهي البركة للصوتيات. موضح العرض المقدم لكل خدمة موسيقى على الإنترنت.

a. اكتب معادلة لتمثيل التكلفة الشهرية الإجمالية لكل عرض.

b. مثل المعادلات بيانياً. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

c. إذا قامت ياسمين بتنزيل 15 أغنية في الشهر، فهل عليها عدم تغيير عرضها الحالي. أم عليها التغيير إلى العرض الآخر؟ اشرح.

يجب عليها التغيير إلى العرض الآخر. فهي ستدفع AED 16.85 في الشهر من خلال عرضها الحالي و AED 10 في الشهر من خلال العرض الآخر.

التمرين وحل المسائل

مثال 1 اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع للمستقيم ذي الميل المعطى والتقاطع مع المحور y أو التقاطع. ثم مثل المستقيم بيانياً. 13-18. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

13. $m: -5$. التقاطع مع المحور y : -2

14. $m: -7$, $b: -4$

15. $m: 9$, $b: 2$

16. $m: 12$. التقاطع مع المحور y : $\frac{4}{5}$

17. $m: -\frac{3}{4}$, $(0, 4)$

18. $m: \frac{5}{11}$, $(0, -3)$

مثال 2 اكتب معادلة بصيغة الميل والنقطة للمستقيم ذي الميل المعطى الذي يمر بالنقطة المعطاة. ثم مثل المستقيم بيانياً. 19-24. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

20. $m = 4$, $(-4, 8)$

21. $m = -7$, $(1, 9)$

19. $m = 2$, $(3, 11)$

23. $m = -\frac{4}{5}$, $(-3, -6)$

24. $m = -2.4$, $(14, -12)$

22. $m = \frac{5}{7}$, $(-2, -5)$

26. $(2, -1)$ و $(2, 6)$ $x = 2$

28. $(0, 5)$ و $(3, 3)$ $y = -\frac{2}{3}x + 5$

30. $(2, 4)$ و $(-4, -11)$ $y = \frac{3}{2}x - 1$

25. $(-1, -4)$ و $(3, -4)$ $y = -4$

27. $(-3, -2)$ و $(-3, 4)$ $x = -3$

29. $(-12, -6)$ و $(8, 9)$ $y = \frac{3}{4}x + 3$

672 | الدرس 11-4 | معادلات المستقيمات


خيارات الواجب المنزلي المتمايزة

المستوى	الواجب	خيار اليومين
AL متدني	13-42, 56-73	31-14, 60-63
OL أساسي	31-14, 53, 56-73	41-24, 56-59, 64-73
BL متقدم	43-69, 70-73 (اختياري)	43-54, 56-59, 64-73

إجابة إضافية


41b.

تكلفة حفل التخرج




معادلة بصيغة الميل والمقطع لكل مستقيم موضع أو موصوف.

31.



$$y = -\frac{10}{3}x + \frac{38}{3}$$



$$y = 5$$

33.

x	-1	3
y	-2	4

$$y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$

34.

x	-4	-8
y	-5	-13

$$y = 2x + 3$$

35. الخط من المحور $x = 3$ والخط من المحور $y = -2$ 36. الخط من المحور $x = -\frac{1}{2}$ والخط من المحور $y = 4$ 37. الخط من المحور $x = 3$ والخط من المحور $y = -2$

اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع لكل مستقيم موضع.

37. يمر بالنقطة $(-7, -4)$ وعمودي على $y = \frac{1}{2}x + 9$ $y = -2x - 18$

38. يمر بالنقطة $(-1, -10)$ ومتوازي مع $y = 7$ $y = -10$

39. يمر بالنقطة $(6, 2)$ ومتوازي مع $y = -\frac{2}{3}x + 1$ $y = -\frac{2}{3}x + 6$

40. يمر بالنقطة $(-2, 2)$ وعمودي على $y = -5x - 8$ $y = \frac{1}{5}x + \frac{12}{5}$

41. التخطيط لحفل سهل لطلاب الصف الأخيرة ولحفظ لاستئجار غرفة اجتماعات في مركز المؤتمرات وهي تكلف 400 AED ويتم فرض رسم إضافي بقيمة 5.50 AED لكل شخص يحضر الحفل.

a. اكتب معادلة للتنبؤ عن تكلفة الحفل إذا حضر عدد x من الناس $y = 5.5x + 400$

b. مثل المعادلة بيانياً. انظر الهامش.

c. يوجد 285 شخصاً في صف سهل، فإذا حضر $\frac{2}{3}$ من هؤلاء الناس، فكم سيتكلف الحفل؟ 1445 AED

d. إذا جمع صف طلاب التخرج مبلغ 2000 AED لصالح الحفل، فكم من الأشخاص يمكنهم الحضور؟ 290


42. استخدام النماذج بدخر يوسف بدخر أمواله لشراء راديو جديد عالت عبر الأرقام الصناعية لسيارته، وبلغت في ادجار مالي كالم للراديو والاشتراك لمدة سنة واحدة من خدمة راديو الأرقام الصناعية قبل أن يتم صفقة الشراء. وبدأ في الادجار لشراء الراديو مبلغ 50 AED من المال المخصص للتخرج. ومنذ هذا الحين، ظل يضيف 15 AED كل أسبوع بعد صرف شيك راتبه.

a. اكتب معادلة للتنبؤ مدخرات يوسف t بعد عدد x أسابيع. $y = 15x + 50$

b. مثل المعادلة بيانياً. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

c. كم من الوقت سيستغرقه يوسف لادجار 150 AED؟ 7 أسابيع

d. يكلف راديو الأرقام الصناعية 180 AED وخدمة الفهر الصناعي تكلف 10 AED لكل شهر. إذا بدأ يوسف في الادجار منذ أسبوعين، فكم من الوقت الإضافي سيستغرقه لادجار مالي كالم؟ الشرح. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.



43. متوازي مع $y = 2x - 3$ p

44. عمودي على $y = \frac{1}{2}x + 7$ q

45. متوازي مع ولكن ليس عمودياً على $y = \frac{1}{2}x - 5$ r و p و q

حدد ما إذا كانت المستقيمات متوازية، أو متعامدة.

أو ليست أيًا منهما. 48. متعامدة

46. $y = 2x + 4$, $y = 2x - 10$ متوازية

47. $y = -\frac{1}{2}x - 12$, $y = 2x + 7$ متعامدة

48. $y - 4 = 3(x + 5)$, $y + 3 = -\frac{1}{3}(x + 1)$ 49. $y - 3 = 6(x + 2)$, $y + 3 = -\frac{1}{3}(x - 4)$ لا هذا ولا ذلك

في التمرين 54، يستخدم الطلاب جدولاً ومعادلة جبرية وتمثيلاً بيانياً ووصفاً لفظياً لاستكشاف مسائل من الحياة اليومية يمكن تمثيلها بمعادلة خطية.


تحليل الخطأ في التمرين 58.
يتعين على الطلاب أن يدركوا أنه في حالة كتابة ميساء لمعادلتها في أبسط صورة، فإنها ستكون مطابقة لإجابة أماني. ذكر الطلاب الميل والمقطع وصيغة الميل والمقطع ينتج عنهما صيغ متكافئة لمعادلة المستقيم.

54a.	المستقيم q $y = 3x + 2$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>-3</td><td>-7</td></tr> <tr><td>-2</td><td>-4</td></tr> <tr><td>-1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td></tr> <tr><td>3</td><td>11</td></tr> </tbody> </table>	x	y	-3	-7	-2	-4	-1	-1	0	2	1	5	2	8	3	11	المستقيم r $y = 0.5x - 3$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>-3</td><td>-4.5</td></tr> <tr><td>-2</td><td>-4</td></tr> <tr><td>-1</td><td>-3.5</td></tr> <tr><td>0</td><td>-3</td></tr> <tr><td>1</td><td>-2.5</td></tr> <tr><td>2</td><td>-2</td></tr> <tr><td>3</td><td>-1.5</td></tr> </tbody> </table>	x	y	-3	-4.5	-2	-4	-1	-3.5	0	-3	1	-2.5	2	-2	3	-1.5
x	y																																	
-3	-7																																	
-2	-4																																	
-1	-1																																	
0	2																																	
1	5																																	
2	8																																	
3	11																																	
x	y																																	
-3	-4.5																																	
-2	-4																																	
-1	-3.5																																	
0	-3																																	
1	-2.5																																	
2	-2																																	
3	-1.5																																	
	المستقيم s $2y = x - 6$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>-3</td><td>-4.5</td></tr> <tr><td>-2</td><td>-4</td></tr> <tr><td>-1</td><td>-3.5</td></tr> <tr><td>0</td><td>-3</td></tr> <tr><td>1</td><td>-2.5</td></tr> <tr><td>2</td><td>-2</td></tr> <tr><td>3</td><td>-1.5</td></tr> </tbody> </table>	x	y	-3	-4.5	-2	-4	-1	-3.5	0	-3	1	-2.5	2	-2	3	-1.5	المستقيم t $y = 3x - 3$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>-3</td><td>-12</td></tr> <tr><td>-2</td><td>-9</td></tr> <tr><td>-1</td><td>-6</td></tr> <tr><td>0</td><td>-3</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	x	y	-3	-12	-2	-9	-1	-6	0	-3	1	0	2	3	3	6
x	y																																	
-3	-4.5																																	
-2	-4																																	
-1	-3.5																																	
0	-3																																	
1	-2.5																																	
2	-2																																	
3	-1.5																																	
x	y																																	
-3	-12																																	
-2	-9																																	
-1	-6																																	
0	-3																																	
1	0																																	
2	3																																	
3	6																																	

674 | الدرس 11-4 | معادلات المستقيمات

Scanned by CamScanner

60. أي شكل بياني هو أفضل تمثيل للمستقيم المار عبر النقطة $C(-2, -3)$ ؟




مراجعة شاملة

حدد ميل المستقيم الذي يمر بالنقاط التالية.


66. $A(2, 5), B(5, 1) \rightarrow \frac{4}{3} = -1.3$

أوجد x و y في كل شكل.
 $x = 16, y = 8.7$



64. $J(4, 3), K(5, -2) \rightarrow -5$

65. $M(0, 2), N(-3, -4) \rightarrow 2$




67. $x = 3, y = 26.33$

69. القيادة بدع منزل وفاء في منتصف المسافة بين محطة الغاز "نومان" ومحطة الغاز "أوراما". وتقع محطة الغاز "نومان" على بعد ربع كيلو متر من منزل وفاء، فكم تبعد محطة الغاز "أوراما" عن منزل وفاء؟ وكم تبعد محطة الغاز "نومان" عن بعضهما؟
محطة غاز "أوراما" تقع أيضاً على بعد ربع كيلو متر من منزل وفاء، وتبعد المحطتان مسافة نصف كيلو متر عن بعضهما.

مراجعة المهارات

- حدد العلاقة بين كل زوج من الزوايا.
- 70. $\angle 1$ و $\angle 12$ خارجية متبادلة
- 71. $\angle 7$ و $\angle 10$ داخلية متتالية
- 72. $\angle 4$ و $\angle 8$ متناظرة
- 73. $\angle 2$ و $\angle 11$ خارجية متبادلة



التدريس المتمايز

التوسع كلف الطلاب بتحديد موقف به معادلة ربح ومعادلة إنفاق، وتمثيل كل معادلة بيانياً على نفس الشبكة، وتسمى نقطة تقاطع المستقيمين باسم "نقطة التعادل". فعلى سبيل المثال، في محل عصير عمر، يربح عمر 0.25 AED لكل كوب يُباع من عصير الليمون، وتبلغ نفقاته 2.50 AED للإبريق و 0.05 AED لكل كوب عصير يصنعه. مثل بيانياً المعادلتين $y = 0.25x$ و $y = 0.05x + 2.5$. ونشير نقطة التقاطع $(12.5, 3.125)$ إلى أنه يتعين على عمر أن يبيع ما لا يقل عن 13 كوباً من عصير الليمون لكل إبريق لكي يحقق ربحاً.

4 التقويم

حصاد الأمس كلف الطلاب بكتابة كيف ساعدهم درس الأمس عن ميول المستقيمات في تعلم كتابة معادلات مستقيمات، وعليهم أن يعطوا ما لا يقل عن مثالين يدعمان استنتاجاتهم.

إجابات إضافية

54c. الإجابة النموذجية: قارن بين ميول المستقيمات ونقاط تقاطعها مع المحور الرأسي y . فالمستقيم q له ميل بمقدار 3 وتقاطع مع المحور الرأسي y عند -2. والمستقيم r له ميل يبلغ 0.5 وتقاطع مع المحور الرأسي y عند -3. والمستقيم s له ميل يبلغ 0.5 وتقاطع مع المحور الرأسي y عند -3. والمستقيم t له ميل قيمته 3 وتقاطع مع المحور الرأسي y عند -3. وبما أن المستقيمين q و r لهما درجة ميل مختلفة والمستقيمين r و t لهما درجة ميل مختلفة، وكل زوج من المستقيمات يتقاطعان، إذا فكل نظام معادلات ذي صلة يكون له حل واحد. وبما أن المستقيمين q و t لهما نفس درجة الميل ولكنهما مختلفتان في تقاطعهما مع المحور الرأسي y ، والمستقيمان متوازيان. إذا فإن نظام المعادلات ذا الصلة لا يوجد له حلول. وبما أن المستقيمين r و s لهما نفس درجة الميل ونفس التقاطع مع المحور الرأسي y ، والمستقيمان متطابقان، إذا فإن نظام المعادلات ذا الصلة له حلول لا نهاية لها.



54d. الإجابة النموذجية: نظام المعادلات ذو الحل الواحد سيكون له زوج مرتب واحد فقط مشترك في كل جدول من جداول القيم. وتمثيل بياني للمستقيمات المتقاطعة. ومعادلات ذات ميول مختلفة. أمّا نظام المعادلات الذي ليس له حلول فلن يكون له أي أزواج مرتبة مشتركة في كل جدول من جداول القيم. وتمثيل بياني للمستقيمات المتوازية. ومعادلات ذات ميول واحدة، ولكنها تختلف في تقاطعها مع المحور الرأسي y . أمّا نظام المعادلات ذو الحلول اللانهائية سيكون له جداول قيم متطابقة. وتمثيل بياني للمستقيمات المتطابقة. ومعادلات لها نفس الميول ونفس التقاطع مع المحور الرأسي y .



مختبر الهندسة معادلات المُنصفَات العمودية

يمكن تطبيق ما تعلمته من السبل ومعادلات المستقيمات على الأشكال الهندسية على أحد المستويات

الأنشطة



أوجد معادلة مستقيم يكون المنصف العمودي على القطعة المستقيمة AB ذات النقطتين الطرفيتين $A(-3, 3)$ و $B(4, 0)$.

الخطوة 1 صمم لصيغة مستقيمة يحتوي على نقطة المنصف للقطعة المستقيمة. استخدم قانون نقطة المنصف لإيجاد نقطة المنصف M في $\overline{AB}$.

$$M\left(\frac{-3+4}{2}, \frac{3+0}{2}\right) = M\left(\frac{-3+4}{2}, \frac{3+0}{2}\right) = M\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

الخطوة 2 صمم معادلي معادلتين على القطعة المستقيمة عبر نقطة المنصف ومن أجل إيجاد ميل المنصف. أوجد $\overline{AB}$ ميل $\overline{AB}$.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{قانون الميل}$$

$$= \frac{0 - 3}{4 - (-3)} = \frac{-3}{7} = -\frac{3}{7}$$

الخطوة 3 الآن استخدم صيغة السبل والنقطة لكتابة معادلة المستقيم. ميل المنصف هو $-\frac{3}{7}$ حيث $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{2}$.

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{صيغة السبل والنقطة}$$

$$y - \frac{3}{2} = -\frac{3}{7}\left(x - \frac{1}{2}\right) \quad \text{استخدم } \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \text{ و } m = -\frac{3}{7}$$

$$y - \frac{3}{2} = -\frac{3}{7}x + \frac{3}{14} \quad \text{خارجية البواقي}$$

$$y = -\frac{3}{7}x + \frac{3}{14} + \frac{3}{2} \quad \text{اجمع: } \frac{3}{14} + \frac{3}{2} = \frac{21}{14} = \frac{3}{2}$$

تدريبات

أوجد معادلة مستقيم يكون المنصف العمودي $\overline{PQ}$ بالنسبة للنقاط الطرفية المعطاة.

1. $P(5, 2), Q(7, 4) \quad y = -x + 9$

3. $P(-5, -1), Q(8, 7) \quad y = \frac{7}{4}x + \frac{19}{4}$

5. $P(0, 1.6), Q(0.3, 2.1) \quad y = -x + 2.1$

2. $P(-3, 9), Q(-1, 5) \quad y = \frac{1}{2}x + 8$

4. $P(-2, 1), Q(0, -3) \quad y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$

6. $P(-7, 3), Q(3, 3) \quad x = -1$

7. تحدّ أوجد معادلات المستقيمتين التي تحتوي على أصلاً XYZ و الرؤوس $X(-2, 0)$ و $Y(1, 3)$ و $Z(3, -1)$.

$$y = x + 2; y = -2x + 5; y = -\frac{1}{5}x - \frac{2}{5}$$

1 التركيز

الهدف استكشاف الأشكال على مستوى إحداثي

المواد الخاصة لكل مجموعة ورفق مربعات

وسائل تعليمية يدوية سهلة التشكيل

فوائد تدريس الهندسة بواسطة الوسائل التعليمية اليدوية الخاصة بـ

ورق نشيل بياني. ح. 1

2 التدريس

العمل بصورة مستقلة

يستطيع الطلاب العمل على هذا النشاط بشكل فردي أو في مجموعات ثنائية ذات قدرات متنوعة. اطلب منهم القراءة عبر النشاط.

بعد قراءتهم للنشاط. ناقش معهم الخطوات المطلوبة لإيجاد المنصف العمودي. اسألهم عن سبب ضرورة إيجاد نقطة المنصف للقطعة المستقيمة المعطاة وكذلك ميلها. اجعلهم يشرحوا ما إذا كان ترتيب الخطوات 1 و 2 مبنياً أم لا.

تدريبات اطلب من الطلاب إتمام التمارين من 1 إلى 7.

3 التقييم

التقييم التكويني

استخدم التمارين من 1 إلى 7 لتقييم مدى استيعاب الطلاب لطريقة كتابة معادلة والنشيل البياني لمستقيم بعد مستقيماً عمودياً.

من العملي إلى النظري

أخبر الطلاب أن يكشوا عن هذا النشاط. مستخدمين كلماتهم وأمثلتهم الخاصة. اطلب منهم تحديد المنصف العمودي وشرح الخطوات. مع رسومات تخطيطية. لطريقة كتابة معادلة ورسم نشيل بياني لمنصف عمودي.

11-5 إثبات توازي المستقيمتين

الدرس 11-5

1 التركيز

التخطيط الرأسي

الدرس 11-5 استخدام ميول المستقيمتين لتحديد المستقيمتين المتوازيين والمتعامدة.

الدرس 11-5 التعرف على العلاقات بين الزوايا الناتجة عن قطع مستقيمتين متوازيين من خلال قاطع. استخدام العلاقات بين الزوايا لإثبات توازي المستقيمتين.

بعد الدرس 11-5 إيجاد المسافة بين مستقيمتين متوازيين والمسافة بين مستقيم ونقطة.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

كلف الطلاب بقراءة القسم لماذا؟ الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

لماذا تم إنشاء جانبي المسار متوازيين عند جميع النقاط؟ الإجابة النموذجية: لن تتمكن السيارات من التحرك بأمان على المسار إذا لم يكن الجانبان متوازيين.

إذا كان أحد الضخبان الداعمة التي تربط جانبي المسار متعامداً على أحد جانبي المسار. فما قياس الزاوية المتكوّنة من هذا الضخيب والجانب الآخر من المسار؟ 90°

لماذا؟

الحالي

السابق


عندما نرى قضبان لعبة الأفعوانية، نلاحظ أن طرفي القضبان واقفاً على نفس المسافة. وهذا بالرغم من أن القضبان منحرف وشعطف. فالقضبان مبنية بعناية لتكون متوازية على كل النقاط بحيث تكون العربة ثابتة على القضبان.

1 التعرف على أرجح الزوايا التي تتكوّن مع المستقيمتين المتوازيين.
2 إثبات أن مستقيمتين متوازيين

الاستخدام الميول لتحديد المستقيمتين المتوازيين والمتعامدة.

1 تحديد المستقيمتين المتوازيين طرفاً قضبان لعبة الأفعوانية متوازيين. وكل الدعائم على طول القضبان هي أيضاً متوازية. وكل زاوية من الزوايا المشكلة بين القضبان والدعائم هي زاوية متناظرة. وقد عرفنا أن الزوايا المتناظرة تكون متطابقة عندما تكون المستقيمتان متوازيين. ومعكوس هذه العلاقة صحيح أيضاً.

المسألة 11.4 معكوس الزوايا المتناظرة



إذا قطع مستقيمتان بواسطة قاطع بحيث تكون الزوايا المتناظرة متطابقة، إذا فالمستقيمتان متوازيان.

أمثلة إذا كان $\angle 3 \cong \angle 1$ ، $\angle 2 \cong \angle 4$ ، $\angle 5 \cong \angle 7$ ، $\angle 6 \cong \angle 8$. فإن $a \parallel b$.

معكوس مسألة الزوايا المتناظرة يمكن استخدامها لإنشاء مستقيمتين متوازيين.

الإنشاء مستقيم متوازٍ عن طريق نقطة ليست موجودة على المستقيم

الخطوة 1 ارسم مستطراً نقوياً لرسم $\overleftrightarrow{AB}$. وارسم النقطة C بحيث لا تكون على $\overleftrightarrow{AB}$ وارسم $\overleftrightarrow{CA}$.	الخطوة 2 انسخ $\angle CAB$ بحيث تكون C هي رأس الزاوية الجديدة. وستة نقاط التقاطع بالحرفين E و D.	الخطوة 3 ارسم $\overleftrightarrow{CD}$. ولأن $\angle ECD \cong \angle CAB$ حسب معطيات الشكل وهما زاويتان متناظرتان. فإن $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$.
--	---	--


1 تحديد المستقيمتين المتوازيتين
المثالان 1 و 2 يوضحان طريقة تحديد توازي المستقيمتين. ويتعين على الطلاب أن يكونوا قادرين على استخدام النظريات والمسلمات المعروفة لتحديد المستقيمتين المتوازيتين.

التقويم التكويني

استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين موجّه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمعاهيم.

مثال إضافي

1 بعد إعطائك المعلومات التالية. هل من الممكن إثبات أن $a \parallel b$ من المستقيمتين الموضحة متوازيتين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فحدّد المسألة أو النظرية التي تثبت صحة إجابتك.



a. $\angle 1 \cong \angle 3$ $a \parallel b$ حسب معكوس نظرية الزوايا المناظرة

b. $m\angle 4 = 100$ و $m\angle 1 = 103$ a ليس متوازيًا مع c حسب معكوس نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة

ثبت الشكل أن هناك مستقيم واحد على الأقل يمر عبر النقطة C ومتوازي مع AB . وتؤكد المسألة التالية أن هذا المستقيم هو المستقيم الوحيد.

نصيحة دراسية

مسلمات إقليدس أدرك إقليدس (أو الهندسة الحديثة، حوالي 300 ق.م) أنه لا بد من سوى القليل من المسلمات لإثبات النظريات في أبهى المسلمات 11.5 هي إحدى مسلمات إقليدس الأصلية الخمسة.

المسألة 11.5 مسلمة المتوازيات


لديك مستقيم ونقطة ليست على هذا المستقيم. إذا هناك بالضبط مستقيم واحد يمر بالنقطة موازي للمستقيم المعطى.

المستقيمان المتوازيان اللذان يقطعهما قاطع يُشكّلان أزواجًا متعددة من الزوايا المتطابقة. ويمكن استخدام هذه الزوايا الخاصة أيضًا من أجل إثبات أن زوجًا من المستقيمتين متوازي.

نظريات إثبات توازي المستقيمتين

11.5 معكوس الزوايا الخارجية المتبادلة


إذا قُطِعَ مستقيمان على مستوى بواسطة قاطع بحيث يكون زوج من الزوايا الخارجية المتبادلة الخارجية متطابقًا، فإن المستقيمتين متوازيتان.



إذا كان $\angle 1 \cong \angle 3$ ، $p \parallel q$

11.6 معكوس الزوايا الداخلية المتبادلة


إذا قُطِعَ مستقيمان على مستوى بواسطة قاطع بحيث يكون زوج من الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقًا، فإن المستقيمتين متوازيتان.



إذا كان $m\angle 4 + m\angle 5 = 180$ ، $p \parallel q$

11.7 معكوس الزوايا الداخلية المتبادلة


إذا قُطِعَ مستقيمان في مستوى بواسطة قاطع بحيث يكون زوج من الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقًا، فإن المستقيمتين متوازيتان.



إذا كان $\angle 6 \cong \angle 8$ ، $p \parallel q$

11.8 معكوس القاطع العمودي


في مستوى، إذا كان مستقيمان عموديين على المستقيم نفسه، فإنهما متوازيتان.



إذا كان $p \perp r$ ، $q \perp r$ ، $p \parallel q$

ثبت النظريات 11.5 و 11.6 و 11.7 و 11.8 في التمارين 6 و 23 و 31 و 30 على الترتيب.

مثال 1 تحديد المستقيمتين المتوازيتين



بناءً على المعلومات التالية، حدد أي المستقيمتين، إن وجدت، متوازيتين. اذكر المسألة أو النظرية التي تعمل إجابتك.

a. $\angle 1 \cong \angle 6$

$\angle 1$ و $\angle 6$ هما زاويتان خارجيتان متبادلتان على المستقيمتين l و n . بما أن $\angle 1 \cong \angle 6$ ، فإن $l \parallel n$ بناءً على معكوس نظرية الزوايا الخارجية المتبادلة.

b. $\angle 2 \cong \angle 3$


$\angle 2$ و $\angle 3$ هما زاويتان داخليتان متبادلتان على المستقيمتين m و l . بما أن $\angle 2 \cong \angle 3$ ، فإن $l \parallel m$ بناءً على معكوس نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة.

إرشاد للمعلمين الجدد

الاستنتاج شجّع الطلاب على تكوين روابط مع المفاهيم السابقة من خلال مقارنة النظريات والمسلمات الواردة في هذا الدرس بتلك الموجودة في الدرس 11-2. اطلب من الطلاب أن يشرحوا أي روابط في المنطق الذي يحدونه.

مثال إضافي

2 تمرين على الاختبار المعياري
أوجد $m\angle ZYN$ حيث إن
 $\overline{PO} \parallel \overline{MN}$. اكتب الحل هنا.




$$x = 15, m\angle ZYN = 140$$

التركيز على محتوى الرياضيات

الاستنتاج يعتقد العديد من الطلاب أن المسلمات والنظريات الموجودة في هذا الدرس هي نفسها الموجودة في الدرس 11-2. ساعدهم في التركيز على الاختلاف الموجود؛ ففي هذا الدرس **سيستنتجون** أن المستقيمتين متوازيتين (العبارة إذا). بينما كانوا في الدرس 11-2 **يبدؤون** بنوازي المستقيمتين (العبارة إذا كان).

التدريس باستخدام التكنولوجيا

كاميرا المستندات اعرض على الطلاب متوازي أضلاع على مستوى إحداثي. وحدّد اتجاهه بحيث لا يكون أي ضلع من الأضلاع عبارة عن قطعة مستقيمة أفقية أو رأسية. أخبر الطلاب أن عليهم إثبات نوازي الأضلاع المتقابلة في الشكل. اختر أربعة طلاب. واطلب من كل واحد منهم إيجاد ميل أحد أضلاع الشكل ثم اختر طالباً آخر لشرح كيف تثبت هذه الميول نوازي الأضلاع المتقابلة.



$$1A. \angle 2 \cong \angle 8$$

$$1B. \angle 3 \cong \angle 11$$

$$1C. \angle 12 \cong \angle 14$$

$$1D. \angle 1 \cong \angle 15$$


$$1E. m\angle 8 + m\angle 13 = 180$$

$$1F. \angle 3 \cong \angle 6$$

يمكن استخدام العلاقات الزاوية بين أجل حل المسائل التي تشمل قياساً مجهولاً.

استخدام علاقات الزوايا

أوجد قيمة x باستخدام العلاقات الزاوية بين $a \parallel b$ حيث يكون $m\angle MRO = 5x + 7$ و $m\angle RPN = 7x - 21$.



قراءة فترة الاختبار

من الشكل، اشرح أن $m\angle MRO = 5x + 7$ و $m\angle RPN = 7x - 21$. والمطلوب منك هو إيجاد قياس $\angle MRO$.

حل فترة الاختبار

$\angle MRO$ و $\angle RPN$ هما زاويتان داخلية متبادلتان. ويكون المستقيمتان a متوازيين. ينبغي أن تكون الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة. لذا $\angle MRO \cong \angle RPN$. وبحسب تعريف التطابق، فإن $m\angle MRO = m\angle RPN$. أدرج قياسات الزوايا المعطاة في هذه المعادلة وأوجد قيمة x .

$$m\angle MRO = m\angle RPN$$

$$5x + 7 = 7x - 21$$

$$7 = 2x - 21$$

$$28 = 2x$$

$$14 = x$$

زاوية المتبادلة

التعويض

أضرب 2 من كل طرف.

أضرب 2 من كل طرف.

أضرب 2 من كل طرف.

والآن، استخدم قيمة x لإيجاد $\angle MRO$.

$$m\angle MRO = 5x + 7$$

$$= 5(14) + 7$$

$$= 77$$

التعويض

$$x = 14$$


نتيجة

التحقق راجع إجابتك باستخدام قيمة x لإيجاد $\angle RPN$.

$$m\angle RPN = 7x - 21$$

$$= 7(14) - 21 = 77$$

$$\checkmark \angle MRO \cong \angle RPN \parallel b, m\angle MRO = m\angle RPN$$



2. أوجد y بحيث يكون $e \parallel f$. اكتب الحل هنا.

20

- 1A. $\angle 2 \cong \angle 8$ متطابقة
- 1B. $\angle 3 \cong \angle 11$ نظرية الزوايا الداخلية
- 1C. $\angle 12 \cong \angle 14$ متطابقة
- 1D. $\angle 1 \cong \angle 15$ نظرية الزوايا الخارجية
- 1E. $m\angle 8 + m\angle 13 = 180$ متطابقة
- 1F. $\angle 3 \cong \angle 6$ نظرية الزوايا الخارجية
- 2. غير ممكن
- 3. $m\angle 1 \cong m\angle 2$ نظرية الزوايا الداخلية
- 4. $\angle 1 \cong \angle 2$ نظرية الزوايا الخارجية
- 5. غير ممكن

نصحة دراسية

إيجاد ما هو مطلوب
لقد مررنا بإحدى فترات اختبار
أحدنا. نلاحظ أن
مستوى السؤال المتطوع
من المثال 2 قد يكون من
أحد الأسئلة المتوقعة بعد
وحدات 1 و 2. والتأكد من
أن المسألة هي 14

صاحب النمط المنطقي كلف الطلاب بأن يرسموا مستقيمتين يقطعهما قاطع بمعابر معينة معطاة قياس الزاوية. ويمكن للطلاب أن يعملوا معاً في مجموعات صغيرة من 3 أو 4 لمناقشة مدى ضرورة أن يكون المستقيمتان متوازيين. أدّر النقاش بحيث يميّز الطلاب حقيقة إمكانية وجود قياسات زوايا عند نوازي مستقيمتين تعوق تلك التي تنشأ عندما لا يكون هناك نوازي.

مثال إضافي

إجابة إضافية (تمرين موجّه)

إجابات إضافية

- 2

2014-2015

نصرانی ہو گئے

التحقق من فهمك

1.

- 2.
- $\sqrt{2}$

3. $\sqrt{2}$ 680 | الفصل 5 | إشارات نماذج المستطيمات

التدريس المتمايز OL BL

680 | الدرس 11-5 | إثبات توازي المستقيمات

3 التمرين

التقويم التكويني

استخدم التمارين 1-7 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

إجابات إضافية

8. $a \parallel b$: الزوايا المتناظرة متطابقة.

إذا فالمستقيمان متوازيان.

9. $a \parallel b$: الزوايا الخارجية المتبادلة

متطابقة. إذا فالمستقيمان متوازيان.

10. $a \parallel b$: الزوايا الداخلية المتبادلة

متطابقة. إذا فالمستقيمان متوازيان.

11. $k \parallel j$: الزوايا الداخلية الموجودة

على نفس الجانب من القاطع

متكاملة. إذا فالمستقيمان متوازيان.

12. $a \parallel b$: الزوايا الداخلية الموجودة

على نفس الجانب من القاطع

متكاملة. إذا فالمستقيمان متوازيان.

13. $c \parallel d$: الزوايا الداخلية المتبادلة

متطابقة. إذا فالمستقيمان متوازيان.

14. معلومات غير كافية لإثبات وجود أي

مستقيمان متوازيين.

15. $c \parallel d$: الزوايا المتناظرة متطابقة.

إذا فالمستقيمان متوازيان.

22. جوانب إطار الباب ستكون

متوازية. والزوايا المتكوّنة بواسطة

هذه الجوانب مع الحافة العلوية

سواء 90° . وإذا كان المستقيمان

متعامدين على نفس المستقيم.

فحينها سيكونان متوازيين.




7. إنشاء حل من الممكن إثبات أن المقاعد على طاولة الرحلات هذه موازية لبعضها البعض. فإذا كان الأمر كذلك، فاشرح وإن لم يكن، فاشرح له.

نعم، هذا ممكن. وقد يكون أحد التفسيرات المحتملة هو قياس الزوايا المتكوّنة بواسطة الإطار والمقاعد. فإذا كانت بالقياس نفسه (90°) على كلا الجانبين، فإن المقاعد متوازية.

حل المسائل

بناءً على المعلومات التالية، حدد أي المستقيمتين، إن وجدت، متوازية. اذكر المسألة أو النظرية التي تعمل إجابتك. 8-15. انظر الهامش.



8. $\angle 8 \cong \angle 11$

9. $\angle 8 \cong \angle 12$

10. $\angle 3 \cong \angle 5$

11. $m\angle 2 + m\angle 12 = 180$







12. $m\angle 4 + m\angle 5 = 180$

13. $\angle 6 \cong \angle 10$


14. $\angle 1 \cong \angle 9$

15. $\angle 6 \cong \angle 8$

أوجد x بحيث يكون $m \parallel n$. حدد المسألة أو النظرية التي استخدمتها. 16-21. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.



22. إطارات خشبية غالباً ما يتم تصنيع إطارات الأبواب الخشبية باستخدام صندوق أو منشار مخصص لعمل أسطح مشطوية زاوية. وهاتان الأداتان تسمحان لك بالقطع بزواوية ذات قياس محدد. فإذا كانت كل قطعة من القطع الثلاث من مواد التأطير قد قطعت بزواوية قياس 45° . فهل سيكون جانبا إطار الباب متوازيين؟ اشرح استنتاجك. انظر الهامش.



23a. $\angle 1$ و $\angle 2$

متكاملتان.

23c. $\angle 2$ و $\angle 3$

متكاملتان.

23e. معكوس مسلمة

الزوايا Δ .

المتناظرة.

23. الإثبات انسج وأكمل إثبات النظرية 11.6.

المعطيات: $\angle 1$ و $\angle 2$ متكاملتان.

المطلوب: $\ell \parallel m$

البرهان:

المعطيات	البرهان
a. المعطيات	a. $\angle 1$ و $\angle 2$ متكاملتان
b. تحديد الزوج الخفي.	b. $\angle 2$ و $\angle 3$ يتكوّنان زوجاً خفياً
c. نظرية التكامل.	c. $\angle 1 \cong \angle 3$
d. نظرية التكامل.	d. $\angle 1 \cong \angle 3$
e. $\ell \parallel m$	e. $\ell \parallel m$

خيارات الواجب المنزلي المتميزة

المستوى	الواجب	خيار اليومي
AL مبتدئ	8-30, 37-40, 42-55	37-40, 42-55 زوجي 8-30, 42, 43, 48-55
OL أساسي	9-35, 36-40, 42-55	8-30, 47-44
BL متقدم	13-55	13-40, 42, 43, 55-48

إجابة إضافية

29. الفتحان موازيان لبعضهما. وإذا كان المستقيمان متعامدين على المستقيم نفسه. فحينها يكونان متوازيين.

24. قياس

الزاوية القائمة

90° وبما

أن كل زاوية

بقياس 45°

فبوضع زاويتين

مما لعمل ركن

من أركان

الإطار يؤدي

إلى مجموع

بقيمة 90° إذا

كان المستقيمان

عموديين على


نفس المستقيم.

إذا فهما موازيان

لبعضهما.

25. المعطيات: $\angle 1 \cong \angle 3$


المطلوب: $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



27. المعطيات: $\angle TOR \cong \angle TSR$

$m\angle R + m\angle TSR = 180$


المطلوب: $\overline{QT} \parallel \overline{RS}$



26. المعطيات: $\overline{WY} \parallel \overline{XZ}$

$\angle 2 \cong \angle 4$


المطلوب: $\overline{WX} \parallel \overline{YZ}$



28. المعطيات: $\angle DAB \cong \angle DCB$

$\overline{AD} \perp \overline{AB}$

المطلوب: $\overline{DC} \perp \overline{BC}$



29. التخزين القطع الصغيرة غالبًا ما تُحفظ في أدراج لجعل العثور على القطع الصحيح أسهل. وفي صندوق التخزين المبين. إطار كل درج عمودي على كل ضلع من الأضلاع. فما الذي يمكنك استنتاجه بشأن الأدراج؟ اشرح استنتاجك. انظر التمام.



30. الإثبات اكتب فترة إثبات للنظرية 11.8.

31-30. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

31. إثبات اكتب إثباتًا من عمودين للنظرية 11.7.

32. درجات السلم بناءً على المعلومات المعطاة في صورة


السلم على اليسار. ما العلاقة بين كل درجة؟ اشرح استنتاجك.

الدرجتان p موازيتان لبعضهما. والدرجتان عموديتان


على المستقيم نفسه. إذا فهما موازيتان لبعضهما.



33.




34.



حدد ما إذا كان المستقيمان r متوازيين. على إجابتك.

35.





33-35. انظر ملحق إجابات الوحدة 11.

في القرنين 16 و 17، أصبحت العلاقات معونات
عسكرية وحسباً، وولاً دولتها لا يمكنها لاستكشاف
أفكار مثالية بين مستعمرين متوارثين

تحليل الحفظ 37

40 مسطرة تقويم لتحلب التميرين
في حرجار ومسطرة تقويم.

38. لا، الإجابة النموذجية، في الشكل




مثال محقة لأن الزاويتين 1 و 4 هما زاويتان داخليتان متبادلتان في المستقيمين $\overline{AD}$ و $\overline{BC}$ حيث يكون $\overline{DB}$ هو القاطع.

37. نَحْدُ المسافة من مستقيم إلى نقطة هي طول القطعة المستقيمة العمودية على المستقيم (النقطة) من النقطة. المسافة بين مستقيمين متوازيين هي المسافة بين أي نقطة على أحد المستقيمين والنقطة العمودية على الآخر. فافجد المسافة بين المستقيمين $2x + 5$ و $2x - 1$. إرشاد: استخدم قانون المسافة.

38. التبرير حل النظمه 11.8 γ تزال صحيحة إذا كان المستقيمان لهما متحدي المستوى؟ ارسو الشكل لتبرير إجابتك. **انظر الهامش.**

انظر ملحق إجابات الوحدة 11.



8. ارسو مستقيمتا متوازيتا مع $\overline{FG}$ عبر النقطة A.

C. أربع مستطيلات متوازاة مع $\overline{E_1F_1}$ على التماس C

d. عتق فرضية بشأن العلاقة بين المستنقعات والذئب

4. قُحِّلْ ارجع إلى الشكل على اليسار.


a. إذا كان $m\angle 5 + m\angle 2 = 180$ ، فثبت أن $b \parallel c$.

b ، باشد. اگر، $a \parallel b$ ، و $m\angle 1 + m\angle 5 = 180$ ، ثابت کنید $t \perp b$.

في هذا القسم نرى ان

الزوج الخطي من الزوايا متكامل كما هو متطابق.

مع بعضهما البعض.



1 التركيز

التخطيط الرأسي

قبل الدرس 11-6 استخدام العلاقات بين الزوايا لإثبات توازي مستقيمين.

الدرس 11-6 إيجاد المسافة بين نقطة ومستقيم. وإيجاد المسافة بين مستقيمين متوازيين.

بعد الدرس 11-6 وضع تخمينات حول المستقيمية وتحديد مدى صحة هذه التخمينات.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

كَلِّف الطلاب بقراءة القسم لماذا؟ الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

- ما المهن الأخرى التي قد تستخدم الشاقول؟ يُستخدم الشاقول بواسطة النجار والمساح.
- لماذا من المهم استخدام أداة تضمن دقة التخطيط الرأسي الصحيح لأي مبنى؟ تكون المباني أكثر استقرارًا وثباتًا ودقة من الناحية الهيكلية عندما تتم المحاذاة الرأسية والأفقية بشكل صحيح.
- ما الأداة المكافئة للشاقول التي يمكننا من التأكد من المحاذاة الأفقية الصحيحة للمبنى؟ ميزان البناء

11-6 المتعامدات والمسافة

لماذا؟

الحالي

السابق



- 1 إيجاد المسافة بين نقطة ومستقيم.
 - 2 إيجاد المسافة بين المستقيمتين المتوازيتين.
- الشاقول (ثقل العادن) مصنوع من خيط موصل به ثقل مصمم خصيصًا. وعندما يُعلق الثقل ويُسمح له بالتأرجح بحرية، فطرف الثقل سيكون بالضبط أسفل الطرف الذي نُثِّت عليه الخيط.
- الشاقول مفيد في تعيين الخط الرأسي أو العمودي الحقيقي عند بناء جدار أو عند تعليق ورق حائط.

- أثبت أن مستقيمين متوازيين باستخدام العلاقات بين الزوايا.




1 المسافة من نقطة إلى مستقيم يشير الشاقول كذلك إلى أقصر مسافة بين النقطة التي عُلق عليها في السقف و الأرض المسنوبة أسفلها. وهذه المسافة العمودية بين نقطة ومستقيم هي الأقصر في كل الحالات.

المفردات الجديدة
مسافة متساوية equidistant

ممارسات في الرياضيات
التفكير بطريقة تجريدية وكيفية استخدام نماذج الرياضيات.


المفهوم الأساسي المسافة بين نقطة ومستقيم



الشرح
المسافة بين مستقيم ونقطة ليست على هذا المستقيم هي طول القطعة المستقيمة العمودية على المستقيم من هذه النقطة.

من خلال إنشاء مستقيم عمودي على مستقيم موجود بالفعل عبر نقطة ليست على المستقيم الموجود كما هو موضح في درس التوسع 5-10، يتم إثبات أنه هناك على الأقل مستقيم واحد يمر عبر نقطة P وهو عمودي على مستقيم AB. والمسألة التالية توضح أن هذا المستقيم هو المستقيم الوحيد المار عبر النقطة P والعمودي على AB.


المسألة 11.6 مسألة التعامد




الشرح
إذا أعطيت مستقيمان ونقطة ليست على هذا المستقيم، يوجد مستقيم واحد بالضبط يمر عبر النقطة العمودية على المستقيم المعطى.

مثال 1 من الحياة اليومية إنشاء مسافة من نقطة إلى مستقيم


تسقيق الحدائق لاحظت مهندسة تسقيق حدائق أن أحد أجزاء قطعة بطول متر من المواسير لا يعزل المياه على نحو جيد. وترغب المهندسة في الاستفادة من ماسورة موجودة بالفعل تحت الأرض أمثلة بالمستقيم m . فأنتن وسع القطعة المستقيمة ذات الطول الذي يمثل أقصر مفا من المواسير مستقيم المهندسة إلى وضعها لتوصيل ماسورة الصرف هذه إلى النقطة A .



المسافة من مستقيم إلى نقطة ليست على هذا المستقيم هي طول القطعة المستقيمة العمودية على المستقيم من هذه النقطة. حدد مكان القطعتين B و C على المستقيم m الواقعتين على مسافة واحدة من النقطة A .




حدد مكان نقطة ثالثة على المستقيم m بحيث تكون واقعة على مسافة واحدة من القطعة B والقطعة C من هذه النقطة D . ثم ارسم $\overline{AD}$ بحيث يكون $\overline{AD} \perp \overline{BC}$.



قياس $\overline{AD}$ يمثل أقصر مفا من المواسير مستقيم المهندسة لوضعها لتوصيل ماسورة الصرف إلى النقطة A .

تمرين موجّه

1. انسح الشكل ثم أنتن وسع القطعة المستقيمة التي تمثل المسافة من Q إلى $\overline{PR}$. انظر الهامش.



مهنة من الحياة اليومية

مهندس تسقيق الحدائق يستمتع مهندس تسقيق الحدائق بالعمل بأيديهم ويبتكرون مهارات تحليلية قوية. كما أن الرؤية الإبداعية والمهنية الغنية من الصعاب المطلوبة في هذه المهنة. وفي المعتاد، يُطلب من مهندس تسقيق الحدائق الحصول على درجة البكالوريوس. ولكن قد تكون درجة الماجستير مطلوبة من أجل تخصصات مثل تصميم ملاعب الجولف.

نصيحة دراسية

رسم أقصر مسافة يمكنك استخدام أدوات مثل زاوية قطعة ورق لمساعدتك على رسم قطعة مستقيمة عمودية من نقطة إلى مستقيم. ولكن لا يمكن استخدام سوى فرجار ومسطرة عدلة لإنشاء هذه القطعة المستقيمة.

المسافة من نقطة إلى مستقيم

مثال 1 يوضح طريقة تحديد المسافة من مستقيم ونقطة لا تنتمي إليه بإنشاء قطعة مستقيمة متعامدة على المستقيم صلي. المثال 2 يوضح طريقة استخدام ندسة الإحداثيات لإيجاد المسافة من مستقيم إلى نقطة لا تنتمي إليه.

تقويم التكويني

استخدم التمارين الواردة في القسم تمرين موجّه بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.

مثال إضافي


1 الإنشاء تم تصميم جمالون

حديثي لسقف ما بحيث يمتد العمود المركزي من قمة السقف (النقطة A) إلى الدعامة الرئيسية الأفقية. تم إنشاء وتسمية القطعة المستقيمة التي يمثل طولها أقصر طول للقطعة الخشبية المطلوبة لربط قمة السقف بالدعامة الرئيسية الأفقية. AB .



إجابة إضافية (تمرين موجّه)

1. $\overline{QT}$ يمثل المسافة من Q إلى $\overline{PR}$.




المتعلمون بالطريقة الحسية الحركية حدد بعض الأمثلة على مستقيمتين متوازيتين في حجرة الصف. مثل الخطوط الأسمنتية في بلاط الأرضية أو إطار اللوحة. اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية لقياس المسافة من نقاط عديدة على طول أحد المستقيمتين إلى نقطة ثابتة على مستقيم آخر. كلّف الطلاب بمناقشة النتائج التي حصلوا عليها. وأدّر المناقشات بحيث يتمكن الطلاب من ملاحظة علاقات القطع المستقيمة والمسافات بين المستقيمتين المتوازيتين.

ملاحظة دراسية
المسافة إلى المحاور لا تحسب المسافة من نقطة إلى المحور الأفقي x يمكن تبسيطها من طريق النظر إلى الإحداثي x والمسافة من نقطة إلى المحور الرأسي y هي سالب الإحداثي y .

الهندسة الإحداثية المستقيمة على المستوى الإحداثي

أوجد المسافة بين المستقيمين ℓ و w اللذين هما $(-5, 3)$ و $(4, -6)$. فأوجد



الخطوة 1

أبدأ بإيجاد ميل المستقيم ℓ المار عبر النقطتين $P(2, 4)$ و $Q(-5, 3)$.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 4}{-5 - 2} = \frac{-1}{-7} = \frac{1}{7}$$

ثم أكتب معادلة هذا المستقيم باستخدام النقطة $Q(-5, 3)$ الموجودة على هذا المستقيم.

صيغة الميل والتقاطع: $y = mx + b$
 $-6 = -1(4) + b$ $m = -1$ و $(x, y) = (4, -6)$
 $-6 = -4 + b$ **بسط.**
 $-2 = b$

أجمع 4 على كل طرف.
معادلة المستقيم ℓ هي $y = -x - 2$ أو $y = -x + (-2)$.

الخطوة 2

أكتب معادلة المستقيم w العمودي على المستقيم ℓ المار عبر $P(2, 4)$.
 بما أن ميل المستقيم ℓ هو -1 وميل المستقيم w هو 1 . فأكتب معادلة المستقيم w المار عبر $P(2, 4)$ بميل قيمته 1 .

صيغة الميل والتقاطع: $y = mx + b$
 $4 = 1(2) + b$ $m = -1$ و $(x, y) = (2, 4)$
 $4 = 2 + b$ **بسط.**
 $2 = b$ **اطرح 2 من كل طرف.**

معادلة المستقيم w هي $y = x + 2$.

الخطوة 3

حل نظام المعادلات لتحديد نقطة التقاطع.

المستقيم ℓ : $y = -x - 2$
 المستقيم w : $(+) y = x + 2$

أجمع المعادلتين: $2y = 0$
 أقسم كل طرف على 2: $y = 0$
 أوجد حل x .

عوض 0 عن y في المعادلة الثانية: $0 = x + 2$
 اطرح 2 من كل طرف: $-2 = x$

نقطة التقاطع هي $(-2, 0)$. لنفترض أن هذه النقطة هي Q .

الخطوة 4

استخدم قانون المسافة لتحديد المسافة بين $Q(-2, 0)$ و $P(2, 4)$.

قانون المسافة: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
 $d = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (0 - 4)^2}$ $x_2 = -2$ و $x_1 = 2$ و $y_2 = 0$ و $y_1 = 4$
 $d = \sqrt{32}$ **بسط.**

المسافة بين النقطة والمستقيم هي $\sqrt{32}$ أو حوالي 5.66 وحدة.

التركيز على محتوى الرياضيات


الزوايا الناتجة عن المستقيمتين المتعامدة

حسب التعريف، فإن المستقيمتين المتعامدة تكون زوايا قائمة. وبسبب تطابق الزوايا القائمة، فإن الزوايا الناتجة عن المستقيمتين المتعامدة تكون متطابقة ومتجاورة. وفي المقابل، إذا نتج عن المستقيمتين زوايا متطابقة ومتجاورة، فحينها يكون المستقيمان متعامدين.

مثال إضافي

2 الهندسة الإحداثية يحتوي

المستقيم k على نقطتين عند $(0, 0)$ و $(-5, 5)$. فأوجد المسافة بين المستقيم k والنقطة $V(1, 5)$.



الإجابة النموذجية: $d = \sqrt{18}$ أو حوالي 4.24 وحدات

التدريس باستخدام التكنولوجيا

التسجيل الصوتي كلف الطلاب

باستخدام تعبيراتهم الخاصة لشرح السبب وراء اعتبار المسافة من نقطة إلى مستقيم هي طول القطعة المستقيمة المتعامدة التي تمتد من النقطة حتى هذا المستقيم. ثم أرفع الملفات الصوتية على موقع الويب الخاص بالصف الدراسي.

2 المسافة بين المستقيمتين المتوازيتين

يعني التعبير "على نفس المسافة" أن المسافة المعقسة بين مستقيمين بطول أي مستقيم متعامد على كلا المستقيمين تكون واحدة دائماً. في المثال 3، سيعمل الطلاب على إيجاد المسافة بين مستقيمتين متوازيتين جبرئياً.

مثال إضافي

3 أوجد المسافة بين المستقيمين المتوازيين a و b باستخدام المعادلتين $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 1$. بالترتيب، حوالي 1.79 وحدة

إرشاد للمعلمين الجدد

روابط من الحياة اليومية كَلَّف الطلاب بتحديد طريق مستقيم داخل حديقة أو ملعب أو حقل. ويجب عليهم تصوّر أي نقطة في الحديقة لا تقع على الطريق. وافترض ذهابهم من هذه النقطة مباشرة إلى الطريق. ثم عليهم إثبات أنّ انتقالهم إلى الطريق تمّ بشكل متعامد عليه.

نصيحة دراسية


المحل الهندسي للنقاط على
مسافة واحدة من مستقيمين
متوازيين
على العمود - المحل الهندسي
للنقاط على مستوى وعلى
مسافة واحدة من مستقيمين
متوازيين هو مستقيم ثالث
متوازي للمستقيمين
المتوازيين ويمر مركز دونهما



منصور ہیں **موجودہ**

2. المسافة d بين نقطتين في $2D$ و $3D$ باستخدام قانون المسافة هو $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.
 مثلاً المسافة بين P إلى A $\sqrt{20} \approx 4.47$

2

[illegible]

وهذا يؤدي إلى تفرق المسافة بين مستقيمين متوازيين.

المفهوم الأساسي: المسافة بين المستقيمات المتوازية

المعادلة بين مستقيمين متوازيين هي المعادلة العمودية بين أحد المستقيمين وأي مماس غير مشترك لهما



نذكر من الدور 1-10 أن الحمل الهندسي هو مجموعة من النقاط التي تحقق شرطاً معيَّناً، والمستقيمات المتوازية بشكل واضح هنا أنها الحمل الهندسي لنقاط في مستوى على مسافة واحدة من مستقيم معيَّن.

النظرية 11.9 مستقيمان على مسافة واحدة من مستقيم ثالث

في مستوى: إذا كان مستقيماً على مسافة واحدة من مستوى ثالث فإن المستقيم متوازٍ.

مؤلف: محمد المصطفى ٢٢٩ رقم الترخيص: ٢٠

مثال 3 المسافة بين المستقيمتين المتوازيين

أوجد المسافة بين المستقيمين المتوازيين l و m باستخدام المعادلتين $y = 2x + 1$ و $y = 2x - 3$ على الترتيب.

محتاج إلى حل نظام معادلات لإيجاد المتطهر التفرقتي لشعبة مستقيمة عمودية على كل من ℓ و m ، ومن معادلتها: تعرف أن ميز المستقيمة ℓ والمستقيمة m هو 2.

ارسم المستقيم p الخارج عن النقاط M و N المتطابقين مع المحور y للمستقيم m -3، 0،
والعمود l على المستقيم m .



الخطوة 1

اكتب معادلة للمستقيم P مع العلم أن ميل P هو المقلوب الضربي للمائل لـ 2 ، أو $-\frac{1}{2}$. استخدم التقاطع مع المحور y للمستقيمة m والنقطة $(0, -3)$ بوصفها إحدى النقطتين الطرفيتين للقطعة المستقيمة العمودية.

$$(y - y_1) = m(x - x_1) \quad \text{صيغة الميل والنقطة}$$

$$(y - (-3)) = -\frac{1}{2}(x - 0) \quad x_1 = 0 \text{ و } y_1 = 3 \text{ و } m = -\frac{1}{2}$$

$$y + 3 = -\frac{1}{2}x \quad \text{ننظف}$$

$$y = -\frac{1}{2}x - 3 \quad \text{نخرج 3 من كل طرف}$$

استخدم نظام معادلات لتحديد نقطة التقاطع للمستقيمين P و l .

الخطوة 2

$$l: y = 2x + 1$$

$$P: y = -\frac{1}{2}x - 3$$

$$2x + 1 = -\frac{1}{2}x - 3 \quad \text{نؤخذ } 2x + 1 \text{ من في المعادلة الثانية}$$

$$2x + \frac{1}{2}x = -3 - 1 \quad \text{أضف الحدود المتشابهة في كل طرف}$$

$$\frac{5}{2}x = -4 \quad \text{ننظف}$$

$$x = -\frac{8}{5} \quad \text{نضرب كل طرف في } \frac{2}{5}$$

$$y = -\frac{1}{2}\left(-\frac{8}{5}\right) - 3 \quad \text{نؤخذ } -\frac{8}{5} \text{ من في معادلة } P$$

$$= -\frac{11}{5} \quad \text{ننظف}$$

نقطة التقاطع هي $\left(-\frac{8}{5}, -\frac{11}{5}\right)$ أو $(-1.6, -2.2)$

استخدم قانون المسافة لتحديد المسافة بين $(0, -3)$ و $(-1.6, -2.2)$.

الخطوة 3

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{قانون المسافة}$$

$$= \sqrt{(-1.6 - 0)^2 + (-2.2 - (-3))^2} \quad x_2 = -1.6 \text{ و } x_1 = 0 \text{ و } y_2 = -2.2 \text{ و } y_1 = -3$$

$$\approx 1.6$$


ننظف باستخدام حاسبة

المسافة بين المستقيمين تبلغ حوالي 1.6 وحدد.

تمرين موجّه

3A. أوجد المسافة بين المستقيمين المتوازيين l و k اللذين معادلاتهما هما $y = -3x + 6$ و $y = -3x - 5$ على الترتيب. $\sqrt{12.1} \approx 3.48$

3B. أوجد المسافة بين المستقيمين المتوازيين l و k اللذين معادلاتهما هما $x + 3y = -14$ و $x + 3y = 6$ على الترتيب. $\sqrt{40} \approx 6.32$



3 التمرين



التقويم التكويني

استخدم التمارين 1-8 للتحقق من استيعاب الطلاب. استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

ملاحظات لحل التمرين

فرجار ومسطرة تقويم تتطلب التمارين من 9 إلى 12 استخدام فرجار ومسطرة تقويم. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الطلاب إلى استخدام ورق صغير الحجم أو ورق شفاف لنسخ الأشكال الموجودة في هذه التمارين.

إجابات إضافية



30. المعطيات: ℓ على نفس المسافة من m و n على نفس المسافة من m .

المطلوب: إثبات أن $\ell \parallel n$

البرهان:

العبارات (المبررات)

1. ℓ على نفس المسافة من m و n على نفس المسافة من m (معطى)

2. $m \parallel \ell$ و $\ell \parallel m$

(تعريف المسافة المتساوية)

3. ميل ℓ = ميل m (تعريف توازي المستقيمتين $\parallel$)

ميل n = ميل m


4. ميل ℓ = ميل n (بالتعويض)

5. $\ell \parallel n$ (تعريف توازي المستقيمتين $\parallel$)


34. نستطيع نحاة قياس المسافة العمودية بين الملتصقات في مكانين مختلفين كما هو موضح. وإذا كانت هذه المسافات متساوية، فحجتها ستكون الملتصقات متوازية.

التحقق من فهمك

1. انظر الهامش. $\overleftrightarrow{TS}$ إلى Y .



2. أنشئ القطعة المستقيمة التي تمثل المسافة المشار إليها. انظر الهامش. $\overleftrightarrow{AB}$ إلى C .



3. البنية بعد تكوين صف. يستدير كل عضو يحمل عددًا زوجيًا من فرقة موسيقية لمواجهة الطرف الأيمن من الملعب ويسير 5 خطوات للأمام مباشرة. وفي الوقت نفسه، يستدير كل عضو يحمل عددًا فرديًا نحو الاتجاه المعاكس ويسير 5 خطوات للأمام مباشرة. وفرض أن كل عضو في الفرقة يغطي المسافة نفسها. فأي شكل سينتج؟ برر إجابتك.



الهندسة الإحداثية أوجد المسافة من P إلى ℓ .

4. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين $(4, 3)$ و $(-2, 0)$. والنقطة P لها إحداثيات $(3, 10)$. وحدات $3\sqrt{5}$
5. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين $(1, -6)$ و $(-4, 9)$. والنقطة P لها إحداثيات $(1, 4)$. وحدات $\sqrt{10}$
6. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين $(4, 18)$ و $(9, -2)$. والنقطة P لها إحداثيات $(5, -9)$. وحدات $\sqrt{13}$

أوجد المسافة بين كل زوج من المستقيمتين المتوازيين باستخدام المعادلات المعطاة.

7. $y = -2x + 4$ و $2\sqrt{5}$ وحدات

8. $y = 7$ و 10 وحدات





$y = -2x + 14$

$y = -3$

3. يجب أن يكون الشكل عبارة عن مستقيمتين متوازيين. ومتوازيين أيضًا مع خط منتصف الملعب. شكل أعضاء الفرقة مستقيمتين على مسافة واحدة من خط منتصف الملعب. إذا حسب النظرية 3.9، سيكون المستقيمان المتوازيان متوازيين.

التمرين وحل المسائل

1. أنشئ كل شكل. أنشئ القطعة المستقيمة التي تمثل المسافة المشار إليها. 9-12 انظر ملحق إجابات الوحدة 11.




خيارات الواجب المنزلي المتميزة

المستوى	الواجب	خيار اليومي
AL متدني	9-29, 41, 42, 44-64	41, 42, زوجي 10-28, 47-44, 64-52
OL أساسي	9-33, 34-42, 44-64	9-29, 48-51
BL متقدم	30-59, (اختياري 60-64)	30-42, 44-47, 52-64



13. ممرات السيارات في الرسم التخطيطي على اليسار. هل ممر السيارات الموضح هو أقصر ممر محتمل من المنزل إلى الطريق؟ اشرح لماذا أو لماذا لا.
 ٧: ممر السيارات العمودي على الطريق سيكون الأقصر. والزاوية التي يشكلها ممر السيارات مع الطريق أقل من 90° ، لذا فهو ليس أقصر ممر سيارات محتمل.



14. تمثيل النماذج لثلاث ممرات محتملة أمام مدرسة. وثمة ثلاثة مسارات موضحة في الرسم التخطيطي على اليسار. فأي من المسارات الثلاثة الموضحة هو الأقصر؟ اشرح استنتاجك.

المسار B: ستكون أقصر مسافة محتملة هي المسافة العمودية من أحد طرفي الفناء إلى الطرف الآخر. وبما أن المسار B هو الأقرب للزاوية 90° ، فهو الأقصر بين المسارات الثلاثة الموضحة.

الهندسة الإحداثية أوجد المسافة من P إلى L.

15. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين (0, 4) و (7, 4). والنقطة P لها إحداثيات (4, 3). وحدتان $\sqrt{2}$
 16. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين (11, -1) و (-3, -11). والنقطة P لها إحداثيات (-1, 1). وحدة $\sqrt{74}$
 17. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين (2, 1) و (4, 1). والنقطة P لها إحداثيات (5, 7). 6 وحدات
 18. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين (4, -1) و (4, 9). والنقطة P لها إحداثيات (1, 6). 3 وحدات
 19. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين (1, 5) و (4, -4). والنقطة P لها إحداثيات (-1, 1). وحدة $\sqrt{10}$
 20. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين (1, -8) و (3, 1). والنقطة P لها إحداثيات (-2, 4). 3 وحدات
 أوجد المسافة بين كل زوج من المستقيمتين المتوازيتين باستخدام المعادلات المعطاة.

21. $y = -2$ وحدتان 6
 $y = 4$
 22. $x = 3$ وحدتان 4
 $x = 7$
 23. $y = 5x - 22$ وحدة $\sqrt{26}$
 $y = 5x + 4$
 24. $y = \frac{1}{3}x - 3$ وحدتان $1.5\sqrt{10}$
 $y = \frac{1}{3}x + 2$
 25. $x = 8.5$ وحدة 21
 $x = -12.5$
 26. $y = 15$ وحدة 19
 $y = -4$
 27. $y = \frac{1}{4}x + 2$ وحدة $4\sqrt{17}$
 $4y - x = -60$
 28. $3x + y = 3$ وحدتان $2\sqrt{10}$
 $y + 17 = -3x$
 29. $y = -\frac{5}{4}x + 3.5$ وحدتان $\sqrt{14.76}$
 $4y + 10.6 = -5x$
 30. البرهان اكتب برهاناً من عمودين للنظرية 11.9. انظر الهامش.

أوجد المسافة من المستقيم إلى النقطة المعطاة.

31. $y = -3$ وحدتان 5
 $y = \frac{1}{6}x + 6$ وحدتان 0
 32. $x = 4$ وحدتان (-2, 5)
 33. $x = 4$ وحدتان (-2, 5)
 34. مُلصقات تعلق نجاة ملصقين على الحائط في غرفتها كما هو موضح. فكيف يمكن لـ نجاة استخدام المسافات العمودية لتأكيد أن الملصقين متوازيان؟ انظر الهامش.




التتميلات المتعددة

في التمرين 39، يستخدم الطلاب رسماً هندسياً ووصفاً لفظياً لاستكشاف مساحة المثلثات الناتجة عن النقاط الواقعة على مستقيمتين متوازيتين.

إجابات إضافية

35. يستطيع أن يستنتج أن الضلعين الأيمن والأيسر للوحة الإعلانات غير متوازيين. لأن المسافة العمودية بين أحد المستقيمتين وأي نقطة على المستقيم الآخر لا بد أن تكون متساوية وتكون واحدة من أي مكان على المستقيمتين حتى يكون المستقيمان متوازيين.


36. المستقيمان متعامدان، وميل ℓ يساوي -1 وميل $\overrightarrow{PQ}$ يساوي 1 . وبما أن الميول هي معكوسات ضربية سالبة، فالمستقيمان متعامدان.



$$a = \pm 1; y = \frac{1}{2}x + 6.43$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 6 \text{ أو } y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$$

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}, 6$$



39. روح الدعاء بالمدارس يُزين عيسى لوحة إعلانات في رواق المدرسة لعرض صور لطلاب يُظهرون روح الدعاء بالمدرسة. ويقطع طولاً واحداً من الطرفين ليتوافق مع عرض الطرف العلوي من اللوحة. ثم يستخدم هذا الشريط المغطى ثغالب لقطع شريط ثلثي تماماً بنفس الطول من أجل الطرف السفلي. وعند تدريس الطرف السفلي في مكانه لاحظ أن الشريط الذي قطعه أقصر بمرارة نصف سنتيمتر. فضع ما الذي يمكنه استنتاجه بشأن لوحة الإعلانات. اشرح استنتاجك. **انظر الهامش.**

الإنشاء المستقيم ℓ يحتوي على نقطتين عند $(-4, 3)$ و $(2, -3)$. ونقع النقطة P على الإحداثي $(-2, 1)$ على المستقيم ℓ . أكمل الشكل التالي

الخطوة 1




مثل بياناً المستقيم ℓ والنقطة P . ضع النقطة عند النقطة P . واستخدم وصية المرحار نفسها. ارسم أقواساً على يسار ويمين النقطة P . وسه هاتين النقطتين B و A .

الخطوة 2

افتح المرحار على وصية أكثر من AP وضع المرحار عند النقطة A وارسم قوساً فوق المستقيم ℓ .

الخطوة 3

باستخدام وصية المرحار نفسها. ضع المرحار عند النقطة B وارسم قوساً فوق المستقيم ℓ . وسه نقطة التقاطع Q . ثم ارسم $\overrightarrow{PQ}$.



36. ما العلاقة بين المستقيم ℓ و $\overrightarrow{PQ}$ ؟ تحقق من تخمينك باستخدام ميل المستقيمتين. **انظر الهامش.**

37. كرر الشكل أعلاه باستخدام مستقيم مختلف ونقطة على ذلك المستقيم. **راجع عمل الطلاب.**


38. الاستنتاج المنطقي $\overline{AB}$ لها ميل بقيمة 2 ونقطة منتصف $M(3, 2)$. والخطعة المستقيمة العمودية على $\overline{AB}$ لها نقطة منتصف $P(4, -1)$ وتشارك في نقطة طرفية B مع $\overline{AB}$.

a. مثل بياناً القطعتين المستقيمتين. **انظر الهامش.**

b. أوجد إحداثيات النقطة A والنقطة B . $A(4, 4), B(2, 0)$

39. التتميلات المتعددة في هذه المسألة، ستكتشف مساحات المثلثات المنشكلة بواسطة نقاط على مستقيمتين متوازيتين.

a. هندسياً ارسم مستقيمتين متوازيتين وشكلاً كما هو موضح. **راجع عمل الطلاب.**




39b. ضع النقطة C في أي مكان على المستقيم m . فمساحة المثلث هي $\frac{1}{2}$ ارتفاع المثلث مضروباً في طول قاعدته. تظل الأعداد ثابتة بغض النظر عن مكان النقطة C على المستقيم m .

b. تخيل أن سطح النقطة C على المستقيم m لضمان أن المثلث ABC ستكون له أكبر مساحة. اشرح استنتاجك.

c. تحليلياً إذا كان $AB = 11$ سنتيمتراً، فما المساحة القصوى للمثلث ABC ؟ سم 16.5^2

إجابات إضافية

46. إذا كان كل مستوي من مستويين على مسافة واحدة من مستوي ثالث، فحيثما يكون المستويان متوازيين.



مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

43. نتخذ لنفترض أن مستطينا عموديا على زوج من المستقيمتين المتوازيتين يقطع المستقيمتين عند النقطتين (4، 2) و (6، 10). فإذا كانت المسافة بين المستقيمتين المتوازيتين هي $\sqrt{5}$ ، فأوجد قيمة $\sin \theta$ حيث θ هي الزاوية بين المستقيمتين المتوازيتين.

45. مسألة غير محددة الإجابة ارسو مخططاً خماسياً غير متقطع باستخدام مسطرة عدالة B-C. انظر الهامش.

46. الاستنتاج المنطقي أحد كتابة النظرية 11.9 بدلالة أن مستويين يقعون على مسافة واحدة من مستوى ثالث. ارسم مثلاً. **انظر الهامش.**

BL **التدريس المتمايز**


Scanned by CamScanner

4 التقويم

تعيين مصطلح الرياضيات يجب على كل طالب أن يعين نقطة على ورقة ويضع مسطرة على نفس الورقة لكي تمثل مستقيماً ثم عليهم بعد ذلك أن يكتبوا تعليمات خاصة بطريقة إيجاد المسافة من النقطة إلى المستقيم (المسطرة). ويجب على الطلاب قياس المسافة وتعليل إجابتهم.

إجابات إضافية

48a.



52. ميل $a: m = \frac{-4 - 2}{1 + 3} = -\frac{3}{2}$

ميل $b: m = \frac{-1 - 2}{5 - 3} = -\frac{3}{2}$

وبما أن الميول متساوية، إذا $a \parallel b$.

57. المعطيات: $AB = BC$

المطلوب إثباته: $AC = 2BC$
العبارات (المبررات)

1. $AB = BC$ (معطى)

2. $AC = AB + BC$ (مسألة جمع القطع المستقيمة)

3. $AC = BC + BC$ (بالتعويض)

4. $AC = 2BC$ (بالتعويض)

58. المعطيات: $\overline{GH} \cong \overline{HJ}$, $\overline{KL} \cong \overline{JK}$
 $\overline{HJ} \cong \overline{KL}$

المطلوب إثباته: $\overline{JK} \cong \overline{GH}$

العبارات (المبررات)

1. $\overline{HJ} \cong \overline{KL}$, $\overline{KL} \cong \overline{JK}$ (معطى)

2. $\overline{HJ} \cong \overline{JK}$ (خاصية التتبع في التماثل)

3. $\overline{GH} \cong \overline{HJ}$ (معطى)

4. $\overline{GH} \cong \overline{JK}$ (خاصية التتبع في التماثل)

5. $\overline{JK} \cong \overline{GH}$ (خاصية التماثل في التماثل)

تمرين على الاختبار المعياري

50. الجواب: 25%
51. الجواب: 40%
52. الجواب: 48

F AED 14 40
G AED 21 60

53. الجواب: 120
54. الجواب: 30 00
55. الجواب: 10
56. الجواب: 51

A 0
B 1

48. إجابة موسعة: الخصلة المستقيمة AS، عمودية على الخصلة المستقيمة CD، والخطعة المستقيمة AB والخطعة المستقيمة CD يقطعان بعضهما عند النقطة X.

أ. الزوايا المتكونة عند تقاطع الخطوط المستقيمة.
ب. أوجد $\overline{AX}$ إذا كان $AS = 12$ و $CD = 10$.
ج. أوجد $\overline{AX}$ إذا كان $AS = 24$ و $CD = 51$.

49. مساحة المصطبة مربع الشكل ومساحته 81,000 متر مربع. فأي مما يلي هو الأقرب لطول أحد أضلاع شكل المصطبة؟

A 100 m
B 200 m
C 300 m
D 400 m

مراجعة شاملة

52. ارجع إلى الشكل على اليسار، وحده ما إذا كان $A \parallel B$ من إجاباتك. انظر الهامش.

اكتب معادلة بصيغة النقطه والميل للمستقيم ذي الميل المعطى الذي يحتوي على النقطه المعطاة.

53. $m: \frac{1}{4}$, $(3, -1)$ $y + 1 = \frac{1}{4}(x - 3)$

54. $m: 0$, $(-2, 6)$ $y - 6 = 0$

55. $m: -1$, $(-2, 3)$ $y - 3 = -(x + 2)$


56. $m: -2$, $(-6, -7)$ $y + 7 = -2(x + 6)$

أثبت ما يلي.

58. المعطيات: $\overline{JK} \cong \overline{KL}$, $\overline{HJ} \cong \overline{GH}$, $\overline{KL} \cong \overline{HJ}$

57. إذا كان $AB = BC$ فإن $AC = 2BC$. انظر الهامش.

المطلوب: $\overline{GH} \cong \overline{JK}$



مراجعة المهارات

استخدم قانون المسافة لإيجاد المسافة بين كل زوج من النقاط.

59. A(0, 0), B(15, 20) 25

60. O(-12, 0), P(-8, 3) 5

61. C(11, -12), D(6, 2) $\sqrt{221} \approx 14.9$

62. R(-2, 3), S(3, 13) 13

63. M(1, -2), N(9, 13) 17

64. Q(-12, 2), T(-9, 6) 5

دليل الدراسة والمراجعة

دليل الدراسة

المفاهيم الأساسية

التقاطع

- عندما يقطع قاطع مستقيمين، فتتكون الأنواع التالية من الزوايا: خارجية، وداخلية، متتالية، وداخلية متبادلة، وخارجية متبادلة، ومتناظرة.
- إذا قُطِعَ مستقيمان متوازيان بواسطة قاطع، فإن:
 - كل زوج من الزوايا المتناظرة يكون متطابقاً
 - كل زوج من الزوايا الداخلية المتبادلة يكون متطابقاً
 - كل زوج من الزوايا الداخلية المتتالية يكون متكافئاً
 - كل زوج من الزوايا الخارجية المتبادلة يكون متطابقاً

الميل

- الميل m الخاص بمستقيم يحتوي على نقطتين بإحداثيات (x_1, y_1) و (x_2, y_2) هو $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ، حيث $x_1 \neq x_2$.

إثبات توازي المستقيمان

- إذا قُطِعَ مستقيمان في مستوى بواسطة قاطع بحيث يكون أي مما يلي صحيحاً، فإن المستقيمين متوازيان:
 - زوج من الزوايا المتناظرة متطابق، أو
 - زوج من الزوايا الخارجية المتبادلة متطابق، أو
 - زوج من الزوايا الداخلية المتبادلة متطابق، أو
 - زوج من الزوايا الداخلية المتتالية متكافئ
- في مستوى، إذا تعامد مستقيمان على المستقيم نفسه، فإنهما متوازيان.

المسافة

- المسافة من مستقيم إلى نقطة ليست على المستقيم هي طول القطعة المستقيمة العمودية على المستقيم من هذه النقطة.
- المسافة بين مستقيمين متوازيين هي المسافة العمودية بين أحد المستقيمين وأي نقطة على المستقيم الآخر.

مخطم الدراسة

تأكد من أن المفاهيم الأساسية مدرجة في المخطم.




المضردات الأساسية

- alternate exterior angles زوايا خارجية متبادلة
- alternate interior angles زوايا داخلية متبادلة
- consecutive interior angles زوايا داخلية متتالية
- corresponding angles زوايا متناظرة
- equidistant مسافة متساوية
- parallel lines مستقيمان متوازيان
- parallel planes مستويات متوازية
- point-slope form صيغة نقطة الميل
- rate of change معدل التغير
- skew lines مستقيمان متخالفتان
- slope ميل
- slope-intercept form صيغة الميل والمقطع
- transversal قاطع

مراجعة المضردات

اذكر إذا ما كانت كل عبارة صحيحة أم خاطئة، فإذا كانت خاطئة، فاستبدل الكلمة أو العدد الذي تحته خط لتكون عبارة صحيحة.



1. إذا كان $\angle 1 \cong \angle 5$ ، فإن المستقيمين p و q متوازيان. **صواب**
2. الزاويتان 4 و 6 زاويتان داخليتان متبادلتان. **صواب**
3. الزاويتان 1 و 7 زاويتان خارجيتان متبادلتان. **صواب**
4. إذا كان المستقيمان p و q متوازيين، فإن الزاويتين 3 و 6 متطابقتان. **صواب**
5. المسافة من النقطة X إلى المستقيم q هي طول القطعة المستقيمة العمودية على المستقيم q من X . **صواب**
6. المستقيم t يعتبر قاطع المستقيمين p و q . **صواب**
7. إذا كان $q \parallel p$ ، فإن $\angle 2$ و $\angle 8$ متكاملتان. **خاطئة: متطابقتان**
8. الزاويتان 4 و 8 زاويتان متناظرتان. **صواب**

التقويم التكويني

المضردات الأساسية إذا واجه الطلاب صعوبة في الإجابة على السارين من 1 إلى 8، فذكرهم بالرجوع لمراجعة الدروس لأنفسهم وأولئك الذين حلوا المضردات.

مخطم الدراسة

مطويات دينا زايت

انقلب من ثلاث إلى ثناء نظيرة على الوحدة والمكان من أنهم قد أضافوا نفس الأمثلة إلى كل جزء أو تبويب في مطوياتهم، واقترح عليهم إبقاء مطوياتهم بجانبهم أثناء إكمال صفحات دليل الدراسة والمراجعة، وضح أن المطويات تعدّ بمثابة أداة مراجعة سريعة من أجل المذاكرة لاختبار الوحدة.

11 دليل الدراسة والمراجعة

مراجعة درس بدرس

مراجعة درس بدرس
التدخل التقويمي اليومي إذا كانت الأمثلة المعطاة غير كافية لعرض الموضوعات التي تتناولها الأسئلة، فذكر الطلاب بأن مراجع الدروس ترشدكم إلى مكان مراجعة الموضوع في كتبهم المدرسية.

إجابات إضافية

9. متناظرة

10. داخلية متبادلة

11. خارجية متبادلة

12. داخلية متتالية

13. نظرية الزوايا الخارجية المتبادلة

14. 57; $\angle 13 \cong \angle 5$ حسب مسلمة

الزوايا المتناظرة، والزوايا

13 و 14 تكونان زوجاً خطياً.

15. 57; $\angle 14 \cong \angle 16$ حسب مسلمة

الزوايا المتناظرة، والزوايا

9 و 16 تكونان زوجاً خطياً.

16. 123; $\angle 11 \cong \angle 5$ حسب نظرية

الزوايا الداخلية المتبادلة، و

1 و 5 حسب نظرية الزوايا

الخارجية المتبادلة.

17. 57; $\angle 1 \cong \angle 5$ حسب نظرية الزوايا

الخارجية المتبادلة، والزوايا

4 و 5 تكونان زوجاً خطياً.

18. 57; $\angle 1 \cong \angle 3$ حسب مسلمة


الزوايا المتناظرة، والزوايا

3 و 6 تكونان زوجاً خطياً.

1-1 المستقيمات المتوازية والمتقاطعات

مثال 1

ارجع إلى الشكل أدناه. صنف العلاقة بين كل زوج من الزوايا باعتباره زوج زوايا داخلية متبادلة أو خارجية متبادلة أو متناظرة أو زوايا داخلية متتالية.



a. $\angle 3$ و $\angle 6$

متتالية داخلية

b. $\angle 2$ و $\angle 6$

متناظرة


c. $\angle 1$ و $\angle 7$

متبادلة خارجية

d. $\angle 3$ و $\angle 5$

متبادلة داخلية

صنف العلاقة بين كل زوج من الزوايا باعتباره زوجاً زوايا داخلية متبادلة أو خارجية متبادلة أو متناظرة أو زوايا داخلية متتالية. 9-12. انظر الهامش.



9. $\angle 1$ و $\angle 5$

10. $\angle 4$ و $\angle 6$

11. $\angle 2$ و $\angle 8$


12. $\angle 4$ و $\angle 5$

13. الجسور يمتد جسر روبلينج المعلق فوق نهر أوهايو رابطاً مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو بمدينة كوفينجتون بولاية كنتاكي. قسّم نوع المستقيمات المشكلة بواسطة الجسر والنهر. مستقيمتان متخالفتان

11-2 الزوايا والمستقيمات المتوازية

مثال 2

الجبر إذا كان $m\angle 5 = 7x - 5$ وكان $m\angle 4 = 2x - 23$ فوجد x . اشرح استنتاجك.



تعريف تقاطع الزوايا $\angle$

$$m\angle 4 + m\angle 5 = 180$$

$$(2x - 23) + (7x - 5) = 180$$

$$9x - 28 = 180$$


$$9x = 208$$

$$x = 23$$

عند أن المستقيمين l و m متوازيان والزوايا 4 و 5 متتامتان باستخدام نظرية الزوايا الداخلية المتتالية.

في الشكل، $m\angle 1 = 123$. أوجد قياس كل زاوية. والذكر أي مسلمة (مسلّمات) أو نظرية (نظريات) قد استخدمتها.

14-19. انظر الهامش.



14. $\angle 5$

15. $\angle 14$


16. $\angle 16$

17. $\angle 11$

18. $\angle 4$


19. $\angle 6$

20. الخرائط يوضح الرسم التخطيطي تخطيط الشوارع النصر والسلام والحربة فأوجد قيمة x .




إجابات إضافية




21. متعامدان



22. ليس أيًا منهما



23. متوازيان



11-3 ميل الخطوط المستقيمة

حدد ما إذا كان $\vec{AB}$ و $\vec{XY}$ متوازيين أم متعامدين أم ليس أيًا منهما. مثل كل مستقيم بيانيًا للتحقق من صحة إجابتك. **أنظر الهامش. 21-23**

21. $A(5, 3), B(8, 0), X(-7, 2), Y(1, 10)$
 22. $A(-3, 9), B(0, 7), X(4, 13), Y(-5, 7)$
 23. $A(8, 1), B(-2, 7), X(-6, 2), Y(-1, -1)$

مثل المستقيم الذي يستوفي كل الشروط بيانيًا.

24. يحتوي على النقطة $(-3, 4)$ ومتوازٍ مع $\vec{AB}$ بالإحداثيات $B(9, 2)$ و $A(2, 5)$ **أنظر الهامش. 24-25**

25. يحتوي على النقطة $(1, 3)$ وعمودي على $\vec{PO}$ بالإحداثيات $O(6, -1)$ و $P(4, -6)$


26. **الطائرات** نظير طائرتا خطوط جوية عابرة للمحيطات على الارتفاع نفسه وباستخدام صور الأقمار الصناعية. يمكن تحديد موضع الطائرة على مستوى إحداثي. وعددت الرحلة رقم 815 على النقطة $(23, 17)$ والنقطة $(15, 11)$ بينما عددت الرحلة رقم 44 على النقطة $(13, 15)$ والنقطة $(19, 17)$ فحدد ما إذا كان مسارهما متوازيين أم متعامدين أم ليس أيًا منهما. **متوازيان**

مثال 3

مثل بيانيًا المستقيم الذي يحتوي على النقطة $C(0, -4)$ وعمودي على $\vec{AB}$ بالإحداثيات $B(0, -2)$ و $A(5, -4)$.

$$\text{ميل } \vec{AB} \text{ هو } \frac{-2 - (-4)}{0 - 5} = \frac{2}{-5} = -\frac{2}{5} \text{ أو } -\frac{2}{5}$$

بما أن $-\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} = -1$ فإن ميل المستقيم العمودي على $\vec{AB}$ الذي يمر عبر C هو $\frac{5}{2}$.



لنمثل المستقيم بيانيًا. أبدأ عند النقطة C . انتقل لأعلى بمقدار 5 وحدات ثم لليمين بمقدار وحدتين. وسمِّ النقطة D وأرسم $\vec{CD}$.

11-4 معادلات الخطوط المستقيمة

اكتب معادلة بصيغة نقطة وميل للمستقيم ذي الميل المعطى الذي يحتوي على النقطة المعطاة.

27. $m = 2, (4, -9) \quad y + 9 = 2(x - 4)$
 28. $m = -\frac{3}{4}, (8, -1) \quad y + 1 = -\frac{3}{4}(x - 8)$

اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع للمستقيم ذي الميل المعطى والتقاطع مع المحور y .

29. $m = 5$ ، التقاطع مع المحور y ، $-3 \quad y = 5x - 3$

30. $m = \frac{1}{2}$ ، التقاطع مع المحور y ، $4 \quad y = \frac{1}{2}x + 4$

اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع لكل مستقيم.

31. $(-3, 12)$ و $(15, 0) \quad y = -\frac{2}{3}x + 10$
 32. $(-7, 2)$ و $(5, 8) \quad y = \frac{1}{2}x + \frac{11}{2}$

33. **تنظيف النوافذ** تملك شركة "إيس لخدمة تنظيف النوافذ" مبلغ 50 AED مقابل طلب الحصول على الخدمة و 20 AED مقابل كل ساعة يقضونها في العمل. اكتب معادلة بصيغة الميل والتقاطع لمتل التكلفة الإجمالية C من حيث عدد الساعات h .

$$C = 20h + 50$$

مثال 4

اكتب معادلة للمستقيم المار عبر النقطة $(2, 5)$ والنقطة $(6, 3)$ بصيغة الميل والتقاطع.

الخطوة 1 أوجد ميل المستقيم المار عبر النقطتين.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 5}{6 - 2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

قانون الميل

$$x_1 = 2 \text{ و } y_1 = 5 \text{ و } x_2 = 6 \text{ و } y_2 = 3$$

بسط.

الخطوة 2 اكتب معادلة للمستقيم.

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{صيغة الميل والنقطة}$$

$$y - 5 = -\frac{1}{2}(x - 2) \quad m = -\frac{1}{2} \text{ و } (x_1, y_1) = (2, 5)$$

$$y - 5 = -\frac{1}{2}x + 1 \quad \text{بسط.}$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 6 \quad \text{اجمع 5 على كل طرف.}$$



إجابات إضافية

34. $w \parallel x$ حسب معكوس نظرية الزوايا الداخلية المتتالية

35. لا شيء

36. $w \parallel x$ معكوس مسلمة الزوايا المتناظرة

37. $v \parallel z$ معكوس نظرية الزوايا الخارجية المتبادلة



42. يقع الصف الثاني على مسافة متساوية في جميع النقاط من الصف الأول.


إجابات إضافية (تمرين على الاختبار)

8. 84: نظرية الزوايا الداخلية المتتالية

9. 138: نظرية الزوايا المتكاملة

10. 42: نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة

12a. فبت أن تريم: $y = 80x$ فبت فور لايف: $y = 55x + 75$



12b. لا، يتقاطع المستقيمان لأن ميل المستقيمين 80 و 55 غير متساويين.

12c. يبدو من التمثيل البياني أنه إذا كان حضورك للمركز لأقل من 3 أشهر، فإن "فيت آن تريم" يعرض سعراً أقل، وإذا كنت تنوي الحضور لمدة تزيد عن 3 أشهر، فمركز "فيت فور لايف" يعرض سعراً أفضل.

11-5 إثبات توازي المستقيمتين


بناءً على المعلومات التالية، حدد أي المستقيمتين، إن وجدت، متوازية. اذكر المسألة أو النظرية التي تبرر إجابتك.

34. $\angle 7 \cong \angle 10$

35. $\angle 2 \cong \angle 10$

36. $\angle 1 \cong \angle 3$

37. $\angle 3 \cong \angle 11$




38. أوجد x بحيث يكون $p \parallel q$. حدد المسألة أو النظرية التي استخدمتها.

9. معكوس نظرية الزوايا الداخلية المتتالية

39. تسمى الحقائق أوجد القياس الضروري لـ $m\angle ADC$ يجعل $AB \parallel CD$ إذا كان $m\angle BAD = 135$



بناءً على المعلومات التالية، حدد أي المستقيمتين، إن وجدت، متوازية. اذكر المسألة أو النظرية التي تبرر إجابتك.



$\angle 1 \cong \angle 7$

$\angle 1$ و $\angle 7$ هما زاويتان داخليتان خارجيتان على المستقيمتين d و b

بما أن $\angle 1 \cong \angle 7$ و $d \parallel b$ بناءً على معكوس نظرية الزوايا الخارجية المتبادلة.

$\angle 4 \cong \angle 5$

$\angle 4$ و $\angle 5$ هما زاويتان داخليتان متبادلتان على المستقيمتين d و c



بما أن $\angle 4 \cong \angle 5$ و $d \parallel c$ بناءً على معكوس نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة.

11-6 المتعامدات والمسافة

انسخ كل شكل. ارسم الخطعة المستقيمة التي تمثل المسافة المشار إليها. 40-42. انظر الهامش.

40. X إلى $\overline{WV}$


41. L إلى $\overline{WV}$




42. ديكور المنزل يرغب عند في تعليل صفين من الصور الموضحة في خطوط متوازية على جدار غرفة معيشتهم. في البداية، باعذ بين المسامير على الجدار في صورة خط مستقيم للصف العلوي. بعد ذلك، غلق خيطاً بئفل لتحديد المسقط الرأسى من كل مسمار وقاس مسافة متساوية أسفل كل مسمار من أجل تحديد الصف الثاني. فلماذا يضمن هذا أن صفى الصور سيكونان متوازيين؟

مثال 6

انسخ الشكل. ارسم الخطعة المستقيمة التي تمثل المسافة من النقطة A إلى $\overline{CD}$.



المسافة من مستقيم إلى نقطة ليست على هذا المستقيم هي طول الخطعة المستقيمة العمودية على المستقيم المار عبر هذه النقطة. وسم الخطعة $\overline{CD}$ وارسم الخطعة المستقيمة العمودية على $\overline{CD}$ من A .



إجابات إضافية

22. $k \parallel j$ ، معكوس مسلّة الروابي

المتناظرة

23. لا يمكن إثبات توازي $\parallel$ أي من

المتتبعات.

24. $p \parallel q$: معكوس نظرية الروابي

الخارجية المتبادلة


25. $y = 10x + 82.5$ حيث

x = عدد ساعات العمل

أوجد المسافة بين كل زوج من الخطوط المتوازية ذات المعادلات المعطاة.

16. $y = x - 11$ $\sqrt{8} \approx 2.8$ 17. $y = -2x + 1$
 $y = x - 7$ $y = -2x + 16$
 $\sqrt{45} \approx 6.7$

18. الاختيار من متعدد أي قطعة مستقيمة متعامدة مع $\overline{CD}$ D



A $\overline{YZ}$


B $\overline{AB}$

C $\overline{DE}$

D $\overline{VZ}$

19. أوجد x بحيث يكون $a \parallel b$. حدد المسألة أو النظرية التي استخدمتها.

14: معكوس نظرية الزوايا الداخلية المتتالية.



الهندسة الإحداثية أوجد المسافة من P إلى ℓ .

20. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين $(-4, 2)$ و $(3, -5)$.

النقطة P لها الإحداثي $(1, 2)$.

$\frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3.5$

21. المستقيم ℓ يحتوي على النقطتين $(6, 5)$ و $(2, 3)$. النقطة P

لها الإحداثي $(2, 6)$.

$\frac{6\sqrt{5}}{5} \approx 2.7$

بناءً على المعلومات التالية، حدد أي المستقيمتين، إن وجدت،


متوازية. اذكر المسألة أو النظرية التي تبرر إجابتك.

22-24. انظر الهامش.

22. $\angle 4 \approx \angle 10$

23. $\angle 9 \approx \angle 6$

24. $\angle 7 \approx \angle 11$



25. الوظائف يعمل محمود في متجر للملابس وأجره AED 10 لكل

ساعة بالإضافة إلى عمولة بنسبة 15% على بضاعة التي يبيعها.

اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع بحيث تمثل ما يكسبه خلال


أسبوع إذا باع بضاعة بقيمة AED 550. انظر الهامش.

صفت العلاقة بين كل زوج من الزوايا باعتباره زوايا داخلية متبادلة أو خارجية متبادلة أو متناظرة أو داخلية متتالية.

1. $\angle 6$ و $\angle 3$ خارجية متبادلة

2. $\angle 4$ و $\angle 7$ داخلية متتالية

3. $\angle 5$ و $\angle 4$ داخلية متبادلة



حدد ميل المستقيم الذي يحتوي على النقاط المعطاة. 4. غير محدد

4. $G(8, 1)$, $H(8, -6)$ 5. $A(0, 6)$, $B(4, 0)$ $-\frac{3}{2}$

6. $E(6, 3)$, $F(-6, 3)$ 0 7. $E(5, 4)$, $F(8, 1)$ -1

في الشكل، $m\angle 12 = 42$ و $m\angle 8 = 96$. أوجد قياس كل زاوية.


وذكر أي معادلة (مسلمات) أو نظرية (نظريات) استخدمتها.

8. $\angle 9$

9. $\angle 11$


10. $\angle 6$

8-10. انظر الهامش.



11. أوجد قيمة x في الشكل أدناه.

128



12. اللياقة البدنية ترغب في الالتحاق بمرکز لياقة بدنية.

ويكلف مرکز "فيت أن تريم" AED 80 لكل شهر. ويكلف مرکز

"فيت فور لايف" رسم عضوية لمرة واحدة بقيمة AED 75

و AED 55 لكل شهر. a-c. انظر الهامش.

a. اكتب وقلل بياني معادلتين بصيغة الميل والمقطع لتمثيل

التكلفة y للحضور في كل مركز لياقة بدنية في فترة x

شهر/شهور.

b. حل المستقيمتين التي تمثلها بياني في الجزء a متوازية؟

اشرح لماذا أو لماذا لا.

c. أي مركز لياقة بدنية يقدم السعر الأفضل؟ اشرح.

اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع لكل مستقيم موصوف.

13. يمر بالنقطة $(-8, 1)$. وعمودي على $y = 2x - 17$

14. يمر بالنقطة $(0, 7)$ ومتوازي مع $y = 4x - 19$

15. يمر بالنقطة $(-12, 3)$. وعمودي على $y = -\frac{2}{3}x - 11$

$y = \frac{3}{2}x + 21$

أسئلة الإجابة الشبكية

1	/	4	
			
			
			
			
			
			
			
			

الكحول

3	.	5	

الكمور العشرية

			3
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

الأعداد الكلية

3				

صحیحہ

• املاً كل فحاعة بالكامل وبوضوح.

مثال إضافي

تمرين على الاختبار المعياري

ما ميل المستقيم الذي يحتوي على النقاط الممثلة في الجدول أدناه؟ 4

x	y
-4	-18
-2	-10
2	6
4	14

3 التقويم


استخدم التمرينين 1 و 2 لتقويم استيعاب الطلاب.

مثال على الاختبار المعياري

اقرأ المسألة. حدد ما تحتاج لمعرفته. ثم استخدم المعلومات الموجودة في المسألة لحلها.




إجابة شبيكية في الشكل أدناه. يتم قطع $\angle ABC$ بواسطة المستقيمين المتوازيين ℓ . فما قياس الزاوية $\angle ABC$ ؟ عبر عن إجابتك بالدرجات.



أعد رسم الشكل وأضف مستقيماً ثالثاً موازياً للمستقيمين ℓ ويمر عبر النقطة B. أوجد قياس الزاوية باستخدام الزوايا الداخلية المتبادلة.

حل المسألة



$$m\angle ABC = 38 + 33 = 71$$

اكتب إجابتك في مربع الإجابة وأملأ الشبكة.


وأملأ الشبكة



تبايرين

اقرأ كل سؤال. ثم اكتب الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة التي قدمها المعلم أو في ورقة أخرى.

1. إجابة شبيكية ما ميل المستقيم الذي يحتوي على النقطتين $R(-2, 1)$ و $S(10, 6)$ ؟ عبر عن إجابتك في صورة كسر. $5/12$
2. إجابة شبيكية حل لإيجاد قيمة x في الشكل أدناه. 31



تمرين على الاختبار تراكبي الوحدات من 1 إلى 11

5. ما التمثيل البياني الذي يمر بالنقطتين $(-3, -1)$ و $(-2, 3)$ ؟


F $y = -6x - 9$

G $y = -\frac{1}{4}x + 3$

H $y = 4x - 5$

J $y = \frac{2}{3}x + 1$

6. ما قيمة $m\angle 1$ في الشكل أدناه ؟ F



F 85

G 90

H 95

J 100

7. يدخر راشد المال لشراء جهاز إلكتروني سيارة. وقد ادخر مبلغ 45 AED. ويمكنه ادخار مبلغ 15 AED كل أسبوع. فإذا كان جهاز الإلكتروني الذي يريده بسعر 210 AED، فكم أسبوعاً سيستغرق راشد لشراء جهاز الإلكتروني ؟ B

A 10

B 11

C 12

D 13


نصيحة عند حل الاختبار

السؤال 6: ارسم رسماً تخطيطياً يمكنك الاستعانة به في حل المسائل. ارسم مستقيماً موازياً ثالثاً يمر عبر رأس الزاوية 1. ثم استخدم خصائص المستقيمتين المتوازيين والخطوط لقطع المسألة.

الاختبار من متعدد

اقرأ كل سؤال. ثم اكتب الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة التي قدمها المعلم أو في ورقة أخرى.

1. إذا كان $b \parallel a$ في الرسم التخطيطي أدناه، فأأي مما يلي قد لا يكون صحيحاً ؟ D



A $\angle 1 \cong \angle 3$

B $\angle 4 \cong \angle 7$

C $\angle 2 \cong \angle 5$

D $\angle 8 \cong \angle 2$

2. في المتحف، تبلغ تكلفة دخول كل طفل 5.75 AED وكل شخص بالغ 8.25 AED. فكم تبلغ تكلفة دخول أسرة تتألف من فردين بالغين و 4 أطفال ؟ B


A AED 34.50

B AED 39.50

C AED 44.50

D AED 49.50

3. ما ميل المستقيم ؟ A



A $-\frac{2}{3}$

B $-\frac{1}{2}$

C $-\frac{2}{5}$

D $-\frac{1}{6}$

4. المستقيم k يحتوي على نقطتين عند $(4, 1)$ وعند $(-5, -5)$.

فأوجد المسافة بين المستقيم k والنقطة $F(-4, 0)$.


G 3.3 وحدات

H 4.0 وحدات


F 3.3 وحدات

G 3.6 وحدات

46.



47a.



50. يمكن للمستويات أن تكون متخالفة لأن تعريف المستويات المتخالفة ينص على أن هذه المستويات يجب ألا تتقاطع ولا تكون مطلقاً في مستوى واحد، ولا يمكن للمستويات المختلفة أن تكون في مستوى واحد. بل هي متوازية أو متقاطعة دائماً. ولذا، فلا بد للمستويات المتخالفة أن تكون في مستويات متوازية أو متقاطعة، ولا يمكن أن تكون في مستويات متخالفة.

الاستكشاف 11-2

1. الزوايا $\angle FAC$, $\angle GAB$, $\angle JBA$, $\angle KBD$ متساوية في القياس، كما أن الزوايا $\angle CAB$, $\angle FAB$, $\angle JBD$, $\angle ABK$ متساوية في القياس.

2. الإجابة النموذجية،

الزوايا	$\angle FAC$	$\angle GAB$	$\angle JBA$	$\angle KBD$	$\angle CAB$	$\angle FAB$	$\angle JBD$	$\angle ABK$
القياس الأول	114	66	114	66	114	66	114	66
القياس الثاني	87	93	87	93	87	93	87	93
القياس الثالث	45	135	45	135	45	135	45	135
القياس الرابع	122	58	122	58	122	58	122	58
القياس الخامس	150	30	150	30	150	30	150	30

3a. زوايا متناظرة: $\angle FAC$, $\angle JBA$, $\angle GAB$, $\angle ABK$, $\angle CAB$, $\angle FAB$, $\angle JBD$, $\angle KBD$. إذا تم قطع مستقيمين متوازيين بقاطع، فإن أزواج الزوايا المتناظرة تكون متطابقة.

3b. زوايا داخلية متبادلة: $\angle FAC$, $\angle ABK$, $\angle GAB$, $\angle JBA$. إذا تم قطع مستقيمين متوازيين بقاطع، فإن الزوايا الداخلية المتبادلة تكون متطابقة.

3c. زوايا خارجية متبادلة: $\angle FAC$, $\angle KBD$, $\angle CAB$, $\angle JBD$. إذا تم قطع مستقيمين متوازيين بقاطع، فإن الزوايا الخارجية المتبادلة تكون متطابقة.

3d. زوايا داخلية متتالية: $\angle FAC$, $\angle JBA$, $\angle GAB$, $\angle ABK$. إذا تم قطع مستقيمين متوازيين بقاطع، فإن الزوايا الداخلية المتتالية تكون متطابقة.

4a. الإجابة النموذجية، جميع الزوايا قياسها 90.

4b. الإجابة النموذجية، إذا تم قطع مستقيمين متوازيين بقاطع بحيث يكون متعامداً على أحد المستقيمين، فإن القاطع يصح متعامداً على المستقيم الآخر.

الدرس 11-2 (تمرين موجه)

1A. مسألة الزوايا المتناظرة

1B. 75° , $\angle 2$ متكاملة مع $\angle 1$ ، نظرية التكامل

1C. 75° , $\angle 3 \cong \angle 2$ ، نظرية الزوايا المتبادلة بالرأس

الدرس 11-2

23. $y = 117$, $x = 51$ زاويتان متكاملتان

24. $x = 39$, $y = 41$ زاويتان متكاملتان

25. $x = 42$ زاويتان متكاملتان


26. $x = 43$ زاويتان على نفس الجهة من القاطع متكاملتان، $y = 18$ زاويتان على نفس الجهة من القاطع متكاملتان

27. $x = 60$ الزوايا الداخلية المتبادلة تكون متطابقة، $y = 14$ زاويتان داخليتان على نفس الجهة من القاطع متكاملتان

28. $x = 70$ زاويتان داخليتان على نفس الجهة من القاطع متكاملتان، $y = 33$ الزوايا المتناظرة متطابقة

34. المعطى: $\ell \parallel m$

المطلوب إثباته: $\angle 1 \cong \angle 8$, $\angle 2 \cong \angle 7$



البرهان:













العبارة (المبررات)

1. $\ell \parallel m$ (معطى)

2. $\angle 1 \cong \angle 5$, $\angle 2 \cong \angle 6$ (مسألة الزوايا المتناظرة Δ)

3. $\angle 5 \cong \angle 8$, $\angle 6 \cong \angle 7$ (نظرية الزوايا المتبادلة بالرأس Δ)

4. $\angle 1 \cong \angle 8$, $\angle 2 \cong \angle 7$ (خاصية التعدي)



35a. الزوايا زوجية الترفيم متطابقة لأن الزوايا الداخلية المتبادلة تكون متطابقة.


35b. الزوايا فردية الترفيم متطابقة لأن الزوايا الداخلية المتبادلة تكون متطابقة.

35c. ستكون الزاويتان متتامتين وإذا تعامد مستقيم على أحد مستقيمين متوازيين، فإنه يكون متعامداً على المستقيم الآخر وتكون المستقيمتان المتعامدتان زوايا قائمة.

40. المستقيمان b و c متعامدان، وبما أن الزاويتين 5 و 6 تكونان زوجاً خطياً، إذاً $m\angle 5 = m\angle 6$ و $m\angle 5 + m\angle 6 = 180$ ، ومن خلال التعويض، تكون $m\angle 5 = 90$ و $m\angle 6 = 90$ إذاً فالمتقيمان b و c متعامدان، وبما أن القاطع c يكون متعامداً على المستقيم a والمستقيمان b و a متوازيان، فإن المستقيم c يكون متعامداً على المستقيم a .





41. هي كلتا النظريتين، يتكون زوج من الزوايا عندما يمر قاطع عبر مستقيمين متوازيين. ومع ذلك، في نظرية الزوايا الخارجية المتبادلة، يكون كل زوج من الزوايا الخارجية المتبادلة المتكونة متطابقاً، بينما يكون كل زوج من الزوايا المتكونة متكاملة في نظرية الزوايا الخارجية المتتالية.

42.



زوايا خارجية متتالية أو زوايا خارجية لنفس القاطع

الصفحات من 662 إلى 665، الدرس 11-3




العبارة (العبارة)

1. $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (معطى)
 2. $m = \frac{-(y_2 - y_1)}{-(x_2 - x_1)}$ (خاصية الضرب)
 3. $m = \frac{-y_2 + y_1}{-x_2 + x_1}$ (خاصية التوزيع)
 4. $m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ (خاصية الجمع والتبديل)


57. الإجابة النموذجية: النقطتان (4, -3) و (5, -5) تقعان على نفس المستقيم مثل النقطتين X و Y. والميل بين كل نقطتين يساوي -2. لإيجاد نقاط إضافية، يمكنك تحديد أي نقطة على المستقيم وطرح 2 من الإحداثي y وإضافة 1 إلى الإحداثي x.

اختبار نصف الوحدة

16. ليس أيًا منهما.




15. متوازيان.




الدرس 11-4 (تمرين موجّه)

1. $y = \frac{1}{2}x + 8$




2. $y + 6 = 4(x + 3)$




الدرس 11-4


4.




5.




6.




37.








38.



39.



45b.


46. $x = 6$ 47. $y = -8$ 48. $x = 15$ 49. $y = 0$ 

56. الإجابة النموذجية:

المعطى: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
 المطلوب إثباته: $m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

البرهان



21. $y - 9 = -7(x - 1)$




22. $y - 5 = \frac{5}{3}(x - 2)$



23. $y - 6 = -\frac{4}{3}(x - 3)$ 24. $y - 12 = -2.4(x - 14)$



42b. مداخلات أحمد



42d. 15. إذا بدأ أحمد عملية التوفير منذ أسبوعين، فسيكون بالمعدل بعد 15 + AED 15 + AED 50 أو AED 80. وهو في حاجة إلى توفير (AED 10) - AED 180 أو AED 300. وهو لا يزال في حاجة إلى توفير 80 - AED 300 أو AED 220. وبمقدار AED 220 على 15 أسبوعاً آخر من أحمد لتوفير ما يكفيه من التوفير.

56. بعد ميل المستقيم المار بالنقطتين (2, 5) و (-2, 2) و (5, 2)

يساوي 3/4. وميل المستقيم المار بالنقطتين (2, 5) و (6, 8)

يساوي 3/4. ونظراً لأن هذين المستقيمين لهما نفس الميل ولهما

نقطة مشتركة، فمعادلهما ستكون متماثلتين. ولذا، جميع النقاط

تقع على نفس المستقيم وجميعها على استقامة واحدة.

الدرس 11-5

16. $x = 42$ الزوايا الخارجية المتبادلة متطابقة. إذا فالمستقيمان متوازيان.


17. $x = 15$ الزوايا المتناظرة متطابقة. إذا فالمستقيمان متوازيان.

18. $x = 72$ الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة. إذا فالمستقيمان متوازيان.


19. $x = 40$ الزوايا الداخلية الموجودة على جهة واحدة من

الخطاطع متكاملة. إذا فالمستقيمان متوازيان.


12b. تكلفة خدمة الموسيقى




13. $y = -5x - 2$




14. $y = -7x - 4$




15. $y = 9x + 2$




16. $y = 12x + \frac{4}{5}$




17. $y = -\frac{3}{4}x + 4$




18. $y = \frac{5}{11}x - 3$




19. $y - 11 = 2(x - 3)$



20. $y - 8 = 4(x + 4)$





31. المعطى: $\angle 1 \cong \angle 2$
المطلوب إثباته: $\ell \parallel m$

العبارة (المبررات)

1. $\angle 1 \cong \angle 2$ (معطى)
2. $\angle 2 \cong \angle 3$ (الزوايا المتقابلة بالرأس تكون متطابقة)
3. $\angle 1 \cong \angle 3$ (خاصية التعدي)
4. $\ell \parallel m$ (إذا كانت الزاويتان المتناظرتان $\angle 1$ و $\angle 3$ متطابقتين $\cong$ ، إذا فالمتستقيمان متوازيان $\parallel$).
33. هذه المستقيمان متوازيان لأن الزوايا المتناظرة متطابقة.
34. هذه المستقيمان متوازيان لأن الزوايا الخارجية المتبادلة متطابقة.
35. هذه المستقيمان ليست متوازيين لأن الزوايا الخارجية المتبادلة ليست متطابقة.
37. تقع النقطة (0, 5) على المستقيم $y = 2x + 5$ والمستقيم المتعامد على المستقيم $y = 2x + 5$ يكون له ميل يساوي $-\frac{1}{2}$. ومعادلة المستقيم المتعامد تكون $y = -\frac{1}{2}x + 5$ ونقطة التقاطع للمستقيمين $y = 2x - 1$ و $y = -\frac{1}{2}x + 5$ هي (4, 7). استخدم صيغة المسافة لإيجاد المسافة بين (0, 5) و (4, 7). المسافة تساوي $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ أو تقريباً 4.47 وحدات.

39. البرهان:

العبارة (المبررات)

1. $w \parallel x$; $x \parallel y$ (معطى)
2. $\angle 2 \cong \angle 3$; $\angle 3 \cong \angle 4$ (إذا مرّ قاطع بمستقيمان متوازيين، فإن الزوايا المتناظرة تكون متطابقة).
3. $\angle 2 \cong \angle 4$ (خاصية التعدي)
4. $w \parallel y$ (إذا كانت الزوايا المتناظرة متطابقة، إذا فالمتستقيمان متوازيان).

41a. البرهان:

العبارة (المبررات)

1. $m\angle 5 + m\angle 2 = 180$ (معطى)
2. $m\angle 2 + m\angle 3 = 180$ (تعريف الزوج الخلفي)
3. $\angle 5 \cong \angle 3$ (الزاويتان المتكاملتان مع نفس الزاوية تكونان متطابقتين مع بعضهما البعض).
4. $b \parallel c$ (إذا كانت الزوايا الخارجية المتبادلة متطابقة، فحينها يكون المستقيمان متوازيين).

41b. البرهان:

العبارة (المبررات)

1. $a \parallel b$; $m\angle 1 + m\angle 5 = 180$ (معطى)
2. $\angle 1 \cong \angle 5$ (إذا مرّ قاطع بمستقيمين متوازيين، فإن الزوايا الداخلية المتبادلة تكون متطابقة).
3. $m\angle 1 = m\angle 5$ (تعريف الزوايا المتطابقة)
4. $m\angle 5 + m\angle 5 = 180$ (التعويض)
5. $2m\angle 5 = 180$ (خاصية الجمع)
6. $m\angle 5 = 90$ (خاصية القسمة في المعادلة)
7. $t \perp b$ (المستقيمان المتعامدان يتكونان من زوايا قائمة).

20. $x = 27$. الزاويتان المتقابلتان بالرأس متطابقتان. والزاويتان الداخليتان الموجودتان على جهة واحدة من القاطع متكاملتان. إذا فالمتستقيمان متوازيان.

21. $x = 36$. الزوايا الخارجية المتبادلة متطابقة. إذا فالمتستقيمان متوازيان.

25. البرهان:

العبارة (المبررات)

1. $\angle 1 \cong \angle 3$; $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ (معطى)
2. $\angle 1 \cong \angle 2$ (إذا كان المستقيمان متوازيين، فحينها تكون الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة).
3. $\angle 2 \cong \angle 3$ (خاصية التعدي)
4. $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ (إذا كانت الزوايا المتناظرة متطابقة، إذا فالمتستقيمان متوازيان).

26. البرهان:

العبارة (المبررات)

1. $\angle 2 \cong \angle 4$; $\overline{WY} \parallel \overline{XZ}$ (معطى)
2. $\angle 1 \cong \angle 2$ (إذا كان المستقيمان متوازيين، فحينها تكون الزوايا المتناظرة متطابقة).
3. $\angle 1 \cong \angle 4$ (خاصية التعدي)
4. $\overline{WX} \parallel \overline{YZ}$ (إذا كانت الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة، فحينها يكون المستقيمان متوازيين).

27. البرهان:

العبارة (المبررات)

1. $\angle TQR \cong \angle TSR$; $m\angle R + m\angle TSR = 180$ (معطى)
2. $m\angle TQR = m\angle TSR$ (تعريف الزوايا المتطابقة)
3. $m\angle R + m\angle TQR = 180$ (التعويض)
4. $\overline{OT} \parallel \overline{RS}$ (إذا كانت الزاويتان الداخليتان الموجودتان على جهة واحدة من القاطع متكاملتين، إذا فالمتستقيمان متوازيان).


28. البرهان:

العبارة (المبررات)

1. $\angle DAB \cong \angle DCB$; $\overline{AD} \perp \overline{AB}$ (التعويض)
2. $\angle DAB$ هي زاوية قائمة (المستقيمان المتعامدان تكون زوايا قائمة).
3. $m\angle DAB = 90$ (تعريف الزاوية القائمة)
4. $m\angle DAB = m\angle DCB$ (تعريف الزوايا المتطابقة)
5. $m\angle DCB = 90$ (التعويض)
6. $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ (تعريف المستقيمان المتعامدان).

30. المعطى: $\ell \perp t$, $m \perp t$

المطلوب إثباته: $\ell \parallel m$



البرهان:

بما أن $\ell \perp t$ و $m \perp t$ ، فإن مجموع قياس الزاويتين $\angle 1$ و $\angle 2$ يساوي 90. وبما أن $\angle 1$ و $\angle 3$ لهما نفس القياس، إذا فهما متطابقتان. وحسب معكوس مسلمة الزوايا المتناظرة، فإن $\ell \parallel m$.

42. الإجابة النموذجية: استخدم زوجًا من الزوايا الخارجية المتبادلة والمتطابقة وخططهما قاطع، ووضح أن الزاويتين الداخليتين المتتامتين تكونان متكاملتين، ووضح أيضًا أن الزوايا الداخلية المتبادلة تكون متطابقة، ووضح أن مستقيمين في مستوى واحد يكونان متعامدين على نفس المستقيم، ووضح أن الزوايا المتناظرة تكون متطابقة.

43. هذه العبارة صحيحة أحيانًا، وكان من الممكن أن تكون صحيحة لو كانت الزاويتان قائمتين، وإلا، فإن الزاويتين المتكاملتين لن تكونا متطابقتين.

الدرس 11-6

- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

الدرس 11-6

42. الإجابة النموذجية: المحل الهندسي للنقاط الموجودة على بُعد واحد من المستقيمين AB و CD اللذين يتقاطعان عند النقطة X هي النقاط التي تقع على طول المستقيم EF ، والذي ينصف الزاويتين المتقابلتين بالرأس $\angle CXA$ و $\angle BXD$ ، والمستقيم GH الذي ينصف الزاويتين المتقابلتين بالرأس $\angle AXD$ و $\angle CXB$ ويكون المستقيمان EF و GH زوجًا من المستقيمتين المتعامدتين.

