



الرياضيات

الفصل الدراسي الثاني

كتاب الطالب

7

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

هبة ماهر التميمي إبراهيم أحمد عمارة د. عيسى عبد الوهاب الطراونة

إضافة إلى جهود فريق التأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية مشتركة من لجان مراجعة وتقييم علمية وتربوية ولغوية، ومجموعات مُركّزة من المعلمين والمُشرّفين التربويين، وملاحظات مجتمعية من وسائل التواصل الاجتماعي، وإسهامات أساسية دقيقة من اللجنة الاستشارية والمجلس التنفيذي والمجلس الأعلى في المركز، ومجلس التربية والتعليم ولجانه المتخصصة.

الناشر

المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج، ووزارة التربية والتعليم - إدارة المناهج والكتب المدرسية، استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب

عن طريق العناوين الآتية: هاتف: 4617304/5-8، فاكس: 4637569، ص. ب: 1930، الرمز البريدي: 11118،

أو بوساطة البريد الإلكتروني: scientific.division@moe.gov.jo

قرّرت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2020/7)، تاريخ 2020/12/1 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2020/161) تاريخ 2020/12/17 م بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© Harper Collins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 028 - 8

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2020/8/2959)

373,19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الرياضيات: كتاب الطالب (الصف السابع) / المركز الوطني لتطوير المناهج - عمان: المركز، 2020

ج 2 (160) ص.

ر.إ.: 2020/8/2959

الواصفات: / الرياضيات / / التعليم الاعدادي / / المناهج /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيّنًا للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي، ومجارة أقرانهم في الدول المتقدمة. ولما كانت الرياضيات إحدى أهمّ الموادّ الدراسية التي تنمّي لدى الطلبة مهارات التفكير وحلّ المشكلات، فقد أولى المركز هذا المبحث عنايةً كبيرةً، وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائق المُتبّعة عالمياً على يد خبراء أردنيين؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها لاحتياجات أبنائنا الطلبة والمعلّمين.

روعي في إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بصورة سلسلة، ضمن سياقات حياتية شائقة، تزيد رغبة الطلبة في التعلّم، ووظّفت فيها التكنولوجيا لتُسهم في جعل الطلبة أكثر تفاعلاً مع المفاهيم المُقدمة لهم. كما عُنِيَ بإبراز خطة حلّ المسألة، فأفرد لها دروساً مستقلة تتيح للطلبة التدرّب على أنواع مختلفة من هذه الخطط وتطبيقها في مسائل متنوعة. لقد احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلّم الطلبة للمفاهيم والمهارات الواردة فيها وإثرائها. ولأنّ التدرّب المكثّف على حلّ المسائل يُعدّ إحدى أهم طرائق ترسيخ المفاهيم الرياضية وزيادة الطلاقة الإجرائية لدى الطلبة؛ فقد أعدّ كتاب التمارين على نحوٍ يُقدّم للطلبة ورقة عمل في كل درس، تُحلّ بوصفها واجباً منزلياً، أو داخل الغرفة الصفية إن توافر الوقت الكافي. ولأنّنا ندرك جيداً حرص المعلّم الأردني على تقديم أفضل ما لديه للطلبة؛ فقد جاء كتاب التمارين أداةً مساعدة تُوفّر عليه جهد إعداد أوراق العمل وطباعتها.

من المعلوم أنّ الأرقام العربية تُستخدم في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية، ولا سيّما على شبكة الإنترنت، التي أصبحت أداةً تعليميةً مُهمّةً؛ لما تزخر به من صفحات تُقدّم محتوىً تعليمياً تفاعلياً ذا فائدة كبيرة. وحرصاً منا على ألا يفوت أبنائنا الطلبة أيّ فرصة، فقد استعملنا في هذا الكتاب الأرقام العربية؛ لجسّر الهوة بين طلبتنا والمحتوى الرقمي العلمي، الذي ينمو بتسارع في عالم يخطو نحو التعليم الرقمي بوتيرة متسارعة.

ونحن إذ نقدّم الطبعة الأولى (التجريبية) من هذا الكتاب، نأمل أن تنال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، وتجعل تعليم الرياضيات وتعلّمها أكثر متعةً وسهولةً، ونعدهم بأن نستمرّ في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من ملاحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج

48	الوحدة 6 التطابق والتشابه
49	مشروع الوحدة: نموذج قصر الحرّانة
50	الدرس 1 التطابق
56	الدرس 2 مقياس الرسم
61	معمل برمجة جيو جبراً: استكشاف: الأشكال المتشابهة ..
62	الدرس 3 التشابه
69	الدرس 4 التكبير
75	معمل برمجة جيو جبراً: التكبير
76	الدرس 5 خطوة حلّ المسألة: الرسم
78	اختبار الوحدة

6	الوحدة 5 التناسب وتطبيقاته
7	مشروع الوحدة: التناسب في الحياة اليومية
8	الدرس 1 معدّل الوحدة
13	الدرس 2 التناسب
18	الدرس 3 العلاقات التناسبية
23	الدرس 4 التناسب الطردي
29	استكشاف: التناسب الطردي
30	الدرس 5 التناسب العكسي
36	الدرس 6 التقسيم التناسبي
41	الدرس 7 تطبيقات مالية
46	اختبار الوحدة

الوحدة 8 الإحصاء والاحتمالات 126

مشروع الوحدة: ميزان الأعداد 127

الدرس 1 الوسط الحسابي 128

الدرس 2 الوسط، والمِنوال، والمدى 134

الدرس 3 التمثيل بالساق والورقة 139

الدرس 4 الاحتمالات 145

الدرس 5 الاحتمال التجريبي 153

اختبار الوحدة 159

الوحدة 7 المساحات والحجوم 80

مشروع الوحدة: صناعة الصابون 81

معمل برمجية جيوجبرا: استكشاف النسبة التقريبية (pi) .. 82

الدرس 1 محيط الدائرة 84

استكشاف: قانون مساحة الدائرة 90

الدرس 2 مساحة الدائرة 91

الدرس 3 حجم المنشور والأسطوانة 96

استكشاف: حجم الهرم 102

الدرس 4 حجم الهرم والمخروط 103

الدرس 5 مساحة سطح المنشور والأسطوانة ... 109

استكشاف: مساحة سطح المخروط 116

الدرس 6 مساحة سطح الهرم والمخروط 117

اختبار الوحدة 124

التناسب وتطبيقاته

ما أهمية هذه الوحدة؟

للتناسب تطبيقات حياتية كثيرة، فهو يُستخدم في تحديد كمية المواد الأولية اللازمة لصنع المواد الغذائية أو الطبية، ويُستخدم أيضًا في تقسيم الميراث وتوزيع الأرباح بين شركاء حصصهم مختلفة، وفي حل مسائل الخصم والضريبة، وتسهيل أعمال التجارة والسياحة الدولية بالتحويل بين العملات المختلفة.



سأتعلم في هذه الوحدة:

- إيجاد معدل الوحدة من نسب كسرية.
- حل مسائل باستخدام مفهوم التناسب.
- تمييز النسبيين: الطردي، والعكسي.
- توظيف التقسيم التناسبي لحل مسائل حياتية.
- تحديد السعر الأفضل لسلعة عُرِفَتْ أسعارها في دولتين أو أكثر بعملاتها.

تعلمت سابقًا:

- ✓ كتابة النسبة بصور مختلفة.
- ✓ إيجاد نسب مكافئة لنسب معطاة.
- ✓ تطبيق معدل الوحدة في مواقف حياتية.
- ✓ حل مسائل حياتية على النسبة والنسبة المئوية.
- ✓ حل مسائل في البيع والشراء تتطلب تحويلات بين عملات محلية وعربية وأجنبية.



مشروع الوحدة: التناسب في الحياة اليومية

المهمة (2): تجارة في مقصف المدرسة

خطوات تنفيذ المشروع:

- 1 أختار ومجموعتي منتجات تباع في مقصف المدرسة (عصير، أو قطع بسكويت، أو ساندويشات) وأكتب أسمائها في الجدول الآتي:

الربح	سعر البيع	تكلفة المنتج	المنتج

خصم على سعر بيع المنتج السابق					
الربح بعد الخصم	نسبة الخصم	سعر البيع الجديد	سعر البيع القديم	المنتج	

- 2 أحدد سعر البيع لكل منتج.
- 3 أحدد تكلفة المنتج.
- 4 أحدد نسبة الخصم لزيادة مبيعات المنتج.
- 5 أجد السعر الجديد والربح بعد الخصم.

عرض النتائج:

تعرض المجموعة جداولها، وتناقش كيفية اختيار المنتج وتحديد نسبة الخصم عليه، وأية أعمال أخرى وثقتها المجموعة.

أستعد ومجموعتي لتنفيذ مشروعنا الخاص الذي نطبق فيه ما نتعلمه في هذه الوحدة والمكون من مهمتين.

المهمة (1): التناسب في السوق

خطوات تنفيذ المشروع:

- 1 أبحث عن عبوات مياه صحية تبتجها شركة واحدة وبسعات مختلفة، وأقرأ ما تحويه من معادن، ثم أختار أحد المعادن (صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، ...) وأملأ الجدول الآتي:

$\frac{y}{x}$	كتلة المعدن (y)	سعة العبوة (x)
		0.25 L
		0.5 L
		1.5 L

- 2 أكتب العلاقة بين x و y على الصورة $y = kx$.

- 3 أمثل العلاقة بيانياً، وأحدد نوع التناسب من الرسم.

عرض النتائج:

تعرض المجموعات جداولها، وتناقش كيفية اختيار الشركة وقراءة كتلة المعدن والصورة التي التقطت لعبوات المياه، والعمليات الحسابية والتمثيل البياني.



أستكشف

تُعَدُّ سمكة الزعنفة الشراعية أسرع أنواع أسماك القرش، إذ يُمكنها أن تقطع مسافة 275 km في ساعتين ونصف. كم كيلومتراً يُمكن لهذه الأسماك أن تقطع في 8 ساعات؟

فكرة الدرس

أجد معدّل الوحدة من نسب كسرية.

المصطلحات

المعدّل، معدّل الوحدة.

المعدل ومعدل الوحدة

مفهوم أساسي

• **بالكلمات** المعدّل (rate) هو نسبة تقارن بين كميتين لهما وحدتان مختلفتان.

عند تبسيط المعدّل ليُصبح مقامه 1 وحدة، فإنّه يُسمّى **معدّل الوحدة** (unit rate).

• **مثال** المعدل: الوحدتان مختلفتان $\frac{12 \text{ km}}{6 \text{ min}}$ معدل الوحدة: المقام يُساوي 1 $\frac{2 \text{ km}}{1 \text{ min}}$

أتذكر

النسبة مقارنة بين كميتين باستعمال القسمة، وتكتب بالرموز على صورة:

$$a:b \text{ أو } \frac{a}{b}$$

ومن معدلات الوحدة الشائعة في الحياة اليومية عدد الكيلومترات المقطوعة لكل ساعة (km/h)، وثمان الكيلوغرام الواحد (kg/JD).

إذا كان بسط المعدّل أو مقامه أو كلاهما كسراً؛ فإنّه يُمكن إيجاد معدّل الوحدة برسم مخطّط أو قسمة البسط على المقام كما في قسمة الكسور.

مثال 1

يمشي ليث مسافة $\frac{3}{2} \text{ km}$ كل $\frac{1}{4} \text{ h}$ ، فما معدّل المسافة التي يقطعها في الساعة الواحدة؟ **الطريقة 1:** أرسم مخطّطاً.

km?			
$\frac{1}{4} \text{ h}$	$\frac{1}{4} \text{ h}$	$\frac{1}{4} \text{ h}$	$\frac{1}{4} \text{ h}$

$$\frac{3}{2} \text{ km}$$

بما أن ليثاً يمشي $\frac{3}{2} \text{ km}$ كل $\frac{1}{4} \text{ h}$ ، أرسم مستطيلاً يعبر عن الساعة الكاملة، وأقسمه إلى أربعة أجزاء.

معدّل المسافة التي يقطعها ليث في الساعة الواحدة (معدّل الوحدة) يُساوي:

$$\frac{3}{2} \text{ km} \times 4 = 6 \text{ km/h}$$

الوحدة 5

$$\begin{aligned}\frac{\frac{3}{2} \text{ km}}{\frac{1}{4} \text{ h}} &= \frac{3}{2} \div \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{2} \times \frac{4}{1} \\ &= \frac{6 \text{ km}}{1 \text{ h}}\end{aligned}$$

الطريقة 2: أستخدمُ قسمة الكسور.

أكتبُ المعدّل على شكل مسألة قسمة

أضربُ في النظير الضربي للعدد $\frac{1}{4}$ ،

ثم أقسمُ على العوامل المشتركة.

أضربُ البسطين والمقامين

إذن، معدّل الوحدة يُساوي $\frac{6 \text{ km}}{1 \text{ h}}$

أتحقق من فهمي:



عمل منزلي: يُمكنُ لمنذرٍ طلاء $7 \frac{1}{2} \text{ m}^2$ من مساحات الأوجه الداخلية لبيته في $\frac{3}{4} \text{ h}$. أجدُ معدّل ما يطليه مندرٌ من الجدران في الساعة الواحدة.

يُمكنُ استخدامُ معدّل الوحدة في تطبيقات حياتية متعددة.



مثال 2: من الحياة



صحة: قاسَ ممرضٌ دقات قلب مريضٍ فوجدَها 52 دقة في $\frac{2}{3} \text{ min}$.

أستعملُ هذا القياس في إيجاد عدد دقات قلب المريض في نصف ساعة.

الخطوة 1 أجدُ معدّل الوحدة:

$$\begin{aligned}\frac{52 \text{ beat}}{\frac{2}{3} \text{ min}} &= 52 \div \frac{2}{3} \\ &= \frac{52}{1} \times \frac{3}{2} \\ &= \frac{78 \text{ beat}}{1 \text{ min}}\end{aligned}$$

أكتبُ المعدّل على شكل مسألة قسمة

أضربُ في النظير الضربي للكسر $\frac{2}{3}$ ،

ثم أقسمُ على العوامل المشتركة.

أبسّطُ

إذن، معدّل الوحدة لدقات قلب المريض $\frac{78 \text{ beat}}{1 \text{ min}}$

الخطوة 2 أستخدمُ معدّل الوحدة في إيجاد عدد نبضات قلب المريض في نصف ساعة:

$$78 \times 30 = 2340$$

أضربُ معدّل الوحدة في عدد دقائق نصف الساعة، ثم أجدُ الناتج:

إذن عدد دقات قلب المريض في نصف ساعة 2340 دقة.

أتعلم

beat تعني دقة



✓ أتحقق من فهمي:

حيوانات: إذا كان الأرنب القطنيّ الذيل يقطع مسافة 8 km في $\frac{1}{6} h$ ، فكَمْ كيلومترًا يقطع هذا النوع من الأرانب في 3 ساعات؟

يُمكننا استعمال معدّل الوحدة لإجراء المقارنات بسهولة في مواقف حياتية كثيرة.

مثال 3: من الحياة



يحتوي 50 g من الجوّافة على 114 mg من فيتامين C، ويحتوي 12.5 g من الفلفل الأصفر على 30 mg من هذا الفيتامين. أيّ الصنّفين يُعدُّ مصدرًا أفضل لفيتامين C؟

الخطوة 1 أجد معدّل الوحدة لكميّة فيتامين C في الغرام الواحد من الجوّافة:

$$\frac{114 \text{ mg}}{50 \text{ g}}$$

أكتب المعدّل على صورة كسرٍ

$$= \frac{114 \text{ mg} \div 50}{50 \text{ g} \div 50}$$

أقسم البسط والمقام على 50

$$= \frac{2.28 \text{ mg}}{1 \text{ g}}$$

أجد الناتج

إذن، معدّل الوحدة لكميّة فيتامين C في الغرام الواحد من الجوّافة هو $\frac{2.28 \text{ mg}}{1 \text{ g}}$

الخطوة 2 أجد معدّل الوحدة لكميّة فيتامين C في الغرام الواحد من الفلفل الأصفر:

$$\frac{30 \text{ mg}}{12.5 \text{ g}}$$

أكتب المعدّل على صورة كسرٍ

$$= 30 \div 12.5$$

أكتب المعدّل على شكل مسألة قسميّة

$$= 30 \div \frac{25}{2}$$

أكتب الكسر العشريّ على صورة كسرٍ غير فعليّ

$$= \frac{30}{1} \times \frac{2}{25}$$

أضرب في النظير الضربيّ للعدد $\frac{25}{2}$

$$= \frac{2.4 \text{ mg}}{1 \text{ g}}$$

أجد الناتج في أبسط صورة

إذن، معدّل الوحدة لكميّة فيتامين C في الغرام الواحد من الفلفل الأصفر هو $\frac{2.4 \text{ mg}}{1 \text{ g}}$

الوحدة 5

الخطوة 3 أقرن معدلي الوحدة:

بما أن معدلي الوحدة كسران هما المقام نفسه، أقرن البسطين فقط. $2.28 \text{ mg} < 2.4 \text{ mg}$

وبما أن البسط في معدلي الوحدة لفيتامين C في الفلفل الأصفر أكبر من البسط في معدلي الوحدة لفيتامين C في الجوافة، يكون الفلفل الأصفر مصدرًا أفضل لفيتامين C.

أتحقق من فهمي:

اشترت ميساء $\frac{4}{5} \text{ kg}$ من التفاح الأحمر بمبلغ JD 1.2 و $\frac{5}{8} \text{ kg}$ من التفاح الأخضر بمبلغ JD 1.25. أي نوعي التفاح سعره أعلى؟

أندرب

وأحل المسائل

أجد معدلي الوحدة لكل مما يأتي:

1 كوب من الماء إلى ثلث كوب من مركز عصير البرتقال.

2 قراءة 5 صفحات من كتاب في نصف ساعة.

3 JD 0.75 ثمن $\frac{3}{5} \text{ kg}$ من الليمون.

4 **سباق الجري:** يمكن لمتسابق جري بطيء قطع مسافة $\frac{3}{5} \text{ km}$ في $\frac{1}{12} \text{ h}$ ، أجد معدلي ما يقطعه المتسابق في الساعة الواحدة.

5 **تجارة:** يقدم أحد المحال التجارية عرضًا لبيع 12 عبوة من المياه المعدنية بـ JD 3.6. أجد سعر العبوة الواحدة.

6 **نباتات:** ينمو نبات الكودزو بمعدل 7.5 cm في 6 h ، كم سستيمترًا ينمو هذا النبات في اليوم الواحد؟

7 **شعارات:** يطبع نادٍ رياضي 300 شعار على قمصان متسبيه ومشجعيه في $2 \frac{1}{2} \text{ h}$. أجد عدد الشعارات التي يطبعها في 5 h

معلومة

الكودزو نبات من فصيلة البازلاء، موطنه الأصلي اليابان، ينمو بعشوائية وبوتيرة سريعة؛ لذا، يُسمى (الوحش الكلوروفيلي).



8 **رياضة:** يُمكنُ لودادَ مشي $7 \frac{1}{2}$ km في $1 \frac{1}{2}$ h . أجدُ معدَّلَ ما يمكنُ لودادُ أنَ تمشيه في ساعةٍ واحدةٍ.

9 يبيِّنُ الجدولُ الآتي أثمانَ 3 علبٍ مختلفةٍ الكتلةِ مِنَ اللَّبَنَةِ . أحددُ وزنَ العلبةِ ذاتِ سعرٍ الوحدةِ الأقلِّ:

أَسْعَارُ اللَّبَنِ	كتلةِ العلبةِ (kg)	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
	السعرُ (JD)	2.8	1.5	0.8

10 **ماء:** خزَّانا ماءٍ متماثلانِ يُملأُ الأولُ بمعدَّلٍ $\frac{3}{4}$ m³ في $\frac{2}{3}$ h ، والثاني بمعدَّلٍ $\frac{5}{8}$ m³ في $\frac{1}{2}$ h . أيُّ الخزانينِ سيمتلئُ أولاً؟

وقود: إذا كانَ معدَّلُ استهلاكِ الوقودِ لإحدى السيَّاراتِ 10.6 L لكلِّ 100 km :

11 ما معدَّلُ الوحدةِ لاستهلاكِ السيَّارةِ مِنَ الوقودِ؟

12 ما كميةِ الوقودِ التي تستهلكها السيَّارةُ إذا قطعتْ مسافةً 50 km ؟

13 ما المسافةُ التي يُمكنُ للسيَّارةِ أنَ تقطعها بِـ 100 L مِنَ الوقودِ؟

14 **أسماء:** أعودُ إلى فقرةٍ (أستكشفُ) بدايةَ الدرسِ وأحلُّ المسألةَ.

تبرير: أُبينُ ما إذا كانتِ كلُّ مِنَ العباراتِ الآتيةِ صحيحةً دائماً أمَ صحيحةً أحياناً أمَ غيرَ صحيحةٍ أبداً، موضِّحاً ذلكَ بأمثلةٍ مناسبةٍ.

15 كلُّ نسبةٍ معدَّلٍ . 16 كلُّ معدَّلٍ نسبةٍ .

17 كل معدَّلٍ وحدةٍ نسبةٍ . 18 لا يُمكنُ أنَ يكونَ بسطُ معدَّلٍ الوحدةِ 1 .

تبرير: أيُّ الحالتينِ الآتيتينِ يزدادُ فيها المعدَّلُ $\frac{x(JD)}{z \text{ kg}}$ ؟ أعطِ مثلاً يوضحُ ذلكَ.

19 عندما تزداد x ولا تتغير z . 20 عندما تزداد z ولا تتغير x .

21 **مسألة مفتوحة:** أكتبُ مسألةً حياتيةً أُحوِّلُ فيها النسبةَ إلى معدَّلٍ الوحدةِ.

22 **أكتب:** كيفَ أجدُ معدَّلَ الوحدةِ مِنْ نِسَبٍ كسريةٍ؟

معلومة

تُعَدُّ السيَّاراتُ الهجينةُ والكهربائيةُ البديلَ الأمثلَ لتقليلِ استهلاكِ الوقودِ.



مهارات التفكير العليا

إرشاد

لأحلَّ المسائلَ 15-18، أوظفُ تعريفاتِ النسبةِ والمعدَّلِ ومعدَّلِ الوحدةِ.



أستكشفُ

يحتوي كوبان من الحليب على 560 mg من الكالسيوم، تقول ديمة إن كمية الكالسيوم في كوب ونصف من الحليب تساوي 420 mg، هل ديمة على صواب؟



فكرة الدرس

أميزُ التناسب من خلال نسبتين معلومتين، وأحلّه.

المصطلحات

التناسب، طرفا التناسب، نسبتان متكافئتان، وسطا التناسب، الضرب التبادلي، حل التناسب.

التناسب والنسب المتكافئة

مفهوم أساسي

• **بالكلمات** **التناسب** (proportion) هو مساواة بين نسبتين. وفي هذه الحالة تُسمى النسبتان **نسبتين متكافئتين** (equivalent ratios).

وسطي التناسب
 $a : b = c : d$
طرفي التناسب

وسط طرف
 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$
طرف وسط

• **بالرموز** $a : b = c : d$ أو $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, b \neq 0, d \neq 0$

ويُسمى العددين a, d **طرفي التناسب** (extremes)، والعددين b, c **وسطي التناسب** (mean).

يمكننا تحديد إن كانت النسبتان متكافئتين بإيجاد معدل الوحدة لكل منهما، أو تبسيطهما، ثم مقارنة الناتجين.

هل تمثل كل نسبتين مما يأتي تناسباً أم لا؟

مثال 1

1 6:8, 18:24

الطريقة 1: أجد معدل الوحدة للنسبتين.

أقارن معدلي الوحدة

الخطوة 3

أجد معدل الوحدة للنسبة الثانية

الخطوة 2

أجد معدل الوحدة للنسبة الأولى

الخطوة 1

$$0.75 = 0.75 \checkmark$$

$$\frac{18}{24} = \frac{18 \div 24}{24 \div 24} = 0.75$$

$$\frac{6}{8} = \frac{6 \div 8}{8 \div 8} = 0.75$$

بما أن معدلي الوحدة متساويان، إذن، النسبتان تمثلان تناسباً، أي أن $6:8 = 18:24$

الطريقة 2: أبسط النسبتين:

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

÷ 2

أقسم البسط والمقام على العامل المشترك الأكبر 2

$$\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$$

÷ 6

أقسم البسط والمقام على العامل المشترك الأكبر 6

بما أن النسبتين متساويتان بعد التبسيط، إذن، فهما تشكّلان تناسبًا.

أتحقق من فهمي:



2 5:3 , 25: 15

3 1: 4 , 3: 16

في أي تناسب $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ يكون حاصل ضرب طرفي التناسب مساويًا لحاصل ضرب وسطَي التناسب $a \times d = b \times c$ ، وتُسمى هذه الخاصية **الضرب التبادلي** (cross multiplication).

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

إذا كان أحد أطراف التناسب غير معروف فإنه يمكننا استعمال خاصية **الضرب التبادلي** لإيجاده، وهذا ما يُسمى **حلّ التناسب** (solve proportion).

مثال 2

أحلّ كلاً من التناسبات الآتية:

1 $\frac{7}{8} = \frac{a}{40}$

$$a \times 8 = 7 \times 40$$

$$8a = 280$$

$$\frac{8a}{8} = \frac{280}{8}$$

$$a = 35$$

خاصية **الضرب التبادلي**

أضرب

أقسم طرفي المعادلة على 8

أبسط

الوحدة 5

2 $\frac{63}{28} = \frac{9}{y}$

$$y \times 63 = 9 \times 28$$

$$63y = 252$$

$$\frac{63y}{63} = \frac{252}{63}$$

$$y = 4$$

خاصية الضرب التبادلي

أضرب

أقسم طرفي المعادلة على 63

أبسط

3 $\frac{12}{x-2} = \frac{32}{x+8}$

$$32(x-2) = 12(x+8)$$

$$32x - 64 = 12x + 96$$

$$\begin{array}{r} -12x \quad -12x \\ \hline \end{array}$$

$$20x - 64 = 96$$

$$\begin{array}{r} +64 \quad +64 \\ \hline \end{array}$$

$$20x = 160$$

$$\begin{array}{r} \div 20 \quad \div 20 \\ \hline \end{array}$$

$$x = 8$$

خاصية الضرب التبادلي

خاصية التوزيع

أطرح $12x$ من الطرفين

أجمع 64 لكلا الطرفين

أقسم طرفي المعادلة على 20

أتحقق من فهمي:



4 $\frac{d}{5} = \frac{1}{35}$

5 $\frac{7}{b} = \frac{28}{3}$

6 $\frac{x}{12-x} = \frac{10}{30}$



مثال 3: من الحياة



شركات: في إحدى شركات الحواسيب، كانت نسبة العاملين في قسم البرمجة إلى العاملين في قسم التسويق 3 : 8، فإذا كان عدد المبرمجين 27، فما عدد العاملين في قسم التسويق؟

أكتب تناسباً وأحلّه، وأفرض أن عدد العاملين في قسم التسويق x .

العاملون في قسم البرمجة

$$\frac{3}{8} = \frac{27}{x}$$

العاملون في قسم التسويق

خاصية ضرب التبادلي

$$3x = 8 \times 27$$

أضرب

$$3x = 216$$

أقسم على 3

$$\frac{3x}{3} = \frac{216}{3}$$

أبسط

$$x = 72$$

إذن، عدد العاملين في قسم التسويق 72 عاملاً.

أتحقق من فهمي:



في أحد الصفوف الأساسية، كانت نسبة الطلاب إلى الطالبات 5 : 6، فإذا كان عدد الطالبات في الصف 18، فكم عدد الطلاب؟

أُتدرب



وأحل المسائل

هل تمثل كل نسبتين مما يأتي تناسباً أم لا؟ أبرر إجابتي.

1 $\frac{3}{7}, \frac{15}{35}$

2 $\frac{7.5}{3}, \frac{30}{12}$

3 $\frac{44}{11}, \frac{18}{4}$

4

دفع أشرف 2.4 JD ثمناً لـ 3 kg من البرتقال، ثم دفع 4 JD ثمناً لـ 5 kg أخرى.

أتحقق من تناسب ما دفعه أشرف ثمناً لـ 3 kg من البرتقال مع ما دفعه ثمناً لـ 5 kg للبرتقال، وأبرر إجابتي.

أحل كلاً من التناضبات الآتية:

5 $\frac{21}{84} = \frac{a}{12}$

6 $\frac{5}{3} = \frac{65}{y}$

7 $\frac{d}{3} = \frac{1}{18}$

8 $\frac{4}{b} = \frac{24}{3}$

9 $\frac{5}{15} = \frac{x}{x+8}$

10 $\frac{x-3}{x+7} = \frac{1}{3}$

11 **علوم:** نسبة الملح إلى الماء في سائل هي 1:5، إذا احتوى السائل على 60 g من الماء، فكم غراماً من الملح يحوي السائل؟

12 **عمل منزلي:** تُعد سمر عصير فواكه بمزج 150 mL من عصير البرتقال مع 100 mL من عصير الجزر. إذا استعملت سمر 600 mL من عصير البرتقال، فما كمية عصير الجزر الذي استعملته؟

أتذكر

يمكنني حل معادلة تحتوي على متغير واحد في أحد طرفيها باستخدام خصائص المساواة.

الوحدة 5

13 علوم: المرأة التي طولها 164 cm يكون عرض كتفيها 42 cm تقريباً. أجد طول امرأة عرض كتفيها 42.6 cm

14 محيطات: نسبة مساحة المحيط الهادي إلى مساحة سطح الأرض هي 3:10، أجد مساحة المحيط الهادي إذا كانت مساحة سطح الأرض 510072000 km^2



إذا كانت كتلة 5 بطاريات من نوع AA تساوي 115 g، أجد كتلة كل ممّا يأتي:

15 بطارية واحدة.

16 8 بطاريات.

معلومة

تغطي المياه حوالي 71% من سطح الأرض، والمحيط الهادي أكبر مسطح مائي على سطح الأرض.



17 حليب: أعود إلى فقرة (أستكشف) بداية الدرس وأحل المسألة.

مهارات التفكير العليا

معلومة

كان مصدر اللون الأرجواني في العصور القديمة نوع من المحار الذي ينتج إفرازات ذات صبغة أرجوانية.




الطالب	اللون الأزرق (كوب)	اللون الأحمر (كوب)
سامي	$\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{3}$
لين	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$
وليد	2	$4\frac{1}{2}$
سمر	$2\frac{1}{2}$	5

18 تبرير: مزج أربعة طلبية في حصة الفن اللون الأحمر واللون الأزرق للحصول على اللون الأرجواني، وبيّن الجدول المجاور الكميات التي استخدمها كل طالب. أي الطلبة حصل على درجة مختلفة من اللون الأرجواني؟ أبرر إجابتي.

19 مسألة مفتوحة: أكتب موقفاً حياتياً فيه تناسب مبيّن السبب، ثم أشرح كيف أجعل الموقف لا يشكّل تناسباً.

20 أكتب: كيف أحدد إن كانت نسبتان تمثّلان تناسباً؟



ارتفاع المجموعة (mm) بالـ	عدد الأقراص	معدل الوحدة لارتفاع القرص
7	5	
14	10	
21	15	

أستكشف

نشاط: يبين الشكل المجاور ارتفاع 3 أعمدة من قطع بلاستيكية. أملأ الجدول المجاور، ثم أجب عن السؤالين الآتيين:

- أصف ما لاحظته.
- أكتب علاقة تربط بين عدد القطع البلاستيكية في أحد الأعمدة وارتفاع ذلك العمود.

فكرة الدرس

أتعرف علاقة التناسب، وأمثلها في المستوى الإحداثي.

المصطلحات

علاقة التناسب

علاقة التناسب (proportional relationship): هي علاقة بين كميتين لجميع نسبهما معدل الوحدة نفسه. ويمكن تحديد ذلك باستخدام جدول يمثل تلك العلاقة.

عدد الدقائق (min)	2	6	18
عدد الصفحات	5	15	45

مثال 1: من الحياة

قراءة: سجلت سلوى الدقائق التي تحتاجها لقراءة عدد من الصفحات في الجدول المجاور، هل توجد علاقة تناسب بين عدد الصفحات والزمن؟

لتحديد وجود علاقة تناسب بين عدد الصفحات والزمن، أجد معدل الوحدة لكل نسبة في الجدول.

$$\frac{\text{عدد الصفحات}}{\text{عدد الدقائق}} \rightarrow \frac{5}{2} = 2.5, \frac{15}{6} = 2.5, \frac{45}{18} = 2.5$$

بما أن معدلات الوحدة لجميع النسب متساوية، إذن، توجد علاقة تناسب بين عدد الصفحات والزمن.

أتحقق من فهمي

العمر (yr)	4	6	9	12
الطول (m)	1	1.1	1.3	1.5

أعمار: يبين الجدول المجاور العلاقة بين طول الإنسان وعمره بالسنوات، هل هذه علاقة تناسب؟ أبرر إجابتي.

الوحدة 5

ويمكننا أيضًا تحديد ما إذا كانت العلاقة بين كميتين تمثل علاقة تناسبٍ بإنشاء جدولٍ لتنظيم قيم العلاقة، وإيجاد معدلاتٍ الوحدة لكل نسبة في الجدول.

مثال 2: من الحياة



رياضة: اشترك باسل في سباقٍ للدراجات الهوائية، فكان يقطع $12 \frac{1}{2}$ km كل $\frac{1}{2}$ h، أبين إذا كانت العلاقة بين المسافة التي يقطعها باسل وعدد الساعات تمثل علاقة تناسبٍ.

كل مدة زمنية تزيد عن التي قبلها بمقدار $\frac{1}{2}$ h، وكذلك تزيد كل مسافة مقطوعة عن التي قبلها بمقدار $12 \frac{1}{2}$ km

الخطوة 1 أنشئ جدولاً يربط بين المسافة المقطوعة وعدد الساعات:

عدد الساعات (h)	$\frac{1}{2}$	1	$1 \frac{1}{2}$	2
المسافة المقطوعة (km)	$12 \frac{1}{2}$	25	$37 \frac{1}{2}$	50

الخطوة 2 أكتب النسب على شكل كسور، ثم أجد معدل الوحدة لكل نسبة:

$$\frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{عدد الساعات}} \rightarrow \frac{12 \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 25, \frac{25}{1} = 25, \frac{37 \frac{1}{2}}{1 \frac{1}{2}} = 25, \frac{50}{2} = 25$$

بما أن معدلات الوحدة لجميع النسب متساوية، إذن، العلاقة بين المسافة المقطوعة والزمن تمثل علاقة تناسبٍ.

أنتحق من فهمي:



تدخر لميس من مصروفها 3 دنانير كل أسبوعين. أبين إذا كانت العلاقة بين ما تدخره لميس وعدد الأسابيع يمثل علاقة تناسبٍ.

مثال 3: من الحياة



إذا كانت تذكرة الدخول لأحد المنتجعات السياحية العائلية 7 JD للفرد إضافةً إلى 3 JD بدل خدمات للعائلة، أبين إذا كانت العلاقة بين عدد أفراد العائلة والمبلغ تمثل علاقة تناسبٍ.

الخطوة 1 أنشئ جدولاً يربط بين عدد أفراد العائلة والمبلغ:

عدد الأفراد	1	2	3	4
المبلغ (JD)	10	17	24	31

الخطوة 2 أكتب النسب على شكل كسور، ثم أجد معدل الوحدة لكل نسبة:

$$\frac{\text{عدد الأفراد}}{\text{المبلغ}} \longrightarrow \frac{10}{1} = 10, \frac{17}{2} = 8.5, \frac{24}{3} = 8, \frac{31}{4} = 7.75$$

بما أن معدلات الوحدة لجميع النسب غير متساوية، إذن، العلاقة بين عدد أفراد العائلة والمبلغ لا تمثل علاقة تناسب.

✓ أتتحقق من فهمي:

عمل: يتقاضى عامل عن كل ساعة عمل 5 JD إضافة إلى 4 JD بدل وجبة طعام، هل العلاقة بين ما يتقاضاه العامل وعدد ساعات عمله علاقة تناسب؟ أبرر إجابتي.

ويمكننا أيضاً تحديد ما إذا كانت العلاقة بين كميتين علاقة تناسب بتمثيلها في المستوى الإحداثي. فتكون العلاقة علاقة تناسب إذا كان تمثيلها البياني مستقيماً يمر في نقطة الأصل.

مثال 4: من الحياة

ماء: يصبُ صنوبر في خزان ماء بمعدل 6 L كل دقيقة. هل تمثل العلاقة بين عدد الدقائق وكمية الماء المضافة إلى الخزان علاقة تناسب؟


الخطوة 1 أنشئ جدولاً يربط بين كمية الماء والزمن:

الزمن (min)	1	2	3	4	5
كمية الماء (L)	6	12	18	24	30

الخطوة 2 أكتب النسب في الجدول على شكل أزواج مرتبة:

الأزواج المرتبة: (1, 6), (2, 12), (3, 18), (4, 24), (5, 30)

الخطوة 3 أمثل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي، وأصل بينها بمستقيم.



بما أن التمثيل البياني مستقيم يمر في نقطة الأصل، إذن، العلاقة بين كمية الماء والزمن تمثل تناسباً.

الوحدة 5

أتحقق من فهمي:



أشجار: يبين الجدول المجاور العلاقة بين تزايد قطر جذع إحدى الأشجار بمرور السنوات. أستخدم التمثيل البياني لأبين ما إذا كانت العلاقة تمثل علاقة تناسب، وأبرر إجابتي.

الزمن (yr)	0	10	20	30	50
القطر (cm)	10	14	18	22	30

أحدد أي العلاقات المبينة في الجداول الآتية تمثل علاقة تناسب، وأبرر إجابتي:

1

الزمن (s)	المسافة (m)
1	2
2	4
4	8

2

الثلث (JD)	عدد القطع
3	1
5	3
7	5





3

الزمن (h)	المبلغ
$\frac{1}{2}$	2
2	8
3	12

4

الثلث (JD)	الطول (m)
2.5	2
3.5	3
4.5	4

أحدد أي التمثيلات البيانية الآتية تمثل علاقة تناسب، وأبرر إجابتي:



أتذكر

تمثل العلاقة علاقة تناسب إذا كان تمثيلها البياني مستقيماً يمر في نقطة الأصل.

9 تطبع سعاد 45 كلمة في الدقيقة الواحدة. هل توجد علاقة تناسب بين عدد الكلمات التي تطبعها سعاد والزمن؟ أبرر إجابتي.

معلومة

يتطلب إتقان مهارات حل مسائل الرياضيات قدرًا كبيرًا من الصبر والثابرة والتدريب.

معلومة

تعد سيارة هينسي فينوم F5 أسرع سيارة في العالم في الوقت الحالي، إذ تبلغ سرعتها نحو 484 km/h.



10

واجب منزلي: يُمكن لعامر حل 6 مسائل من مادة الرياضيات في $\frac{1}{4}h$. أكمل الجدول الآتي الذي يمثل العلاقة بين عدد المسائل التي يُمكن لعامر حلها في كل مدة زمنية، ثم أَيْن ما إذا كانت العلاقة تمثل علاقة تناسب.

الزمن (h)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
عدد المسائل	6			

11

يُبين الجدولان الآتيان المسافات التي قطعتها سيارتان. أي السيارتين تمثل العلاقة بين المسافة التي قطعتها والزمن علاقة تناسب؟ أبرر إجابتك.

السيارة الأولى					السيارة الثانية				
الزمن (h)	2	3	5	6	الزمن (h)	1	3	4	6
المسافة (km)	140	210	350	420	المسافة (km)	60	135	280	360

درجات حرارة: لتحويل درجات الحرارة من مئوي إلى فهرنهايتي أضرب الدرجة المئوية في $\frac{9}{5}$ ثم أجمع 32°C إلى الناتج.

الدرجات المئوية $^\circ\text{C}$	0	10	20	30
الدرجات فهرنهايتي				

12

أكمل الجدول المجاور:

13

هل توجد علاقة تناسب بين

درجات الحرارة المئوية والدرجات فهرنهايتي؟

مهارات التفكير العليا

أفكر

كيف أحدد وجود علاقة تناسب عن طريق جدول يمثل تلك العلاقة؟

14

أكتشف الخطأ: يقول خليل: إن الجدول المجاور يمثل علاقة تناسب؛ لأن كلاً من السعر وعدد الحبات يزداد بمقدار ثابت.

عدد الحبات	السعر (JD)
4	1
6	2
8	3
10	4

15

تبرير: إذا علمت أن هناك علاقة تناسب بين كميتين، وأعطيت زوجاً مرتباً من هذه العلاقة غير (0, 0)، فكيف أجد زوجاً مرتباً آخر؟ أبرر إجابتك.


16

مسألة مفتوحة: أكتب مسألة حياتية تمثل علاقة تناسب، وأمثلها بيانياً.

17

أكتب: كيف أستخدم معدل الوحدة لأحدد إن كانت العلاقة علاقة تناسب؟

أستكشف



يبيّن الشكل المجاور العلاقة بين الكتلة على الأرض والكتلة على القمر.

(1) هل توجد علاقة تناسب بين الكتلة على الأرض والكتلة على القمر؟

(2) ما كتلة شخص على القمر إذا كانت كتلته على الأرض 60 kg؟

فكرة الدرس

أميزّ التناسب الطردي، وأكتب معادلته بإيجاد ثابت التناسب.

المصطلحات

ثابت التناسب، التناسب الطردي.

تمثّل العلاقة بين الكميتين المتغيرتين x و y تناسباً طردياً (direct variation) إذا كانت النسبة بين جميع قيميهما ثابتة، ولتكن k حيث $k \neq 0$ ، بحيث تؤدي الزيادة في إحدى الكميتين إلى زيادة الأخرى والعكس، ويسمى k ثابت التناسب (constant of variation)، وهو يمثل معدل الوحدة.

التناسب الطردي

مفهوم أساسي

• بالكلمات: التناسب الطردي هو علاقة بين المتغيرين x و y تكون فيها النسبة $y : x$ ثابتة.

• بالرموز: $k = \frac{y}{x}$ حيث $k \neq 0$

وتمثّل المعادلة $y = kx$ معادلة التناسب الطردي.

مثال 1

يمثّل الجدول المجاور علاقة بين المتغيرين x و y :

1 أبين أن x و y متناسبتين طردياً، ثم أجد ثابت التناسب k .

أجد النسبة $\frac{y}{x}$ لجميع القيم المتناظرة:

$$\frac{y}{x} \longrightarrow \frac{8}{1} = 8, \frac{16}{2} = 8, \frac{24}{3} = 8$$

النسبة $y : x$ ثابتة، إذن x و y متناسبتان طردياً، وثابت التناسب $k = 8$.

x	y
1	8
2	16
3	24
10	?

أذكر

يمثل ثابت التناسب معدل الوحدة للعلاقة.

2 أكتب معادلة التناسب الطردي، ثم أجد القيمة المجهولة في الجدول.

$$y = 8x$$

أكتب معادلة التناسب الطردي

$$y = 8x$$

$$= 8(10)$$

$$= 80$$

أعوّض $x = 10$ في المعادلة

أجد الناتج

✓ **أتحقق من فهمي:**

يمثل الجدول المجاور علاقة بين المتغيرين x و y :

3 أبين أن x و y متناسبان طرديًا، ثم أجد ثابت التناسب k .

4 أكتب معادلة التناسب الطردي، ثم أجد القيمة المجهولة في الجدول.

x	y
3	1
6	2
9	3
12	?

مثال 2: من الحياة

يمثل الجدول المجاور علاقة تناسب بين عدد السيارات في محطة غسيل

للسيارات والمبلغ المستحق مقابل تقديم الخدمة:

1 أبين أن عدد السيارات والمبلغ متناسبان طرديًا، ثم أجد ثابت التناسب k .

$$\frac{\text{المبلغ (JD)}}{\text{عدد السيارات}} \longrightarrow \frac{20}{5} = 4, \quad \frac{40}{10} = 4, \quad \frac{60}{15} = 4, \quad \frac{80}{20} = 4$$

النسبة بين جميع القيم ثابتة، إذن، المبلغ وعدد السيارات متناسبان طرديًا، وثابت التناسب $k = 4$.

2 أكتب معادلة التناسب الطردي.

$$y = 4x$$

✓ **أتحقق من فهمي:**

يبين الجدول المجاور علاقة تناسب بين الزمن بالثواني اللازم لضخ عدد

من لترات البنزين في إحدى محطات الوقود:

3 أبين أن عدد اللترات والزمن متناسبان طرديًا، ثم أجد ثابت التناسب k .


4 أكتب معادلة التناسب الطردي.

الزمن (s)	عدد اللترات
74	9.25
84	10.5
96	12
136	17

الوحدة 5

يُمكننا إيجاد ثابت التناسب لعلاقة تناسبٍ طرديٍّ ممثلةً بيانيًا، وذلك بتحديد قيمة y عندما تكون $x = 1$ ، أو إيجاد معدل الوحدة لأي نقطة على التمثيل البياني.


مثال 3



يبين التمثيل البياني المجاور العلاقة بين الزمن بالدقائق والسرعات الحرارية التي يحرّقها شخص في أثناء ممارسته التمارين الرياضية:

أبين أن العلاقة تمثل تناسبًا طرديًا.

تمثل العلاقة في التمثيل البياني المجاور علاقة تناسبٍ طرديٍّ؛ لأنَّ النقاط الممثلة تقع على مستقيم يمرُّ بنقطة الأصل.



أجد ثابت التناسب k .

الطريقة 1: لإيجاد ثابت التناسب k ، أحدد قيمة y عندما $x = 1$.

إذن، ثابت التناسب $k = 10$.

الطريقة 2: أختار النقطة $(2, 20)$ ، ثم أجد منها ثابت التناسب k .

$$k = \frac{y}{x} \\ = \frac{20}{2} \\ = 10$$

أكتب معادلة التناسب الطردي


$$x = 2, y = 20$$

أجد الناتج

أكتب معادلة التناسب الطردي

$$y = 10x$$

أتحقق من فهمي:



يبين التمثيل البياني المجاور العلاقة بين عدد أكواب الطحين وعدد أكواب الحليب في وصفة لإعداد الكعك. أكتب معادلة لهذا التناسب.



مثال 4: من الحياة



رُصد ارتفاع الثلج على قمة أحد الجبال في أثناء عاصفة ثلجية، فُوجِدَ أَنَّهُ يزداد بمقدار 2 cm كل ساعة.

1

أمثل العلاقة بيانياً.

أنشئ جدولاً، وأكتب النسب فيه على شكل أزواج مرتبة.

الزمن (h)	1	2	3	4
ارتفاع الثلج (cm)	2	4	6	8

الأزواج المرتبة: (1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)

2

أبين أن العلاقة تمثل تناسباً طردياً.

تمثل العلاقة تناسباً طردياً؛ لأن النقاط الممثلة لها تقع على مستقيم يمر بنقطة الأصل.

3

أكتب معادلة التناسب الطردي.

بما أن هذه علاقة تناسب طردي، إذن، يمكن إيجاد معادلة لها. وباستخدام النقطة (1, 2) نجد أن ثابت التناسب $k = 2$.
إذن، المعادلة: $y = 2x$

4

أجد ارتفاع الثلج بعد مرور 10 ساعات.

$$y = 2 \times 10$$

$$= 20$$

أعوّض $x = 10$
أجد الناتج

إذن، ارتفاع الثلج بعد مرور 10 ساعات هو 20 cm



أتحقق من فهمي:

يزداد طول نبتة بمقدار 1.5 cm كل أسبوع:

5

أبين أن العلاقة تمثل تناسباً طردياً.

6

أكتب معادلة لهذه العلاقة.



الوحدة 5

أَتَدْرِبُ وأحل المسائل

أحددُ أيَّ العلاقاتِ الخطية الآتية تمثلُ تناسبًا طرديًا، وإنْ كَانَتْ كذلكُ أَجدُ ثابتَ التناسبِ لها:

1

x	y
2	5
4	10
6	15

2

x	y
185	60
235	32
275	40




3

x	y
3	6
4	8
5	10

4

x	y
4	6
5	8
6	10

أكتبُ معادلةَ التناسبِ الطرديِّ في كلِّ ممَّا يأتي:



طائرات: انطلقت طائرتان عموديتان A و B في الوقت نفسه، ويمثل الشكل المجاور العلاقة بين ارتفاع كلٍّ منهما بالأمتار والزمن بالدقائق. هل توجد علاقة تناسبٍ طرديٍّ بين ارتفاع كلٍّ طائرة والزمن؟ أبرِّرْ إجابتي. إذا كانت العلاقة تمثلُ تناسبًا طرديًا؛ أجدُ ثابتَ التناسبِ لكلِّ طائرة.

أوضحُ سببَ ارتفاعِ الطائرة A بصورةٍ أسرعٍ مِنَ الطائرة B.

يمثلُ كلٌّ مِنَ الجدولينِ الآتيينِ علاقةَ تناسبٍ طرديَّة. أجدُ القِيَمَ المجهولة في كلِّ منهما:

10

x	2		6	12
y		10		30

11

x	8	10		16
y	12		18	

معلومة


يبلغُ متوسطُ سرعةِ الطائراتِ العمودية 260 km/h ، إلا أنَّ أسرعَ طائرةٍ عمودية تبلغُ سرعتها 416 km/h.



إرشاد

أستعين بثابت التناسب لتبرير إجابتي.

رحلات: نظّمت مدرسة ريان رحلة إلى غابات جرّش وعجلون، بحيث يرافق كلّ 14 طالباً معلّم واحد. أكتب معادلة تمثّل هذه العلاقة وأمثلها بيانياً.



بيّن الشكل المجاور عدد ضربات أجنحة طائر الطنان بالنسبة للزمن بالثواني (s):


ماذا تمثّل النقطة (2, 160) ؟

أكتب معادلة تمثّل هذه العلاقة.

أجد عدد ضربات الجناح بعد مرور 6 دقائق.

معلومة

يُعدّ طائر النحلة الطنان أصغر طائر على وجه الأرض، إذ يبلغ وزنه 1.8 g وطوله 5 cm.



يمثّل الشكل المجاور العلاقة بين الزمن بالساعات (h) والمسافة بالكيلومترات التي يقطعها متسابق رياضة تسلّق جبال:

أكتب معادلة تمثّل هذه العلاقة.

كم ساعة يحتاج المتسابق لقطع مسافة 30 km ؟

معلومة

تلقى رياضة تسلّق الجبال اهتماماً متزايداً في الأردن؛ لتوافر البيئة الجبلية المناسبة في العديد من المحافظات.

مهارات التفكير العليا

مسألة مفتوحة: أكتب مسألة حياتية يكون ثابت تناسب فيها 6 km

السعر (JD)	الزمن (h)
x	10
y	20
150	z

تبرير: إذا كان ثابت تناسب العلاقة الطردية الممثلة في الجدول المجاور يساوي 5. أجد القيم المجهولة في الجدول، وأبرّر خطوات الحل جميعها.

إرشاد

أوظف ثابت التناسب وحلّ المعادلات في إيجاد القيم المجهولة.

أكتب: كيف أحدد إذا كانت العلاقة بين متغيرين تمثّل علاقة تناسب طردي؟


التناسب الطردي

يمكنني استخدام برمجية جيو جبرا (GeoGebra) لتمثيل علاقة تناسب بيانيًا وتحديد إن كانت تمثل تناسبًا طرديًا أم لا.

نشاط 1

x	1	2	3	4
y	2	4	6	8

يمثل الجدول المجاور علاقة بين المتغيرين x و y ، أستخدم برمجية جيو جبرا لأحدد ما إذا كان المتغيرين x و y متناسبين طرديًا، وإذا كانا كذلك أجد معادلة التناسب ثم أحدد ثابتته.




أكتب النسب المعطاة في الجدول على شكل أزواج مرتبة:

$$(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)$$

أمثل الأزواج المرتبة في المستوى الاحداثي:

- أختار أيقونة  من شريط الأدوات.
- أنقر بالمؤشر على مواقع الأزواج المرتبة.



أصل بين النقاط بمستقيم:

- أختار أيقونة  من شريط الأدوات.
- أنقر بالمؤشر على نقطتين من النقاط الممثلة؛ لرسم مستقيم يصل بينهما.

ألاحظ أن المستقيم يمر بجميع نقاط العلاقة إضافة إلى نقطة الأصل. إذن، تمثل العلاقة تناسبًا طرديًا.

أجد معادلة علاقة التناسب وثابتته:

- تظهر معادلة التناسب في شريط الإدخال وبجانبها سهم صغير. $\rightarrow 2x - y = 0$

ويمكننا كتابة المعادلة على الصورة $y = 2x$ ، عندها نلاحظ أن ثابت التناسب $k = 2$

أدرب



يمثل كل جدول فيما يأتي علاقة بين المتغيرين x و y . أستخدم برمجية جيو جبرا لأمثل العلاقة بيانيًا، وأحدد ما إذا كانت تمثل علاقة تناسب طردي أم لا، وإن كانت تمثلها أجد معادلة العلاقة وثابت التناسب لها.

1	x	1	2	3	4
	y	4	8	12	16

2	x	1	2	3	4
	y	6	4	2	0

أستكشف



تتناقص درجات الحرارة كلما ارتفعنا عن سطح البحر حتى نهاية الطبقة الأولى من الغلاف الجوي بمعدل 0.65 درجة مئوية لكل 100 m. إذا كان ارتفاع قلعة عجلون 1050 m عن سطح البحر، فكيف يمكن حساب الفرق بين درجة الحرارة عند قلعة عجلون و سطح البحر؟

فكرة الدرس

أميزُ التناسب العكسي، وأكتب معادلته بإيجاد ثابت التناسب.

المصطلحات

التناسب العكسي.

علاقة التناسب العكسي (inverse variation): هي علاقة بين كميتين بحيث تؤدي زيادة الكمية الأولى إلى نقصان الكمية الثانية.

التناسب العكسي

مفهوم أساسي

• **بالكلمات** إذا وجدت علاقة تناسب عكسي بين المتغيرين x و y فإن ناتج ضربيهما يساوي ثابتاً k .

• **بالرموز** $x \times y = k$ ، حيث $k \neq 0$ وتمثل $y = \frac{k}{x}$ معادلة التناسب العكسي.

مثال 1

x	5	10	25	50
y	20	10	4	?

يمثل الجدول المجاور علاقة بين المتغيرين x و y :
أبين أن x و y متناسبتان عكسيًا، ثم أجد ثابت التناسب k .

أجد $x \times y$ لجميع القيم المتناظرة:

$$x \times y \longrightarrow 5 \times 20 = 100, \quad 10 \times 10 = 100, \quad 25 \times 4 = 100$$

ألاحظ أن ناتج $x \times y$ متساو لجميع الأزواج المرتبة، إذن، توجد علاقة تناسب عكسي بين المتغيرين x و y ، وثابت التناسب $k = 100$.

الوحدة 5

2 أكتب معادلة التناسب العكسي، ثم أجد القيمة المجهولة في الجدول.

$$y = \frac{100}{x}$$

$$y = \frac{100}{x}$$

أكتب معادلة التناسب العكسي

$$= \frac{100}{50}$$

أعوض $x = 50$ في المعادلة

$$= 2$$

أجد الناتج

أتحقق من فهمي:



يمثل الجدول المجاور علاقة بين المتغيرين x و y :

x	3	6	9	12
y	12	6	4	?

3 أبين أن x و y متناسبان عكسيًا، ثم أجد ثابت التناسب k .

4 أكتب معادلة التناسب العكسي، ثم أجد القيمة المجهولة في الجدول.

مثال 2: من الحياة



يمثل الجدول المجاور العلاقة بين معدل السرعة والزمن اللازم لقطع المسافة بين عمان والطفيلة التي تساوي 180 km:

الزمن (h)	معدل السرعة (km/h)
2	90
2.5	72
3	60
4	45

1 أبين أن معدل السرعة والزمن متناسبان عكسيًا، ثم أجد ثابت التناسب k .

$$2 \times 90 = 180, \quad 2.5 \times 72 = 180, \quad 3 \times 60 = 180, \quad 4 \times 45 = 180 \rightarrow \text{معدل السرعة} \times \text{الزمن}$$

ألاحظ أن ناتج ضرب متساو لجميع القيم المتناظرة؛ إذن، معدل السرعة والزمن متناسبان عكسيًا، وثابت التناسب $k = 180$.

2 أكتب معادلة العلاقة.

$$y = \frac{180}{x}$$

أتحقق من فهمي:



يمثل الجدول الآتي العلاقة بين عدد العمال والزمن اللازم لبناء سور:


الزمن (h)	عدد العمال
12	2
6	4
4	6
3	8

3 أبين أن عدد العمال والزمن متناسبان عكسيًا، ثم أجد ثابت التناسب k .

4 أكتب معادلة العلاقة.

يُمكننا إيجاد ثابت التناسب لعلاقة تناسب عكسيٍّ ممثِّلَةٍ بيانيًّا، وذلك بتحديد زوج مرتَّبٍ على التمثيل البياني، وتعويض قيمة x و y في معادلة التناسب العكسي.

مثال 3



يبيِّن الشكل المجاور علاقة عكسيَّة بين المتغيَّرين x و y :

أجد ثابت التناسب k :

أختارُ زوجًا مرتَّبًا على التمثيل البياني للعلاقة، مثل (2, 1)،

وأعوِّضه في معادلة التناسب العكسي.

أكتب معادلة التناسب العكسي

أعوِّض $x = 2, y = 1$

بالضرب التبادلي

$$y = \frac{k}{x}$$

$$1 = \frac{k}{2}$$

$$k = 2$$

إذن ثابت التناسب $k = 2$

أكتب معادلة التناسب العكسي:

$$y = \frac{2}{x}$$


أتحقق من فهمي:



يبيِّن الشكل المجاور علاقة عكسيَّة بين المتغيَّرين x و y :

أجد ثابت التناسب k .

أكتب معادلة التناسب العكسي.



مثال 4: من الحياة



محيطات: يبيِّن الجدول المجاور العلاقة بين عمق الماء ودرجات الحرارة في المحيط

الأطلسي:

أحد ما إذا كانت العلاقة تمثِّل علاقة تناسبٍ طرديٍّ أم عكسيٍّ.

ألاحظ من الجدول أنه كلما ازداد العمق انخفضت درجة الحرارة؛ لذا، لا يُمكن أن

تمثِّل العلاقة تناسبًا طرديًّا.

العمق (ft)	درجة الحرارة (°F)
500	28
1000	14
2000	7

أتعلم

القدم من وحدات قياس
الطول ويرمز له بالرمز ft

الوحدة 5

أختبر إذا كانت العلاقة تمثل تناسبًا عكسيًا:


$$500 \times 28 = 14000, \quad 1000 \times 14 = 14000, \quad 2000 \times 7 = 14000$$

ألاحظ أن ناتج الضرب متساو لجميع القيم المتناظرة، إذن، درجة الحرارة وعمق الماء متناسبان عكسيًا، وثابت التناسب $k = 14000$.

2 أكتب معادلة التناسب العكسي.

$$y = \frac{14000}{x}$$

3 أمثل علاقة التناسب بيانيًا.



أمثل الأزواج المرتبة في الجدول في المستوى الإحداثي، ثم أرسم خطًا منحنياً يمر بها جميعاً.

4 أجد درجة الحرارة على عمق 7000 ft:

$$\begin{aligned} y &= \frac{14000}{x} \\ &= \frac{14000}{7000} \\ &= 2 \end{aligned}$$

أكتب معادلة التناسب العكسي

$$x = 7000$$

أجد الناتج

إذن درجة الحرارة على عمق 7000 ft تساوي 2°F

✓ **أتحقق من فهمي:**

يبين الجدول المجاور العلاقة بين عدد العمال والزمن الذي يستغرقه في طلاء أحد المنازل:

عدد العمال	الزمن (h)
2	4
4	2
8	1

5 أحدد ما إذا كانت العلاقة تمثل علاقة تناسبٍ طرديٍّ أم عكسيٍّ.

6 أمثل العلاقة بيانيًا.

7 أجد الزمن الذي يحتاجه 5 عمالٍ لطلاء المنزل.

أحدد أي العلاقات الآتية تمثل تناسبًا طرديًا وأيها تمثل تناسبًا عكسيًا:

أدرب
وأحل المسائل

1

x	-2	2	4	6
y	-1	1	2	3

2

x	0.5	1	3	6
y	6	3	1	0.5




3

x	2	5	8	20
y	10	4	2.5	1

4

x	2	4	8	11
y	1.5	3	6	8.25

أحدُ أيِّ العلاقاتِ الآتيةِ تمثِّلُ تناسبًا طرديًا وأيُّها تمثِّلُ تناسبًا عكسيًا، وأيُّها لا يمثِّلُ أيًّا منهما، مبرِّرًا إجابتي:



أحدُ أيِّ العلاقاتِ الآتيةِ تمثِّلُ تناسبًا طرديًا وأيُّها تمثِّلُ تناسبًا عكسيًا، وأيُّها لا يمثِّلُ أيًّا منهما، مبرِّرًا إجابتي:

8 $xy = 8$

9 $y - x = 0$



10 $y - 2 = \frac{7}{x}$

11 $2y = \frac{3}{x}$

12 $y = x + 9$

13 $y = \frac{5}{2x}$

أكتبُ معادلةَ التناسبِ العكسيِّ في كلِّ ممَّا يأتي:



الزمنُ (h)	عددُ العمَّالِ
1	48
2	24
6	8
12	4

يمثِّلُ الجدولُ المجاورُ العلاقةَ بينَ عددِ العمَّالِ وساعاتِ العملِ اللازمةِ لتعبئةِ إنتاجِ بستانٍ مِنَ البرتقالِ في صناديقٍ. أبيتُ ما إذا كانت العلاقة بين عدد الساعات وعدد العمَّالِ تمثِّلُ تناسبًا عكسيًا.

طولُ قطعةِ الأرضِ (y)	عرضُ قطعةِ الأرضِ (x)
30	4
	6
	8
	10

قطعةُ أرضٍ مستطيئة الشكل مساحتها 120 m^2 . أكملُ الجدولَ المجاورَ الذي يمثِّلُ العلاقةَ بينَ طولِ القطعةِ وعرضها، ثمَّ أحددُ نوعَ التناسبِ وأمثلهُ بيانيًا.

معلومة



تعد ثمار الحمضيات المنتجة في الأردن من أفضل الأنواع على مستوى العلم حيث تتميز بجودة عالية مما جعلها تنافس في جميع الأسواق.

16

17

الوحدة 5

في كلٍّ من الجدولين الآتيين يتناسب المتغيّران x و y عكسيًا. أكتب معادلة كلّ تناسب، ثمّ أجد القيم المجهولة.

18	x	3		0.5	
	y	4	12		144

19	x	20		2	
	y	3	4		40

أعوذ إلى فقرة (أستكشف) بداية الدرس وأحلّ المسألة مقربًا لإجابة لأقرب جزء من عشرة.

20

مهارات التفكير العليا

تحدّ: يتناسب الزمن (t) الذي يستلم فيه الزبائن طلباتهم من أحد المطاعم عكسيًا مع مربع عدد العاملين (n). إذا احتاج زبون 20 دقيقة لاستلام طلبه عندما كان عدد العاملين 4. فأجب عما يأتي:

أكتب معادلة تُعطي t بدلالة n .


21

إذا أصبح عدد العاملين $2n$ ، كم سيوفّر الزبون من الوقت لاستلام الطلب.

22

إرشاد

يمكن الاستفادة من النقطة $(4, 2)$ التي تقع على كلا المنحنيين في إيجاد معادلة كلٍّ منهما.



تبرير: يمثل أحد التمثيلين البيانيين المجاورين p و q تناسبًا طرديًا ويمثل الآخر تناسبًا عكسيًا.

أكتب معادلة لكلٍّ منهما.

23

أصف التغيّر الذي يطرأ على y عندما تتغيّر x في كل حالة. أبرّر إجابتني.

24

مسألة مفتوحة: أكتب وأمثّل بيانيًا علاقتي تناسبٍ إحداهما طرديةٌ والأخرى عكسيةٌ لهما ثابت التناسب نفسه.

25

تبرير: إذا كانت النقطتان $(3, 8)$ و $(2, y)$ تقعان على منحنى العلاقة العكسية نفسه، فأجد قيمة y .

26

أكتب: كيف أميز التناسب العكسي باستعمال التمثيل البياني؟

27



أستكشف

اشترك حسنٌ وسعيدٌ وسليمٌ في تجارةٍ، فدفَعَ حسنٌ 2000 JD، ودفَعَ سعيدٌ 4000 JD، ودفَعَ سليمٌ 1000 JD، وفي نهاية العام بلغت أرباح هذه التجارة 1400 JD، كيف ستوزع الأرباح بينهم؟

فكرة الدرس

أوظفُ التقسيم التناسبي في حلِّ مسائل حياتية.

المصطلحات

التقسيم التناسبي.

أتذكر

يُمكننا ضربُ النسب بالعدد نفسه للحصول على نسب مكافئة.

التقسيم التناسبي (proportional division): هو تقسيم كمية أو شيءٍ بنسب معلومة، مثل تقسيم مبلغٍ من المال على ورثة أو تقسيم أرباح تجارة على شركاء حسب مساهمة كل واحدٍ منهم.

مثال 1

قسم عمر وسامي قطعة أرض مساحتها 1600 m^2 بينهما بنسبة 2 : 3، أجد مساحة الجزء الذي سيحصل عليه كل منهما، وأتحقق من صحة الحل.

$$2 + 3 = 5$$

أجد عدد الأجزاء جميعها

$$\frac{1600}{5} = 320 \text{ m}^2$$

أجد قيمة الجزء الواحد بالقسمة على عدد الأجزاء

ولإيجاد مساحة الجزء الذي سيحصل عليه كل من عمر وسامي؛ أضرب النسبة الخاصة بكل منهما في مساحة الجزء الواحد:

$$2 \times 320 = 640 \text{ m}^2$$

مساحة الجزء الخاص بعمر من قطعة الأرض

$$3 \times 320 = 960 \text{ m}^2$$

مساحة الجزء الخاص بسامي من قطعة الأرض

أتحقق من صحة الحل:

$$640 \text{ m}^2 + 960 \text{ m}^2 \stackrel{?}{=} 1600 \text{ m}^2$$

أجمع المساحتين

$$1600 \text{ m}^2 = 1600 \text{ m}^2 \quad \checkmark$$

الطرفان متساويان، إذن، الحل صحيح

أتحقق من فهمي:

أقسم مبلغ 1400 JD بين سُهَي وجميل بنسبة 3:7



اشترك ثلاثة أشخاص في تجارة، دفع الأول JD 18000 في رأس المال، ودفع الثاني JD 9000 ودفع الثالث JD 15000، وفي نهاية العام كان صافي الأرباح JD 7000. إذا وزعت الأرباح حسب مساهمة كل منهم في رأس مال التجارة، أجد نصيب كل واحد منهم من الأرباح، وأتحقق من صحة الحل. لإيجاد نصيب كل منهم من أرباح التجارة، أتبع الخطوات الآتية:

أذكر

(ق.م.أ) هو
اختصار القاسم
المشترك الأكبر.

$$18000 : 9000 : 15000$$

$$6 : 3 : 5$$

الأول إلى الثاني إلى الثالث

أقسم على (ق.م.أ) للمبالغ وهو 3000

إذن نصيب الشخص الأول 6 أجزاء من الأرباح، والشخص الثاني 3 أجزاء، والشخص الثالث 5 أجزاء.

الخطوة 2 أجد مقدار الجزء الواحد من الربح

$$6 + 3 + 5 = 14$$

أجد عدد الأجزاء جميعها

$$\frac{7000}{14} = 500$$

أقسم الربح على عدد الأجزاء

إذن، قيمة الجزء الواحد من الربح تساوي JD 500.

الخطوة 3 أجد نصيب كل واحد من الأشخاص الثلاثة، بضرب عدد أجزائه في قيمة الجزء الواحد:

$$6 \times 500 = 3000$$

نصيب الأول من الأرباح

$$3 \times 500 = 1500$$

نصيب الثاني من الأرباح

$$5 \times 500 = 2500$$

نصيب الثالث من الأرباح

أتحقق من صحة الحل:

$$JD 3000 + JD 1500 + JD 2500 = JD 7000$$

$$JD 7000 = JD 7000 \quad \checkmark$$

أجمع نصيب كل منهم من الأرباح

الطرفان متساويان، إذن، الحل صحيح

أتحقق من فهمي:



اشترك ثلاثة أشخاص في شراء سيارة أجرة بمبلغ JD 45000، واتفقوا على أن نسب ملكية السيارة بينهم الأول إلى الثاني إلى الثالث بالشكل 3 : 4 : 2، وأن يدفع كل منهم من ثمنها حسب نسبة ملكيته. أجد المبلغ الذي دفعه كل منهم، وأتحقق من صحة الحل.

مثال 3

تُوفِّي رجلٌ وتركَ JD 20000 لورثته، وله زوجةٌ وولدان وبنتٌ، أحسبُ نصيبَ كلٍّ مِنَ الْوَرَثَةِ علماً بأنَّ للزوجة $\frac{1}{8}$ التَّركَةِ، وللذكرِ مثل حظِّ الأنثيين بعد أخذِ حصةِ الزوجة.

الخطوة 1 أجِدْ نصيبَ الزوجة مِنَ التَّركَةِ:

$$20000 \times \frac{1}{8} = 2500$$

أضربُ المبلغَ في $\frac{1}{8}$ ، وأبسِّطُ

إذن نصيب الزوجة JD 2500

الخطوة 2 أجِدْ ما تبقى مِنَ التَّركَةِ بعد أن أخذتِ الزوجة نصيبها:

$$20000 - 2500 = 17500$$

أطرحُ نصيبَ الزوجة مِنَ المبلغ

الخطوة 3 أوزعُ ما تبقى مِنَ التَّركَةِ على الولدين والبنتِ بحيثُ تكونُ النسبُ 2:2:1

$$2 + 2 + 1 = 5$$

أجدُ عددَ الأجزاء جميعها

$$17500 \div 5 = 3500$$

أجدُ قيمةَ الجزء الواحدِ بالقسمةِ على عددِ الأجزاء

$$3500 \times 2 = 7000$$

أجدُ نصيبَ كلِّ ولدٍ بالضربِ في 2

إذن، نصيبُ البنتِ هو الجزء الواحدُ JD 3500، ونصيبُ كلِّ ولدٍ JD 7000.

أتحقَّقُ مِنْ صحةِ الحلِّ:

$$JD 3500 + JD 7000 + JD 7000 + JD 2500 \stackrel{?}{=} JD 20000$$

$$JD 20000 = JD 20000 \checkmark$$

أجمعُ نصيبَ كلِّ منهمُ مِنَ الميراثِ

الطرفانِ متساويانِ، إذن، الحلُّ صحيحٌ

أتحقَّقُ من فهمي:

تُوفِّي رجلٌ وتركَ JD 30000 لورثته وهم: ولدٌ، وثلاثُ بناتٍ، إذا أوصى بِسُدُسِ تَرَكَتِهِ للجمعياتِ الخيرية، فأحسبُ نصيبَ كلٍّ مِنَ الْوَرَثَةِ.

مثال 4



حضَّرَ الطَّلَبَةُ فِي مَخْتَبَرِ الْكِيمِيَاءِ مَحْلُولًا مِنْ مُذِيبٍ وَمُذَابٍ بِنِسْبَةِ 5:1، إِذَا كَانَتْ كَمِّيَّةُ الْمَحْلُولِ 216 mL، فَمَا كَمِّيَّةُ كُلِّ مِنَ الْمُذِيبِ وَالْمُذَابِ؟

$$5 + 1 = 6$$

أجدُ عددَ الأجزاء جميعها

$$216 \div 6 = 36$$

أجدُ مقدارَ الجزء الواحدِ بالقسمةِ على 6

$$36 \times 5 = 180 \text{ mL}$$

أجدُ كَمِّيَّةَ الْمُذِيبِ بِالضَّرْبِ فِي عَدَدِ أَجْزَائِهِ

إذن، كَمِّيَّةُ الْمُذِيبِ فِي الْمَحْلُولِ 180 mL وكَمِّيَّةُ الْمُذَابِ 36 mL

الوحدة 5

$$180 \text{ mL} + 36 \text{ mL} = 216 \text{ mL}$$

$$216 \text{ mL} = 216 \text{ mL} \quad \checkmark$$

أتحقق من صحة الحل:

أجمع كمية كل من المذيب والمذاب
الطرفان متساويان، إذن، الحل صحيح

أتحقق من فهمي:



إذا كانت نسبة المذيب إلى المذاب في محلول 3:2، وكانت كمية المحلول 250 mL، أجد كمية كل من المذيب والمذاب.

أُتدرب وأحل المسائل



1 **طعام:** وُزِعَ طَبَقٌ بيتزا مكوّن من 14 جزءاً متماثلاً بين شخصين بنسبة 3:4، أجد نصيب كل واحد منهما.

2 **حدائق:** حديقة مثلثة الشكل، النسبة بين أطوال أضلاعها 3:4:5، فإذا كان محيطها 120 m، أحسب أطوال أضلاع هذه الحديقة.

3 **معادن:** معدن كتلته 187 g مكوّن من نحاس وفضة بنسبة $\frac{1}{7} : \frac{1}{4}$ ، ما كمية كل من النحاس والفضة في المعدن؟

4 **مشاريع صغيرة:** اشتركت ثلاث سيدات في مشروع بيتي لصناعة الصابون وبيعه، فدفعت الأولى JD 500، والثانية JD 300 والثالثة JD 400، وفي نهاية العام كان صافي الأرباح JD 2400. أجد نصيب كل واحدة منهن إذا وُزعت الأرباح حسب مساهمة كل منهن في رأس مال المشروع، وأتحقق من صحة الحل.

5 **قسّم مبلغ** JD 2800 بين عامل وفني ومهندس بنسبة $1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{4}$ ، أجد نصيب كل واحد منهم من المبلغ.

6 **ميراث:** توفيت سيدة، وتركت لورثتها، وهن زوج وولد وبنت، مبلغ JD 18000، أحسب نصيب كل من الورثة علماً بأن للزوج $\frac{1}{4}$ التركة، وللولد مثلي البنت.

7 **قُطِعَ** أنبوب بلاستيكي طوله 1.2 m إلى ثلاثة أجزاء بنسبة 2:3:5، أجد طول كل جزء بالسنتيمتر.

8 **هندسة:** مثلث متطابق الضلعين، نسبة طول أحد الضلعين المتطابقين إلى طول الضلع الثالث هي 3:2، إذا كان محيط المثلث 70 cm، أجد أطوال أضلاعه.



مؤسسة نهر الأردن
Jordan River Foundation

معلومة

في عام 1995 أسست جلالة الملكة رانيا العبدالله مؤسسة نهر الأردن التي تهدف إلى توفير فرص عمل للسيدات تمكّنهن من تحسين مستوى معيشتهن، إضافة إلى بناء قدراتهن في مجال إدارة المشاريع وتطويرها.

9 **طقس:** إذا كانت نسبة عدد الأيام العاصفة إلى عدد الأيام المشمسمة إلى عدد الأيام الماطرة في شهر نيسان هي 3:2:5، أجد عدد الأيام العاصفة، وعدد الأيام الماطرة.

10 إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث 1:2:3، أجد قياسات زواياه.

11 أعود إلى فقرة (أستكشف) بداية الدرس وأحل المسألة.

مهارات التفكير العليا

أكتشف الخطأ: خليط مكون من ثلاثة ألوان: الأحمر، والأزرق، والأبيض، بنسب 3:2:1، كميته 660 mL. لتحديد الكمية المستخدمة من كل لون في الخليط، استخدم سليم طريقتين، وحصل على إجابة خاطئة في كل منهما.

الطريقة 2
الأحمر $660 \div 3 = 220$
الأزرق $660 \div 2 = 330$
الأبيض $660 \div 1 = 660$

الطريقة 1
$3 + 2 + 1 = 6$
$660 \div 6 = 110$
الأحمر $2 \times 110 = 220$
الأزرق $1 \times 110 = 110$
الأبيض $3 \times 110 = 330$

12 أوضّح الخطأ الذي وقع فيه سليم في كل طريقة.


13 ما الإجابة الصحيحة؟

14 **تحد:** قطعة أرض مستطيلة الشكل، نسبة طولها إلى عرضها 5:3، فإذا كان محيطها 160 m، أجد مساحتها.

15 **تبرير:** أعدد رمي خليطاً من العصير الطبيعي يحتوي البرتقال والليمون والزنجبيل بالنسبة 40:9:1، وأعدت ميس خليطاً من المكونات نفسها ولكن بالنسبة 10:2:1 أي الخليطين فيه نسبة أكبر من الزنجبيل؟ أبرر إجابتي.

إرشاد

أقسم الشبكة إلى 3 مناطق مستوعلاً التقسيم التناسبي.



16 **تحد:** أقسم شبكة المربعات المجاورة إلى ثلاثة أجزاء مستخدماً خطين، بحيث تكون النسبة بين المساحات الناتجة 2:3:4

17 **أكتب:** كيف أوظف التقسيم التناسبي في حل مسائل حياتية؟



أستكشف

سعر علبه عطر في مدينة الرياض SAR 140،
وسعرها في السوق الحرة في مطار الملكة علياء
الدولي USD 32، وسعرها في عمان JD 25،
أي الأسعار أفضل لمسافر يريد أن يشتري علبه
عطر من هذا النوع؟



فكرة الدرس

أعد تقارير مالية لمشاريع
تتضمن: البيع والشراء،
ومقارنة الأسعار.

المصطلحات

التكلفة، سعر البيع، الربح،
الخسارة، التكلفة الكلية،
سعر الصرف.

توجد تطبيقات مالية عديدة في حياتنا اليومية مثل: الربح (P) (profit)، والخسارة (loss)، وهناك مصطلحات عديدة مرتبطة بالربح والخسارة منها: التكلفة (cost): وهي ما يدفعه البائع ثمنًا للسلعة، والتكلفة الكلية (total cost (TC)) وهي مجموع تكلفة السلعة وما ينفقه البائع من مصاريف أخرى على السلعة، مثل أجور نقل وتخزين وضرائب، وغيرها. أما سعر البيع (SP) (sale price) فهو المبلغ الذي يقبضه البائع عند بيع سلعة. ويحقق البائع الربح عندما يكون سعر البيع أكبر من التكلفة، أي أن: $P = SP - TC$. ويخسر البائع عندما يكون سعر البيع أقل من التكلفة.

مثال 1

1 اشترى تاجر سيارة بمبلغ JD 12500 ودفع رسوم تسجيل لها JD 350، ثم باعها بسعر JD 14000، هل ربح التاجر أم خسر في عملية البيع؟ أجد مقدار الربح أو الخسارة.

الخطوة 1 أجد تكلفة السيارة الكلية، وهي سعر الشراء مضافاً إليه رسوم التسجيل:

$$12500 + 350 = 12850$$

تكلفة السيارة الكلية (TC)

بما أن سعر البيع أكبر من التكلفة الكلية؛ إذن، ربح التاجر.

الخطوة 2 أجد الربح بطرح التكلفة الكلية من سعر البيع:

$$14000 - 12850 = 1150$$

$$P = SP - TC$$

إذن، ربح التاجر مبلغ JD 1150.

2

اشترى حسامٌ ثلاجةً بمبلغ JD 980، ودفعَ أجورَ نقلٍ وتركيبٍ لها JD 65، ثمَّ باعها بسعرٍ JD 1000. هل ربحَ حسامٌ أمَّ خسرَ في عملية البيع؟ أجدُ مقدارَ الربحِ أو الخسارة.

الخطوة 1 أجدُ تكلفةَ الثلاجة الكلية، وهي سعرُ الشراء مضافاً إليه أجورُ النقلِ والتركيب:

$$980 + 65 = \text{JD } 1045 \quad \text{تكلفةُ الثلاجة الكلية (TC)}$$

بما أنَّ سعرَ البيع أقلُّ من التكلفة الكلية؛ إذن، خسرَ حسامٌ.

الخطوة 2 أجدُ الخسارة بطرح سعرِ البيع من التكلفة الكلية:

$$1045 - 1000 = \text{JD } 45$$

إذن، خسرَ حسامٌ مبلغَ JD 45.

أتتحقق من فهمي:

اشترى تاجرٌ 30 كيسَ أرزٍ بسعرٍ JD 5 للكيس الواحد، ودفعَ أجرةَ نقلها JD 16، وقبضَ JD 180 ثمنَ بيعِ الكمية كلها، هل ربحَ التاجرُ أمَّ خسرَ في عملية البيع؟ أجدُ مقدارَ الربحِ أو الخسارة.

تُستخدمُ النسبة المئوية كثيراً في التطبيقات الحياتية مثل تحديد سعرِ سلعةٍ بعد إضافة ضريبة المبيعات.

مثال 2



اشتركتُ ليلي في إنترنت منزلي بمبلغ JD 300 سنوياً مضافاً إليه ضريبة مقدارها 16%، كم ستدفعُ ليلي شهرياً؟

الخطوة 1 أجدُ قيمةَ الضريبة بضرب نسبة الضريبة في المبلغ:

$$\frac{16}{100} \times 300 = 48 \quad \text{قيمة الضريبة}$$

الخطوة 2 أجمعُ قيمةَ الضريبة إلى قيمة الاشتراك لأجدَ المبلغ الكلي:

$$300 + 48 = 348 \quad \text{المبلغ الكلي يساوي الاشتراك مضافاً إليه الضريبة}$$

الخطوة 3 أجدُ المبلغ المستحق شهرياً:

$$348 \div 12 = 29 \quad \text{أقسّم المبلغ الكلي على 12 (عدد أشهر السنة)}$$

إذن، مبلغ الاشتراك الشهري الذي ستدفعه ليلي JD 29.

أنذكر

يُمكنُ كتابةُ النسبة المئوية بالصورة العشرية، مثلاً: $5\% = 0.05$ ، أو الكسرية $4\% = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$

الوحدة 5

أتحقق من فهمي:

اشترى عليّ إطارات لسيّارته بمبلغ JD 205، ما المبلغ الذي سيدفعه عليّ ثمنًا للإطارات علمًا بأن نسبة الضريبة 10%؟

ويمكننا استخدام النسبة المئوية في تحديد سعر سلعة بعد الخصم.

مثال 3

أعلن متجر عن خصم نسبته 20% على جميع محتويات المحلّ، ما سعر سلعة بعد الخصم إذا كان سعرها الأصلي JD 85؟

أتعلم

السعر بعد الخصم: sale price (SP)
السعر الأصلي: marked price (MP)
مقدار الخصم: discount (D)

الخطوة 1 أجد مقدار الخصم بضرب نسبة الخصم في سعر السلعة:

$$\frac{20}{100} \times 85 = 17 \quad \text{مقدار الخصم (D)}$$

الخطوة 2 أجد السعر بعد الخصم:

$$85 - 17 = 68 \quad SP = MP - D$$

إذن سعر السلعة بعد الخصم JD 68.

أتحقق من فهمي:

ترغب مريم في شراء مكنسة كهربائية ثمنها JD 90، إذا كانت نسبة الخصم على المكنسة 15%، ما المبلغ الذي ستدفعه مريم ثمنًا للمكنسة؟

سعر الصرف (exchange rate) للعملة A بالعملة B: هو قيمة وحدة من العملة A بالعملة B. فمثلاً USD 1 = JD 0.705، وكذلك JD 1 = USD 1.41.

لكي أحوّل من عملة A إلى عملة B أستخدم المعادلة $y = k \times x$

$$\begin{array}{ccc} \text{المبلغ بالعملة B} & & \text{المبلغ بالعملة A} \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & y = k \times x & \\ & \uparrow & \\ & \text{سعر صرف العملة A بالعملة B} & \end{array}$$

أتذكر

JD: دينار أردني
USA: دولار أمريكي
SAR: ريال سعودي

يستخدم سعر الصرف للتحويل بين العملات والمقارنة بين أسعار السلع في دول مختلفة.

مثال 4

سعر حاسوبٍ محمولٍ في الأردن JD 500 ، وسعره في أمريكا USD 648.6 ، وسعره في المملكة المتحدة £ 504 ، أحدد أي الأسعار أفضل لشخصٍ يريد شراء جهاز حاسوبٍ من هذا النوع، إذا علمت أن سعر صرف الدولار الأمريكي بالدينار الأردني 0.71 ، والجنيه الاسترليني بالدينار الأردني 0.99 (أقرب الإجابة لأقرب عدد صحيح).

لأتمكن من المقارنة أحوّل سعر الحاسوب من العملات الأخرى إلى الدينار الأردني باستعمال المعادلة: $y = k \times x$

$$JD\ 648.6 \times 0.71 \approx JD\ 461$$

أحوّل سعر الحاسوب من الدولار الأمريكي إلى الدينار الأردني

$$JD\ 504 \times 0.99 \approx JD\ 499$$

أحوّل سعر الحاسوب من الجنيه الاسترليني إلى الدينار الأردني

ألاحظ أن أقل سعر هو JD 461 ، أي USD 648.6 .

✓ **أتحقّق من فهمي:**

زار سائحٌ إماراتيّ مدينة البترا الأثرية، واشترى أشياء تراثية من البيئة الأردنية بقيمة JD 200 ، فكّم درهماً إماراتياً (AED) دفعَ علماً بأنّ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدرهم الإماراتي 5.18؟

أُتدربُ

وأحلّ المسائل

1 **زراعة:** قطف مزارع 82 صندوقاً من التفاح من بستانه، ودفع JD 106 أجره عمال ونقل. إذا تلف صندوقان أثناء النقل وباع الباقي بسعر JD 3 للصندوق الواحد، أجد صافي ربح المزارع من التفاح.

2 **هاتف:** إذا كان سعر الشحن الشهري لهاتف سماح JD 8 ، يضاف إليه 15% ضريبة، أجد المبلغ السنوي الذي تدفعه سماح.

3 **سيارة:** اشترى تاجرٌ سيارةً بمبلغ JD 14000 ، ودفع JD 150 مقابل تسجيل ونقل ملكية، وباعها بمبلغ JD 15848 . أجد ربح التاجر في هذه السيارة، وأتحقق من صحة الحل.

4 **مكنسة:** سعر مكنسة كهربائية في الأردن JD 50 ، وسعرها في اليابان 7045 ينًا يابانيًا، وسعرها في اليونان 64 يورو، أجد أي الأسعار أفضل لشخصٍ يريد شراء مكنسة من هذا النوع، إذا علمت أن سعر صرف الين الياباني بالدينار الأردني 0.0068 ، واليورو بالدينار الأردني 0.84 (أقرب الإجابة لأقرب عدد صحيح).

معلومة

تسمى عملة اليابان الين ويرمز لها بالرمز (¥).

الوحدة 5

5 صُرفَ JD 200 بـ 86 دينارًا كويتيًّا، أَجِدْ كَمْ دينارًا كويتيًّا قيمةً JD 1450؟

6 استوردَ تاجرٌ أردنيٌّ بضاعةً مِنَ الصينِ بقيمةً 89700 يوانٍ صينيٍّ ودفعَ 5382 يوانًا أجرةَ شحنٍ، ثُمَّ باعَهَا بمبلغٍ JD 12720، أَجِدْ ربحَ التاجرِ (سعرُ صرفِ اليوانِ الصينيِّ بالدينارِ الأردنيِّ 0.10).

7 **عُطُورٌ:** أعودُ إلى فقرة (أستكشفُ) بدايةً الدرسِ وَأُحدِّدُ أفضلَ سعرٍ لعلبة العطر.

معلومة

تختلفُ رائحةُ العطرِ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ؛ لِإِخْتِلَافِ نِسَبِ المُرَكَّبَاتِ الكيمايَّةِ المكوِّنةِ لِلجِلْدِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ.

مهاراتُ التفكيرِ العُلْيَا

8 **أكتشفُ المختلفَ:** القيمةُ الأولى في كلِّ زوجٍ ممَّا يأتي، هِيَ سَعْرُ البِيعِ الأصليِّ لسلعةٍ، والقيمةُ الثانيةُ هِيَ سَعْرُ بَيعِهَا بَعْدَ التَّزِيلَاتِ. أَحدِّدُ الزَّوْجَ الَّذِي نِسْبَةُ التَّزِيلَاتِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ عَنِ باقِي الأزواجِ، وأبرِّرُ إجابتي.

JD 16, JD 12

JD 28, JD 21

JD 30, JD 25

JD 48, JD 36

تبرير: معطف ثمنه JD 25 وفي موسم التزيلات خفض بنسبة 20% من ثمنه. أوجد كل من محمود وعلي ثمن المعطف بطريقة مختلفة كالآتي:

علي

$$\frac{80}{100} \times 25 = 20$$

ثمن المعطف JD 20

محمود

$$\frac{20}{100} \times 25 = 5$$

$$25 - 5 = 20$$

ثمن المعطف JD 20

9 ما الفرق بين طريقة علي وطريقة محمود في إيجاد ثمن المعطف؟ هل طريقة كل منهما صحيحة؟

10 هل يمكن استخدام طريقة علي لإيجاد ثمن أي سلعة بعد الخصم؟ أبرر إجابتي.

11 **تبرير:** باعَ تاجرٌ سيارتينِ بِسَعْرِ JD 8700 لِكُلِّ مِنْهُمَا، فإذا ربحَ في الأولى 20% وخسرَ في الثانية 20%، فهل خسرَ أم ربحَ أم استردَّ رأسَ مالِهِ مِنْ هَذِهِ التَّجَارَةِ؟ أبررُ إجابتي.

12 **اكتبُ** كيفَ أَّحدِّدُ الربحَ أو الخسارةَ في عملياتِ البِيعِ والشراءِ؟

اختبار الوحدة

أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- 1 قرأ عماد $\frac{3}{8}$ صفحة في $\frac{1}{3}$ دقيقة. أجد معدل الوحدة لقراءة عماد بالصفحة لكل دقيقة.
- a) $\frac{4}{11}$ b) $\frac{9}{8}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{8}{9}$

- 2 تنمو نبتة بمعدل 0.5 cm في اليوم الواحد، أجد كم يوماً تحتاج لتنمو بمقدار 10 cm:
- a) 5 b) 10 c) 20 d) 24

- 3 أحل التناسب $\frac{9}{12} = \frac{x}{8}$:
- a) $10\frac{2}{3}$ b) $13\frac{1}{2}$

- c) 7 d) 6

- 4 أحدد أي الآتي يشكّل تناسباً:

- a) $\frac{3.5}{14}, \frac{2}{8}$ b) $\frac{18}{10}, \frac{5.1}{3}$
- c) $\frac{9}{3.6}, \frac{10}{4.2}$ d) $\frac{7}{16}, \frac{3}{7}$

- 5 تستهلك شاحنة 80 L من الديزل لقطع مسافة 280 km، كم المسافة بالكيلومتر التي تقطعها بخزانٍ ممتلئ سعة 100 L؟

- a) 300 b) 320 c) 350 d) 380

- 6 تحتاج مروحة 210 g من السمن لعمل 12 قطعة من البسكويت، أجد كم غراماً تحتاج لعمل 18 قطعة من البسكويت نفسه.

- a) 140 b) 250 c) 300 d) 315

- 7 يُمكن لستة أشخاص أن يقطفوا ثمار كرمٍ عنبٍ في 10 أيام. أجد كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم قطف ثمار الكرم في 12 يوماً.

- a) 7 b) 5 c) 4 d) 8

- 8 يتسع رف لـ 30 كتاباً سُمك الواحد منها 2 cm، أجد كم كتاباً سُمك الواحد منها 5 cm يُمكن وضعها في هذا الرف.

- a) 12 b) 6 c) 15 d) 23

- 9 يقسم معلم زمن حصته الصفية للتدريس وحل المسائل بنسبة 2:3. إذا كان زمن الحصة 45 دقيقة، أجد زمن حل المسائل بالدقيقة:

- a) 9 b) 18 c) 27 d) 24

- 10 اشترك حمزة وأخوه حسن وأخته سارة في تجارة. إذا كانت أرباحهم في نهاية العام JD 12000 ووُزعت الأرباح بالنسبة 5:2:3، أجد نصيب سارة بالدينار.

- a) 1200 b) 2400

- c) 3600 d) 6000

- 11 سعر حذاء JD 25. إذا كانت نسبة الخصم 26% فإن سعر الحذاء بعد الخصم:

- a) 18.5 b) 18

- c) 17.5 d) 17

تدريب على الاختبارات الدولية

17 قطع سائق دراجة هوائية 1800 m في 5 دقائق. أجد معدل سرعته بالمتري لكل ثانية.

- a) 30 b) 6
c) 72 d) 360

18 يوجد 100 سُعر حراري في 250 mL من مشروب مياه غازية، أجد عدد السُعرات الحرارية في 200 mL من هذا المشروب.

- a) 50 b) 125
c) 20 d) 80

19 في موسم التزيلات انخفض سعر جهاز حاسوب بمقدار 20%. إذا كان سعره قبل التزيلات JD 800، أجد سعره بالدينار بعد التزيلات.

- a) 780 b) 700
c) 640 d) 160

20 حديقة منزلية مساحتها 84 m²، يزرع صاحبها 2 m² بالورود مقابل كل 5 m² مزروعة بالأشجار. أجد مساحة الأرض المزروعة وروداً. أبين خطوات الحل.

12 أكمل الجدول الآتي الذي يمثل العلاقة بين طول ضلع المضلع الخماسي المنتظم (x)، ومحيطه (y).

x طول الضلع	4	5	7	8
y محيط الشكل				

أمثل العلاقة بيانياً، وأحدد نوع التناسب، ثم أجد معدل الوحدة من التمثيل البياني.

13 تتناسب كمية الصلصال المستخدمة في صنع التحف طردياً مع مكعب ارتفاع التحفة. إذا استخدم 500 cm³ من الصلصال في صنع تحفة ارتفاعها 10 cm، أجد كمية الصلصال اللازمة لعمل تحفة مماثلة ارتفاعها مثلي ارتفاع التحفة الأولى.

14 يمكن لمصعد أن يحمل 9 أشخاص بأمان بكتل وسطها الحسابي 72 kg. أجد كم شخصاً بكتل وسطها الحسابي 81 km يمكن أن يحملهم المصعد بأمان.

15 أعدت سهام خليطاً من العصير الطبيعي مكون من البرتقال والجزر والموز بالنسبة 10:4:1. إذا كان لدى سهام 2.5 L فقط من البرتقال، أجد الكمية المطلوبة من المكونات الآخرين لعمل الخليط.

16 يريد سعيد شراء حقيبة سفر سعرها الأصلي JD 40. يوجد عرضان من التزيلات؛ الأول: خصم JD 6 عن المشتريات التي تزيد عن JD 30، والثاني: خصم 20% على أية مشتريات. أي العرضين أفضل؟

التطابق والتشابه

ما أهمية هذه الوحدة؟

لِتشابه الأشكال الهندسية وتطابقها أهمية كبيرة في حياتنا، فهي تُستعمل في كثير من المجالات؛ مثل معرفة ارتفاعات المباني، وتصميم نماذج فنية مكبرة مثل المبخرة الجميلة المقامة عند مدخل مدينة سحاب والتي تعد الأكبر في العالم.



سأتعلم في هذه الوحدة:

- العلاقة بين الأضلاع والزوايا المتناظرة في شكلين متشابهين.
- العلاقة بين الأضلاع والزوايا المتناظرة في شكلين متطابقين.
- حل مسائل باستعمال مقياس الرسم.
- رسم شكل هندسي تحت تأثير تكبير.

تعلمت سابقًا:

- ✓ حل مسائل باستخدام مفهوم التناسب.
- ✓ مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث والمضلع.
- ✓ رسم انسحاب ودوران وانعكاس لشكل في المستوى الإحداثي.



مشروع الوحدة: نموذج قصر الحرائة

4 أحدّد بعض الأشكال الهندسية المتطابقة في القصر الحقيقي.

5 أحدّد بعض الأشكال الهندسية المتشابهة في القصر الحقيقي.

عرض النتائج:

أصمّم مطويةً مبتكرةً وأكتبُ فيها:

- خطوات عمل المشروع والنتائج التي توصلتُ إليها.
- المواد التي استعملتها في تصميم النموذج، ومدى استفادتي من المواد في البيئة من حولي.
- معلومة جديدة عرفتُها في أثناء العمل على المشروع ومقترحًا لتوسعة المشروع.
- بعض الصعوبات التي واجهتني في أثناء العمل على المشروع، وكيف تغلبتُ عليها.
- أعرض المطوية والنموذج أمام الصف، وأخبرهم بأبعاد النموذج.

أستعدُّ وزملائي لتنفيذ مشروعنا الخاص الذي سنوظف فيه ما نتعلمه في هذه الوحدة.

هدف المشروع:

تنمية مهاراتي، وتعزيز معرفتي بتطابق الأشكال الهندسية وتشابهها ومقياس النموذج، واستعمالها في تصميم نموذج لقصر الحرائة.

خطوات تنفيذ المشروع:

1 أبحث في الإنترنت عن أبعاد قصر الحرائة، وأبحث عن صور له من الداخل والخارج.



2 أجهّز الأدوات والمواد اللازمة لصنع النموذج، مستغلًا قدر الإمكان المواد المتوفرة في البيئة من حولي.

3 أختار مقياس نموذج مناسب، وأستعمله لتحديد أبعاد القصر في النموذج.



فكرة الدرس

أميز المضلعات المتطابقة، وأحل مسائل تعتمد على مفهوم التطابق.

المصطلحات


الأضلاع المتناظرة، الزوايا المتناظرة، مضلعات متطابقة.

أستكشف

التغرام لعبة صينية عُمرها 1000 سنة، تحتوي مجموعة من الأشكال بمقاسات ثابتة تُجمع معاً لتشكيل شكل معين. أي الأشكال الهندسية في اللعبة لها الشكل والقياس نفسهما؟



درست سابقاً أن الشكل الأصلي وصورته تحت تأثير التحويلات الهندسية (الدوران، والانعكاس، والانسحاب) لها الشكل والمقاس نفسهما، إذن، فهما متطابقان، ومن ثم، يمكننا التحقق من تطابق شكلين، بإجراء انسحاب، أو دوران، أو انعكاس لأحدهما والتأكد من انطباقه على الشكل الآخر تماماً.




المضلعات المتطابقة (congruent polygons) مضلعات أجزاؤها المتقابلة متطابقة، فالأضلاع المتقابلة تسمى **الأضلاع المتناظرة** (corresponding sides)، والزوايا المتقابلة تسمى **الزوايا المتناظرة** (corresponding angles). ويستعمل الرمز ($\cong$) للدلالة على أن الشكلين متطابقين.

المضلعات المتطابقة

مفهوم أساسي



• **بالكلمات** يكون المضلعان متطابقين إذا كانت الأضلاع المتناظرة متطابقة والزوايا المتناظرة متطابقة.





• **بالرموز** إذا كان $ABCD \cong EFGH$ فإن:

الزوايا المتطابقة: $\angle A \cong \angle E$, $\angle B \cong \angle F$, $\angle C \cong \angle G$, $\angle D \cong \angle H$

الأضلاع المتطابقة: $\overline{AB} \cong \overline{EF}$, $\overline{BC} \cong \overline{FG}$, $\overline{CD} \cong \overline{GH}$, $\overline{DA} \cong \overline{HE}$

أكتبُ جُمْلَ التَّطابِقِ لِكُلِّ مِنْ أَزْوَاجِ الْمُضْلَعَاتِ الْمُتَطَابِقَةِ الْآتِيَةِ:

1



أستخدمُ عددًا متساويًا مِنَ الْأَقْوَاسِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الزَّوَايا المتناظرة المتطابقة، وعددًا متساويًا مِنَ الْخُطُوطِ الصَّغِيرَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْأَضْلَاعِ المتناظرة المتطابقة.

1

الخطوة

أكتبُ جُمْلَ التَّطابِقِ:

2

الخطوة


الزوايا المتناظرة: $\angle M \cong \angle P$, $\angle L \cong \angle Q$, $\angle N \cong \angle R$

الأضلاع المتناظرة: $\overline{ML} \cong \overline{PQ}$, $\overline{LN} \cong \overline{QR}$, $\overline{MN} \cong \overline{PR}$


أتحقق من فهمي:



2



3




يُمْكِنُنِي اسْتِخْدَامُ خَوَاصِّ تَطَابِقِ الْمُضْلَعَاتِ لِإِيجَادِ قِيَاسَاتِ زَوَايَا وَأَضْلَاعٍ مَجْهُولَةٍ.

في الشكلِ المجاورِ $FCDE \cong NOPM$ ، وكان

$CD = 7 \text{ cm}$ ، فأجد: $m\angle P = 104^\circ$

قياس $\angle D$.

1



بما أنَّ $\angle D$ و $\angle P$ متناظران في مضلعين متطابقين،

إذن، فهما متطابقتان. ومنه $m\angle D = 104^\circ$

2 طول $\overline{OP}$.

أتذكر

الرمز OP يعني طول القطعة المستقيمة $\overline{OP}$

بما أن $\overline{OP}$ و $\overline{CD}$ متناظران في مضلعين متطابقين، إذن، فهما متطابقان.


ومنه $OP = 7 \text{ cm}$

✓ **أنتحقق من فهمي:**

في الشكل المجاور $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ ، أجد:

3 قياس $\angle A$


4 طول $\overline{XY}$



يمكن استعمال مجموع قياسات زوايا المضلع في إيجاد زوايا مفقودة.

مثال 3

1 في الشكل المجاور $\triangle WYS \cong \triangle MKV$ ، أجد $m\angle V$.



الخطوة 1 أجد قياس الزاوية $m\angle S$

$$m\angle Y + m\angle W + m\angle S = 180^\circ$$

$$35^\circ + 62^\circ + m\angle S = 180^\circ$$

$$97^\circ + m\angle S = 180^\circ$$

$$m\angle S = 83^\circ$$

مجموع قياسات زوايا المثلث

أعوّض $m\angle Y = 35^\circ$ و $m\angle W = 62^\circ$

أجمع


أطرح 97° من الطرفين

الخطوة 2 أستخدم خواص المثلثات المتطابقة.

بما أن $\angle S$ و $\angle V$ متناظران في مضلعين متطابقين، إذن، فهما متطابقان، ومنه $m\angle V = 83^\circ$

✓ **أنتحقق من فهمي:**


2 في الشكل المجاور $\triangle CAB \cong \triangle ZXY$ ، فأجد $m\angle A$.



الوحدة 6

يمكن استعمال المعادلات في إيجاد قياسات زوايا وأضلاع مجهولة في المضلعات المتطابقة.

مثال 4



في الشكل المجاور $ABCD \cong PQRS$ ،
أجد كلاً مما يأتي:

1 قيمة المتغير x .

بما أن $\angle A, \angle P$ متناظران في شكلين متطابقين، إذن، $(2x + 4)^\circ$ تساوي 100°

$$2x + 4 = 100$$

$$\begin{array}{r} -4 \quad -4 \\ \hline \end{array}$$

$$2x = 96$$

$$\begin{array}{r} \div 2 \quad \div 2 \\ \hline \end{array}$$

$$x = 48$$

أكتب المعادلة

أطرح 4 من الطرفين

أقسم على 2

أجد الناتج


إذن قيمة x تساوي 48

أتحقق من فهمي:


2 قيمة المتغير y

أكتب جُمْلَ التَّطابقِ لِكُلِّ من أزواج المضلعات المتطابقة الآتية:

1




2



إشارات مرور: يبين الشكل المجاور إشارتي مرور متطابقتين، إذا كان $m\angle Y = 60^\circ$ ،

و $ZX = 55 \text{ cm}$ ، فأجد:



3 قياس $\angle S$

4 طول $\overline{TR}$


أدرب

وأحل المسائل

معلومة

اخترعت أول إشارة ضوئية لتنظيم المرور في العام 1868 في بريطانيا؛ ليتمكن أفراد الشرطة من تنظيم مرور العربات التي تجرها الخيول لا سيما في فترات الليل.

بيِّن الشكلُ الآتي مضلعًا سداسيًا منتظمًا مقسمًا إلى 17 مثلثًا:



أتذكر



المضلع المنتظم هو مضلع لجميع أضلاعه الطول نفسه، ولزواياه الداخلية القياس نفسه.

أحدِّد المثلثات جميعها المتطابقة مع المثلث C .

أي المثلثات يتطابق مع المثلث D ؟

أي المثلثات يطابق المثلث H ؟

الشكل المجاور $\triangle ABC \cong \triangle NML$ ، فأجد:



قياس $\angle M$



طول $\overline{BC}$

طول $\overline{AB}$

أتذكر

مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180°

في الشكل المجاور $ABCD \cong ZWXY$ ، فأجد:




طول $\overline{WX}$

قياس $\angle W$


قياس $\angle X$

الوحدة 6


14 في الشكل الآتي إذا كان $ABCD \cong HEFG$ ، فأجد قيمة كل من المتغيرين x و y :



15 **تبرير:** في الشكل المجاور إذا كان $ABCM \cong XYKM$ ، أجد $m\angle KMC$ مبرراً إجابتي.



16 **أكتشف الخطأ:** أحدد الخطأ في الحل الآتي وأصححه:



17 **تحذير:** فيما يلي وصف $\triangle ABC$ و $\triangle ZXW$ قائمَي الزاوية.

$\triangle ABC$

طول الوتر 10 cm، وطول أحد أضلاعه 6 cm

$\triangle ZXW$

طول الوتر 10 cm وقياسا زاويتين فيه 25° و 65°

أحدد في ما إذا كان المثلثان $\triangle ABC$ و $\triangle ZXW$ متطابقين، مبرراً إجابتي.

18 **أكتب:** كيف أحدد في ما إذا كان مضعان متطابقين أم لا؟

مهارات التفكير العليا

أتذكر

مجموع قياسات الزوايا المتجاورة على مستقيم يساوي 180°

إرشاد

عند البحث في تطابق مثلثين يمكننا رسمهما أولاً.



أستكشف

إذا كان طول ملعب مدرسة فراس 12 m، وعرضه 9 m، وأراد رسم الملعب بحيث يقابل كل 1 cm على الرسم 3 m في الحقيقة، فما أبعاد الملعب على الرسم؟



فكرة الدرس

أحل مسائل مستعملاً مقياس الرسم.

المصطلحات

مقياس الرسم، مقياس النموذج، عامل المقياس.

يُستعمل **مقياس الرسم** (scale drawing) لرسم أشكال ثنائية الأبعاد بشكل مشابه للشكل الأصلي بمقاس أكبر أو أصغر. يمثل مقياس الرسم أو مقياس النموذج نسبة تقارن بين قياسات الرسم أو النموذج وقياسات الأشياء الحقيقية، فقياسات الرسم أو النموذج تتناسب مع القياسات الحقيقية.

مثال 1



يُستعمل ما يقارب 700000 زهرة لتشكيل سجادة مستطيلة الشكل في الميدان الرئيس في مدينة بروكسل مرة كل عامين، وقبل صنع السجادة يُعد المصممون مقياس رسم للسجادة. إذا كان عرض السجادة الحقيقي 40 m وعرضها على الرسم 20 cm، فأجد مقياس الرسم.

لإيجاد مقياس الرسم أجد النسبة بين الطول على الرسم والطول الحقيقي، ثم أبسط النسبة بحيث يصبح البسط يساوي 1:

20 cm ← في الرسم

40 m ← في الحقيقة

$$\frac{20 \text{ cm}}{40 \text{ m}}$$

أقسم على 20

$$\frac{1 \text{ cm}}{2 \text{ m}}$$

أبسط

إذن، مقياس الرسم هو 1 cm : 2 m

أتحقق من فهمي:



إذا كان الطول الحقيقي لقطعة أرض 15 m، وطولها على الرسم 30 cm، أجد مقياس الرسم.

يمكن استعمال مقياس الرسم لإيجاد المسافة الفعلية بين منطقتين باستعمال الخريطة.

مثال 2

تظهر في الشكل المجاور خريطة المملكة الأردنية الهاشمية:

أجد المسافة الحقيقية بين عمّان والعقبة.



مقياس الرسم:
1 cm : 100 km

أستعمل مسطرة السنتيمترات لإيجاد المسافة بين عمّان والعقبة على الخريطة، والتي تبلغ 3.3 cm تقريباً.

أفترض أنّ المسافة الحقيقية بين عمّان والعقبة تساوي x ، ثم أكتب تناسباً مستعملاً مقياس الرسم.

	الطول		المقياس
على الخريطة	$\frac{1 \text{ cm}}{100 \text{ km}}$	$\frac{3.3 \text{ cm}}{x}$	على الخريطة
المسافة الحقيقية			المسافة الحقيقية

$$1 \times x = 100 \times 3.3$$

خاصية ضرب التبادلي

$$x = 330$$

أبسط

إذن، المسافة الحقيقية بين عمّان والعقبة تساوي 330 km تقريباً.


أتحقق من فهمي:



أجد المسافة الحقيقية بين عمّان والرويشد.

يُستعملُ مقياسُ النموذجِ (scale model) لتصميمِ نموذجٍ ثلاثيِّ الأبعادٍ مشابهٍ لشيءٍ يُرادُّ تكبيرُهُ أو تصغيرُهُ.

مثال 3



يبينُ الشكلُ المجاورُ نموذجًا لصاروخٍ فضاء استعملَ لتصميمهِ مقياسُ النموذجِ 1 cm : 5 m

فإذا كانَ ارتفاعُ الصاروخِ 20 m ، أجد ارتفاعَ نموذجِ الصاروخِ.

أفترضُ أن ارتفاعَ نموذجِ الصاروخِ يساوي x ، ثم أكتبُ تناسبًا مستعملًا مقياسَ النموذجِ.

	المقياسُ	الطولُ	
على النموذجِ	$\frac{1 \text{ cm}}{5 \text{ m}}$	$\frac{x \text{ cm}}{20 \text{ m}}$	على النموذجِ
في الحقيقية			في الحقيقية

$$5 \times x = 1 \times 20$$

$x = 4$

خاصيةُ الضربِ التبادليِّ
أبسطُ

إذن، ارتفاعَ نموذجِ الصاروخِ 4 cm


✓ **أتتحقق من فهمي:**

أجدُ طولَ جناحِ الصاروخِ إذا كانَ طولَ الجناحِ في النموذجِ 7 m

يمكنُ كتابةُ مقياسِ الرسمِ أو مقياسِ النموذجِ دونَ وحداتٍ إذا كانَ للقياساتِ في الحقيقة وفي الرسمِ الوحداتُ نفسها، وعندئذٍ تُسمَّى النسبةُ بينهما **عاملَ المقياسِ** (scale factor).

مقياس مع وحدات		مقياس دون وحدات
1 cm : 2 m	$\frac{1 \text{ cm}}{2 \text{ m}}$	$\frac{1 \cancel{\text{cm}}}{200 \cancel{\text{cm}}} \rightarrow 1 : 200$

مثال 4



أجدُ عاملَ المقياسِ لنموذجِ سيارةٍ إذا كانَ مقياسُ النموذجِ 1 cm : 0.5 m

$$\frac{1 \text{ cm}}{0.5 \text{ m}} = \frac{1 \cancel{\text{cm}}}{50 \cancel{\text{cm}}} = \frac{1}{50}$$

أحوّل وحدةَ m إلى cm
أختصرُ الوحداتَ المشتركة

إذن، عاملُ المقياسِ 1 : 50

أتحقق من فهمي:



أستعمل عامل المقياس في السؤال السابق لإيجاد الطول الحقيقي للسيارة إذا كان طولها في النموذج 5 cm

أَتَدْرِبُ وأحل المسائل

1 صمّم حسامٌ نموذجًا لمبنى، إذا كان الارتفاع الحقيقي له 7 m، وارتفاعه في النموذج 14 cm، فأجد مقياس النموذج.
مقياس رسم يمثل كل 1 cm فيه 8 cm في الحقيقة، أجد المسافات في الحقيقة التي تمثلها المسافات الآتية على الرسم:

2 7 cm

3 4.5 cm

4 25 cm

5 4 cm



مقياس الرسم:
1 cm : 750 km

6 خريطة: أستخدم الخريطة المجاورة لأجد المسافة بين مدينتي عمان والرياض. أستخدم المسطرة للمقياس.

أكتب عامل المقياس لكل مما يأتي:

7 1 cm على الخريطة تقابل 0.4 m في الحقيقة.

8 2 cm على الخريطة تقابل 2 m في الحقيقة.

9 5 cm على الخريطة تقابل 25 m في الحقيقة.


10 رياضة: ملعب لكرة السلة في دوري المحترفين (NBA) طوله 28 m وعرضه 15 m، أجد أبعاد الملعب في الرسم إذا كان مقياس الرسم 1 cm : 4 m

11 مسجد: صمّم مهندسٌ نموذجًا لمسجد (الأسماء الحُسنَى) بمقياس نموذج 1 cm : 2 m، إذا كان طول قطعة الأرض التي بُني عليها المسجد 72 m وعرضها 45 m، فأجد أبعاد قطعة الأرض في النموذج.

معلومة

يقع مسجد (الأسماء الحُسنَى) ذو الـ 99 قبة على حافة شاطئ لوساكار في إندونيسيا، وتمثل قبائه عدد أسماء الله الحُسنَى.





نملة: يبين الشكل المجاور رسماً لنملة النجار، إذا كان مقياس رسم النملة 1 cm : 2.5 mm، أجد الطول الحقيقي لرأس النملة، وصدرها، وبطنها.

12

معلومة

نملة النجار نملة تتواجد بشكل طبيعي في العديد من أنحاء العالم، وتفضل لبناء أعشاشها الخشب الرطب غير المستعمل.



شريان: صمم نموذج لشريان بمقياس رسم 1 cm : 0.3 mm، إذا كان قطر الشريان الحقيقي 2.7 mm، فأجد قطر الشريان في النموذج.

13

معلومة

الأبهر (الوتين) هو الشريان الأكبر في جسم الإنسان، ويقارب قطره 2.5 cm.

تبرير: يبين الصندوق الآتي أربعة مُعاملات مقياس مختلفة.

1:50

1:10000

1:10

1:10000000

أختار من الصندوق عامل المقياس المناسب لكل مما يأتي مبرراً إجابتي:

15 خريطة مدينة

14 خريطة العالم

17 نموذج بركان

16 خريطة مدرسة

تحد: صممت زينب نموذجين للمجسم نفسه باستعمال معاملي مقياس مختلفين، الأول 1:50، والثاني 1:100، أي النموذجين أكبر؟ أبرر إجابتي.

مسألة مفتوحة: أكتب مقياس نموذج لمجسم أبعاده أصغر 20 مرة من أبعاد الشيء الحقيقي.

18

أتذكر

أوظف خواص النسبة لتحديد أي النموذجين أكبر.

19

كيف يمكنني إيجاد عامل المقياس لمقياس رسم؟



20

استكشاف: الأشكال المتشابهة

الهدف: استكشف العلاقة بين أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا المتناظرة في شكلين متشابهين باستعمال برمجية جيو جبرا.

نشاط

الخطوة 1 أرسم مثلثين

- أرسم $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه $A(2, 1)$, $B(3, 4)$, $C(6, 1)$ ، وذلك باختيار أيقونة  من شريط الأدوات، ثم انقر بالمؤشر على مواقع الأزواج المرتبة التي تقع عندها رؤوس المثلث في المستوى الإحداثي، وأغلق الشكل بالنقر على الرأس الأول مرة أخرى.
- أرسم $\triangle DEF$ الذي إحداثيات رؤوسه $D(8, 1)$, $F(12, 5)$, $E(16, 1)$ ، ماذا ألاحظ؟ ما العلاقة بين المثلثين؟

الخطوة 2 أجد أطوال الأضلاع في المثلثين وقياسات زواياهما

$\triangle ABC$		$\triangle DEF$	
$AB =$	$m\angle A =$	$DE =$	$m\angle D =$
$AC =$	$m\angle B =$	$DF =$	$m\angle F =$
$BC =$	$m\angle C =$	$EF =$	$m\angle E =$

- أجد أطوال أضلاع $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$ ، وذلك باختيار أداة قياس أطوال الأضلاع  من شريط الأدوات، ثم انقر على الضلع المطلوب، وأسجل النتائج في الجدول المجاور:

- أجد قياسات زوايا $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$ ، وذلك باختيار أداة قياس الزوايا  من شريط الأدوات، ثم انقر على ضلعي الزاوية المطلوبة، وأسجل النتائج في الجدول.

الخطوة 3 أجد النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة

- أكتب أطوال الأضلاع المتناظرة في المثلثين على شكل نسبة أبسط صورة:

$$\frac{DE}{AB} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{DF}{AC} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{EF}{BC} = \frac{\quad}{\quad}$$


أحلّ النتائج:

- معتمدًا على الجدول الذي أنشأته، أجيب عن الأسئلة الآتية:
- ما العلاقة بين قياسات زوايا المثلثين وأطوال أضلعهما.
- ماذا ألاحظ حول النسبة بين أطوال الأضلاع المتناظرة في المثلثين؟
- اقترح اسمًا مناسبًا يصف العلاقة بين $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$

أفكر:

- أرسم مثلثين قائمي الزاوية لهما الشكل نفسه والنسب بين أضلعهما المتناظرة متساوية.

أستكشفُ



الفراكتلات أشكالٌ هندسيّةٌ يمكنُ تقسيمُها إلى أجزاءٍ أصغرَ من الكلِّ معَ المحافظةِ على الشكلِ نفسه.
أحوطُ مثلثينِ بمقاسينِ مختلفينِ لهما شكلُ المثلثِ الكبيرِ نفسه.


فكرة الدرس

أميزُ المضلعاتِ المتشابهة، وأحلُّ مسائلَ تعتمدُ على مفهومِ التشابه.


المصطلحات

أشكالٌ متشابهة، مضلعاتٌ متشابهة.

يكون الشكلان **شكليّين متشابهين** (similar figures) إذا كان لهما الشكل نفسه، ليس بالضرورة أن يكون لهما المقاس نفسه. ويُستخدم الرمز $(\sim)$ للدلالة على أن الشكليّين متشابهان.



$\Delta ABC \sim \Delta EDF$ يشابه المثلث ΔEDF





ΔXYZ لا يشابه المثلث ΔVUW

المضلعات المتشابهة (similar polygons) مضلعاتٌ زواياها المتناظرة متطابقة، وأطوال أضلاعها المتناظرة متناسبة.

المضلعات المتشابهة

مفهوم أساسي



• **بالكلمات** إذا تشابه مضلعان فإن زواياهما المتناظرة متطابقة، وأطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة.


• **بالرموز** إذا كان $ABCD \sim EFGH$ فإن:

الزوايا المتطابقة: $\angle A \cong \angle E$, $\angle B \cong \angle F$, $\angle C \cong \angle G$, $\angle D \cong \angle H$

النسبة بين أطوال الأضلاع المتناظرة متساوية: $\frac{EF}{AB} = \frac{FG}{BC} = \frac{GH}{CD} = \frac{HE}{DA} = \frac{2}{1}$

الوحدة 6

مثال 1



في الشكل المجاور $\Delta RST \sim \Delta XYZ$

أكتب أزواج الزوايا المتناظرة:

$$\angle R \cong \angle X, \angle S \cong \angle Y, \angle T \cong \angle Z$$



أجد النسبة بين طولَي كُلِّ ضلعين متناظرين بأبسط صورة، ثم أكتب جملة التناسب:

$$\frac{RS}{XY} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$$

$$\frac{ST}{YZ} = \frac{30}{18} = \frac{5}{3}$$

$$\frac{TR}{ZX} = \frac{25}{15} = \frac{5}{3}$$

إذن، جملة التناسب هي $\frac{RS}{XY} = \frac{ST}{YZ} = \frac{TR}{ZX}$



أتحقق من فهمي:



في الشكل المجاور $ABCD \sim EFGH$

أكتب أزواج الزوايا المتناظرة.

أجد النسبة بين طولَي كُلِّ ضلعين متناظرين بأبسط صورة، ثم أكتب جملة التناسب.

تسمى النسبة بين طولَي الضلعين المتناظرين في المضلعين المتشابهين عامل المقياس.

مثال 2



أبين في ما إذا كان المثلثان المجاوران متشابهين، ثم أجد

عامل المقياس:

الخطوة 1 أجد قياس الزاوية الثالثة في كل من المثلثين:

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$$

$$30^\circ + m\angle B + 90^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle B + 120^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle B = 60^\circ$$

مجموع قياسات زوايا المثلث

أعوّض $m\angle A = 30^\circ$ و $m\angle C = 90^\circ$

أجمع

أطرح 120° من الطرفين

إذن، قياس الزاوية $\angle B$ يساوي 60°

$$m\angle E + m\angle D + m\angle F = 180^\circ$$

$$m\angle E + 30^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle E + 120^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle E = 60^\circ$$

مجموع قياسات زوايا المثلث

أعوّض $m\angle D = 30^\circ$ و $m\angle F = 90^\circ$

أجمع

أطرح 120° من الطرفين

إذن، قياس الزاوية $\angle E$ يساوي 60°

ومنّه $\angle B \cong \angle E$, $\angle A \cong \angle D$, $\angle C \cong \angle F$

إذن، الزوايا المتناظرة متطابقة.

الخطوة 2 أجد النسبة بين طولَي كُلِّ ضلعين متناظرين:

$$\frac{AB}{ED} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{AC}{FD} = \frac{6\sqrt{3}}{4.5\sqrt{3}} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{BC}{EF} = \frac{6}{4.5} = \frac{4}{3}$$

النسب متساوية، إذن، أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة.

بما أن الزوايا المتناظرة متطابقة، والأضلاع المتناظرة متناسبة، إذن، $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ، وعامل المقياس يساوي $\frac{4}{3}$


أتحقق من فهمي:



2


أبين في ما إذا كان المستطيلان المجاوران متشابهين،

ثم أجد عامل المقياس:



يمكن استعمال خواص المضلعات المتشابهة في إيجاد القياسات المجهولة.

مثال 3



في الشكل المجاور $\triangle DEF \sim \triangle MNP$ ، أجد قيمة المتغير x

$$\frac{MP}{DF} = \frac{NP}{EF}$$

$$\frac{16}{12} = \frac{20}{x}$$

$$16x = 240$$

$$x = 15$$


أكتب تناسباً

أعوّض $MP = 16$, $DF = 12$, $NP = 20$

خاصية ضرب التبادلي

أبسط

الوحدة 6



أتحقق من فهمي:

في الشكل المجاور $ABCD \sim WXYZ$ ، أجد قيمة المتغير m


إذا تشابه مضلعان وكان عامل المقياس لهما يساوي k ، فإن النسبة بين محيطيهما تساوي k أيضًا.

محيط المضلعات المتشابهة

مفهوم أساسي


• **بالكلمات** إذا تشابه مضلعان فإن النسبة بين محيطيهما تساوي النسبة بين أضلاع المتناظرة.

• **بالرموز** إذا كان $KLMN \sim PQRS$ فإن:



$$\frac{PQ + QR + RS + SP}{KL + LM + MN + NK} = \frac{PQ}{KL} = \frac{QR}{LM} = \frac{RS}{MN} = \frac{SP}{NK}$$

مثال 4: من الحياة



مسبح في صالة رياضية، طوله 50 m وعرضه 25 m، بُني مسبح آخر في الصالة مشابه للمسبح القديم طوله 40 m. أجد محيط المسبح الجديد.

الخطوة 1 أجد عامل المقياس:

بما أن المسبح الأول يشابه المسبح الثاني فإن عامل المقياس يساوي النسبة بين الأضلاع المتناظرة،
 $\frac{40}{50} = \frac{4}{5}$ ، إذن، عامل المقياس $\frac{4}{5}$

الخطوة 2 أجد محيط المسبح القديم:

$$P = 2l + 2w$$

$$= 2(50) + 2(25)$$

$$= 150$$

محيط المستطيل

$$l = 50, w = 25$$

أجد الناتج

إذن، محيط المسبح القديم 150 m

الخطوة 3 أجد محيط المسبح الجديد باستعمال عامل المقياس:

$$\frac{x}{150} = \frac{4}{5}$$

$$5x = 4 \times 150$$

$$5x = 600$$

$$x = 120$$

النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين

بالضرب التبادلي

أبسط


أقسم على 5

إذن، محيط المسبح الجديد 120 m

أتحقق من فهمي:





نافذتان زجاجيتان متشابهتان على شكل مضلع خماسي، أجد محيط النافذة الصغيرة.





أكتب أزواج الزوايا المتناظرة، ثم أجد عامل المقياس لكل من أزواج المضلعات المتشابهة الآتية:

1



2



أدرب وأحل المسائل


أتذكر

العدد المتساوي من الأقواس يدل على الزوايا المتناظرة المتطابقة


الوحدة 6

أَبَيِّنْ ما إذا كانَ كُلُّ رَوْجٍ مِنَ المِضْلَعاتِ الآتِيَةِ متشابهين، ثُمَّ أَجِدْ عامِلَ القِياسِ لِلْمِثْسابَةِ مِنْها:


3



4



أَجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِنَ المِثْتابِرِينَ x و y فِي رَوْجِ المِضْلَعاتِ المِثْتابَةِ الآتِيَةِ:




5

معلومة

ترجع أقدم نماذج لقطع الأثاث المتعارف عليه اليوم إلى ما تركه المصريون القدماء.

6




أثاث: يبيّن الشكل المجاور طاولتين متشابهتين إحداهما مخصّصة للأطفال والأخرى للكبار. أجد طول طاولة الأطفال.

أتذكر

القدم من وحدات قياس الطول ويرمز له بالرمز ft


7



حديقة: وقفت ميار بجانب لعبة في الحديقة. إذا كان طول ميار 5 ft، وطول ظلّها 4 ft، وكان طول ظلّ اللعبة 4.8 ft، فأجد ارتفاع اللعبة، علماً أنّ المثلثات متشابهة.

مهارات التفكير العليا

في الشكل المجاور $JKLM \sim EFGH$ ، أجد:




عامل المقياس.

قيمة كل من المتغيرات z و y و x .

محيط كل مضلع.

تحذّر: مستطيلان متشابهان، النسبة بين أضلاعهما المتناظرة هي 1 : 4. أجد النسبة بين مساحتيهما.




أكتشف الخطأ: أحدد الخطأ،

وأصححه في كيفية إيجاد

محيط $\triangle ZWY$ ، علمًا أن

$\triangle ABC$ و $\triangle ZWY$ متشابهان.




تبرير: في الشكل المجاور، أغير موقع رأس

واحد في الشكل (1) ليصبح الشكلان (1) و (2)

متشابهين. أبرر إجابتي.

تبرير: أبين صحة العبارة الآتية، مبررًا إجابتي.

أي مضلعين منتظمين لهما العدد نفسه من الأضلاع متشابهان.




تبرير: في الشكل المجاور $\triangle TPR \sim \triangle XPZ$ ،

أجد طول PS ، وأبرر إجابتي.

أكتب: كيف أحدد إذا كان مضلعان متشابهين أم لا؟

إرشاد

أبعاد المضلعات المشابهة متناسبة وتساوي عامل المقياس.



أستكشف


استعمل مصمّم برمجية حاسوبٍ
لِتعديلِ قياساتِ الصورةِ الصغيرةِ
في الشكلِ المجاور. ما العلاقةُ بينَ
الصورتين؟

فكرة الدرس

أرسمُ شكلاً تحتَ تأثيرِ تكبيرٍ
بمعاملٍ صحيحٍ موجبٍ.

المصطلحات

تكبير، مُعاملُ التكبير،
مركزُ التكبير.




التكبير (enlargement) تحويلٌ هندسيٌّ تزيدُ فيه أبعادُ الشكلِ الأصليِّ بنسبةٍ ثابتةٍ،
ويُسمّى الشكلُ الجديدُ صورةً. وصورةُ الشكلِ تحتَ تأثيرِ التكبيرِ مشابهةٌ للشكلِ
الأصليِّ، ما يعني أن الأضلاعَ المتناظرةَ متناسبةٌ، والزوايا المتناظرةَ متطابقةٌ.

تسمى النسبةُ بينَ طولِ ضلعِ الصورةِ وطولِ الضلعِ المناظرِ لَهُ في الشكلِ الأصليِّ **مُعاملُ التكبير (scale factor)**، وقيمتُهُ k ، وهوَ
يدلُّ على عددِ مراتِ تكبيرِ الصورةِ. أما **مركزُ التكبير (center of enlargement)** فهو النقطةُ الثابتةُ التي يُكَبَّرُ منها الشكلُ.
يمكنُ رسمُ صورةٍ شكلٍ تحتَ تأثيرِ تكبيرٍ باستعمالِ شبكةِ المربّعاتِ.

مثال 1


أرسمُ صورةً $\triangle CBD$ تحتَ تأثيرِ تكبيرٍ مركزُهُ النقطةُ A ومُعاملُهُ 2




الخطوة 2

أقيسُ المسافةَ بينَ مركزِ التكبيرِ وكلِّ رأسٍ من رؤوسِ
المثلثِ باستعمالِ المسطرة، ثمَّ أضربُ القياساتِ التي
حصلتُ عليها في 2 (مُعاملُ التكبير).


الخطوة 1




أبدأ بِرسمِ خطوطٍ
باستعمالِ المسطرةِ ابتداءً
منَ مركزِ التكبيرِ بحيثُ
يمرُّ كلُّ منها بأحدِ رؤوسِ
المثلثِ، وأمدُّ الخطوطَ
على استقامتها.



الخطوة 4
أصل بين النقاط،
وَأَسْمِي المثلث
الجديد $B'C'D'$



الخطوة 3
أقيس المسافات الجديدة
على الخطوط التي رسمتها
في الخطوة 1 ابتداءً من مركز
التكبير، وأحدد علامة لكل منها.




أنسخ المضلع المرسوم جانباً على ورقة مربعات، ثم أرسم صورته تحت تأثير تكبير مركزه
النقطة O ومعامله 3.

يمكن أيضاً استعمال إحداثيات رؤوس الشكل لرسم صورته في المستوى الإحداثي تحت تأثير تكبير مركزه نقطة الأصل
ومعامله k .

التكبير في المستوى الإحداثي

مفهوم أساسي



• لإيجاد صورة شكل تحت تأثير تكبير مركزه نقطة الأصل
ومعامله k ، أضرب إحداثي كل رأس من رؤوس الشكل
الأصلي في مُعامل التكبير k حيث $k > 1$ ، وذلك لأحصل
على إحداثيات رؤوس الصورة.


$$(x, y) \rightarrow (kx, ky)$$

• بالكلمات

• بالرموز

مثال 2

1 أرسم المضلع $ABCD$ الذي إحداثيات رؤوسه $A(-1, 2)$, $B(3, 1)$, $C(2, -1)$, $D(-1, -1)$ في المستوى
الإحداثي، ثم أرسم صورته تحت تأثير تكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 3.




الخطوة 1 أرسم المضلع $ABCD$ في المستوى الإحداثي:

الوحدة 6

الخطوة 3

أرسم المضلع $A'B'C'D'$ في المستوى الإحداثي.



الخطوة 2

أجد إحداثيات رؤوس الصورة بضرب الإحداثي x والإحداثي y لكل رأس من رؤوس الشكل الأصلي في 3.

إحداثيات رؤوس الشكل الأصلي	إحداثيات الصورة
(x, y)	$(3x, 3y)$
$A(-1, 2)$	$A'(-3, 6)$
$B(3, 1)$	$B'(9, 3)$
$C(2, -1)$	$C'(6, -3)$
$D(-1, -1)$	$D'(-3, -3)$

أتحقق من فهمي:



1 أرسم $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه $A(0, 2)$, $B(2, -1)$, $C(-2, -1)$ في المستوى الإحداثي، ثم أرسم صورته تحت تأثير تكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 4.

بما أن الشكل وصورته الناتجة عن تكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله k متشابهان، فإنه يمكن إيجاد معامل التكبير k بإيجاد النسبة بين أطوال الأضلاع المتناظرة، أو بإيجاد النسبة بين الإحداثي x أو الإحداثي y لأحد رؤوس الشكل بعد التكبير والإحداثي المناظر له في الشكل الأصلي.

مثال 3


يبين الشكل المجاور المثلث $\triangle OAB$ وصورته $\triangle OCD$ الناتجة عن تكبير مركزه نقطة الأصل:

1 أجد معامل التكبير.

الطريقة 1: بما أن $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ فإن النسبة بين طولَي أي ضلعين متناظرين

$$\frac{OC}{OA} = \frac{4}{2} = 2 \text{ تساوي معامل التكبير:}$$

إذن، معامل التكبير 2



الطريقة 2: أجد النسبة بين الإحداثي y للرأس C والإحداثي y للرأس A المناظر له: $\frac{y_C}{y_A} = \frac{4}{2} = 2$
إذن، معامل التكبير يساوي 2


1 أجد إحداثي الرأس D .

ينتج إحداثي الرأس D عن ضرب إحداثيات الرأس B المناظر له في معامل التكبير:
 $(3, 0) \rightarrow (3 \times 2, 0 \times 2) \rightarrow (6, 0)$

إذن، $D(6, 0)$.

✓ **أتحقق من فهمي:**

يبين الشكل المجاور ΔUOV وصورة ΔXOY الناتجة عن تكبير مركزه نقطة الأصل، أجد:



3 إحداثي الرأس X .

2 معامل التكبير.

مثال 4: من الحياة



تُظهر العدسة المكبرة المجاورة الأجسام أكبر بـ 5 مرات من حجمها الأصلي. إذا كان طول الدُعسوقة المجاورة تحت العدسة 3.9 cm، فأجد الطول الحقيقي للدُعسوقة.

$$3.9 = 5 \times l$$

$$0.78 = l$$

طول الصورة يساوي معامل التكبير $\times$ الطول الحقيقي

أقسم طرفي المعادلة على 5

إذن، الطول الحقيقي للدُعسوقة 0.78 cm

✓ **أتحقق من فهمي:**


تُظهر العدسة المكبرة المجاورة الأجسام أكبر بـ 7 مرات من حجمها الأصلي. إذا كان طول بذرة التفاح المجاورة تحت العدسة 1.75 cm، فأجد الطول الحقيقي لبذرة التفاح.




الوحدة 6

أَتَدْرِبُ وأحل المسائل

أنسخ كل مضلع مما يأتي على ورقة مربعات، ثم أرسم صورته تحت تأثير تكبير مركزه النقطة O ، مستعملًا معامل التكبير المعطى أسفله:






معامل التكبير 3




معامل التكبير 4


أجد معامل التكبير في كل مما يأتي:



أنسخ كل مضلع مما يأتي على ورقة مربعات، ثم أرسم صورته له تحت تأثير تكبير مركزه نقطة الأصل، مستعملًا قيمة معامل التكبير المعطاة أسفله:




معامل التكبير 3



معامل التكبير 4

يبين الشكل المجاور المثلث $\triangle OKL$ وصورته $\triangle OMN$ الناتجة عن تكبير مركزه نقطة الأصل، أجد:




معامل التكبير.

إحداثي الرأس K .



عدسات: تُظهر العدسة المكبرة المجاورة الأجسام أكبر بـ 2 مرة من حجمها الأصلي. إذا كان طول بصمة الإبهام المجاورة تحت العدسة 2.5 cm، أجد طول البصمة الحقيقي.




تصميم جرافيكي: أنشأ مصمم الشعار المجاور لشركة عقارات، ولكنه يحتاج إلى جعله أكبر مرتين لاستخدامه على لافتة. أرسم الشعار تحت تأثير تكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 2.

تبرير: مثلث إحداثيات رؤوسه $A(1, 2)$, $B(1, 0)$, $C(3, 1)$ ، كُبر باستعمال نقطة الأصل كمركز للتكبير. إذا كان إحداثيًا أحد رؤوس الصورة $(18, 6)$ ، أجد كلاً مما يأتي مبرراً إجابتي:

معامل التكبير.

إحداثيات الرؤوس الأخرى.

اكتشف الخطأ: رسم عدنان مستطيلاً طوله 3 cm وعرضه 2 cm، ثم أوجد صورة له تحت تأثير معامل تكبير قيمته 5، فكان عرض المستطيل الجديد 15 cm، أبين الخطأ الذي وقع فيه عدنان، وأصححه.



تحذّر: يُظهر الشكل المجاور صورة لإحدى دُمى الماتريوشكا. أرسم صورة للدُمى تحت تأثير تكبير معامل 2 ومركزه نقطة الأصل.

اكتب: كيف أجد معامل التكبير لشكل مرسوم في المستوى الإحداثي؟

معلومة

بصمة الإصبع علامة مميزة لكل شخص، وتُستخدم في التعرف إلى هوية الشخص، وعادة ما تستعمل بصمة الإبهام.

مهارات التفكير العليا

أفكر

أي الأزواج المرتبة يقابل الزوج المرتب $(18, 6)$ ؟

معلومة

الماتريوشكا دُمى روسية شهيرة على شكل امرأة تحوي بداخلها دُمى أخرى لها الشكل نفسه ولكن أصغر حجماً.



التكبير

يمكنني استعمال برمجية جيو جبراً لتكبير صورتي الشخصية مع المحافظة على جودة الصورة وهيئتها.

نشاط

الخطوة 1: ألتقط صورة:

- ألتقط لنفسي صورةً بالهاتف المحمول، وأحفظها في ملفٍّ على جهاز الحاسوب.



الخطوة 2: أدرج الصورة في المستوى الإحداثي:


- أختار أيقونة  من شريط الأدوات، ثم أختار الصورة التي حفظتها.
- أعدل موقع الصورة، وأختار مقاساً مناسباً لها بتحريك النقطتين A و B اللتين تظهران عليها.

الخطوة 3: أحدد الصورة بنقاط، وأحدد مركز التكبير:

- أختار أيقونة  من شريط الأدوات، ثم أنقر على الرأسين الآخرين للصورة لتظهر نقطة عند كل رأس، ثم أنقر على نقطة الأصل.
- أرسم مستطيلاً حول الصورة، وذلك باختيار أيقونة  من شريط الأدوات، ثم أنقر على النقاط الأربعة التي تظهر على رؤوس الصورة. ولإغلاق الشكل أنقر على النقطة الأولى مرة أخرى.

الخطوة 4: أكبر الصورة:

- أختار أيقونة  من شريط الأدوات.
- أنقر وسط الصورة، ثم أنقر على مركز التكبير (نقطة الأصل).
- أحدد معامل التكبير الذي أريد في مربع الحوار الذي يظهر، ثم أنقر على .



أدرب:

- 1 ألتقط صوراً أخرى، وأحفظها على جهاز الحاسوب، ثم أكبرها تحت تأثير تكبير مركزه نقطة الأصل، باختيار معامل التكبير الذي أريد.



فكرة الدرس

حل المسألة باستخدام خطة (الرسم).

ظل: أراد محمد معرفة طول مبنى قريب من منزله، فقرر استعمال المثلثات المتشابهة في ذلك، فقام بقياس طول ظله فوجده 0.9 m، وقاس طول ظل المبنى في الوقت نفسه فوجده 7.6 m، إذا كان طول محمد 1.8 m أحسب طول المبنى.

أفهم

1

المعطيات:

- طول محمد 1.8 m وطول ظله 0.9 m، وطول ظل المبنى 7.6 m
 - المثلثان الناتجان من طول محمد وطول ظله وطول المبنى وطول ظله متشابهان.
- المطلوب:** إيجاد طول المبنى.

أخطط

2

أرسم شكلاً أثبت عليه معطيات المسألة مفترضاً أن طول المبنى المراد إيجاده x .

أحل

3

بما أن المثلثين متشابهين، إذن، أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة.

$$\frac{x}{1.8} = \frac{7.6}{0.9}$$

أكتب تناسباً

$$0.9x = 1.8 \times 7.6$$

خاصية الضرب التبادلي


$$0.9x = 13.68$$

أضرب

$$x = 15.2$$

أقسم على 0.9

إذن، يبلغ المبنى 15.2 m



أتحقق

4

أعوض قيمة x في التناسب لأتحقق من تساوي النسبتين.

$$\frac{15.2}{1.8} \stackrel{?}{=} \frac{7.6}{0.9}$$

أعوض $x = 15.2$

$$8.4 = 8.4 \checkmark$$

الطرفان متساويان، إذن، الحل صحيح

أَتَدْرِبُ وأحل المسائل

1 **شاحنة:** صندوق شاحنة قاعدته على شكل مستطيل طوله 11 m وعرضه 3 m، صمم نموذج مشابه له عرض قاعدته 0.4 m. أجد طول النموذج، مقرباً إجابتي لأقرب عدد صحيح.

2 **تنس:** طاولة تنس على شكل مستطيل طوله 2.5 m وعرضه 1.5 m، وملعب تنس حقيقي طوله 23.5 m وعرضه 11 m. هل الملعب والطاولة متشابهان؟ أبرر إجابتي.

3 **أبراج:** يبلغ ارتفاع لعبة في مدينة الألعاب 25 m، وطول ظلها 9 m. أجد طول رجل طول ظلها في الوقت نفسه 70 cm.

4 **غرفة:** غرفة طعام على شكل مستطيل طولها 5 m وعرضها 4 m، أما طولها في مخطط المنزل 20 cm، أجد عرض غرفة الطعام في المخطط.

5 **سيارة:** صممت شركة سيارات نموذج لعبة مشابه لإحدى سيارات السباق التي تنتجها، فإذا كان طول السيارة الحقيقية 5 m وعرضها 1.8 m، وكان عرض اللعبة 6.3 cm. أجد طول اللعبة.

6 **لوحة إعلانية:** قررت شركة تكبير شعارها الخاص وتحويله إلى لوحة إعلانية، فإذا كان الشعار مستطيل الشكل طوله 6 cm وعرضه 4 cm، وكان طول اللوحة الإعلانية 2.5 m. أجد محيط اللوحة.

7 **أرض:** قطعة أرض مستطيلة الشكل محيطها 72 m، وطولها 18 m، تتشابه مع قطعة أرض أخرى محيطها 120 m، أجد عرض قطعة الأرض الثانية.

8 **أكتب:** أكتب مسألة يمكنني حلها باستخدام خطة حل المسألة (الرسم)، ثم أحلها.

معلومة

يطلق على تنس الطاولة أيضاً (بينج بونج)؛ وذلك بسبب صوت الارتطام الناتج عن تصادم الكرة بالضرب ثم بالطاولة التي تلعب عليها.


معلومة

يستمر تصميم السيارة حوالي ثلاث سنوات، وفي بداية التصميم تكون السيارة مجرد رسم بسيطة توضح فكرة شكل السيارة من الخارج.

اختبار الوحدة

أختارُ رمزَ الإجابة الصحيحة لكلِّ ممَّا يأتي:

1 إذا كان



$$\triangle DEF \cong \triangle LMN$$

أيُّ الآتيَّة هي جملةٌ

تطابقٍ صحيحةٌ:



a) $\overline{DE} \cong \overline{LN}$

b) $\overline{FE} \cong \overline{NL}$

c) $\angle N \cong \angle F$

d) $\angle M \cong \angle F$

2 إذا كان الشكلان الآتيان متشابهين فإنَّ طول $\overline{TQ}$ يساوي:



a) 8

b) 12

c) 6

d) 18

3 مستطيل طوله 8 cm إذا رسمت صورة له تأثير تكبير

معاملة 2، فإنَّ طول الصورة يساوي:

a) 4 cm

b) 10 cm

c) 12 cm

d) 16 cm

4 كُبر $\triangle CDE$ إلى $\triangle C'D'E'$ ، إذا كان

$$D'E' = 3.25 \text{ cm}, CD = 2.5 \text{ cm}$$

$$C'D' = 7.5 \text{ cm} \text{ فإنَّ طول } DE \text{ يساوي:}$$

a) 1.08 cm

b) 5 cm

c) 9.75 cm

d) 19 cm

5 إذا كان $ABC \sim DEF$ ، فإنَّ $m\angle A$ يساوي:

a) $m\angle B$

b) $m\angle D$

c) $m\angle E$

d) $m\angle F$

6 إذا كان ارتفاعُ برج 160 m، وصُممَ له نموذجٌ بمقياس 1 : 2000، فإنَّ ارتفاعَ نموذجِ البرج:

a) 0.16 m

b) 0.8 m

c) 0.08 m

d) 320000 m

7 مقياسُ الرسم الذي يعطي أكبرَ نموذجٍ هو:

a) 1 : 4000


b) 1 : 300

c) 1 : 200

d) 1 : 100

8 إذا كان الشكلان الآتيان متشابهين، أجد قيمة كل

من x و y .



إذا كان ABC مثلثاً قائم الزاوية في B ، وكان

$$AB = 21 \text{ cm}, \text{ وكان } \triangle ABC \sim \triangle DEF$$

$$BC = 15 \text{ cm}, DE = 7 \text{ cm}, \text{ أجد:}$$

10 مساحة $\triangle DEF$


9 طول $\overline{EF}$

15 طابع برید طولہ 4 cm، وعرضہ 3 cm، إذا تم تكبيره ليصبح عرضه 11.5 cm، أجد طول الطابع بعد التكبير، أقرب إجابتی لأقرب جزء من عشرة.

16 صمّم معاویة نموذجًا لِدیناصور، فإذا كان طول النموذج 5.2 m، والطول الحقيقي لِدیناصور 13 m، أجد مقياس النموذج.

تدريب على الاختبارات الدولية

17 في المربع EFGH، أيّ العبارات الآتية غير صحيحة؟




(a) المثلثان EIF, EIH متطابقان

(b) المثلثان GHF, GHI متطابقان

(c) المثلثان EFH, EGH متطابقان

(d) المثلثان EIF, GIH متطابقان

18 إذا كان المثلثان ABC, DEF متطابقين، فإنّ




$m\angle AGD$ يساوي:

(a) 100° (b) 80°

(c) 60° (d) 40°

19 إذا كان المثلثان الآتيان متشابهان، فإنّ قيمة المتغيّر




x تساوي:

(a) 4.2 (b) 4.65

(c) 5.6 (d) 8.4


11 في الشكل المجاور، إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle LMN$

وكان AE يوازي BD ، أجد: $m\angle ACD$




أنسخ كل مضلع ممّا يأتي على ورق مربّعات، ثمّ أرسّم صورة له تحت تأثير تكبير مركزه النقطة O، ومعامله 3:


12



13



14 إذا كان المثلثان الآتيان متطابقين.



أجد قيمة كل من a و b و c .

المساحات والحجوم

ما أهمية هذه الوحدة؟

تُعَدُّ دراسة المساحات والحجوم من أكثر الموضوعات أهميةً في علم الرياضيات، لما لها من استعمالات حياتية، ولا سيما في علم العمارة، إذ يوظف المهندسون المعماريون قوانين المساحات والحجوم في فن العمارة مثلما يظهر في تصميم المباني الجميلة في منطقة بوليفارد العبدلي.



سأتعلم في هذه الوحدة:

- حساب مساحة الدائرة ومحيطها.
- إيجاد المساحة الكلية وحجوم أشكال ثلاثية الأبعاد.
- توظيف قوانين المساحة الكلية والحجوم في حل مسائل رياضية وتطبيقات حياتية.

تعلمت سابقاً:

- ✓ حساب مساحات الأشكال الثنائية الأبعاد.
- ✓ فهم الدائرة، وتعرف عناصرها، ورسمها.
- ✓ فهم العلاقة بين زوايا المضلعات وأضلاعها.



مشروع الوحدة: صناعة الصابون

3 أبدأ عملية تصنيع الصابون بمساعدة أحد أفراد عائلتي، مع الحذر والتنبه جيداً عند استخدام الأدوات والغاز.

4 أعطي أرقاماً لقطع الصابون التي أصنعها، وأحسب حجم كل قالب ومساحة سطحه، وأدون ما أتوصل إليه في الجدول الآتي:

رقم القالب	شكل القالب الهندسي	حجم القالب	مساحة سطح الصابون الكلية

5 أحدد سعراً لكل قالب اعتماداً على حجمه ومساحة سطحه الكلية، وأغلّفه تغليفاً جميلاً.

6 أصمم مطوية تحوي صوراً لقوالب الصابون التي أعددتها، وفوائدها الصحية للبشرة، إضافة إلى معلومات عن حجم كل قالب ومساحة سطحه الكلية.

عرض النتائج:

- أحدد مع معلمي ومدير مدرستي يوماً مفتوحاً لعرض منتجاتنا وبيعها في المدرسة، بحيث يمكن أن يحضر فيه أهالي الطلبة والمجتمع المحلي.
- أوضح للزوار مراحل تصنيع الصابون والمواد اللازمة في تصنيعه، وأزودهم بالمطوية التي أعددتها.



أستعدّ وزملائي لتنفيذ مشروعنا الخاص الذي سنوظف فيه ما نتعلمه في هذه الوحدة حول حساب المساحات والحجوم للأشكال الثلاثية الأبعاد.

خطوات تنفيذ المشروع:


1 أبحث في الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) عن طريقة تصنيع مادة الصابون في المنزل، وأسجل المواد اللازمة وكمياتها مثل: زيت نباتي، وهيدروكسيد الصوديوم، وزيت عطري، وملونات طبيعية، وغيرها، موظفاً قوانين التناسب عند الحاجة لمضاعفة الكميات المطلوبة في التصنيع. يمكنني إضافة مواد طبيعية مفيدة للبشرة.



2 أحضر الأدوات اللازمة لتصنيع الصابون مثل: كأس مدرّج، وملعقة خشبية، وقفازات لليدين، وقوالب لتشكيل

الصابون، مراعيّاً توفير قوالب سهلة الاستخدام كالمصنوعة من السيليكون بأشكال متنوعة وأحجام مختلفة تمثل المجسمات التي سأدرسها في هذه الوحدة.

استكشاف النسبة التقريبية (π)



الهدف: استكشف العلاقة بين محيط الدائرة وقطرها،
باستعمال برمجية جيوجبرا (GeoGebra)

نشاط 1


الخطوة 1

أرسم ثلاث دوائر بأنصاف أقطار مختلفة:

- أختار أيقونة من شريط الأدوات.

- أنقر زر الفأرة الأيسر مع السحب لرسم دائرة مركزها A.

- أكرر الخطوة السابقة؛ لأرسم دائرتين مركز كل منهما B و C على الترتيب.




الخطوة 2

أجد طول قطر كل دائرة:

- أختار أيقونة من شريط الأدوات.

- أرسم قطرًا للدائرة A بالنقر عليها لتظهر نقطة، ثم أنقر لأحدد نقطة أخرى على الدائرة؛ بحيث تمر القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين في المركز.

- أختار أيقونة من شريط الأدوات، ثم أنقر على القطر الذي رسمته، ليظهر طوله.



- أكرر الخطوتين السابقتين لأرسم قطرًا لكل من الدائرتين B و C، وأجد طوله.

- أسجّل أطوال أقطار الدوائر الثلاث في الجدول الآتي:

الدائرة	محيط الدائرة (c)	قُطر الدائرة (d)	$\frac{c}{d}$
A			
B			
C			

الخطوة 3

أجد محيط كل دائرة:

- اختار أيقونة  من شريط الأدوات.
- أنقر على الدائرة؛ ليظهر محيطها.
- أكتب محيط كل دائرة في الجدول.

الخطوة 4

أجد النسبة بين المحيط والقُطر:

- أستخدم الآلة الحاسبة لأجد النسبة بين المحيط والقُطر، بقسمة المحيط (c) على القُطر (d).
- لكل دائرة.
- أقرب الناتج لأقرب جزء من مئة.

أحلّ النتائج:

- معتمدًا على الجدول الذي أنشأته، ماذا ألاحظ حول النسبة $\frac{c}{d}$ التي حصلتُ عليها؟
- أكتب قاعدة تربط بين محيط الدائرة وطول قُطرها.

أندرب

أستعمل قاعدة المحيط التي حصلتُ عليها في إيجاد:

- 1 محيط دائرة قُطرها 4 cm
- 2 طول قُطر دائرة محيطها 9.42 cm
- 3 هل طول قُطر الدائرة ومحيطها متناسبان طرديًا؟ أبرر إجابتي.

أستكشفُ



أرادتُ علًا شراء خاتم، إذا كان محيطُ
إصبعها 59 mm، أيُّ الخاتَمينِ
المجاورين سيناسبُها؟

فكرة الدرس

أحسبُ محيطَ الدائرة.

المصطلحات


محيطُ الدائرة، النسبةُ
التقريبيةُ.

تعلمتُ في استكشافِ هذا الدرسِ أنَّ نسبةَ محيطِ أيِّ دائرةٍ إلى قُطْرِها تساوي تقريباً 3.14، ويسمَّى هذا العددُ
النسبةَ التقريبيةَ (pi)، ويعبَّرُ عنه بالرمزِ الإغريقي (π)، وقيمةُ π تساوي 3.1415926....، فالمنازلُ العشريةُ فيه لا تنتهي؛ لذا،
يُمكنُ استخدامُ قيمةٍ تقريبيةٍ له وهي 3.14 أو $\frac{22}{7}$ ، وتُستعملُ هذه النسبةُ لإيجادِ محيطِ الدائرة.

محيطُ الدائرة (circumference) هو المسافةُ حولَ الدائرة.

محيطُ الدائرة

مفهومٌ أساسيٌّ



بالنماذج

محيطُ الدائرة (c) يساوي ناتجَ ضربِ طولِ القُطرِ (d)
في (π)، أو يساوي مثلي ناتجِ ضربِ طولِ نصفِ القُطرِ (r)
في (π).

بالكلمات


$$c = 2\pi r \quad \text{أو} \quad c = \pi d$$

بالرموز

مثال 1

أجدُ محيطَ كلِّ دائرةٍ ممَّا يأتي، وأستعملُ الآلةَ الحاسبةَ لأتحققَ منَ صحةِ إجابتي:
بما أنَّ 14 أحدُ مضاعفاتِ 7، إذن، أستخدمُ $\frac{22}{7}$: $\pi \approx \frac{22}{7}$

1



$$c = \pi d$$

$$\approx \frac{22}{7} \times 14$$

صيغةُ محيطِ الدائرة

أعوِّضُ $\pi \approx \frac{22}{7}$ و $d = 14$

الوحدة 7

$$\approx \frac{22}{17} \times 14^2$$

$$\approx 44$$

أقسّم على العوامل المشتركة

أجد الناتج


إذن، محيط الدائرة يساوي 44 cm تقريباً.

أستعمل الآلة الحاسبة لأتحقق من صحة إجابتي على النحو الآتي:

SHIFT π $\times$ 14 = s $\leftrightarrow$ d 43.98229715

وعند تقريب الإجابة لأقرب جزء من عشرة، يكون المحيط 44 cm تقريباً. إذن، إجابتي صحيحة.

2



$$c = 2\pi r$$

$$\approx 2 \times 3.14 \times 5$$

$$\approx 31.4$$

صيغة محيط الدائرة

أعوّض $r = 5$ و $\pi \approx 3.14$

أجد الناتج

إذن، محيط الدائرة يساوي 31.4 mm تقريباً.

أستعمل الآلة الحاسبة لأتحقق من صحة إجابتي على النحو الآتي:


2 SHIFT π $\times$ 5 = s $\leftrightarrow$ d 31.41592654

وعند تقريب الإجابة لأقرب جزء من عشرة، يكون المحيط 31.4 mm تقريباً. إذن، إجابتي صحيحة.


أتحقق من فهمي:



3



4



يُمكن إيجاد طول نصف قطر الدائرة أو طول قُطْرِها إذا علِمْتُ محيطُها، باستعمالِ خطواتِ حلِّ المعادلةِ.

مثال 2

1 أجد طول نصف قطر دائرة محيطها 18.84 cm، أستخدم $\pi \approx 3.14$:

$$\begin{aligned} c &= 2\pi r \\ 18.84 &= 2 \times 3.14 \times r \\ \frac{18.84}{2 \times 3.14} &= \frac{2 \times 3.14 \times r}{2 \times 3.14} \\ 3 &= r \end{aligned}$$

صيغة محيط الدائرة
أعوّض $\pi \approx 3.14$ و $c = 18.84$

أقسّم الطرفين على 2×3.14
أبسّط

إذن، طول نصف قطر الدائرة 3 cm

2 أجد طول قطر دائرة محيطها 62.8 m، أستخدم $\pi \approx 3.14$:

$$\begin{aligned} c &= \pi d \\ 62.8 &= 3.14 \times d \\ \frac{62.8}{3.14} &= 3.14 \times d \\ 20 &= d \end{aligned}$$

صيغة محيط الدائرة
أعوّض $\pi \approx 3.14$ ، $c = 62.8$

أقسّم الطرفين على 3.14
أبسّط

إذن، طول قطر الدائرة يساوي 20 m

✓ **أتحقّق من فهمي:**

3 أجد طول نصف قطر دائرة محيطها 75.36 cm، أستخدم $\pi \approx 3.14$.

4 أجد طول قطر دائرة محيطها 47.1 km، أستخدم $\pi \approx 3.14$.


يُمكن استعمالُ قانونِ محيطِ الدائرة في مواقف حياتية متنوعة وكثيرة.

مثال 3: من الحياة



تحرّكت حافلةٌ حولَ دوارٍ مُروريٍّ طولُ قُطْرِهِ 30 m، أجد المسافةَ التي قطعَتْها الحافلةُ بعدَ أن سارَتْ حولَ التقاطعِ مرةً واحدةً.

المسافةُ التي تقطعُها الحافلةُ تساوي محيطَ التقاطعِ، وبما أنَّه على شكلِ دائرةٍ فينبغي أن أجد محيطَ الدائرةِ.



الوحدة 7

$$c = \pi d$$

$$\approx 3.14 \times 30$$

$$\approx 94.2$$

صيغة محيط الدائرة

أعوّض $d = 30$ و $\pi \approx 3.14$

أجد الناتج

إذن، المسافة التي قطعها الحافلة تساوي 94.2 m



أتتحقق من فهمي:




أجد محيط مقود سيارة إذا كان قطره 45 cm

أجد محيط كل دائرة مما يأتي، وأستعمل الآلة الحاسبة لأتحقق من صحة إجابتي:
(أقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة).

أدرب وأحل المسائل




1



2




3



4 أجد طول نصف قطر دائرة محيطها 94.2 cm، أستخدم $\pi \approx 3.14$

5 أجد طول قطر دائرة محيطها 36.11 m، أستخدم $\pi \approx 3.14$



6 أجد محيط الشكل المجاور الذي يمثل ثلاثة أرباع دائرة طول نصف قطرها 3.6 cm

7 ساعة: يبلغ قطر ساعة بيغ بن البريطانية 7 m، أجد المسافة التي يقطعها رأس عقرب الدقائق في اليوم الواحد.

معلومة


بدأ عمل ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن عام 1859 م، ويبلغ بن اسم جرسها الضخم الذي يدق كل ساعة.



معلومة


بدأت صناعة خيوط النسيج في العصور القديمة في الهند والصين ومصر، إذ عُرفت فيها زراعة القطن وإنتاج الغزل والنسيج.

8



سياج: صمّم عليّ حديقةً على شكل نصف دائرة قُطرها 8 m، وأراد إحاطتها بسياج؛ لإغلاقها. ما طول السياج الذي يلزمه لإغلاق الحديقة؟ إذا كان سعر المتر الواحد من السياج 4 JD، أجد تكلفة السياج.

9



خيطة: بكرة خيوط على شكل أسطوانة طول قُطرها 6 cm، إذا لفّ خيط حولها 150 مرة. أجد طول الخيط.

10



عجلة: يبين الشكل المجاور دراجتين من ذوات العجلة الواحدة. إذا كان طول نصف قُطر الدراجة الأولى 48 cm، وطول نصف قُطر الدراجة الثانية 33 cm. بكم تزيد المسافة التي تقطعها العجلة الأولى عن المسافة التي تقطعها العجلة الثانية في الدورة الواحدة لكل منهما؟ أقرب إجابتي لأقرب سنتيمتر.

معلومة


ترمز الحلقات الخمس المتشابكة في شعار دورة الألعاب الأولمبية إلى روح التضامن والأخوة بين سكان الأرض، إذ تمثل كل حلقة قارة من قارات العالم.

11



صمّمت فادية مجسمًا يشبه شعار دورة الألعاب الأولمبية من حلقات بلاستيكية صنعتها باستعمال أنبوب بلاستيكي، بحيث كان طول نصف قُطر كل حلقة دائرية 75 cm، كم سنتيمترًا من الأنبوب استعملت فادية؟

12




يتكوّن الشكل المجاور من 3 أنصاف دوائر، إذا علمت أنّ نصفَي الدائرتين الصغيرتين متطابقان، أجد محيط الشكل مقربًا لإجابتي لأقرب جزء من عشرة.

13

خواتم: أعود إلى فقرة (استكشف) بداية الدرس وأحل المسألة.

14 **تبرير:** أحدد ما إذا كان محيط دائرة طول نصف قطرها 4 m أقل أم أكبر من 24 m دون إجراء الحسابات، وأبرر إجابتي.


15 **تبرير:** ركّض محمود على طول المسار الأزرق، وركضت سميرة على طول المسار الأحمر، أيُّهما قطع مسافة أكبر: محمود أم سميرة؟ أبرر إجابتي.



إرشاد

ألاحظ أن المسارات مكونة من مجموعة من أنصاف الدوائر.

16 **تبرير:** إذا أصبح طول قطر دائرة مثلي طول قطرها الأصلي، ما تأثير ذلك في محيطها؟ أبرر إجابتي.



17 **أكتشف الخطأ:** يتكوّن الشكل المظلل

المجاور من نصفي دائرة، طول قطر الدائرة

الصغيرة 20 cm، وطول قطر الدائرة

الكبيرة 30 cm. تقول ربما: إن محيط

المنطقة المظلمة 88.5 cm، أمّا عاصم

فيقول: إن محيطها 78.5 cm، فأَيُّ منهما على صواب؟ أبرر إجابتي.

18 **أكتب** كيف أجّد محيط دائرة علمت نصف قطرها؟

قانون مساحة الدائرة


الهدف: استكشاف قانون مساحة الدائرة، وعلاقته بالنسبة التقريبية π .

نشاط 1

الخطوة 1

اقسم قرصًا دائريًا إلى أجزاء متطابقة:


- أنني قرصًا دائريًا 4 مرات من المنتصف؛ لأكون 16 جزءًا متطابقًا.
- أختار أحد الأجزاء، وأقسمه جزأين متطابقين.
- أسمي نصف قطر الدائرة r ومحيط الدائرة c .



الخطوة 2

أكون مستطيلًا:

- أقص الأجزاء، وأعيد ترتيبها لتكون مستطيلًا مثلما في الشكل المجاور.



- يمثل طول المستطيل، ويمثل عرضه

الخطوة 3

أجد مساحة المستطيل الذي كونه:

- أعوض قيمتي الطول والعرض الجديدتين، اللتين حصلتي عليهما من الخطوة 2، في قاعدة مساحة المستطيل $A = l \times w$ ، لأحصل على قاعدة جديدة وهي:

- أعوض $2\pi r$ بدلًا من c في المعادلة، وأبسط المعادلة، ثم أصف الناتج.

اتذكر

مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض
وبالرموز: $A = l \times w$
حيث l : الطول، w : العرض،
 A : المساحة.

أدرب

استعمل قاعدة المساحة التي حصلت عليها في إيجاد:

- 1 مساحة دائرة طول نصف قطرها 4 cm
- 2 مساحة دائرة طول قطرها 12 km
- 3 هل العلاقة بين قطر الدائرة ومساحتها علاقة تناسب؟ أبرر إجابتي.



أستكشفُ

أعلن محلُّ بيع فطائرٍ عن عرضٍ لبيع فطيرة بيتزا كبيرة طول قطرها 30 cm بسعر JD 7.99، وفطيرتي بيتزا متوسطتين طول قطر كل واحدة 20 cm بسعر JD 7.99، أي العرضين أفضل؟



فكرة الدرس

أحسب مساحة الدائرة.

المصطلحات

مساحة الدائرة


توصلت في الاستكشاف الذي سبق هذا الدرس إلى صيغة لحساب مساحة الدائرة (area of a circle)، مستعملًا فيها النسبة التقريبية π .

مساحة الدائرة

مفهوم أساسي



• بالنماذج



• بالكلمات مساحة الدائرة (A) يساوي ناتج ضرب π في مربع نصف القطر.


$$A = \pi r^2$$

• بالرموز

مثال 1

أجد مساحة كل دائرة مما يأتي، وأستعمل الآلة الحاسبة لأتحقق من صحة إجابتي:

1



$$A = \pi r^2$$

$$\approx 3.14 \times (12)^2$$

$$\approx 452.16$$

صيغة مساحة الدائرة

أعوض $\pi \approx 3.14$ و $r = 12$

أجد الناتج

إذن، مساحة الدائرة تساوي 452.16 m^2 تقريبًا.

أستعمل الآلة الحاسبة لأتحقق من صحة إجابتي على النحو الآتي:


SHIFT π $\times$ 12 x^2 = s $\leftrightarrow$ d 452.3893421

الإجابة قريبة. إذن، إجابتي صحيحة.


أتحقق من فهمي:



2



3



يمكن إيجاد طول نصف قطر دائرة أو طول قطرها إذا علمت مساحتها، باستعمال خطوات حل المعادلة.

مثال 2

1 أجد طول نصف قطر دائرة مساحتها 1256 cm^2 ، أستخدم $\pi \approx 3.14$

$$A = \pi r^2$$

صيغة مساحة الدائرة

$$1256 = 3.14 \times r^2$$

أعوض $\pi \approx 3.14$ و $A = 1256$

$$\frac{1256}{3.14} = \frac{3.14 \times r^2}{3.14}$$

أقسم الطرفين على 3.14

$$400 = r^2$$

أبسط

$$20 = r$$

$$20 \times 20 = 400$$

إذن، طول نصف قطر الدائرة يساوي 20 cm

أتحقق من فهمي:



2 أجد طول نصف قطر دائرة مساحتها 113.04 cm^2 ، أستخدم $\pi \approx 3.14$.

3 أجد طول قطر دائرة مساحتها 153.86 m^2 ، أستخدم $\pi \approx 3.14$.

الوحدة 7

يُمكن استخدام قانون مساحة الدائرة في مواقف حياتية متنوعة وكثيرة.

مثال 3: من الحياة



يبلغ قطر القطعة النقدية من فئة الخمسة قروش 26 mm تقريباً، أجد مساحة الوجه الظاهر منها، وأقرب إجابتي لأقرب عدد صحيح.

قطر القطعة النقدية 26 mm. إذن، طول نصف قطرها 13 mm

$$A = \pi r^2$$

$$\approx 3.14 \times (13)^2$$

$$\approx 530.66$$

$$\approx 531$$

صيغة مساحة الدائرة

$$r = 13 \text{ و } \pi \approx 3.14$$

أجد الناتج

أقرب الإجابة لأقرب عدد صحيح

إذن، مساحة الوجه الظاهر من القطعة النقدية يساوي 531 mm² تقريباً.




أتتحقق من فهمي:


يبلغ قطر إشارة منع التدخين المجاورة 20 cm، أجد مساحتها، وأقرب إجابتي لأقرب عدد صحيح.

أجد مساحة كل دائرة مما يأتي، وأستعمل الآلة الحاسبة لأتحقق من صحة إجابتي:


1



2



3




أجد طول نصف قطر دائرة مساحتها 314 cm²، أستخدم $\pi \approx 3.14$

4

أجد مساحة نصف الدائرة الظاهرة في الشكل المجاور.

5




أدرب وأحل المسائل






6 صحة: إذا كان طول قطر الزجاجة الدائرية في جهاز قياس ضغط الدم 18 cm، أجد مساحتها.




7 مراوح: تتكوّن المروحة المجاورة من 4 أجزاء متطابقة كل جزء منها على شكل ربع دائرة، ودائرة داخلية، أجد مساحة سطح المروحة الخارجي.

8 دراجة: تقطع عجلة دراجة مسافة 197 cm في كل دورة كاملة لها، أجد مساحة العجلة. أقرب إجابتي لأقرب عدد صحيح.



9 عقد: صنعت ريماس عقدًا باستعمال دائرتين. لوئت جزءًا من العقد باللون الأصفر مثلما يظهر في الشكل المجاور، أحسب مساحة الجزء الذي لوئته مقربًا إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

10 أجد مساحة المنطقة المظللة في الشكل المجاور. أقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة.



11 فطائر: أعود إلى فقرة (استكشف) بداية الدرس وأحل المسألة.

إرشاد

ضغط الدم هو قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية التي ينتقل خلالها لإمداد كافة أنسجة الجسم وأعضائه بالغذاء.

إرشاد

في السؤالين 9 و 10، ما العلاقة بين مساحة المنطقة المظللة ومساحتي الدائرتين في كل شكل؟


مهارات التفكير العليا

تبرير: أنامل العبارتين الآتيتين، ثم أصفهما بما يلائمهما مما بين القوسين (صحيحة دائماً، صحيحة أحياناً، ليست صحيحة) مبرراً إجابتني مع تدعيمها بأمثلة دالة:

12 محيط الدائرة أكبر من قُطرها.

13 مساحة الدائرة أكبر من 1 cm^2

14 **أكتشف الخطأ:** أوجد أسامة محيط دائرة طول قُطرها 12.4 cm ومساحتها، فكانت إجابته كما يأتي:




$c = \pi d$	$A = \pi r^2$
$c = \pi \times 12.4$	$A = \pi \times 6.2^2$
$= 39.0 \text{ cm}$	$= \pi \times 12.4$
	$= 39.0 \text{ cm}$

أبين الخطأ الذي وقع فيه، وأصححه.

إرشاد


ألاحظ أن أسامة قرّب إجابته لأقرب عدد صحيح.



15 **تحّد:** يبين الشكل المجاور 4 دوائر متماسة طول نصف قُطر كل منها 6 cm ، وصلت مراكز الدوائر الأربعة لتشكّل مربعاً. أجد مساحة المنطقة المظللة.

أتذكّر

مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$



16 **تحّد:** يبين الشكل المجاور دائرة قُطرها AC . أجد مساحة المنطقة المظللة.

17 **أكتب:** كيف أجد مساحة دائرة علمت قُطرها؟



أستكشف

مقياس المطر أداة تُستخدم لقياس كمية الأمطار التي تسقط في مكان معين في مدة زمنية محددة، ويتكوّن من أنبوب على شكل أسطوانة يعلوها قمع. ما كمية الماء التي ستملأ مقياس مطر ارتفاعه 50 cm وطول نصف قطر قاعدته 2.5 cm؟



فكرة الدرس

أجد حجم المنشور والأسطوانة.

المصطلحات

الحجم، المنشور

الحجم (volume) هو الحيز الذي يشغله الجسم في الفضاء، ويُقاس بالوحدات المكعبة.



المنشور (prism) مجسم كثير السطوح، له قاعدتان متوازيتان ومتطابقتان، وأوجهه الجانبية مستطيلات. ويسمى المنشور بحسب شكل قاعدته.

حجم المنشور

مفهوم أساسي



• بالنماذج



حجم المنشور (V) يساوي ناتج ضرب مساحة قاعدته (B) في ارتفاعه (h).

$$V = Bh$$


• بالكلمات

• بالرموز

مثال 1

أجد حجم كل منشور مما يأتي:

1



$$\begin{aligned} V &= Bh \\ &= (l \times w)h \\ &= (7.5 \times 2) \times 4 \\ &= 60 \end{aligned}$$

حجم المنشور

القاعدة مستطيلة، إذن، $B = l \times w$


أعوض $l = 7.5$, $w = 2$, $h = 4$

أجد الناتج

إذن، حجم المنشور يساوي 60 cm^3

الوحدة 7

2



$$V = Bh$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 3\right)h$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 3\right) \times 6$$

$$= 36$$

حجم المنشور

$$B = \frac{1}{2} \times 4 \times 3, \text{ إذن، القاعدة مثلث،}$$

$$h = 6 \text{ أعرض}$$


أجد الناتج

إذن، حجم المنشور يساوي 36 cm^3


أتحقق من فهمي:



3



4



ويمكننا استخدام قانون حجم المنشور في مواقف حياتية كثيرة ومتنوعة.

مثال 3: من الحياة



الزراعة الرأسية هي زراعة يتوسع فيها رأسياً في مبانٍ مكوّنة من طوابق متعددة يُستغنى فيها عن التربة الزراعية. إذا كان أحد هذه المباني على شكل منشور قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها 60 m، وارتفاعه 111 m، أجد حجم المبنى.

$$V = Bh$$

$$= (l^2)h$$

$$= (60)^2 \times 111$$

$$= 399600$$

حجم المنشور

$$B = l^2, \text{ إذن، القاعدة مربعة،}$$

$$l = 60, h = 111 \text{ أعرض}$$


أجد الناتج

إذن، حجم المبنى 399600 m^3

أتحقق من فهمي:




أجد حجم حوض الأسماك المجاور.



الأسطوانة (cylinder): مجسم له قاعدتان دائريتان متطابقتان ومتوازيتان، ترتبطان معاً بسطح منحنٍ، وارتفاع الأسطوانة (h) هو المسافة العمودية بين قاعدتيها، ويسمى نصف قطر القاعدة نصف قطر الأسطوانة (r).


عند المقارنة بين أسطوانة ومنشور لهما الارتفاع نفسه، نلاحظ أن كلا المجسمين مكون من قاعدتين، وكو قسما المنشور والأسطوانة إلى طبقات لوجدنا أن مساحة سطح كل طبقة مساو لمساحة القاعدة، وبما أن ارتفاع الطبقات مساو لارتفاع المنشور والأسطوانة، نستنتج أنه يمكن حساب حجم الأسطوانة بطريقة مشابهة لطريقة حساب حجم المنشور، وذلك بضرب مساحة قاعدتها في ارتفاعها.



حجم الأسطوانة

مفهوم أساسي

• بالنماذج




حجم الأسطوانة (V) التي نصف قطرها (r) يساوي ناتج ضرب مساحة قاعدتها (B) في ارتفاعها (h)

$$V = Bh \text{ أو } V = \pi r^2 h$$

• بالكلمات

• بالرموز

مثال 3



أجد حجم الأسطوانة المجاورة وأقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

$$V = \pi r^2 h$$

$$= \pi (8^2) (12.5)$$


حجم الأسطوانة

$$r = 8, h = 12.5$$

$$\text{SHIFT } \pi \times 8^2 \times 12.5 = \text{s} \leftrightarrow \text{d} \quad 2513.274123$$

أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، حجم الأسطوانة يساوي 2513.3 cm^3 تقريباً.



أتحقق من فهمي:

أجد حجم الأسطوانة المجاورة، وأقرب إجابتي لأقرب جزء من مئة.

الوحدة 7

يُمكننا استخدام قانون حجم الأسطوانة في مواقف حياتية كثيرة ومتنوعة.

مثال 4: من الحياة



الصومعة الأسطوانية مبنية مجهز لتخزين الحبوب وحفظها في مكان آمن بعيد عن أسباب الإتلاف. أجد حجم صومعة يبلغ ارتفاعها 30 m وطول قطرها 20 m وأقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

$$V = \pi r^2 h$$

حجم الأسطوانة

$$= \pi(10^2)(30)$$

$$r = 10, h = 30$$

$$\approx 9424.8$$

أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، حجم الصومعة يساوي 9424.8 m^3 تقريباً.

أنتحق من فهمي:



كم ستيتمراً مكعباً من القهوة يتسع له الكوب المجاور.




أندرب




وأحل المسائل

أجد حجم كل مجسم مما يأتي:


1




2



3



4




أتذكر

إذا لم تتوفر الآلة الحاسبة يمكنني استعمال قيمة تقريبية لـ (π) وهي 3.14

أَجِدْ حَجْمَ كُلِّ مَجَسِّمٍ مِمَّا يَأْتِي:

5 منشورٌ قاعدتهُ مربعةٌ طولُ ضلعِها 4 m، وارتفاعُهُ 15 m

6 أسطوانةٌ طولُ قطرها 21.4 dm وارتفاعُها 33.7 dm



7 **حوض ماءٍ:** يبين الشكل المجاور حوض سباحةٍ على شكل أسطوانةٍ، طولُ قطرها 5.4 m، وارتفاعُها 120 cm


أَجِدْ حَجْمَ الحوضِ.

8 ما كميةُ الماءِ بالليتر التي يُمكنُ أَنْ يَتَسَعَ لَهَا الحوضُ؟


9 ما المدةُ الزمنيةُ التي يحتاجُها الحوضُ حتَّى يمتلئَ إذا كانت سرعةُ تعبئتهِ 50 L/min؟

أَجِدْ حَجْمَ كُلِّ مَجَسِّمٍ مِمَّا يَأْتِي:

10



11




إرشاد

لأَجِدَ حَجْمَ مَجَسِّمٍ مَرَكَّبٍ أَفَكِّكْ أَجْزَاءَهُ إِلَى مَجَسَّاتٍ أَعْرِفُهَا وَأَجِدْ حَجْمَ كُلِّ جُزْءٍ، ثُمَّ أَجِدْ مَجْمُوعَ الْحُجُومِ الَّتِي أَوْجَدْتَهَا.


أَسْتَعْمَلُ الْمَعْلُومَاتِ الْمَوْضُوحَةَ عَلَى كُلِّ شَكْلِ مِمَّا يَأْتِي لِإِيجَادِ الْبُعْدِ الْمَفْقُودِ:

12



$$V = 608 \text{ cm}^3$$

13




$$V = 110 \text{ cm}^3$$

أتذكر

مساحةُ شبه المنحرف $\times \frac{1}{2} \times \text{مجموع طولي القاعدتين}$
المتوازيين $\times \text{الارتفاع}$

14 **أمطار:** أعودُ إِلَى فقرةٍ (أستكشفُ) بدايةَ الدرسِ، وَأَحْلُ الْمَسْأَلَةَ.


مهارات التفكير العليا




15 تبرير: ذوّب كمال منشورًا مِنْ الشَّمْعِ أبعاده 10 cm, 9 cm, 20 cm لتشكيل شمعاتٍ على شكل منشورٍ قاعدته مثلثة كما في الشكل المجاور. كم شمعةً يستطيع كمال أن يصنع مِنْ كميّة الشمع التي لديه؟ أبرّر إجابتني.

أفكر

ما العلاقة بين حجم الحجر وحجم الماء المزاح؟




16 تبرير: تأمل الشكل المجاور، ثم أصف كيف يُمكنني إيجاد حجم الجسم المغمور بالماء، مبررًا إجابتني، علمًا بأن طول نصف قطر قاعدة الدّورق 1.5 cm، ثم أجده.



17 تبرير: تتكوّن كل مجموعة مِنْ أوراق التذكير المجاورة مِنْ 500 ورقة. هل يوجد اختلاف بين حجمي المجموعتين؟ أبرّر إجابتني، ثم أجّد حجم كلّ مجموعة، علمًا بأن أبعاد الورقة الواحدة 6 cm, 6 cm, 0.02 cm

إرشاد

أستخدم خطة التخمين والتحقق لإيجاد أبعاد المنشور.



18 تحدّ: منشورٌ قاعدته على شكلٍ مستطيل، وأبعاده أعدادٌ كلّية، ومساحات أوجهه 40 cm^2 , 48 cm^2 , 30 cm^2 أجّد حجم المنشور موضّحًا خطوات الحل.

19 أكتب: كيف أجّد حجم منشور ثلاثي؟

حجم الهرم


الهدف: استكشف العلاقة بين حجمي هرم ومنشور تتساوى فيهما مساحة القاعدة والارتفاع.

الهرم (pyramid): شكل ثلاثي الأبعاد، قاعدته مضلع، وأوجهه الجانبية مثلثات تشترك في نقطة تسمى الرأس.

نشاط 1

الخطوة 1

أصمم شبكة مكعب وهرم:




• أصمم شبكة مكعب مفتوح من الأعلى طول ضلعه 8 cm

• أصمم شبكة هرم رباعي برسم 4 مثلثات متطابقة الضلعين طول قاعدة كل منها 8 cm وارتفاعه $8 \frac{1}{2}$ cm

الخطوة 2

أنشئ هرمًا ومكعبًا:




• أقص الشبكات، وألصق الحواف معًا، لينتج مجسم هرم رباعي ومكعب كما في الشكل المجاور.

• أضع الهرم الرباعي والمكعب على الطاولة أمامي، وأقارن ارتفاعي المجسمين. ماذا ألاحظ؟
• أضع قاعدة الهرم على سطح المكعب، وأقارن قاعدتي المجسمين، ماذا ألاحظ؟

الخطوة 3

أستعمل الرمل للمقارنة بين حجم الهرم وحجم المنشور:



• أملأ الهرم الرباعي بالرمل وأفرغه في المكعب، وأكرر العملية حتى يمتلئ المكعب.

أحلل النتائج:

• كم مرة ملأت الهرم لتعبئة المكعب؟
• ما العلاقة بين حجم الهرم وحجم المنشور الذي يتساوى معه في القاعدة والارتفاع.

أدرب



1 أجد حجم هرم رباعي يتساوى في القاعدة والارتفاع مع منشور رباعي حجمه 27 cm^3

2 أجد حجم هرم ثلاثي يتساوى في القاعدة والارتفاع مع منشور ثلاثي حجمه 36 m^3

أستكشف



يعود بناء هَرَم خوفو إلى العام 2560 قبل الميلاد تقريباً،
إذا علمت أن ارتفاع هذا الهرم 139 m تقريباً،
وقاعدته مربعة الشكل طول ضلعها 230 m،
فكم حجمه؟

فكرة الدرس

أجد حجم الهرم
والمخروط.

المصطلحات


المخروط

توصلت في الاستكشاف الذي يسبق هذا الدرس إلى أن حجم الهرم يساوي ثلث حجم المنشور المُساوي له في مساحة القاعدة والارتفاع.

حجم الهرم

مفهوم أساسي

• بالنماذج



حجم الهرم (V) يساوي ثلث مساحة قاعدته (B)
في ارتفاعه (h)

$$V = \frac{1}{3} Bh$$


• بالكلمات

• بالرموز

مثال 1

أجد حجم كل هَرَم مما يأتي، وأقرب إجابتي لأقرب جزء من مئة:

1



$$V = \frac{1}{3} Bh$$

$$= \frac{1}{3} (l \times w) h$$

$$= \frac{1}{3} (8 \times 5) \times 10$$

$$\approx 133.33$$

حجم الهرم

القاعدة مستطيل، إذن، $B = l \times w$

أعوّض $l = 8$, $w = 5$, $h = 10$


أجد الناتج

إذن، حجم الهرم يساوي 133.33 cm^3 تقريباً.


أتحقق من فهمي:



2



3



يُمكننا استخدام قانون حجم الهرم في مواقف حياتية كثيرة ومتنوعة.



مثال 2: من الحياة



تتكوّن محمية مواتر للنباتات في كندا من 4 بيوت زجاجية كلّ منها على شكل هرم قاعدته مربعة الشكل، ويحتوي كلّ بيت منها على مُناخٍ مختلفٍ وأنواعٍ متباينةٍ من النباتات. أجد حجم الهرم الأكبر علمًا بأن ارتفاعه 24 m، وطول ضلع قاعدته المربعة 25 m

$$V = \frac{1}{3} Bh$$

حجم الهرم

$$= \frac{1}{3} (l^2) h$$

القاعدة مربعة، إذن، $B = l^2$

$$= \frac{1}{3} (25)^2 \times 24$$

أعوّض $l = 25$, $h = 24$

$$= 5000$$

أجد الناتج

إذن، حجم الهرم يساوي 5000 m^3

أتحقق من فهمي:




أجد حجم أصغر هرم في المحمية علمًا بأن ارتفاعه 18 m وطول ضلع قاعدته المربعة 19.5 m. أقرب إجابتي لأقرب جزءٍ من عشرة.

الوحدة 7

المخروط (cone): شكل ثلاثي الأبعاد، له قاعدة دائرية واحدة، وسطح منحني يصل القاعدة بالرأس.


علاقة حجم المخروط بحجم الأسطوانة مثل علاقة حجم الهرم بحجم المنشور، أي أن حجم المخروط يساوي ثلث حجم الأسطوانة المساوية له في مساحة القاعدة والارتفاع.



حجم المخروط

مفهوم أساسي

• بالنماذج



حجم المخروط (V) الذي طول نصف قطره (r) يساوي ثلث مساحة قاعدته (B) في ارتفاعه (h)

• بالكلمات


$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \text{ أو } V = Bh$$

• بالرموز

مثال 3

أجد حجم كل مخروط مما يأتي، وأقرب إجابتني إلى أقرب جزء من مئة:

1



$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\ &= \frac{1}{3} \pi (5^2)(12) \\ &\approx 314.16 \end{aligned}$$

حجم المخروط

$$r = 5, h = 12$$


أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، حجم المخروط يساوي 314.16 cm^3 تقريباً.


أتحقق من فهمي:



2



3



يُمكننا استخدام قانون حجم الهرم في مواقف حياتية كثيرة ومتنوعة.



مثال 4: من الحياة



تشتهر مدينة بانكوك في تايلند بحقول الملح، حيث تُشَقُّ أفنية وتُجمَعُ فيها المياه المالحة في مسطحات وتترك لتجف تحت أشعة الشمس، ثم يُجمَعُ الملح على شكل أكوام مخروطية الشكل. إذا كان طول قطر الكومة 120 cm وارتفاعها 55 cm، فأجد حجمها وأقرب إجابتي لأقرب جزء من مئة: بما أن كومة الملح على شكل مخروط، إذا أجد حجم المخروط.

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$= \frac{1}{3} \pi (60^2)(55)$$

$$\approx 207345.12$$

حجم المخروط

$$r = 60, h = 55 \text{ أعوض}$$

أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، حجم كومة الملح يساوي 207345.12 cm^3 تقريباً.

أتتحقق من فهمي:



في المثال السابق، إذا كان طول نصف قطر كومة ملح 35 cm، وارتفاعها 40 cm، أجد حجم الكومة، وأقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة.


أدرب

وأحل المسائل




أجد حجم كل مجسم مما يأتي، وأقرب إجابتي لأقرب جزء من مئة:


1



2




3




الوحدة 7

أَجِدْ حَجْمَ كُلِّ مخروطٍ مِمَّا يَأْتِي، وَأَقْرَبُ إجابتي لِأَقْرَبِ جزءٍ مِنْ عَشْرَةٍ:


4



5



6



إرشاد

في السؤال 7 أَتَنَبَّهُ على توحيد
الوحدات قبل إيجاد الحجم.


أَجِدْ حَجْمَ كُلِّ مجسَّمٍ مِمَّا يَأْتِي، وَأَقْرَبُ إجابتي لِأَقْرَبِ جزءٍ مِنْ عَشْرَةٍ:

هَرَمٌ ارتفاعه 5 dm ومساحة قاعدته 18 cm^2

مخروطٌ طول نصف قطره 4 mm وارتفاعه 6.5 mm

7

8



الكوب الأول


الكوب الثاني

أكواب: يبيِّن الشكل المجاور كويبن، المنطقة الداخلية في كلٍّ منهما على شكل مخروط. أيُّ الكويبن يتسع لكمية أكبر من السائل؟ أبرر إجابتي.


9

أَجِدْ حَجْمَ كُلِّ مجسَّمٍ مِمَّا يَأْتِي، وَأَقْرَبُ إجابتي لِأَقْرَبِ جزءٍ مِنْ مِئَةٍ:



10




11



12



(1)



(2)

علوم: يبيِّن الشكل المجاور قُمعين

يُستخدَمان في مختبرات العلوم،

القُمع (1) على شكل مخروط،

والقُمع (2) على شكل مخروط مع


أسطوانة متصلة بقاعدته. أيُّ القُمعين

حجمه أكبر؟ أبرر إجابتي.


13

أستعملُ المعلوماتِ الموضَّحةَ على كلِّ شكلٍ ممَّا يأتي لإيجاد البُعدِ المفقودِ:

14



15



معلومة

أهراماتُ مصرَ هي مقابرُ ملكيَّة كلِّ منها يحملُ اسمَ الملكِ الَّذي بناه ثُمَّ دُفِنَ فيه.


أهراماتُ مصرَ: أعودُ إلى فقرة (أستكشفُ) بدايةَ الدرسِ وأحلُّ المسألة.

16

مهاراتُ التفكيرِ العُلْيَا

أفكر

كيفَ أوظِّفُ حلَّ المعادلاتِ في حلِّ السَّؤالِ 19؟





تبريرُ: يبيِّنُ الشكلُ المجاورُ مخروطًا وأسطوانةً لهُما الحجمُ نفسُهُ، ما علاقةُ ارتفاعِ المخروطِ بارتفاعِ الأسطوانة؟ أبرِّرْ إجابتي.

19


أكتشفُ الخطأ: أبيِّنُ الخطأَ في إيجادِ حجمِ كلِّ مجسَّمٍ مِنَ المَجسَّمينِ الآتيين، وَأصحِّحُهُ.

20



معلومة

استُعمِلَتِ الساعةُ الرمليةُ قديمًا لقياسِ الوقتِ في الرحلاتِ البحريةِ، وظلَّتْ قرونًا عدَّة تُستخدَمُ على مَتَنِ السُّفنِ.



تبريرُ: يسقطُ الرَّمْلُ في الساعةِ الرَّمليَّةِ المجاورةِ بمعدَّلِ 50 cm^3 لكلِّ دقيقةٍ. كمَ مِنَ الوقتِ يحتاجُ الرَّمْلُ ليسقطَ كُلُّهُ في الجزءِ السفليِّ؟

21

أكتبُ: أصفُ العلاقةَ بينَ حجمِ الهرمِ وحجمِ المنشورِ المساوي لهُ في القاعدةِ والارتفاعِ.

22

أستكشف



يمثل الجزء الأمامي من راصفة الطرُق في الصورة المجاورة أسطوانة طولها 1.07 m وطول قطر قاعدتها الدائرية 1.28 m، ما مساحة التي ترصفها الآلية من الطريق في الدورة الواحدة؟

فكرة الدرس

أجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح المنشور والأسطوانة.

المصطلحات

المساحة الجانبية للسطح،
المساحة الكلية للسطح.


المساحة الكلية (total surface area) لسطح أي مجسم تساوي مجموع مساحات جميع أوجهه.

المساحة الجانبية (L.A) لسطح المنشور هي مجموع مساحات أوجهه الجانبية.

المساحة الجانبية والكليّة لسطح المنشور

مفهوم أساسي

بالنماذج



المساحة الجانبية (L.A) لسطح المنشور تساوي ناتج ضرب ارتفاع المنشور h في محيط القاعدة P أما المساحة الكلية (S.A) لسطح المنشور فتساوي مجموع مساحته الجانبية ومساحتي قاعدتيه.

$$L.A = Ph$$

$$S.A = L.A + 2B$$


بالكلمات

بالرموز

مثال 1

أجد المساحة الكلية لسطح كل منشور مما يأتي:

1



$$P = 2l + 2w$$

$$P = 2(20) + 2(14)$$

$$= 68$$

أجد محيط القاعدة:

$$P = 2l + 2w$$

$$l = 20, w = 14$$

أجد الناتج

إذن، محيط القاعدة 68 cm

الخطوة 2 أجد المساحة الجانبية لسطح المنشور:

$$\begin{aligned} L.A &= Ph \\ &= 68 \times 10 \\ &= 680 \end{aligned}$$

المساحة الجانبية لسطح المنشور

$$p = 68, h = 10$$

أجد الناتج

إذن، المساحة الجانبية لسطح المنشور 680 cm^2

الخطوة 3 أجد مساحة القاعدة:

$$\begin{aligned} B &= l \times w \\ &= 20 \times 14 \\ &= 280 \end{aligned}$$

مساحة المستطيل

$$l = 20, w = 14$$

أجد الناتج

إذن، مساحة قاعدة المنشور 280 cm^2

الخطوة 4 أجد المساحة الكلية لسطح المنشور:

$$\begin{aligned} S.A &= L.A + 2B \\ &= 680 + 2(280) \\ &= 1240 \end{aligned}$$

المساحة الكلية لسطح المنشور

$$L.A = 680, B = 280$$


أجد الناتج

إذن، المساحة الكلية لسطح المنشور تساوي 1240 cm^2


أتحقق من فهمي:



2



3



الوحدة 7

يُمكننا استخدام قانوني المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح المنشور في مواقف حياتية كثيرة ومتنوعة.

مثال 2: من الحياة



يُعدُّ مبنى مركز بالتيمور التجاري أعلى مبنى خماسي منتظم في العالم، ويبلغ ارتفاعه 124 m تقريباً، وطول ضلع قاعدته الخماسية 41 m تقريباً، أجد المساحة الجانبية لسطح المبنى.

بما أن قاعدة المبنى على شكل خماسي منتظم، إذن، محيط القاعدة يساوي ناتج ضرب عدد الأضلاع في طول الضلع الواحد.

$$P = 5 \times l$$

$$= 5 \times 41$$

$$= 205$$

$$L.A = Ph$$

$$= 205 \times 124$$

$$= 25420$$

محيط الخماسي المنتظم

$$l = 41 \text{ أعرض}$$

أجد الناتج

المساحة الجانبية لسطح المنشور

$$p = 205, h = 124 \text{ أعرض}$$

أجد الناتج


إذن، المساحة الجانبية لسطح المنشور 25420 m^2

أتحقق من فهمي:




أجد المساحة الكلية لسطح مركز بالتيمور التجاري إذا علمت أن مساحة قاعدة المبنى 39200 m^2

يُمكننا إيجاد المساحة الكلية للأسطوانة عن طريق شبكتها. فعند فتح أسطوانة، أجد أن مساحة المستطيل الناتج يساوي المساحة الجانبية للأسطوانة، والمساحة الكلية لسطحها يساوي مجموع مساحتها الجانبية ومساحتي القاعدتين.



• بالكلمات

المساحة الجانبية ($L.A$) لسطح الأسطوانة هي مساحة سطحها المنحني، وتساوي حاصل ضرب محيط قاعدتها في ارتفاعها.
أما المساحة الكلية ($S.A$) للأسطوانة فتساوي مجموع مساحتها الجانبية ومساحتي قاعدتيها.



• بالنماذج

$$L.A = 2\pi rh \quad \text{أو} \quad L.A = \pi dh$$


$$S.A = 2\pi h + 2\pi r^2 \quad \text{أو} \quad S.A = L.A + 2B$$

• بالرموز

مثال 3

أجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح الأسطوانة المجاورة. أقرّب إجابتي لأقرب جزء من مئة.

1



$$L.A = 2\pi rh$$

$$= 2\pi(1)(3)$$

$$\approx 18.85$$

$$S.A = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

$$\approx 18.85 + 2\pi(1)^2$$

$$\approx 25.13$$

المساحة الجانبية لسطح الأسطوانة

أعوّض $r = 1$, $h = 3$

أستعمل الآلة الحاسبة

المساحة الكلية لسطح الأسطوانة

أعوّض $L.A = 18.85$, $r = 1$


أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، المساحة الجانبية لسطح الأسطوانة تساوي 18.85 m^2 تقريباً، والمساحة الكلية لـ 25.13 m^2 تقريباً.


أتحقّق من فهمي:



2




3



الوحدة 7

يُمكننا استخدام قانوني المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح الأسطوانة في مواقف حياتية كثيرة ومتنوعة.

مثال 4: من الحياة



أرادت لمياء تغليف الشمعة المجاورة لصديقتها هدية في عيد ميلادها.

كم ستحتاج مربعاً على الأقل تحتاج لمياء من ورق التغليف؟

أقرب إجابتني لأقرب جزء من عشرة.

بما أن التغليف للشمعة كاملة، إذن، أجد المساحة الكلية لسطح الأسطوانة.

$$L.A = 2\pi rh$$

$$= 2\pi(4)(14)$$

$$\approx 351.9$$

$$S.A = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

$$\approx 351.9 + 2\pi(4)^2$$

$$\approx 452.4$$

المساحة الجانبية لسطح الأسطوانة

أعوّض $r = 4$, $h = 14$


أستعمل الآلة الحاسبة

المساحة الكلية لسطح الأسطوانة

أعوّض $r = 4$, $L.A = 351.9$

أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، تحتاج لمياء تقريباً 452.4 cm^2 على الأقل من الورق لتغليف الشمعة.



أتتحقق من فهمي:



يُنتج مصنع علبة أسطوانية الشكل، ارتفاع الواحدة منها 7 cm،

وطول قطرها 5 cm. أجد المساحة الكلية لسطح العلبة.

أقرب إجابتني لأقرب جزء من عشرة.

أدرب




وأحل المسائل

أتذكر


محيط قاعدة المضلع المنتظم يساوي ناتج ضرب عدد الأضلاع في طول الضلع الواحد.

أجد المساحة الجانبية لسطح كل مجسم مما يأتي:


1



2




3




أَجِدْ المساحة الكلية لسطح كل مجسم مما يأتي:


4



5



6



أَجِدْ المساحة الكلية لسطح كل مجسم مما يأتي:

7 منشور قاعدته مستطيلة الشكل، طولها 6.2 cm وعرضها 4 cm، وارتفاعه 8.5 cm

8 أسطوانة طول نصف قطرها 5 mm وارتفاعها 15 mm

9 أسطوانة طول قطرها 4 m، وارتفاعها 20 m



10 أقلام: قلم تلوين على شكل منشور سداسي، طول ضلع قاعدته 4 mm، وارتفاعه 170 mm، أجد المساحة الجانبية لسطح القلم.

معلومة

تُصنع الأقلام الملونة من الجرافيت مع إضافة الأصباغ إلى الحشوة، وتُضاف له مادة شمعية لتسهيل حركته على الأسطح.

11 ناطحات سحاب: ناطحة سحاب على شكل منشور قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها 64 m، وارتفاعه 414 m، أجد المساحة الجانبية لسطح ناطحة السحاب.




12 أبراج: يبلغ ارتفاع برج الساعة في مكة المكرمة 250 m تقريباً، وهو على شكل منشور قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها 43 m، أجد المساحة الجانبية لسطح البرج.


معلومة

تعد الساعة الواقعة أعلى برج مكة أكبر ساعة في العالم، ويمكن قراءة الوقت منها من بُعد سبعة عشر كيلومتراً.

13 أجد مساحة الكرتون اللازمة لصنع الأنبوب الآتي:



الوحدة 7




عَلَبٌ: غُلِّفَتْ جَوَانِبُ عُلْبَةِ الْأَقْلَامِ الْمَجَاوِرَةِ وَقَاعَدْتُهَا بِوَرَقٍ لِلتَّزْيِينِ. أَجِدْ مَسَاحَةَ الْوَرَقِ اللَّازِمَةِ لِتَغْلِيفِ الْعُلْبَةِ.

14

إرشاد

لا يوجد وجهٌ علويٌّ لعلبة الأقلام.



بيوت زجاجية: يبيّن الشكل المجاور بيتًا زجاجيًا للنباتات، أَجِدْ مَسَاحَةَ الزَّجَاجِ الَّتِي اسْتُعْمِلَتْ فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ.

15

معلومة


البيت الزجاجي مبنى مصمّم لحماية النباتات غير الموسمية من البرودة أو الحرارة الشديدة.

راصفة طُرُق: أعودُ إلى فقرة (أستكشف) بدايةً الدرس وأحلّ المسألة.


16

مهارات التفكير العليا

تحدّ: أَجِدْ المَسَاحَةَ الكُلِّيَّةَ لِسطحِ كُلِّ مجسّمٍ ممّا يأتي:



17



18

إرشاد

في السؤالين 17 و 18، ألاحظ أنّ هناك جزءًا مفقودًا من قاعدتي كلّ مجسّم.

تبرير: إذا أصبحت أطوال أضلاع مكعبٍ مثلي طولها الأصلي، فما تأثير ذلك في المساحة الكلية لسطحه؟ أبرّر إجابتي.

19

أكتشف الخطأ: يقول سيف: إذا تساوى حجمًا أسطوانتين، فإنّه يكون لهما المساحة الجانبية نفسها، هل ما يقوله سيفٌ صحيحٌ، أبرّر إجابتي.

20



تحدّ: يبيّن الشكل المجاور 4 كرات تنسٍ موضوعة في علبة أسطوانية الشكل. إذا كان قطر كلّ كرة منها 7 cm، فأجد المساحة الجانبية لسطح العلبة، وأبرّر إجابتي.

21


أفكر

ما علاقة مجموع أطوال أقطار الكرات الأربع بارتفاع الأسطوانة؟

أكتب: كيف أَجِدُ المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح المنشور؟

22

مساحة سطح المخروط



الهدف: استكشف المساحة الكلية لسطح المخروط.


الارتفاع الجانبي (ℓ) (slant height) للمخروط هو المسافة بين الرأس ونقطة على حافة القاعدة.

نشاط 1

الخطوة 1

أحدد أبعاد المخروط من شبكته:

- أحضر مخروطاً وأحدد أبعاده.
- أقص المخروط على طول ارتفاعه الجانبي، وأفتحه لتشكيل شبكة.



أكون متوازي مستطيلات:


الخطوة 2

- أقسم السطح المنحني للمخروط إلى 6 أجزاء متساوية.

- أقص الأجزاء، وأعيد ترتيبها لتكون

- متوازي أضلاع كما في الشكل المجاور.
- أكتب تعبيراً رياضياً يمثل طول متوازي

الأضلاع.



أجد مساحة متوازي الأضلاع الذي كونه:

الخطوة 3

- أستخدم التعبير الذي حصلت عليه في الخطوة 2؛ لأكتب قاعدة لمساحة متوازي الأضلاع التي تمثل المساحة الجانبية لسطح المخروط.
- أكتب قاعدة للمساحة الكلية لسطح المخروط.

أندرب



1 أجد المساحة الجانبية لسطح مخروط طول نصف قطره 5 cm، وارتفاعه الجانبي 7 cm، أقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

2 أجد المساحة الكلية لسطح مخروط طول قطره 4 m، وارتفاعه الجانبي 6.5 m، أقرب إجابتي لأقرب جزء من مئة.



أستكشف

إذا كان طول نصف قطر قاعدة وحدة الإنارة المجاورة 20 cm، وارتفاعها 30 cm، أجد مساحة المعدن التي استُخدمت في تصنيع الوحدة.

فكرة الدرس


أجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح الهرم المنتظم والمخروط.

المصطلحات

هرم منتظم، الارتفاع الجانبي للهرم


الهرم المنتظم (regular pyramid) هرم قاعدته مضلع منتظم، وأوجهه الجانبية مثلثات متطابقة كل منها متطابق الضلعين، وارتفاع كل مثلث يسمى **الارتفاع الجانبي** (ℓ) (slant height) للهرم.

نلاحظ أنه عند إعادة ترتيب الأوجه الجانبية للهرم المنتظم؛ فإنها تشكل نصف مستطيل طوله يساوي محيط قاعدة الهرم، وعرضه مساوٍ لارتفاع الهرم الجانبي، وعليه، فإن مساحة سطح الهرم الجانبية تساوي نصف محيط القاعدة في ارتفاعه الجانبي.



المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح الهرم

مفهوم أساسي



بالنماذج

المساحة الجانبية ($L.A$) لسطح الهرم المنتظم تساوي نصف محيط القاعدة (P) مضروباً في الارتفاع الجانبي (ℓ)
المساحة الكلية ($S.A$) لسطح الهرم المنتظم تساوي مجموع مساحته الجانبية ومساحة قاعدته.

بالكلمات

$$L.A = \frac{1}{2} P \ell$$


$$S.A = L.A + B$$

بالرموز

مثال 1

أجد المساحة الكلية لسطح كل هَرَمٍ منتظمٍ مما يأتي:

1



5 cm

$$P = 4 \times 5 = 20 \text{ cm}$$

$$B = 5^2 = 25 \text{ cm}^2$$

أجد محيط القاعدة ومساحتها:

الخطوة 1

$$p = 4 \times l \text{ إذن: القاعدة مربعة،}$$

$$B = l^2 \text{ مساحة القاعدة}$$

أجد المساحة الجانبية لسطح الهَرَم المنتظم:

الخطوة 2

$$L.A = \frac{1}{2} P \ell$$

$$= \frac{1}{2} (20) \times 8$$

$$= 80$$

المساحة الجانبية لسطح الهَرَم

$$P = 20, \ell = 8 \text{ أعوض}$$

أجد الناتج

إذن، المساحة الجانبية لسطح الهَرَم تساوي 80 cm^2

أجد المساحة الكلية لسطح الهَرَم المنتظم:

الخطوة 3

$$S.A = L.A + B$$

$$= 80 + 25$$

$$= 105$$

المساحة الكلية لسطح الهَرَم

$$L.A = 80, B = 25 \text{ أعوض}$$


أجد الناتج

إذن، المساحة الكلية لسطح الهَرَم المنتظم تساوي 105 cm^2

أتحقق من فهمي:




2



8m

3




10 m

الوحدة 7

يُمكننا استخدام قانون المساحة الكلية لسطح الهرم في مواقف حياتية كثيرة ومتنوعة.



مثال 2: من الحياة



يظهر في الشكل المجاور سقف منزل على شكل هرم رباعي منتظم، يُراد تغطيته بقطع خشبية، مساحة كل قطعة منها 2.5 m^2 . كم قطعة خشبية نحتاج لتغطية السقف.

أجد المساحة الجانبية لسطح الهرم:

$$P = 4 \times 5.5 = 22 \text{ m}$$

القاعدة مربعة، إذن: $p = 4 \times l$

$$L.A = \frac{1}{2} P \ell$$

المساحة الجانبية لسطح الهرم

$$= \frac{1}{2} (22)(4.5)$$

أعوّض $P = 22$, $\ell = 4.5$

$$= 49.5$$

أجد الناتج


إذن، المساحة الجانبية للسطح تساوي 49.5 m^2

وبما أن القطعة الخشبية الواحدة تغطي مساحة 2.5 m^2 ، فإن عدد القطع التي نحتاجها لتغطية السطح يمكن إيجادها بقسمة مساحة السطح على مساحة القطعة الخشبية الواحدة:

$$49.5 \div 2.5 = 19.8$$

إذن، نحتاج 20 قطعة خشبية تقريباً لتغطية سطح المنزل.

أتحقق من فهمي:




صمم ينال الهرم المجاور الذي يمثل الأعمدة الأساسية لنموذج خيمة، كم مساحة القماش التي يحتاجها لإكمال النموذج وتغطية الأعمدة؟

توصلت في الاستكشاف الذي يسبق هذا الدرس إلى أن المساحة الجانبية للمخروط تساوي نصف محيط قاعدته في ارتفاعه الجانبي، وأن مساحته الكلية هي مجموع المساحة الجانبية ومساحة قاعدته.

المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح المخروط

مفهوم أساسي



بالنماذج

المساحة الجانبية ($L.A$) لسطح المخروط تساوي ناتج ضرب نصف محيط قاعدة المخروط طول نصف قطرها (r) في الارتفاع الجانبي (l) له.
أما المساحة الكلية ($S.A$) لسطح المخروط فتساوي مجموع مساحته الجانبية ومساحة القاعدة.

$$L.A = \pi r l$$

$$S.A = L.A + B$$


بالكلمات

بالرموز

مثال 3

أجد المساحة الكلية لسطح كل مخروط مما يأتي، وأقرب الإجابة لأقرب جزء من عشرة:

1



أجد المساحة الجانبية لسطح المخروط:

الخطوة 1

المساحة الجانبية لسطح المخروط

$$r = 15, l = 25$$

أستعمل الآلة الحاسبة

$$\begin{aligned} L.A &= \pi r l \\ &= \pi(15)(25) \\ &\approx 1178.1 \end{aligned}$$

إذن، المساحة الجانبية لسطح المخروط تساوي 1178.1 cm^2

أجد مساحة القاعدة:

الخطوة 2

مساحة القاعدة

$$r = 15$$

أستعمل الآلة الحاسبة

$$\begin{aligned} B &= \pi r^2 \\ &= \pi(15^2) \\ &\approx 706.9 \end{aligned}$$

إذن مساحة القاعدة 706.9 cm^2

الوحدة 7

الخطوة 3 أجد المساحة الكلية لسطح المخروط:

$$S.A = L.A + B$$

$$= 1178.1 + 706.9$$

$$= 1885$$

مساحة سطح المخروط


$$L.A = 1178.1, B = 706.9$$

أجد الناتج


إذن، المساحة الكلية لسطح المخروط تساوي 1885 cm^2 تقريباً.

أتحقق من فهمي:

2




3



يمكننا استخدام قانون المساحة الكلية لسطح المخروط في مواقف حياتية كثيرة ومتنوعة.

مثال 4: من الحياة



تستخدم في بعض التجارب الكيميائية أقماغ على شكل مخروط يوضع بداخلها ورق ترشيح. أجد مساحة ورق الترشيح اللازمة للقمع المجاور. أقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

أجد المساحة الجانبية لسطح المخروط:

$$L.A = \pi r \ell$$

$$= \pi (40)(60)$$

$$\approx 7539.8$$

المساحة الجانبية لسطح المخروط

$$r = 40, \ell = 60$$

أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، مساحة ورق الترشيح تساوي 7539.8 cm^2 تقريباً.

أتحقق من فهمي:



مخروط مرور طول نصف قطره 25 cm وارتفاعه الجانبي 75 cm. أجد المساحة الجانبية لسطح المخروط. أقرب إجابتي لأقرب عدد صحيح.




أَتَدْرِبُ وأحل المسائل

أتذكر


الهرم المنتظم هرم قاعدته
مضلع منتظم

أجد المساحة الكلية لسطح كل هرم منتظم مما يأتي:

1




2




أجد المساحة الكلية لسطح كل مخروط مما يأتي:

3



4



أجد المساحة الكلية لسطح كل مجسم مما يأتي:

هرم رباعي منتظم طول قاعدته 5 m، وارتفاعه الجانبي 6 m

5

مخروط طول نصف قطره 16 m، وارتفاعه الجانبي 28 m

6



مصباح طاولة: قاعدة غطاء مصباح الطاولة المجاور
على شكل هرم سداسي منتظم طول ضلعه 8 in أقدّر
مساحة الزجاج اللازمة لصنع الغطاء.

7

أتذكر

inch وحدة قياس للطول.



متاحف: يحتوي متحف اللوفر في فرنسا على
هرم زجاجي قاعدته مربعة الشكل طول ضلعه
35.3 m تقريباً، وارتفاعه الجانبي 28 m، أجد
مساحة الزجاج المستخدمة في تغطية الهرم.

8


معلومة

شيد هرم اللوفر عام
1988 م بمناسبة احتفال
فرنسا بمرور قرنين على
الثورة الفرنسية.


الوحدة 7

أَجِدْ المساحة الكلية لسطح كل مجسم مما يأتي:

9





10



أفكر

في السؤالين 10 و 11، كم قاعدة للشكل على حساب مساحتها لإيجاد المساحة الكلية لسطح كل مجسم؟




11 **أقماغ:** صنّع القمعان المجاوران من البلاستيك، أجد الفرق بين مساحتي البلاستيك المستخدمة في صنّع القمعين. أقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

11

12 **مصايح:** أعود إلى فقرة (أستكشف) بداية الدرس وأحل المسألة.

12

مهارات التفكير العليا



13 **أكتشف الخطأ:** أوجد جمال المساحة الكلية لسطح الهرم المجاور، وكان حله كالآتي:

13

$$\begin{aligned} S.A &= 40^2 + \frac{1}{2} (160)(15) \\ &= 1600 + 1200 \\ &= 2800 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

أبين الخطأ الذي وقع فيه جمال، وأصححه.

14 **تبرير:** أيهما أطول؛ ارتفاع الهرم المنتظم، أم ارتفاعه الجانبي؟ أبرر إجابتي.

14

15 **تبرير:** إذا قلص نصف قطر قاعدة مخروط إلى النصف وبقي الارتفاع نفسه. ما تأثير ذلك في المساحة الجانبية لسطح المخروط. أبرر إجابتي.

15


16 **أكتب:** كيف أجد المساحة الكلية لسطح المخروط؟

16

إرشاد

يمكنني تعويض نصف قطر القاعدة الجديد في قاعدة المساحة الجانبية، ثم ملاحظته تأثيره.

اختبار الوحدة




6 المساحة الكلية
للصندوق المجاور:


- a) 380 mm^2 b) 900 mm^2
c) 1100 mm^2 c) 1800 mm^2

أجد محيط كل شكل من الشكلين الآتيين:

7




8



9 عجلة دائرية طول نصف
قطرها 26.67 cm، كم دورة
تدور العجلة عندما تقطع
السيارة مسافة 335.28 m؟

10 أجد الفرق بين محيط مربع طول ضلعيه 12 cm،
ومحيط دائرة طول قطرها 12 cm، أقرب إجابتني
لأقرب جزء من عشرة.

11 أجد مساحة المنطقة المظللة في الشكل الآتي:



أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1 الصيغة التي تعبر عن مساحة الشكل المجاور:




- a) $2\pi r$ b) πr^2
c) $\frac{1}{2}\pi$ d) $\frac{1}{2}\pi r^2$

2 دائرة محيطها $20\pi \text{ cm}$ ، فإن طول نصف قطرها
يساوي:

- a) 4.5 cm b) 10 cm
c) 20 cm d) 17.5 cm

3 إذا كان حجم المنشور
المجاور يساوي 1، فإن
قيمة x تساوي:

- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{\ell}{4}$ c) ℓ d) 4




4 حجم الجسم المجاور
يساوي:

- a) 24.5 m^3 b) 20.5 m^3
c) 48 m^3 c) 49 m^3

5 المساحة الكلية لأسطوانة ارتفاعها 30.5 cm وطول
نصف قطرها 3 cm، (مقرَّبًا إجابتني لأقرب جزء من
مئة) تساوي:

- a) 274.90 cm^2 b) 603.19 cm^2
c) 631.14 cm^2 c) 688.01 cm^2

تدريب على الاختبارات الدولية:



حجم المجسم
المجاور يساوي:

18

- a) 180 cm^3 b) 1320 cm^3
c) 960 cm^3 c) 1140 cm^3

أي الآتي يُعدُّ أفضل تقدير لحجم مكعب طول ضلعه 18.79 mm ؟

19

- a) 80 mm^3 b) 800 mm^3
c) 8000 mm^3 c) 80000 mm^3

المساحة الكلية لسطح أسطوانة طول قطرها 15 cm وارتفاعها 2 cm تساوي:

20

- a) 30 cm^2 b) 117.8 cm^2
c) 353.4 cm^2 c) 447.7 cm^2

المساحة الكلية لسطح مخروط طول نصف قطر قاعدته 7 cm ، وارتفاعه الجانبي 11.4 cm تساوي:

21

- a) 153.9 cm^2 b) 250.7 cm^2
c) 272.7 cm^2 c) 404.6 cm^2

المساحة الجانبية لسطح هرم رباعي منتظم طول ضلع قاعدته 5 cm ، وارتفاعه الجانبي 7 cm يساوي:

22


- a) 17.5 cm^2 b) 35 cm^2
c) 70 cm^2 c) 95 cm^2

منشور قاعدته مستطيلة الشكل، طوله 4.2 m ، وعرضه 3.2 m ، وحجمه 83.3 m^3 ، أجد ارتفاعه.


12

أجد محيط الشكل الآتي:

13



علماً بأن الدوائر الأربعة في الشكل متطابقة.




أجد حجم المنزل
المجاور.

14

قمة برج على شكل مخروط ارتفاعه الجانبي 33.5 m وطول نصف قطر قاعدته 15 m ، أجد المساحة الجانبية لقمة البرج.

15



الشكل المجاور
يُبين خيمة مصنوعة
من قماش للجهاث

16

الأربعة للخيمة إضافة إلى الأرضية. أجد مساحة القماش اللازمة لصنع الخيمة.

17

مبنى على شكل هرم سداسي منتظم، طول ضلع قاعدته 8 m ، وارتفاعه الجانبي 14 m ، أجد المساحة الجانبية لسطح المبنى.

ما أهمية هذه الوحدة؟

لِلإحصاء أهمية كبيرة في حياتنا، فهو يساعد على تنظيم البيانات وتحليلها، واتخاذ القرارات الصحيحة اعتمادًا على البيانات المتاحة. وفي هذه الوحدة سوف أتعلّم الكثير حول تمثيل البيانات وتحليلها باستعمال مقياس النزعة المركزية وكتابة استنتاجات دقيقة.



سأتعلّم في هذه الوحدة:

- تمثيل البيانات باستعمال الساق والورقة.
- تمثيل البيانات بالجدول ذات الاتجاهين.
- تحديد مقياس النزعة المركزية المناسب لوصف البيانات.
- تعرّف الاحتمال النظري والتجريبي.

تعلّمت سابقًا:

- ✓ تمثيل البيانات في جداول تكرارية.
- ✓ حساب الوسط الحسابي.
- ✓ حساب الوسيط والمنوال والمدى.
- ✓ حساب احتمالات الحوادث البسيطة.



مشروع الوحدة: ميزان الأعداد



أستعدُّ ومجموعتي لتنفيذ مشروعنا الخاص الذي نطبِّق فيه ما نتعلمه في هذه الوحدة لتصميم ميزان أعداد واستعماله لحساب الوسط الحسابي.

4 أصنع 10 كتلٍ باستعمال قطع خشبية متساوية المقاس والكتلة، وأحدث ثقباً في كل منها لأعلقها على المسامير.

خطوات تنفيذ المشروع:

صنع ميزان الأعداد

1 أصنع قاعدة خشبية مستطيلة الشكل طولها 40 cm وعرضها 20 cm، ثم أثبت قطعة خشبية بشكل رأسي في منتصفها.

2 أثبت ذراعاً خشبية طولها 70 cm من منتصفه عند قمة القطعة الرأسية بحيث يبقى متأرجحاً مثل كفتي الميزان.

3 أرسّم تدريجاً على الذراع المتأرجحة كما في الشكل المجاور. أترك مسافة 5 cm بين كل رقمين، وأثبت مساميراً أسفل كل عدد لأعلق كتلاً عليها.



استعمال ميزان الأعداد


1 أعلق 5 كتلٍ في أماكن مختلفة على ميزان الأعداد، بحيث تبقى الذراع المتحركة متوازنة (أفقية) بعد تعليق الكتل.

2 ما وجه الشبه بين نقطة منتصف الذراع الأفقية والوسط الحسابي؟

3 أضيف 3 كتلٍ أخرى بحيث تمثل إحدى هذه الكتل قيمة متطرفة وتبقى الذراع المتحركة متوازنة.

عرض النتائج:

أعرض وأعضاء مجموعتي ميزان الأعداد أمام الصف، ثم أعلق عليه 4 كتلٍ بحيث لا تكون الذراع متوازنة، وأطلب من بقية طلبة الصف تحديد موقع الكتلة الخامسة التي لو أضيفت ستوازن الذراع، ثم أضيفها لأتحقق من إجاباتهم.



أستكشف

أنظر إلى التمثيل بالأعمدة المجاور، ثم أجيب؟

(1) أجد مجموع أطوال الخطوط الحمراء، ثم أجد مجموع أطوال الخطوط الخضراء، ماذا ألاحظ؟

(2) ماذا يمثل ارتفاع الخط المنقط بالنسبة لعدد الهواتف المباعة؟

(3) إذا بيع يوم الخميس 50 هاتفًا، ما تأثير ذلك على الخط المنقط؟


فكرة الدرس

أحسب الوسط الحسابي لبيانات مفردة أو منظّمة في جداول تكرارية.

المصطلحات

مقاييس النزعة المركزية، الوسط الحسابي، القيمة المتطرفة.

تُسمى القيمة التي تصف مركز البيانات **مقياس نزعة مركزية** (measure of central tendency)، وأكثر مقاييس النزعة المركزية استخدامًا **الوسط الحسابي** (mean)، وهو القيمة التي مجموع المسافات بينها وبين القيم الأكبر منها يساوي مجموع المسافات بينها وبين القيم الأصغر منها. في الشكل أدناه، العدد 7 هو الوسط الحسابي للبيانات.



ويمكن إيجاد الوسط الحسابي أيضًا بجمع القيم ثم قسمة الناتج على عددها.

مثال 1

أجد الوسط الحسابي للبيانات 18, 19, 3, 23, 22 ثم أرسم مخططاً لأبين أن مجموع المسافات بين الوسط الحسابي والقيم الأكبر منه يساوي مجموع المسافات بينه وبين القيم الأصغر منه.


$$\frac{18+19+3+23+22}{5} = \frac{85}{5} = 17$$

أجمع القيم، وأقسّمها على عددها
أبسط

إذن، الوسط الحسابي يساوي 17

الوحدة 8

عند تمثيل البيانات بالنقاط ألاحظ أن مجموع المسافات بين العدد 17 والقيم الأكبر منه يساوي 14، ومجموع المسافات أيضًا بين العدد 17 والقيمة الأصغر منه يساوي 14 مثلما في الشكل أدناه.



أتدقق من فهمي:



أجد الوسط الحسابي للبيانات 45, 52, 40, 39, 41, 50, 48، ثم أرسم مخططاً لأبين أن مجموع المسافات بين الوسط الحسابي والقيم الأكبر منه يساوي مجموع المسافات بينه وبين القيم الأصغر منه.

تسمى القيمة الأكبر بكثير أو الأصغر بكثير من بقية البيانات **قيمة متطرفة** (extreme value). ألاحظ في المثال السابق أن العدد 3 أصغر كثيراً من بقية البيانات؛ إذن، فهو قيمة متطرفة. ألاحظ أيضاً أن العدد 3 أدى إلى إزاحة الوسط الحسابي نحوه (إلى اليسار) بعيداً عن معظم القيم. إذن، فوجود القيم المتطرفة يؤثر في الوسط الحسابي، ويجعله أقل دقة عند وصف مركز البيانات.

مثال 2

أحدد القيمة المتطرفة في كل مجموعة بيانات مما يأتي، وأصف أثرها في الوسط الحسابي:

1 93, 81, 94, 43, 89, 92, 94, 99

القيمة 43 أصغر بكثير من بقية القيم؛ لذا، فهي متطرفة، وعند حساب الوسط الحسابي فإن هذه القيمة المتطرفة سوف تؤثر في قيمته وتسحبها نحوه (لأسفل) بحيث تصبح أقل من معظم القيم.

2 $8\frac{1}{2}$, $6\frac{5}{8}$, $3\frac{1}{8}$, $5\frac{3}{4}$, $6\frac{5}{8}$, $5\frac{5}{8}$, $19\frac{1}{2}$, $4\frac{7}{8}$

القيمة $19\frac{1}{2}$ أكبر بكثير من بقية القيم؛ لذا، فهي متطرفة، وعند حساب الوسط الحسابي فإن هذه القيمة المتطرفة سوف تؤثر في قيمته وتسحبها نحوه (لأعلى) بحيث تصبح أعلى من معظم القيم.



3 43, 37, 35, 30, 41, 23, 33, 31, 82, 21

4 68, 55, 70, 6, 71, 58, 81, 82, 63, 79

يمكن أيضًا حساب الوسط الحسابي للبيانات المنظمة في جداول تكرارية.

مثال 3: من الحياة



سأل أنس 10 طلاب في ساحة المدرسة عن مقاس أحذيتهم، ونظم البيانات في الجدول التكراري المجاور. أجد الوسط الحسابي لهذه البيانات.

الطريقة 1:

أجد مجموع القيم بتكرار جمع كل منها بحسب التكرار المعطى في الجدول، ثم أقسم الناتج على عدد القيم (مجموع التكرارات).

$$\frac{30 + 30 + 32 + 32 + 32 + 34 + 36 + 36 + 36 + 36}{10} = \frac{334}{10} = 33.4$$

أجمع القيم، وأقسمها على عددها
أبسط

إذن، الوسط الحسابي يساوي 33.4

الطريقة 2:

يمكن إيجاد مجموع القيم بضرب كل منها في تكرارها. أضيف عمودًا إلى الجدول لأكتب فيه نواتج الضرب وصفًا لأكتب فيه المجموع.

أقسم مجموع نواتج الضرب على
مجموع التكرارات

$$\frac{334}{10} = 33.4$$

إذن، الوسط الحسابي يساوي 33.4، وهي القيمة نفسها التي حصلت عليها في الطريقة الأولى.

مقاس الحذاء	التكرار
30	2
32	3
34	1
36	4

المقاس	التكرار	التكرار × المقاس
30	2	$30 \times 2 = 60$
32	3	$32 \times 3 = 96$
34	1	$34 \times 1 = 34$
36	4	$36 \times 4 = 144$
المجموع	10	334

الوحدة 8

أتحقق من فهمي:



عدد أفراد الأسرة	التكرار
3	1
4	3
5	5
6	4
7	3

سألت سارة 16 طالبة في الصف السابع عن عدد أفراد أسرته كل منهن، ونظمت البيانات في الجدول التكراري المجاور. أجد الوسط الحسابي لهذه لعدد أفراد الأسرة.

إذا علمت قيمة الوسط الحسابي فإنه يمكن استعمالها لحساب قيمة مجهولة في البيانات.

مثال 4: من الحياة



نقود: لدى باسمة 6 قطع نقدية دائرية من بلدان متنوعة. إذا كانت أقطار 5 من هذه القطع بالسنتيمترات 2.9, 5.1, 3.1, 4.9, 2.4 والوسط الحسابي لأقطار القطع النقدية الستة معاً يساوي 3.5 cm، فما قطر القطعة النقدية السادسة؟



الخطوة 1 أجد مجموع أقطار القطع النقدية الستة بضرب الوسط الحسابي في عدد القطع النقدية جميعها.

$$3.5 \times 6 = 21 \text{ cm}$$

2.4	4.9	3.1	5.1	2.9	?
21					
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

الخطوة 2 أترح مجموع أقطار القطع النقدية الخمسة المعلومة من المجموع الذي حصلت عليه في الخطوة السابقة.

$$21 - (2.4 + 4.9 + 3.1 + 5.1 + 2.9) = 2.6$$



إذن، طول القطعة النقدية السادسة يساوي 2.6 cm

أتحقق من فهمي:



تتكون عائلة سعيد من 8 أشخاص، والوسط الحسابي لأطوالهم جميعاً يساوي 150 cm إذا كانت أطوال 7 أشخاص من العائلة بالسنتيمترات هي 170, 186, 114, 96, 178, 143, 135 فما طول الشخص الثامن؟

أَجِدُ الوَسْطَ الحِسابِيَّ لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ بَياناتٍ مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ أَرَسِّمُ مَخْطُطًا لِأَبْيَنَ أَنَّ مَجْمُوعَ المَسافاتِ بَيْنَ الوَسْطِ الحِسابِيَّ وَالْقِيَمِ الأكبرِ مِنْهُ يَساوي مَجْمُوعَ المَسافاتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِيَمِ الأصْغَرِ مِنْهُ:



أُحَدِّدُ القِيَمَةَ المَتَطَرِّفَةَ فِي كُلِّ مَجْمُوعَةٍ بَياناتٍ مِمَّا يَأْتِي، وَأَصِفُ أَثَرَهَا فِي الوَسْطِ الحِسابِيَّ:

- 3 97, 105, 88, 116, 92, 100, 97, 22, 100
- 4 -15, 13, -7, -9, -11, -13, -14, -14
- 5 1.2, 2.3, -0.9, 0.8, 7.9, 0, 2.6, 1.7, 3.2

التكرار	عدد الأسماك
15	18
9	19
3	20
4	21
13	22
6	23

يَبَيِّنُ الجَدُولُ التَّكَرُّرِيَّ المَجاورُ عَدَدَ أَسماكِ الزينة في 50 حوضًا زجاجيًا معروضةً لِلبيعِ فِي أَحَدِ المَحالِّ. أَجِدُ الوَسْطَ الحِسابِيَّ لِعَدَدِ الأَسماكِ فِي الأَحْواضِ الزجاجية.



7 إذا كَانَ الوَسْطُ الحِسابِيُّ لِلْقِيَمِ 149, 145, Δ, 142, 161 يَساوي 145، فَأَجِدُ قِيَمَةَ Δ.

8 إذا كَانَ الوَسْطُ الحِسابِيُّ لِلْقِيَمِ 14, 32, □, 77, -17, -52 يَساوي 11، فَأَجِدُ قِيَمَةَ □.

الوحدة 8

أكتشف الخطأ: يعمل خالد مهندساً، وقد أحصى عدد الحُفَر في عددٍ من الشوارع الفرعية، ونظّمها في الجدول التكراري الآتي:

عدد الحُفَر في الشارع	5	6	7	8	9
التكرار	5	8	6	3	5

حسب خالد الوسط الحسابي لعدد الحُفَر في الشوارع باتّباع الخطوات الآتية:

$$5 + 8 + 6 + 3 + 5 = 27$$

إذن، الوسط الحسابي يساوي $\frac{27}{5}$

هل إجابته خالد صحيحة؟ أبرّر إجابتي.

أكتب تعليمات واضحة يمكن أن يستعملها خالد لإيجاد الوسط الحسابي بشكل صحيح.

عدد الأهداف التي أحرزها فريق كرة القدم في 25 مباراة

عدد الأهداف	التكرار
0	4
1	7
2	6
3	3
4	3
5	1
المجموع	25

الوسط الحسابي لعدد الأهداف يساوي 1.88

أكتشف الخطأ: لم يحضر هيثم حصة الرياضيات؛ لأنّه ذهب ليمثّل المدرسة في المسابقة العلمية، لكنّه نسخ دفتر زميله. في اليوم التالي شاهد المعلم دفتر هيثم، فأخبره أنّه أخطأ في نسخ أحد أعداد الجدول المجاور، لكنّ

العددين 25 و 1.88 صحيحان. ما العدد الذي أخطأ هيثم في نسخه؟ أبرّر إجابتي.

نحلّ: إذا كان الوسط الحسابي لعددين يساوي 3، والوسط الحسابي لثلاثة أعداد أخرى يساوي 7، أجد الوسط الحسابي للأعداد الخمسة معاً. أبرّر إجابتي.

أكتب: كيف أجد الوسط الحسابي لبيانات ممثّلة في جدول تكراري؟

مهارات التفكير العليا

معلومة

تتكوّن حُفَر الشوارع نتيجة الماء الموجود في بنية تربة الشارع الذي يُضعف تربة المسار، ثمّ تُجهد حركة المرور فوق المنطقة المصابة سطح الأسفلت وتكسره.

إرشاد

أجد أولاً مجموع عدد الأهداف باستعمال القيمتين اللتين أعلم أنّهما صحيحتان.

أستكشفُ

تمثّل الأعداد الآتية كتلّ غزلانٍ الرّيم في حديقة حيواناتٍ.

(1) ما الكتلة التي تتوسط البيانات

(2) ما عدد الكتل الأكبر منها؟

38, 22, 41, 29, 36, 40, 33



فكرة الدرس

أحسب الوسيطِ وَالْمِنْوَالِ وَالْمَدَى، وأحدد المقياس الأنسب لوصف البيانات.

المصطلحات

الوسيط، الْمِنْوَالُ، الْمَدَى

تعلمتُ في الدرس السابق الوسيط الحسابي وكيفية استعماله لوصف مركز البيانات، ويمكن أيضًا وصف مركز البيانات باستخدام الوسيط (median)، وهو العدد الأوسط في البيانات المرتبة تصاعديًا أو تنازليًا عندما يكون عددها فرديًا، أو هو الوسيط الحسابي للعددين الأوسطين عندما يكون عدد البيانات زوجيًا.

أفكر

هل يتأثر الوسيط بالقيم المتطرفة؟

عدد البيانات زوجي

2, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 15

الوسيط هو $\frac{5+9}{2} = 7$

عدد البيانات فردي

1, 3, 3, 6, 7, 8, 9

الوسيط يساوي 6

يمكن أيضًا وصف مركز البيانات باستخدام المنوال (mode)، وهو القيمة الأكثر تكرارًا في البيانات.

مثال 1: من الحياة



الرفق بالحيوان: يبين الجدول المجاور عدد الحيوانات المريضة التي عالجتها جمعية لرعاية الحيوانات في 8 أشهر. أجد الوسيط والمنوال لهذه البيانات.

لحساب الوسيط أتبع الخطوات الآتية:

الخطوة 1 أرّب البيانات تصاعديًا.

29, 38, 38, 44, 47, 50, 56, 94

عدد الحيوانات المريضة			
29	44	50	38
47	38	56	94

الوحدة 8

الخطوة 2 أحدد موقع الوسيط.

بما أن عدد البيانات زوجي فإن الوسيط يقع بين العددين الأوسطين. أحدد العددين الأوسطين، ثم أحسب الوسيط الحسابي لهما.

29, 38, 38, 44, 47, 50, 56, 94

$$\frac{44 + 47}{2} = 45.5$$

إذن، الوسيط يساوي 45.5

لإيجاد المنوال، أحدد القيمة الأكثر تكرارًا وهي 38. إذن، المنوال يساوي 38

تحقق من فهمي:

تمثل البيانات الآتية عدد السعرات الحرارية في عدد من حبات الفاكهة. أجد الوسيط والمنوال لهذه البيانات.

38, 50, 44, 29, 94, 56, 38, 47

معلوم أن الوسيط الحسابي والوسيط والمنوال مقياس نزع مركزي تصف مركز البيانات بطرائق مختلفة، إلا أنها لا تقدم أي معلومة حول تشتت البيانات وتباُعدها. ولقياس مقدار تشتت البيانات وتباُعدها نستعمل المدى (range) وهو يساوي الفرق بين أكبر قيم البيانات وأصغرها. وتدل القيمة الكبيرة للمدى على أن البيانات متباعدة، أما القيمة الصغيرة له فتدل على أن البيانات قريبة من بعضها بعضًا.

مثال 2: من الحياة



يبين الجدول المجاور كتل الأطفال الذين ولدوا في أحد المستشفيات يومي الثلاثاء والأربعاء بالكيلوغرام.

أجد مدى كتل المواليد في كل يوم، ثم أحدد اليوم الذي كانت فيه كتل المواليد أكثر تجانسًا.

الأربعاء	الثلاثاء
4.8 3.8 2.7	4.6 3.8 2.8
4.2 1.9 3.1	3.9 3.5 3.3
3.1 3.9	2.9 4.1

الثلاثاء: أكبر قيم البيانات يوم الثلاثاء هي 4.6، وأصغر القيم هي 2.9، إذن المدى هو: $4.6 - 2.9 = 1.7$

الأربعاء: أكبر قيم البيانات يوم الأربعاء هي 4.8، وأصغر القيم هي 1.9، إذن المدى هو: $4.8 - 1.9 = 2.9$

إذن كتل الأطفال الذين ولدوا يوم الثلاثاء أكثر تجانسًا، لأن قيمة المدى لكتلهم أقل.

تحقق من فهمي:




يبين الجدول المجاور أسعار عبوات عطور بالدينار في محلين مختلفين. أجد مدى أسعار عبوات العطور في كل محل، ثم أحدد المحل الذي فيه أسعار عبوات العطور أكثر تجانسًا.

المحل الثاني	المحل الأول
78 45 50	88 44 55
95 65 61	23 40 140
40 75	50 35

في بعض الأحيان يكون استخدام أحد المقاييس مناسباً أكثر من استخدام المقاييس الأخرى، وذلك بحسب نوع البيانات (عددية أو غير عددية) أو بحسب تباعدها واحتوائها على قيم متطرفة.

مثال 3



أحدّد ما إذا كان يجب استعمال الوسط الحسابي أو الوسيط أو المنوال أو المدى في كلّ من المواقف الآتية:

1

تحديد لون الأفاعي السامة الأكثر شيوعاً:

ألوان الأفاعي بيانات غير عددية، لذلك لا يمكن وصفها باستعمال الوسط الحسابي أو الوسيط أو المدى. إذن، المقياس الوحيد الذي يمكن استعماله لوصف هذه البيانات هو المنوال. منوال هذه البيانات هو اللون الأخضر؛ لأنه الأكثر تكراراً.

2

تحديد الرياضي الذي رمياته أكثر تجانساً

في لعبة رمي الرمح:

الرميات القريبة من بعضها بعضاً هي الأكثر تجانساً. استعمال المدى لأحد مقدار تباعد الرميات.

3

وصف مركز القيم في الشكل الآتي والتي تمثل رواتب عشرة موظفين، أحدهم مدير.



تحتوي البيانات قيمة متطرفة إلى أقصى اليمين، ويبدو أنها راتب المدير. إذن، استعمال الوسيط أنسب في هذه الحالة من استعمال الوسط الحسابي؛ لأنه لا يتأثر بالقيم المتطرفة للمناقشة.

أتعلم

يمكن استعمال كلمة المتوسط لدلالة على مقياس النزعة المركزية (الوسط، والوسيط، والمنوال).

أتحقق من فهمي:

4

تريد مريم أن تعرف متوسط لون العيون في صفها.

5

يريد ريان إيجاد متوسط درجات زملائه في امتحان مادة العلوم.

15 18 15 12 15 17 14 15 15

الوحدة 8

أندرب وأحل المسائل

طقس: قاست شروق كمية هطل الأمطار في حديقة منزلها خلال 14 يومًا من شهر كانون الأول، وسجلت القيم كما يأتي:

1.5 cm	3.9 cm	0.0 cm	0.7 cm	0.0 cm
5.9 cm	2.4 cm	3.4 cm	4.7 cm	0.0 cm
2.1 cm	4.5 cm	1.7 mm	3.1 cm	

أجد:


- الوسيط
- الوسط الحسابي
- المِنوال
- المَدَى

أفكر

أيُّهُما يتأثر بالقيم المتطرفة:
الوسط الحسابي، أم
الوسيط؟

أسرة: سألت أسماء بعض طالبات صفها عن عدد إخوانهن، ثم مثلت الإجابات كما في الشكل أدناه. أجد الوسيط والوسط الحسابي، ثم أحدد أيهما أفضل لوصف مركز هذه البيانات.

عدد الأخوة الذكور



عبدالله وكنان سباحان يتنافسان دائماً في البطولات، ويبيّن الجدول الآتي ملخصاً للنتائج التي أحرزها في آخر 10 بطولات. بناءً عليه، أكمل الجمل الآتية:

	الوسيط (بالتواني)	المَدَى (بالتواني)
عبدالله	72.3	3.9
كنان	71.6	7.2

..... أسرع بالمتوسط من

7 النتائج التي يحرزها منسجمة أكثر من النتائج التي يحرزها

أحدّد ما إذا كان يجب استعمال الوسط الحسابي أم الوسيط أم المنوال أم المدى في كلٍّ من المواقف الآتية:

8 تريد منار أن تجد مركز القيم التالية والتي تمثل أعمار 7 من أفراد عائلتها:

12 34 25 18 32 88 5

9 يريد معلم الرياضيات تحديد الدرجة التي نصف درجات الطلبة أقل منها.

أحدّد القيم الممكنة جميعها للعدد المجهول على البطاقة السابعة في كلٍّ من الحالات الآتية:

13	12	18	16
17	10	?	

10 إذا كان وسيط الأعداد السبعة يساوي 14

11 إذا كان وسيط الأعداد السبعة يساوي 16

12 إذا كان وسيط الأعداد السبعة يساوي 13 والمدى يساوي 9

مهارات التفكير العليا

إرشاد

ألاحظ أن عدد البيانات زوجي؛ لذا، فإن الوسيط يساوي الوسط الحسابي للعددين الأوسطين.

13 **تبرير:** إذا كان الوسيط للقيم المرتبة تصاعدياً 12, 8, $\square$, Δ , 3, 2 يساوي 6، فأجد القيم الممكنة جميعها لكلٍّ من Δ و $\square$.

14 **مسألة مفتوحة:** أكتب مجموعة أعداد وسطها الحسابي 28، ووسطها 29، ومداه 18.

15 **مسألة مفتوحة:** أصف موقفاً حياتياً لا يكون فيه استعمال الوسط الحسابي مناسباً لوصف مركز البيانات. أحدّد المقياس الأنسب لوصف هذه البيانات.

16 أكتب مثلاً لبيانات يكون فيها الوسط يساوي الوسيط ويساوي قيمة المنوال

17 **أكتب** كيف أحدّد المقياس الأنسب لوصف البيانات؟



فكرة الدرس


أمثل البيانات بالساق والورقة.
أختبر صحة فرضية بالاعتماد على
بيانات مُعطاة.

المصطلحات

مخطط الساق والورقة، الفرضية.

أستكشف

رسمت رشا الصورة المجاورة وقالت
لزميلاتها: (إنّ فيها 15 عددًا من
منزليتين). ما هذه الأعداد؟



مخطط الساق والورقة (stem-and-leaf diagram) هو طريقة لتنظيم البيانات تقسم فيها كل قيمة في البيانات إلى جزئين هما: الساق وهو الرقم (أو الأرقام) الذي في المنزلة الكبرى، والورقة وهي الأرقام الأخرى.

15, 16, 21, 23, 23, 26, 26, 30, 32, 41

الساق	الورقة
1	5 6
2	1 3 3 6 6
3	0 2
4	1

طريقة تمثيل
العدد 32

مثال 1: من الحياة



تمثل الأعداد الآتية كتل عدد من طلبة الصف التاسع. أمثل الكتل باستعمال مخطط

الساق والورقة:

46	52	71	67	55	72	63	60	48	54
49	61	56	58	52	64	48	45	65	57

أجد أكبر وأصغر عدد في البيانات، ثم أحدد الرقم الذي في المنزلة الكبرى لكل منهما:

أكبر عدد 72، والرقم الذي في منزلته الكبرى 7، وأصغر عدد 45، والرقم الذي في منزلته الكبرى 4

الساق	الورقة
4	
5	
6	
7	

أرسم خطأ رأسيًا وآخر أفقيًا، وأكتب كلمتي (الساق) و(الورقة) كما في

الشكل المجاور، ثم أكتب السيقان من 4 إلى 7

الساق	الورقة
4	6 8 9 8 5
5	2 5 4 6 8 2 7
6	7 3 0 1 4 5
7	1 2

الخطوة 3 أكتب الأوراق المناظرة لكل ساق على الجانب الأيمن من الخط، فمثلاً للعدد 46 أكتب الرقم 6 إلى يمين الرقم 4. أكرّر الورقة بعدد مرات ظهورها في البيانات.

الدرس	الورقة
4	5 6 8 8 9
5	2 2 4 5 6 7 8
6	0 1 3 4 5 7
7	1 2

الخطوة 4 أرتب الأوراق تصاعدياً، ثم أضع مفتاحاً يوضح كيف تُقرأ البيانات.

المفتاح: $4|5 = 45$

أتحقق من فهمي:

تمثل الأعداد الآتية أطوال 16 طفلاً زاروا طبيب الأطفال في أحد الأيام، أمثل البيانات باستعمال مخطط الساق والورقة:

58 cm 67 cm 91 cm 50 cm 72 cm 49 cm 61 cm 86 cm

72 cm 83 cm 97 cm 45 cm 70 cm 99 cm 57 cm 63 cm

عند تمثيل البيانات بمخطط الساق والورقة فإنه يمكن تفسيرها ووصف توزيعها، ويمكن أيضاً إيجاد الوسيط والمنوال لها بسهولة؛ لأنها مرتبة تصاعدياً.

الساق	الورقة
0	1 5
1	0 3 7
2	5 7
3	0 1 2 2 3 3 5 7 9 9
4	5 7
6	3 8 9

المفتاح: $0|1 = 1$

مثال 2

يمثل مخطط الساق والورقة المجاور أعمار ركاب حافلة سياحية:

1 ما عدد الركاب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة؟

تمثل قيم الساق 0 و 1 و 2 الأعمار الأقل من 30، وعدد الأوراق التي تقابلها يساوي 7، إذن، عدد الركاب الذين يقل عمرهم عن 30 سنة يساوي 7

الساق	الورقة
0	1 5
1	0 3 7
2	5 7
3	0 1 2 2 3 3 5 7 9 9
4	5 7
6	3 8 9

الوحدة 8

الساق	الورقة
0	1 5
1	0 3 7
2	5 7
3	0 1 2 2 3 3 5 7 9 9
4	5 7
6	3 8 9

أجد المدى.

أكبر قيم البيانات 69، وأصغر القيم 1

$$\text{المدى} = 69 - 1 = 68$$

أتحقق من فهمي:

يمثل مخطط الساق والورقة المجاور عدد النقاط التي أحرزها فريق

كرة السلة المدرسي في عدد من المباريات:

ما عدد المباريات التي أحرز فيها الفريق أكثر من 20 نقطة؟

أجد الوسط.

أجد المدى.

أصف توزيع عدد النقاط التي أحرزها الفريق.

الساق	الورقة
0	2
1	2 2 3 5 8
2	0 0 1 1 3 4 6 6 6 8 9
3	0 0 1

$$\text{المفتاح: } 1|2 = 12$$

الفرضية (hypothesis) هي توقع حول ظاهرة معينة نريد أن نختبر صحتها بجمع بيانات مناسبة، وتمثيلها، وتحليلها، ثم كتابة استنتاجات بالاعتماد على البيانات.

اختبار الفرضيات

مفهوم أساسي

عند دراسة ظاهرة ما فإننا عادة نتبع المراحل الأربعة الآتية:

المرحلة (1): نضع فرضية حول الظاهرة.

المرحلة (2): نجمع بيانات مناسبة.

المرحلة (3): نمثل البيانات تمثيلاً واضحاً، ونجري الحسابات (مثلاً: نحسب الوسط الحسابي أو المدى).

المرحلة (4): نكتب استنتاجات ومن خلالها نقبل الفرضية أو نرفضها.

مثال 3: من الحياة

كرة قدم: يريد مدرب فريق كرة قدم أن يستقصي اللياقة البدنية للاعبين

فريقه، فبدأ بوضع الفرضية الآتية:

يمكن لأقل من نصف اللاعبين أن يقطعوا المسافة

حول الملعب ركضاً في أقل من 60 ثانية.

الساق	الورقة
4	5 6 7 8 9 9
5	0 1 2 2 4 5 6 7 8 9 9
6	1 1 2 3 3 3 4 5 5 6 7 8
7	0 2 5

$$\text{المفتاح: } 4|5 = 45$$

الساق	الورقة
4	5 6 7 8 9 9
5	0 1 2 2 4 5 6 7 8 9 9
6	1 1 2 3 3 3 4 5 5 6 7 8
7	0 2 5

المفتاح: $4|5 = 45$

جمع المدرب بيانات بتسجيل الزمن الذي استغرقه كل لاعب ليقطع المسافة حول الملعب ركضاً، ومثلها في مخطط الساق والورقة المجاور. بناءً على هذه البيانات، هل الفرضية التي وضعها المدرب صحيحة؟

عدد اللاعبين يساوي 32، وقطع 17 منهم المسافة في أقل من 60 ثانية، وهذا العدد أكبر من نصف عدد اللاعبين. إذن، أكثر من نصف عدد اللاعبين استطاع أن يقطع المسافة في زمن أقل من 60 ثانية؛ لذا، فإن الفرضية التي وضعها المدرب ليست صحيحة.

أتحقق من فهمي:

أكتب استنتاجاً حول صحة الفرضية الآتية اعتماداً على البيانات:

أقل من رُبُع اللاعبين يحتاجون إلى 70 ثانية على الأقل ليقطعوا المسافة حول الملعب ركضاً.

الساق	الورقة
7	5 9
8	0 2 6 7 7
9	1 7 8
10	2 6

المفتاح: $8|2 = 82$

أكتب جميع الأعداد الممثلة في مخطط الساق والورقة المجاور.

أَتَدَرَّبُ
وأحل المسائل

1

أمثل كل مجموعة بيانات مما يأتي باستعمال مخطط الساق والورقة:

2 56 57 59 61 64 65 67 69
70 75 77 77 79 81 82

3 19 21 45 35 53 26 38
27 36 34 52 35 33 41

4 13.1 12.5 14.7 12.8 13.6 13.4
15.2 12.5 13.4 14.3 14.8 13.9

الوحدة 8

معلومة

يُفضَّل تناول وجبات خفيفة وغير دسمة قبل ممارسة رياضة الجري ولا تحتوي على نسبة عالية من السُّعرات الحراريّة.

5

رياضة: جمع سَعْد معلومات عن عدد الدقائق اليوميّ التي يقضيها 24 طالبًا من طلبة صفّه في ممارسة رياضة الجري، ونظّم البيانات في مخطط الساق والورقة المجاور. أكتب فرضية حول عدد الدقائق اليوميّ التي يقضيها الطلبة في ممارسة هذه الرياضة، وأختبر صحتها باستعمال البيانات.

الساق	الورقة
0	0 7
1	2 3 5 5 9
2	0 1 2 4 5 6 7
3	1 2 6 7 8 9
4	1 3 5
5	2

المفتاح: $1|2 = 12$

6

وضعت مريم الفرضية الآتية، وتريد أن تختبر صحتها:

وسيط أطوال طالبات الصفّ العاشر 155 cm

الساق	الورقة
13	6 9
14	3 4 6 6
15	2 2 3 4 6 7 8 9
16	0 1 1 2 4 5 5 6 7 8
17	1 3 5 6 6 8
18	2 3 4 5
19	1

المفتاح: $13|4 = 134$

جمعت مريم بيانات بتسجيل أطوال عينة عشوائية تحتوي على 35 طالبة في الصفّ العاشر، ثمّ مثلتها في مخطط الساق والورقة المجاور. بناءً على هذه البيانات، هل الفرضية التي وضعتها مريم صحيحة؟

معلومة

توجد أطول حشرة في العالم غربيّ الصين، ويبلغ طولها 62.4 cm

7

ما عدد الحشرات التي طولها 4.5 cm؟

8

ما نسبة الحشرات التي طولها أكبر من 3.8 cm؟

9

ما مدى أطوال الحشرات؟

10

أجد المنوال لأطوال الحشرات.

11

أجد الوسيط لأطوال الحشرات.


الساق	الورقة
1	2 5 6 8 9
2	1 3 5 6 7 8
3	1 1 2 3 5 6 7 9
4	1 5 5 5 6 7
5	0 4 5 5 8

المفتاح: $1|2 = 1.2 \text{ cm}$



كمية الأمطار (مم)

خلال المنخفض الجوي



طقس: تبين الصورة المجاورة كميات الأمطار التي هطلت في مختلف مناطق المملكة بالمليمتر خلال أحد المنخفضات الجوية:

أمثل البيانات بمخطط الساق والورقة.

أجد الوسيط والمنوال والمدى لكميات الأمطار التي هطلت.

12

13

مهارات التفكير العليا

أكشف الخطأ: رصدت منار أطوال

16 نبتة في حديقتها ومثلتها في مخطط الساق والورقة المجاور. هل مثلت منار درجات الحرارة تمثيلاً صحيحاً؟ أبرر إجابتي.

14

15	2	4							
16	0	6	3	9					
17	5	8	2	1	0				
18	5	7	1	4	8	7			
19	6	1	4						

تبرير: تقدم طلبة الصف السابع لإختباري رياضيات وعلوم، ويبين مخطط الساق والورقة المجاور درجاتهم في اختبار الرياضيات. إذا كان الوسيط الحسابي والمدى لدرجاتهم في اختبار العلوم كما يأتي: الوسيط الحسابي: 68% المدى: 31% فأقارن بين درجات الطلبة في الاختبارين، وأبرر إجابتي.

15

إرشاد

أجد الوسيط الحسابي والمدى لدرجات الطلبة في اختبار الرياضيات.


الساق	الورقة
4	5
5	0 2 6
6	4 5 6 6 8 9
7	0 1 4 7 8
8	
9	2
المفتاح: 4 5 = 45	

كيف أجد الوسيط لبيانات ممثلة بمخطط الساق والورقة؟

أكتب

16

أستكشفُ



(1) ما الكسر الذي يمثل الكرات الخضراء في الكيس المجاور؟

(2) إذا أغمض حسن عينيه واختار كرة عشوائياً من الكيس، فهل فرصة اختيار كرة برتقالية مساوية لفرصة اختيار كرة صفراء؟



فكرة الدرس

أحسب احتمالات وقوع الحوادث.

المصطلحات

الفضاء العيني، متساوية الاحتمال، غير متساوية الاحتمال، الحادث، احتمال الحادث، الجدول ذو الاتجاهين.

الفضاء العيني (sample space) مجموعة النواتج المتوقعة حدوثها عند إجراء تجربة عشوائية ما. لكل من مؤشرَي القرصين الآتيين 5 نواتج ممكنة، لذلك فإن الفضاء العيني هو $\{1, 3, 5, 7, 9\}$.




• عند تدوير مؤشر القرص A يكون لكل عدد فرصة الظهور نفسها، لذلك تُسمى نواتج هذه التجربة نواتج **متساوية الاحتمال** (equally likely) ولذلك تسمى تجربة عادلة.

• عند تدوير مؤشر القرص B تكون فرص ظهور الأعداد مختلفة، لذلك تُسمى نواتج هذه التجربة نواتج **غير متساوية الاحتمال** (not equally likely).


الحادث (event) هو ناتج واحد أو أكثر من نواتج التجربة العشوائية، ويرمز له بأحد الأحرف مثل A. **واحتمال الحادث (event probability)** هو فرصة وقوعه، ويرمز له بالرمز $P(A)$ ، فإذا كانت نواتج التجربة العشوائية متساوية الاحتمالية فإن احتمال وقوع أي حادث يساوي نسبة عدد عناصر الحادث إلى عدد النواتج الممكنة جميعها (الفضاء العيني).

$$P(A) = \frac{\text{عدد عناصر الحادث}}{\text{عدد عناصر الفضاء العيني}}$$

تعني النسبة 0% أنَّ الحادث لا يمكن أن يقع، أمَّا النسبة 100% فتعني أنَّ الحادث سوف يقع بالتأكيد. ويكون احتمال وقوع أيِّ حادثٍ بين هاتين النسبتين كما يظهر في مقياس الاحتمال أدناه:



مثال 1



لدى حنين كيسٌ يحتوي على قطع حلوى بألوانٍ مختلفة، إذا أغمضت حنين عينيها وسحبت قطعة حلوى عشوائيًا من الكيس، فأجد كلاً مما يأتي:


1 احتمال سحب قطعة حلوى حمراء:



عدد النواتج الممكنة (الفضاء العيني) لهذه التجربة العشوائية يساوي 12 وعدد عناصر هذا الحادث يساوي 5؛ لأنَّ الكيس فيه 5 قطع حلوى حمراء.

$$P(\text{حمراء}) = \frac{5}{12}$$

2 احتمال سحب قطعة حلوى خضراء أو برتقالية:



عدد عناصر هذا الحادث يساوي 4؛ لأنَّ الكيس فيه 3 قطع حلوى خضراء وقطعة حلوى برتقالية واحدة، ومجموعها معاً يساوي 4.

$$P(\text{خضراء أو برتقالية}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$


3 احتمال سحب قطعة حلوى ليست بنفسجية:



عدد عناصر هذا الحادث يساوي 11؛ لأنَّ الكيس يحتوي 11 قطعة حلوى ليست بنفسجية:

$$P(\text{ليست بنفسجية}) = \frac{11}{12}$$

الوحدة 8



4 احتمال سحب قطعة حلوى زرقاء:

عدد عناصر هذا الحادث يساوي 0؛ لأن الكيس لا يحتوي على قطعة حلوى زرقاء.

$$P(\text{زرقاء}) = \frac{0}{12} = 0$$

أتحقق من فهمي:



6 احتمال سحب قطعة حلوى صفراء أو خضراء.

5 احتمال سحب قطعة حلوى خضراء.

8 احتمال سحب قطعة حلوى سوداء.

7 احتمال سحب قطعة حلوى ليست حمراء.

إن احتمال اختيار العدد 4 من مجموعة الأعداد الآتية يساوي $\frac{1}{10}$ ، ويمكن أن نكتب هذا الاحتمال على الصورة 0.1 أو 10%

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

لكن إذا أردنا أن نحسب احتمال عدم اختيار العدد 4 فإن ذلك يعني احتمال اختيار أحد الأعداد 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 والذي يساوي $\frac{9}{10}$ أو 0.9 أو 90%

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

ألاحظ أن $0.1 + 0.9 = 1$

لذلك فإن $0.9 = 1 - 0.1$

احتمال عدم وقوع الحادث

مفهوم أساسي




إذا كان احتمال وقوع الحادث A يساوي $P(A)$ فإن احتمال عدم وقوع الحادث A يساوي $1 - P(A)$.

مثال 2

1


إذا كان احتمال اختيار طالب من الصف السابع لديه دراجة هوائية يساوي $\frac{6}{10}$ ، فما احتمال اختيار طالب ليس لديه دراجة هوائية؟



$$\begin{aligned} P(\text{ليس لديه دراجة}) &= 1 - P(\text{لديه دراجة}) \\ &= 1 - \frac{6}{10} \\ &= \frac{4}{10} \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

2

إذا كان احتمال أن يهطل المطر غداً يساوي 0.7، فما احتمال ألا يهطل غداً؟



$$\begin{aligned} P(\text{لا يهطل المطر}) &= 1 - P(\text{يهطل المطر}) \\ &= 1 - 0.7 \\ &= 0.3 \end{aligned}$$

أنتحق من فهمي:

3

إذا كان احتمال خسارة الفريق في المباراة 0.4، فما احتمال ألا يخسر الفريق المباراة؟

4

إذا كان احتمال اختيار طالبة من الصف السابع ترتدي نظارة يساوي $\frac{1}{9}$ ، فما احتمال اختيار طالبة لا ترتدي نظارة؟

الجدول ذو الاتجاهين (two-way table) هو جدول تكراري يعرض بيانات تنتمي إلى فئتين بينهما عناصر مشتركة، بحيث تظهر الفئة الأولى في صفوفه والفئة الثانية في أعمدته.



	أبيض	أسود	المجموع
أنثى			
ذكر			
المجموع			18

مثال 3

لدى مزارع 18 خروفاً مقسمةً كما يأتي:

9 ذكور 10 سوداء 5 إناث بيضاء

أنظم هذه البيانات في جدول ذي اتجاهين.

يجب أن يظهر الجدول ما إذا كان الخروف ذكراً أو أنثى، وإن كان أسوداً أم أبيض.

لذلك يمكن أن أستخدم صفّاً للذكور و صفّاً آخر للإناث، وأن أستخدم عموداً

للخراف البيضاء وعموداً آخر للخراف السوداء. نحتاج إلى صف وعمود إضافيين لنكتب فيهما المجموع.

الوحدة 8

	أبيض	أسود	المجموع
أنثى	5		
ذكر			9
المجموع		10	18

	أبيض	أسود	المجموع
أنثى	5	4	9
ذكر	3	6	9
المجموع	8	10	18

يمكننا الآن أن أكتب البيانات المُعطاة في السؤال في الجدول.

أستعمل المجموع الكلي للخراف لإيجاد القيم المجهولة.

✓ **أتحقق من فهمي:**

لدي أمني 32 بطاقة مقسمة كما يأتي:

15 خضراء 18 مستطيلة 5 حمراء مربعة

أنظم هذه البيانات في جدول ذي اتجاهين.

تُستعمل الجداول ذات الاتجاهين كثيرًا في حساب الاحتمالات.

مثال 4

	أزرق	أحمر	أخضر
ولد	12	8	8
بنت	8	16	8

	أزرق	أحمر	أخضر
ولد	12	8	8
بنت	8	16	8

سُئل 60 طفلًا عن اللون المفضل لهم، ونظمت إجاباتهم في الجدول المجاور:

1 إذا اختير طفل عشوائيًا، فما احتمال أن يكون ولدًا يفضل اللون الأزرق؟

عدد الأولاد الذين يفضلون اللون الأزرق يساوي 12، ومجموع عدد الأطفال الذين سُئلوا يساوي 60 ولإيجاد الاحتمال أقسم 12 على 60

$$P(\text{ولد يفضل اللون الأزرق}) = \frac{\text{عدد الأولاد الذين يفضلون اللون الأزرق}}{\text{العدد الكلي للأطفال}}$$

$$= \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$$

2

إذا اختيرَ طفلٌ عشوائيًا، فما احتمالُ أن يكونَ طفلًا يفضلُ اللونَ الأزرقَ؟

	أخضر	أحمر	أزرق
ولد	8	8	12
بنت	8	16	8

عددُ الأطفال الذين يفضلون اللونَ الأزرقَ يساوي $12+8$ ،
ولإيجاد الاحتمال، أقسمُ هذا العددَ على عددِ الطلبة جميعهم.

$$P(\text{طفلٌ يفضلُ اللونَ الأزرق}) = \frac{\text{عددُ الأطفال الذين يفضلون اللونَ الأزرق}}{\text{العدد الكلي للأطفال}} \\ = \frac{12 + 8}{60} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$$

3

إذا اختيرَ طفلٌ عشوائيًا، فما احتمالُ أن يكونَ ولدًا؟

	أخضر	أحمر	أزرق
ولد	8	8	12
بنت	8	16	8

عددُ الأولاد يساوي $12+8+8$ ، ولإيجاد الاحتمال، أقسمُ هذا
العددَ على عددِ الطلبة جميعهم.

$$P(\text{طفلٌ ولد}) = \frac{\text{عددُ الأطفال الأولاد}}{\text{العدد الكلي للأطفال}} \\ = \frac{12 + 8 + 8}{60} = \frac{28}{60} = \frac{7}{15}$$

أنتحقق من فهمي:



4

إذا اختيرَ طفلٌ عشوائيًا، فما احتمالُ أن تكونَ بنتًا تفضلُ اللونَ الأخضرَ؟

5

إذا اختيرَ طفلٌ عشوائيًا، فما احتمالُ أن يكونَ طفلًا يفضلُ اللونَ الأحمرَ؟

6


إذا اختيرَ طفلٌ عشوائيًا، فما احتمالُ ألا تكونَ بنتًا؟

أَتَدْرِبُ

وأحل المسائل



أيُّ التجارب العشوائية الآتية نواتجها متساوية الاحتمال؟



1 اختيار كرة زجاجية من وعاءٍ يحتوي على 5 كرات حمراء
و5 كرات خضراء.

1

2 تدوير مؤشر القرص المجاور.


2

الوحدة 8

3 إذا كان احتمال فوز فريق كرة القدم الذي تشجعه ناديا يساوي $\frac{3}{7}$ ، فما احتمال ألا يفوز الفريق؟

4 إذا كان احتمال أن تصل الحافلة في موعدها يساوي $\frac{8}{11}$ ، فما احتمال أن تتأخر الحافلة؟

أدار فادي مؤشر القرص المجاور، أجد احتمال أن يقف المؤشر عند:



5 قطاع أزرق.

6 قطاع يحمل رقماً سالباً.

7 قطاع لونه ليس أحمر.

8 قطاع أصفر يحمل رقماً زوجياً.


9 قطاع يحمل رقماً أكبر من 3.

10 قطاع يحمل رقماً أقل من 10.

11 قطاع أصفر أو يحمل رقماً أكبر من 3.

أكمل الجدول الآتي الذي يُظهر أعداد الأقراص الملونة المجاورة له وألوانها:

	أزرق	وردي	أصفر
A	4		2
B			
C		1	
D	0		



إذا اختير قرص واحد عشوائياً من مجموعة الأقراص في المثال السابق، فأجد:

12 احتمال اختيار حرف A مكتوباً على قرص أصفر.

13 احتمال اختيار قرص أزرق.

14 احتمال اختيار قرص مكتوب عليه الحرف C.

أتذكر

احتمال عدم وقوع الحادث

A يساوي $1 - P(A)$

أفكر

أي الحوادث في السؤال

المجاور حادث مؤكد، وأياها

حادث مستحيل؟

معلومة

الدراسة الطبية هي ممارسة علمية لها ضوابط محددة تهدف للحصول على معلومات عن مرض معين أو اختبار علاج ما.

اختير 38 شخصاً من محافظتي الزرقاء والعقبة للمشاركة في دراسة طبية، وكان توزيعهم كما يأتي، أنظم هذه البيانات في جدول ذي اتجاهين، ثم أستمه للإجابة عن الأسئلة الآتية:

18 شخصاً من محافظة الزرقاء منهم 7 رجال.

8 نساء من محافظة العقبة.

15 ما عدد الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة من محافظة العقبة؟

16 ما عدد الرجال الذين شاركوا في الدراسة؟

17 ما عدد الرجال الذين شاركوا في الدراسة من محافظة العقبة؟

	برتقال	فراولة	شكولاته
مغلفة	3	4	2
غير مغلفة	8	3	5

تبرير: يبين الجدول المجاور عدد قطع الحلوى المغلفة وغير المغلفة التي اشترتها فدوى، وهي ثلاث نكهات

مختلفة، إذا اختارت فدوى قطعة حلوى عشوائياً، فأكمل الجمل الآتية بما يناسبها مبرراً إجابتي:

18 احتمال أن تكون قطعة الحلوى التي اختيرت مغلفة وبنكهة البرتقال يساوي

19 احتمال أن تكون قطعة الحلوى التي اختيرت غير مغلفة وبنكهة الشوكولاته يساوي

20 احتمال أن تكون قطعة الحلوى التي اختيرت بنكهة الفراولة يساوي

21 يساوي 16%

22 يساوي 48% أو

23 أكتب ما الفرق بين الحادث واحتمال الحادث؟

أستكشف:

نشاط: أرمي قطعة نقدية 20 مرة، وأسجل النتائج التي أحصل عليها في الجدول المجاور.

(1) أقرن النتائج التي أحصل عليها مع نتائج زملائي. هل هي متساوية؟

(2) أجد الفرق بين عدد مرّات ظهور الكتابة وعدد مرّات ظهور الصورة.

(3) أعيد التجربة، ولكن برمي القطعة النقدية 100 مرة، ثم أجب عن السؤال 2 مرة أخرى. ماذا ألاحظ؟



فكرة الدرس

أجد الاحتمال التجريبي لوقوع حادث.

المصطلحات

الاحتمال النظري،
الاحتمال التجريبي.

تعلمت في الدرس السابق كيفية إيجاد احتمال وقوع حادث، وذلك بإيجاد نسبة عدد عناصر حادث إلى عدد النواتج الممكنة جميعها، وهو ما يُسمى **الاحتمال النظري** (theoretical probability)، أما **الاحتمال التجريبي** (experimental probability) لحادث ما فهو تقدير للاحتمال النظري بالاعتماد على عدد مرّات وقوع الحادث عند إجراء التجربة عدة مرّات.

الاحتمال التجريبي

مفهوم أساسي

• **بالكلمات:** الاحتمال التجريبي هو الاحتمال الذي يعتمد على عدد مرّات تكرار التجربة.

$$P(A) = \frac{\text{عدد مرّات وقوع الحادث}}{\text{عدد مرّات إجراء التجربة}}$$

مثال 1

ألقت نور حجر النرد المجاور 30 مرة، وسجلت الرقم الظاهر على الوجه العلوي، فكانت النتائج كما في الجدول المجاور:




الرقم	1	2	3	4	5	6
التكرار	7	8	2	3	6	4

أجد الاحتمال التجريبي لظهور الرقم 4.

$$P(A) = \frac{\text{عدد مرّات ظهور الرقم 4}}{\text{عدد مرّات إجراء التجربة}} = \frac{3}{7+8+2+3+6+4} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$$

2 أجد الاحتمال التجريبي لظهور عددٍ أولي.

$$P(A) = \frac{\text{عدد مرّات ظهور عددٍ أولي}}{\text{عدد مرّات إجراء التجربة}} \\ = \frac{8 + 2 + 6}{30} \\ = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$$



✓ أنصحك من فهمي:

دور ليث مؤشر القرص المجاور 10 مرّات، فكانت النتائج كما في الجدول الآتي:

اللون	أحمر	أصفر	أخضر
التكرار	2	5	3

3 أجد الاحتمال التجريبي لتوقّف المؤشر عند اللون الأخضر.

4 أجد الاحتمال التجريبي لتوقّف المؤشر عند اللون الأصفر.

يمكن تحديد ما إذا كانت التجربة العشوائية عادلة أم لا بمقارنة قيم الاحتمال التجريبي بقيم الاحتمال النظري المقابلة لها؛ فإذا كانت القيم المتقابلة جميعها متقاربة فإن التجربة العشوائية عادلة.

مثال 2

ألقي كلٌّ من ريم ورائد حجر نرد 30 مرة، فكانت النتائج كما في الجدولين أدناه:

رائد						
الرقم	1	2	3	4	5	6
التكرار	6	6	4	5	5	4

ريم						
الرقم	1	2	3	4	5	6
التكرار	2	3	8	3	10	4

1 أقرن بين نواتج الاحتمال النظري ونواتج الاحتمال التجريبي لتجربة كل من ريم ورائد.

الخطوة 1 أجد الاحتمال النظري لظهور كل رقم على حجر النرد:

$$P(1) = \frac{1}{6} = 0.17, \quad P(2) = \frac{1}{6} = 0.17, \quad P(3) = \frac{1}{6} = 0.17,$$

$$P(4) = \frac{1}{6} = 0.17, \quad P(5) = \frac{1}{6} = 0.17, \quad P(6) = \frac{1}{6} = 0.17$$

الوحدة 8

الخطوة 2 أجد الاحتمال التجريبي لظهور كل رقم على حجر النرد:

رائد

$$P(1) = \frac{6}{30} = 0.2, \quad P(2) = \frac{6}{30} = 0.2,$$

$$P(3) = \frac{4}{30} = 0.13, \quad P(4) = \frac{5}{30} = 0.17,$$

$$P(5) = \frac{5}{30} = 0.17, \quad P(6) = \frac{4}{30} = 0.13$$

ريم

$$P(1) = \frac{2}{30} = 0.07, \quad P(2) = \frac{3}{30} = 0.1,$$

$$P(3) = \frac{8}{30} = 0.27, \quad P(4) = \frac{3}{30} = 0.1,$$

$$P(5) = \frac{10}{30} = 0.33, \quad P(6) = \frac{4}{30} = 0.13$$

أتعلم

قد تكون أسطح حجر النرد الذي استعملته ريم غير منتظمة؛ لذا، نتج عنها عدم تساوي الاحتمال.



الخطوة 3 أقرن بين الاحتمالات النظرية والتجريبية:

ألاحظ أن قيم الاحتمال التجريبي في تجربة ريم ليست قريبة من قيم الاحتمال النظري المقابلة لها. أما قيم الاحتمال التجريبي في تجربة رائد ف قريبة من قيم الاحتمال النظري المقابلة لها.

2 أي منهما تعد تجربته العشوائية تجربة عادلة. أبرر إجابتي.

نواتج الاحتمال النظري قريبة من نواتج الاحتمال التجريبي في تجربة رائد، لذا تعد تجربته العشوائية تجربة عادلة.

أتحقق من فهمي:



يحتوي قرص دوار أربعة أقسام مرقمة من (1-4)، وعند تسجيل الرقم الذي يستقر عنده المؤشر كانت النتائج كما في الجدول الآتي:

الرقم	1	2	3	4
التكرار	10	10	9	11

أبين ما إذا كانت التجربة العشوائية عادلة أم لا.

يمكننا استعمال الاحتمال النظري في مواقف حياتية كثيرة، من أهمها بناء توقعات لأحداث يصعب حساب احتمالات وقوعها نظرياً.

مثال 3: من الحياة



يأخذ خبراء التفتيش في المطارات والموانئ البحرية عينات عشوائية من البضاعة المستوردة لاختبار مدى مطابقتها لمواصفات سوق الشراء. فإذا وجد ضابط الجودة في 5 بناطيل عيوباً مصنعيةً من 200 بنطال في أحد صناديق الشحن، فكُم بنطالاً يُتوقَّع وجود عيب مصنعي فيه في شحنة تحوي 5000 بنطال؟

أستعمل الاحتمال التجريبي لتوقع عدد البناتيل التي يوجد فيها عيوب مصنعية في الشحنة.

الخطوة 1 أجد الاحتمال التجريبي:

$$P(A) = \frac{\text{عدد مرّات وقوع الحادث}}{\text{عدد مرّات إجراء التجربة}} = \frac{5}{200} = \frac{1}{40}$$

الخطوة 2 أضرب الاحتمال التجريبي لوجود بناطيل فيها عيوب مصنعية في عدد البناتيل التي تحويها الشحنة:

$$\frac{1}{40} \times 5000 = 125$$

إذن، يُتوقَّع وجود 125 بنطالاً فيها عيوب مصنعية في الشحنة.

أتحقق من فهمي:

رُصدت عدد الأيام الماطرة في آخر 12 يوماً من شهر آذار فوجد أنها يومان. إذا استمر هطل الأمطار بالمعدل نفسه، فكُم يوماً من المتوقع أن يكون ماطرًا في شهر نيسان؟

أُتدرب وأحل المسائل



صورة	37
كتابة	63

بيّن الجدول المجاور نتائج رمي قطعة نقدية 100 مرة وتسجيل الوجه العلوي. أجد الاحتمالين التجريبيين الآتيين:

2 ظهور كتابة.

1 ظهور صورة.

الوحدة 8

لدى كلٍّ من هاشم وميسون قرصٌ دوّارٌ يحتوي أربعة أقسامٍ مرقّمةٍ من (1-4)، أدار كلٌّ منهما قرصه وسجّل الرقم الذي استقرَّ عنده كما في الجدولين الآتيين:

هاشم				
الرقم	1	2	3	4
التكرار	11	14	10	15

ميسون				
الرقم	1	2	3	4
التكرار	33	17	28	22

3 كم مرّة أدار كلٌّ منهما قرصه؟

4 أجد الاحتمال النظريّ لتوقّف المؤشر عند كلِّ رقمٍ على القرص الدوّار.

5 أجد الاحتمال التجريبيّ لتوقّف المؤشر عند كلِّ رقمٍ على القرص الدوّار.

6 أيٌّ منهما تجربته العشوائية عادلة؟ أبرّر إجابتي.

سيّارة	دراجة	شاحنة
19	8	8

يبين الجدول المجاور أنواع المركبات وأعدادها التي رصدها كاميرا مراقبة عند مرورها في أحد الشوارع خلال الفترة الزمنية من 5 p.m. حتى 6 p.m.، أستمّل الجدول لإيجاد الاحتمال التجريبيّ لـ:

7 مرور سيّارة أمام الكاميرا.

8 مرور دراجة أمام الكاميرا.

9 مرور شاحنة أمام الكاميرا.

10 **بيض:** فحص تاجر 20 طبق بيض فوجد أنّ 3 أطباق تحوي بيضاً مكسوراً. فكّم طبق


بيض من المتوقع وجود بيض مكسور فيه من 1000 طبق؟

معلومة

اخترعت في العام 1973 أول كاميرا مراقبة تعمل برقاقة صغيرة.



يبيّن التمثيل بالأعمدة المجاور نتائج تجربة إلقاء حجر نرد وتسجيل الرقم الظاهر على وجهه العلوي، أجد الاحتمال التجريبي لـ:



11 ظهور الرقم 6 .

12 عدم ظهور الرقم 1 .

13 ظهور رقم أقل من 3 .

14 ظهور الرقمين 2 أو 4 .

إرشاد

أجد أولاً عدد مرات إلقاء حجر النرد، مستعيناً بالتمثيل البياني.

مهارات التفكير العليا

تبرير: سجل يوسف عدد مرات فوز وخسارة

وتعادل فريق كرة السلة الذي يشجعه في موسم

واحد في الجدول المجاور:

فوز	تعادل	خسارة
36	25	19

15 أجد الاحتمال التجريبي لفوز الفريق.

16 معتمداً على نتائج الاحتمال التجريبي، هل من المتوقع فوز الفريق في المباراة القادمة؟ أبرر إجابتي.

تبرير: قرص دوار يحتوي أربعة أقسام لكل منها لون مختلف. بيّن الجدول المجاور نتائج تجربة تدوير مؤشره 200 مرة:

	أحمر	زهري	أزرق	أسود
التكرار	36		72	
الاحتمال التجريبي		0.29	0.36	

17 أكمل الجدول.

18 أي أقسام القرص لها المقاس نفسه؟ أبرر إجابتي.

19 **اكتب** كيف أجد الاحتمال التجريبي لحادث ما؟

إرشاد

أكتب نتائج الاحتمال التجريبي على الصورة العشرية؛ لتسهيل عملية المقارنة.

اختبار الوحدة

أختار رمز الإجابة الصحيحة:

1 جمعت رنيم المعلومات الآتية عن عدد الكتب التي قرأتها زميلاتها في العطلة الصيفية:

1	2	5	4	0	2	3	4	0
0	10	8	4	7	3	1	6	4

أي المقاييس الآتية يمثل 10 كتب؟

- (a) المتوسط الحسابي (b) الوسيط (c) المنوال (d) المدى

2 الوسط الحسابي لمجموعة القيم

70, 80, 90, 100, 70 يساوي:

- (a) 280 (b) 90 (c) 80 (d) 70


3 مقياس مقدار تشتت البيانات وتباعدتها هو:

- (a) المتوسط الحسابي (b) الوسيط (c) المدى (d) المنوال

4 إذا دار مؤشر القرص المجاور

600 مرة، كم مرة تقريباً يتوقع

أن يقف على القطاع الأحمر؟



- (a) 30 (b) 40 (c) 50 (d) 60

5

يوجد في مدرسة 1200 طالب (ذكور وإناث)، اختيرت عينة من 100 طالب عشوائياً، فكان عدد الذكور فيها 45.

أي الأعداد الآتية يمثل عدد الذكور المحتمل في المدرسة؟

- (a) 450 (b) 500 (c) 540 (d) 600

يلخص الجدول المجاور أعمار حضور حفلين شعريين بالسنوات:

	الحفل (1)	الحفل (2)
الوسيط	38	37
الوسط الحسابي	38.4	39.2
المدى	64	48

6

أقارن تباعد أعمار حضور الحفلين. أفسر إجابتي.

7

يريد أحمد أن يحدد الحفل الذي حضره أناس أصغر سناً، فما الصعوبات التي سوف تواجهه؟

الساق	الورقة	زراعة: يبين مخطط الساق والورقة المجاور كتل 25 تفاحة رُصدت في مختبر زراعي:
9	2 4 5 6	
10	0 2 4 5 5 8 8	
11	1 1 4 4 4 7	
12	2 3 5 6 8	
13	1 4 9	

المفتاح: 9|2 = 92 g

8 ما عدد التفاحات التي تقل كتلتها عن 100 g؟

9

9 ما نسبة التفاحات التي كتلتها بين 120 g و 130 g؟

10

10 ما كتلة أثقل تفاحة؟

11

11 ما مدى كتل التفاحات؟

12

12 أجد المنوال لكتل التفاحات.

13

13 أجد الوسيط لكتل التفاحات.

اختبار الوحدة

تدريب على الاختبارات الدولية

22 اختيار من متعدد: إذا كان وسيط القيم 27, 42, □, 29, 56, 48 يساوي 37 والمدى يساوي 29، فإن القيمة المجهولة هي:

a) 47 b) 37 c) 32 d) 41

تقدم طلبة شعبتين من الصف السابع لاختبار رياضيات، وفي ما يأتي ملخص لنتائج الطلبة:

السابع (ب)

الوسيط الحسابي: 55

الوسيط: 56

المدى: 48

السابع (أ)

الوسيط الحسابي: 65

الوسيط: 59

المدى: 72

إذا كان عدد الطلبة في كل شعبة يساوي 30 طالباً، فأضع إشارة (✓) في المكان المناسب أمام كل جملة مما يأتي:

23 درجات طلبة الصف السابع (أ) متباعدة

أكثر من درجات طلبة الصف السابع (ب).

☐ خطأ ☐ صحيح

24 درجات طلبة الصف السابع (أ) أعلى من درجات

طلبة الصف السابع (ب). ☐ خطأ ☐ صحيح

25 أقل من نصف طلبة الصف السابع (ب) حصلوا على

درجة أعلى من 50. ☐ خطأ ☐ صحيح

26 مجموع درجات طلبة الصف السابع (أ) أعلى

من مجموع درجات طلبة الصف السابع (ب).

☐ خطأ ☐ صحيح

لدى هاني 20 بنطالاً لبعضها زر من الأمام ولبعضها الآخر رباط مطاطي، ويبيّن الجدول أدناه أعداد هذه البنطال وألوانها:

	أزرق	أسود	بنّي
بنطال له زر من الأمام	3	5	4
بنطال له رباط مطاطي	3	2	3

إذا اختار هاني بنطالاً عشوائياً، فأجد احتمال:

14 اختيار بنطال برباط مطاطي.

15 اختيار بنطال بنّي برباط مطاطي.

16 اختيار بنطال أسود.

17 اختيار بنطال برباط مطاطي لونه أسود أو بنّي.

18 اختيار بنطال أسود أو بنّي.

يبيّن مخطط الساق والورقة أدناه عدد زوار متحف في 20 يوماً:

20	5 6 8
21	0 1 5 5 8
22	1 3 5 6 7 8 9
23	3 7 8
24	1 4

المفتاح: 20|5 = 250

19 أجد وسيط عدد الزوّار.

20 أجد المنوال.

21 أجد المدى.