



الرياضيات

الصف الحادي عشر - الفرع الأدبي

الفصل الدراسي الأول

11


وفتر الإجابات



كتاب الطالب وكتاب التمارين


لجميع الوحدات لمادة الرياضيات

الصف الأول الثانوي ادبي



الفصل الثاني المنهاج الجديد ٢٠٢٢



رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
أتحقق من فهمي	10	(1) المجال هو جميع قيم x الحقيقية ما عدا العدد 1 (2) $f(-1) = 0$ ، $f(1)$ غير معرف ، $f(3) = 0$ (3) المدى هو جميع قيم y التي تنتمي للفترة $(2, \infty)$ 
أتحقق من فهمي	11	$f(x) = \begin{cases} x + 3, & x \leq 1 \\ -0.5x + 4.5, & 1 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$
أتحقق من فهمي	12	$P(x) = \begin{cases} 1.15x, & x < 700 \\ 1.1x, & 700 \leq x < 1000 \\ x + 50, & x > 1000 \end{cases}$


رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	13	مجال الاقتران f هو جميع قيم x الحقيقية مجال الاقتران g هو جميع قيم x الحقيقية التي تنتمي للفترة $(-3, \infty)$ ما عدا العدد 0
2	13	$g(-2) = -3$ ، غير معرف $g(0)$ ، $f(2) = 2$ ، $f(-1) = 2$
3	13	 المدى هو جميع قيم y التي تنتمي للفترة $(-1, \infty)$
4	13	 المدى هو جميع قيم y التي تنتمي للفترة $(-5, \infty)$ ما عدا -1 ، 1
5	13	$f(x) = \begin{cases} -4, & x < 2 \\ 4, & x \geq 2 \end{cases}$

$f(x) = \begin{cases} -\frac{5}{3}x - \frac{8}{3}, & x \leq -1 \\ \frac{4}{3}x - \frac{2}{3}, & -1 < x \leq 2 \\ -3, & x > 2 \end{cases}$	13	6
$f(x) = \begin{cases} 2, & x < -4 \\ -x - 2, & -4 < x < 2 \\ x - 6, & x > 2 \end{cases}$	13	7
$f(x) = \begin{cases} -4, & x < -2 \\ x - 2, & -2 \leq x < 2 \\ -\frac{7}{4}x + \frac{7}{2}, & x \geq 2 \end{cases}$	13	8
$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x \leq 5 \\ 10 + x, & x > 5 \end{cases}$	13	9
$p(x) = \begin{cases} 500 + 0.01x, & x \leq 2000 \\ 500 + 0.15x, & x > 2000 \end{cases}$	14	10
7300 دينارًا	14	11
نعم، صحيح؛ لأن محو الأجزاء التي لا تقع ضمن المجال المحدد يُبقي تمثيل الاقتران المطلوب، مع مراعاة وضع دائرة مفتوحة أو مغلقة عند أطراف الفترة إن وجدت فجوات أو قفزات في التمثيل البياني.	14	12
إجابة محتملة:	13	13
$f(x) = \begin{cases} 3, & x < 0 \\ 5, & x \geq 0 \end{cases}$	13	14
 مجال الاقتران h هو جميع قيم x الحقيقية ، ومداه هو جميع قيم y الحقيقية ما عدا العدد 1	13	

الدرس 2 : اقتران القيمة المطلقة


رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
أتحقق من فهمي	16	$h(x) = \begin{cases} 2x + 8, & x \geq -4 \\ -2x - 8, & x < -4 \end{cases}$
أتحقق من فهمي	19	1)  مجال الاقتران f هو جميع قيم x الحقيقية ، ومداه هو جميع قيم y الحقيقية التي تنتمي للفترة $(-\infty, 0]$ 2)  مجال الاقتران f هو جميع قيم x الحقيقية ، ومداه هو جميع قيم y الحقيقية التي تنتمي للفترة $[2, \infty)$
أتحقق من فهمي	20	$f(x) = 2x + 6 \quad \text{أو} \quad f(x) = 2 x + 3 $

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	21	$f(x) = \begin{cases} x - 6, & x \geq 6 \\ 6 - x, & x < 6 \end{cases}$
2	21	$g(x) = \begin{cases} 3x + 3, & x \geq -1 \\ -3x - 3, & x < -1 \end{cases}$
3	21	$h(x) = \begin{cases} 2x - 2, & x \geq 2.5 \\ -2x + 8, & x < 2.5 \end{cases}$
4	21	$p(x) = \begin{cases} 3(x + 1), & x \geq -1 \\ -3(x + 1), & x < -1 \end{cases}$
5	21	 $f(x) = x + 3$
6	21	 $f(x) = - x + 3$




21

7




21

8





21

9

	21	10
$f(x) = x - 2$	21	11
$f(x) = - 4x $	21	12
$f(x) = x - 1 - 2$	22	13
$a = 1, \quad m = 2, \quad b = -5, \quad c = 0$ بما أن $a > 0$، فإن منحنى f مفتوح إلى أعلى ورأسه النقطة $\left(\frac{-b}{m}, c\right) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) = (2.5, 0)$ إذن؛ الجواب هو البديل a إجابة محتملة:	22	14
$f(x) = - x + 3$	22	15


اختبار نهاية الوحدة

الإجابة / الحل التفصيلي	رقم الصفحة	رقم السؤال
b) -1	22	1
c) -2	22	2
b) 1	22	3
d) $f(x) = \begin{cases} x+4, & x < -1 \\ -2x, & x \geq -1 \end{cases}$	22	4
d) $f(x) = - x-2 + 1$	22	5
a) $[-4, \infty)$	22	6
d) $[0, 3)$	22	7
c) $(-\infty, 2]$	22	8
	22	9




22

10



22

11



22

12

$p(t) = \begin{cases} 1.5, & 0 < t \leq 1 \\ 3, & 1 < t \leq 3 \\ 7, & t > 3 \end{cases}$	23	13
	23	14
7 JD	23	15
3 JD	23	16
$T(x) = \begin{cases} 0.15x, & 0 < x \leq 20000 \\ 0.2x, & x > 20000 \end{cases}$	23	17
$f(x) = \begin{cases} 1 - 3x, & x \geq \frac{1}{3} \\ 3x - 1, & x < \frac{1}{3} \end{cases}$	23	18
$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x - 4, & x \geq 8 \\ 4 - \frac{1}{2}x, & x < 8 \end{cases}$	23	19
$h(x) = \begin{cases} x, & x \geq -5 \\ -x - 10, & x < -5 \end{cases}$	23	20
B	23	21
D	23	22
A	23	23
E	23	24
C	23	25


رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي																												
أتحقق من فهمي	30	(1) بيانياً (من الشكل المجاور) $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2) = 1$ إذن؛ $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2) = 1$ عددياً (من الجدول أدناه) <table border="1"> <tr> <td>0.9</td> <td>0.99</td> <td>0.999</td> <td>1</td> <td>1.001</td> <td>1.01</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>0.81</td> <td>0.9801</td> <td>0.998001</td> <td>1</td> <td>1.002001</td> <td>1.0201</td> <td>1.21</td> </tr> </table> بيانياً (من الشكل المجاور) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2) = 1$ إذن؛ $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2) = 1$ عددياً (من الجدول أدناه) <table border="1"> <tr> <td>-3.1</td> <td>-3.01</td> <td>-3.001</td> <td>-3</td> <td>-2.999</td> <td>-2.99</td> <td>-2.9</td> </tr> <tr> <td>-1.1</td> <td>-1.01</td> <td>-1.001</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> إذن؛ $\lim_{x \rightarrow -3} h(x)$ غير موجودة أي أن: $\lim_{x \rightarrow -3^+} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow -3^-} h(x)$ إذن؛ $\lim_{x \rightarrow -3} h(x)$ غير موجودة بيانياً (من الشكل المجاور) $\lim_{x \rightarrow -3^+} h(x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow -3^-} h(x) = -1$ أي أن: $\lim_{x \rightarrow -3^+} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow -3^-} h(x)$ إذن؛ $\lim_{x \rightarrow -3} h(x)$ غير موجودة	0.9	0.99	0.999	1	1.001	1.01	1.1	0.81	0.9801	0.998001	1	1.002001	1.0201	1.21	-3.1	-3.01	-3.001	-3	-2.999	-2.99	-2.9	-1.1	-1.01	-1.001		1	1	1
0.9	0.99	0.999	1	1.001	1.01	1.1																								
0.81	0.9801	0.998001	1	1.002001	1.0201	1.21																								
-3.1	-3.01	-3.001	-3	-2.999	-2.99	-2.9																								
-1.1	-1.01	-1.001		1	1	1																								

a) $\lim_{x \rightarrow -1} (3x^2 - 4x - 2)$ $\lim_{x \rightarrow -1} (3x^2 - 4x - 2)$ $= \lim_{x \rightarrow -1} (3x^2) - \lim_{x \rightarrow -1} (4x) - \lim_{x \rightarrow -1} (2)$ $= 3(\lim_{x \rightarrow -1} x)^2 - 4 \times \lim_{x \rightarrow -1} (x) - \lim_{x \rightarrow -1} (2)$ $= 3(-1)^2 - 4 \times -1 - 2$ $= 5$ b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3x^2+1}}{2x-5}$ $= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{3x^2+1}}{\lim_{x \rightarrow 1} (2x-5)}$ $= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} (3x^2+1)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (2x-5)}$ $= \frac{\sqrt{3(\lim_{x \rightarrow 1} x)^2 + \lim_{x \rightarrow 1} (1)}}{2\lim_{x \rightarrow 1} (x) - \lim_{x \rightarrow 1} (5)}$ $= \frac{\sqrt{3(1)^2 + (1)}}{2(1) - 5}$ $= \frac{-4}{3}$	32 أنصحق من فهمي خاصيتا المجموع والفرق خاصيتا القوة والضرب في ثابت نهاية الاقتران المحايد والاقتران الثابت بالتبسيط  خاصية القسمة خاصية الجذر النوني خاصية القوة وخاصيتا المجموع والفرق وخاصية الضرب في ثابت نهايتا الاقتران المحايد والاقتران الثابت بالتبسيط	
a) 17 b) 0 c) بما أن $x = 5$ لا تقع في مجال الاقتران النسبي (لأنها صفر للمقام)، فإنه يتعذر إيجاد قيمة النهاية بالتعويض المباشر.	34	أنصحق من فهمي

a) - 5 b) - 4	35	أتحقق من فهمي
a) $g(x) = \frac{x^3+1}{x+1}$, $x = -1$ بما أن الاقتران النسبي g غير معرف عند $x = -1$ ؛ لأنها تجعل مقامه صفرًا ، فإن g غير متصل عند $x = -1$ b) $h(x) = \begin{cases} x-1, & x < 3 \\ 4-x, & x \geq 3 \end{cases}$, $x = 3$ $h(3) = 4 - 3 = 1$ $\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (4 - x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow 3^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - 1) = 2$ $\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^-} h(x)$ أي أن: $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ غير موجودة إذن؛ الاقتران h غير متصل عند $x = 3$	37	أتحقق من فهمي

أنتدرب وأحل المسائل

الإجابة / الحل التفصيلي	رقم الصفحة	رقم السؤال
$\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = 2$	38	1
$\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = 1$	38	2
$\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$ غير موجودة	38	3
$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -1$	38	4
$\lim_{x \rightarrow -2} h(x) = \frac{1}{2}$	38	5
$\lim_{x \rightarrow -3} h(x) = 1$	38	6



بيانيًا (من الشكل المجاور)

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 3) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 3) = 5$$


$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3) = 5 \text{ ؛ إذن}$$

عدديًا (من الجدول أدناه)

1.9	1.99	1.999	2	2.001	2.01	2.1
4.9	4.99	4.999	5	5.001	5.01	5.1

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 3) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 3) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3) = 5 \text{ ؛ إذن}$$



بيانيًا (من الشكل المجاور)

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - 1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 \text{ ؛ إذن}$$

عدديًا (من الجدول أدناه)

0.9	0.99	0.999	1	1.001	1.01	1.1
-0.19	-0.0199	-0.001999	0	0.002001	0.0201	0.21

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - 1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 \text{ ؛ إذن}$$

بيانيًا (من الشكل المجاور)

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6 \text{ ؛ إذن}$$

عدديًا (من الجدول أدناه)

2.9	2.99	2.999	3	3.001	3.01	3.1
5.9	5.99	5.999	6	6.002	6.02	6.2

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6 \text{ ؛ إذن}$$

بيانيًا (من الشكل المجاور)

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) = 2$$

أي أن:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^-} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \text{ غير موجودة}$$

عدديًا (من الجدول أدناه)

-1.1	-1.01	-1.001	-1	-0.999	-0.99	-0.9
2.1	2.01	2.001		-1.999	-1.99	-1.9

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) \text{ ؛ أي أن:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \text{ غير موجودة}$$

$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 2x + 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (x^2) + \lim_{x \rightarrow -1} (2x) + \lim_{x \rightarrow -1} (1) \\ &= (\lim_{x \rightarrow -1} x)^2 + 2 \times \lim_{x \rightarrow -1} (x) + \lim_{x \rightarrow -1} (1) \\ &= (-1)^2 + 2 \times -1 + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$	38	11
$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 4} \left(\sqrt{x} + \frac{4}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x}) + \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{4}{x} \right) \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 4} (x)} + \frac{\lim_{x \rightarrow 4} (4)}{\lim_{x \rightarrow 4} (x)} \\ &= \sqrt{4} + \frac{4}{4} \\ &= 3 \end{aligned}$	38	12
$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt[3]{\frac{2x+2}{x^2+18}} \\ &= \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2x+2}{x^2+18} \right)} \\ &= \sqrt[3]{\frac{\lim_{x \rightarrow 3} (2x+2)}{\lim_{x \rightarrow 3} (x^2+18)}} \\ &= \sqrt[3]{\frac{2 \times \lim_{x \rightarrow 3} (x) + \lim_{x \rightarrow 3} (2)}{(\lim_{x \rightarrow 3} (x))^2 + \lim_{x \rightarrow 3} (18)}} \\ &= \sqrt[3]{\frac{2 \times 3 + 2}{3^2 + 18}} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$	38	13

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 1 - 1 = 0$	38	14
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1^2 = 1$	38	15
$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 3)}{(x + 2)} = \frac{2 - 3}{2 + 2} = \frac{-1}{4}$	38	16
$f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 2 \\ x^2, & x \geq 2 \end{cases}, \quad x = 2$ $f(2) = 2^2 = 4$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2) = 4$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x) = 4$ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ أي أن: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 = f(2)$ إذن؛ الاقتران f متصل عند $x = 2$	38	17
$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < -1 \\ x^3, & x \geq -1 \end{cases}, \quad x = -1$ $f(-1) = (-1)^3 = -1$ $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^3) = -1$ $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (2x + 1) = -1$ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -1$ أي أن: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -1 = f(-1)$ إذن؛ الاقتران f متصل عند $x = -1$	38	18
$f(x) = x^2 + 2x + 3, \quad x = 0$ $f(0) = 3$ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x + 3) = 3$ أي أن: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3 = f(0)$ ، إذن؛ الاقتران f متصل عند $x = 0$	38	19

$h(x) = \frac{x^3 + 8}{2}, \quad x = 2$ $h(2) = \frac{2^3 + 8}{2} = 8$ $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^3 + 8}{2} \right) = 8$ أي أن: $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 8 = h(2)$ ، إذن؛ الاقتران h متصل عند $x = 2$	38	20
$g(x) = \frac{2x^2 + 3x - 2}{x + 2}, \quad x = -2$ بما أن الاقتران النسبي g غير معرف عند $x = -2$ ؛ لأنها تجعل مقامه صفرًا ، فإن g غير متصل عند $x = -2$	38	21
$q(x) = \frac{3x^2 + x}{x}, \quad x = 0$ بما أن الاقتران النسبي q غير معرف عند $x = 0$ ؛ لأنها تجعل مقامه صفرًا ، فإن q غير متصل عند $x = 0$	38	22
1300 JD	39	23
$P(x) = \begin{cases} 500 + 0.1x, & 0 \leq x \leq 8000 \\ 660 + 0.08x, & x > 8000 \end{cases}$ $P(8000) = 1300$ $\lim_{x \rightarrow 8000^+} p(x) = \lim_{x \rightarrow 8000^+} (660 + 0.08x) = 1300$ $\lim_{x \rightarrow 8000^-} p(x) = \lim_{x \rightarrow 8000^-} (500 + 0.1x) = 1300$ $\lim_{x \rightarrow 8000} p(x) = 1300$ أي أن: $\lim_{x \rightarrow 8000} p(x) = 1300 = p(8000)$ ، إذن؛ الاقتران p متصل عند $x = 8000$	39	24
بما أن الاقتران f غير معرف عند $x = -1$ ، فإنه غير متصل عند $x = -1$	39	25
إجابة محتملة: $f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < -1 \\ 2x, & x > -1 \end{cases}$ لأن؛ $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (2x) = 2 \times -1 = -2$ $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (x - 1) = -1 - 1 = -2$	39	26

27	39	بما أن $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ موجودة ، فإن $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow 3^+} (2 + \sqrt{k}) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x + 3)$ $2 + \sqrt{k} = 6$ $\sqrt{k} = 4$ $k = 16$
28	39	عند $x = -4$ الاقتران f غير متصل؛ لأنه غير معرف عند $x = -4$ لوجود الفجوة في تمثيله البياني، أما عند $x = 2$ فرغم أن الاقتران f معرف عندها حيث $f(2) = 1$ ، فإنه غير متصل عند $x = 2$ لاختلاف قيمته عندها عن قيمة نهايته عندما تقترب x من العدد 2 حيث: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -4$
28	39	بما أن الاقتران f متصل عند $x = 3$ ، فإن: $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ $3^2 + k = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3)$ $9 + k = 6$ $k = -3$



الدرس 2: المشتقة

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
أتحقق من فهمي	42	$f(x) = 8 - x^2, x = 2$ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ التعريف العام للمشتقة $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ التعريف العام للمشتقة $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8 - (2+h)^2 - (4)}{h}$ بتعويض $f(2+h) = 8 - (2+h)^2$ و $f(2) = 4$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8 - (4 + 4h + h^2) - 4}{h}$ بالتبسيط $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4h - h^2}{h}$ بجمع الحدود المتشابهة $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(-4-h)}{h}$ بإخراج h عاملاً مشتركاً من البسط $= \lim_{h \rightarrow 0} (-4 - h)$ بالقسمة على h $= -4$ بتعويض $h = 0$
أتحقق من فهمي	45	$y = 7x + 1$ $\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ التعريف العام للمشتقة $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{7(x+h) + 1 - (7x + 1)}{h}$ بتعويض $f(x+h) = 7(x+h) + 1$ و $f(x) = 7x + 1$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{7x + 7h + 1 - 7x - 1}{h}$ بفك الأقواس $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{7h}{h}$ بجمع الحدود المتشابهة $= \lim_{h \rightarrow 0} 7$ بالقسمة على h $= 7$ نهاية الثابت

a) $y = x^{-6}, x > 0$ $\frac{dy}{dx} = -6x^{-7} = \frac{-6}{x^7}$ b) $y = \frac{4}{x^3}, x > 0$ $y = 4x^{-3}$ $\frac{dy}{dx} = -12x^{-4} = \frac{-12}{x^4}$ c) $y = \sqrt{x^7}, x \geq 0$ $y = x^{\frac{7}{2}}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{7}{2}x^{\frac{5}{2}} = \frac{7}{2}\sqrt{x^5}$	44	أتحقق من فهمي
a) $y = \sqrt[4]{x^3} - \frac{6}{x^2}, x > 0$ $y = x^{\frac{3}{4}} - 6x^{-2}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{4}} + 12x^{-3}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4\sqrt[4]{x}} + \frac{12}{x^3}$ b) $y = \frac{x^6 - 4x^5 + 8x^2}{4x^2}, x \neq 0$ $y = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2$ $\frac{dy}{dx} = x^3 - 3x^2$	45	أتحقق من فهمي
$s(t) = t^3 + \sqrt{t} \Rightarrow s(t) = t^3 + t^{\frac{1}{2}}$ $\frac{ds}{dt} = 3t^2 + \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}} = 3t^2 + \frac{1}{2\sqrt{t}}$ $\frac{ds}{dt} _{t=4} = 3(4)^2 + \frac{1}{2\sqrt{4}} = 48.25 \text{ m/sec}$	44	أتحقق من فهمي

الإجابة / الحل التفصيلي	رقم الصفحة	رقم السؤال
$f(x) = 4x^2$, $x = 1$ $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(1+h)^2 - (4)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(1 + 2h + h^2) - 4}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 + 8h + 4h^2 - 4}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8h + 4h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(8 + 4h)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (8 + 4h) = 8$	46	1
$f(x) = 1 - x^2$, $x = -2$ $f'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - (-2+h)^2 - (-3)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - (4 - 4h + h^2) + 3}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3 + 4h - h^2 + 3}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h - h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(4 - h)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (4 - h) = 4$	46	2

$f(x) = x^2 + x, \quad x = 2$ $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 + (2+h) - (6)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4 + 4h + h^2) + (2 + h) - 6}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6 + 5h + h^2 - 6}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h + h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(5+h)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (5 + h) = 5$	46	3
$f(x) = x^2 - 2x + 3, \quad x = -1$ $f'(-1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-1+h)^2 - 2(-1+h) + 3 - (6)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 - 2h + h^2) + (2 - 2h) - 3}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 - 4h + h^2 - 3}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4h + h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(-4+h)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (-4 + h) = -4$	46	4
$f(x) = 4x + 1$ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(x+h) + 1 - (4x + 1)}{h}$	46	5

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4x + 4h + 1 - 4x - 1}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} 4$ $= 4$		
$y = 1 - x$ $\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - (x+h) - (1-x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - x - h - 1 + x}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (-1)$ $= -1$	46	6
$f(x) = \frac{1}{2}x - 1$ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(x+h) - 1 - (\frac{1}{2}x - 1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}h - 1 - \frac{1}{2}x + 1}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}h}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2}$	46	7

$y = \frac{2x+4}{6}$ $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ $\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}(x+h) + \frac{2}{3} - (\frac{1}{3}x + \frac{2}{3})}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}h + \frac{2}{3} - \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}h}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{3}$ $= \frac{1}{3}$	46	8
$y = \frac{1}{3}x + 1$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3}$	46	9
$y = 8 - 3x$ $\frac{dy}{dx} = -3$	46	10
$y = \frac{1}{2}x^2 + 5x + 7$ $\frac{dy}{dx} = x + 5$	46	11
$y = \frac{2x^3 + 4x + 1}{3} = \frac{2}{3}x^3 + \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$ $\frac{dy}{dx} = 2x^2 + \frac{4}{3}$	46	12
$y = \sqrt{8} + 3\sqrt{x}, \quad x \geq 0$ $y = \sqrt{8} + 3x^{\frac{1}{2}}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{3}{2\sqrt{x}}$	46	13
$y = 5\sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{x^3}$ $y = 5x^{\frac{2}{3}} + 4x^{-3}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{10}{3}x^{-\frac{1}{3}} - 12x^{-4} = \frac{10}{3\sqrt[3]{x}} - \frac{12}{x^4}$	46	14

$y = \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x^2} + 4, \quad x > 0$ $y = 2x^{-\frac{1}{2}} + 2x^{-2} + 4$ $\frac{dy}{dx} = -x^{-\frac{3}{2}} - 4x^{-3} = \frac{-1}{\sqrt{x^3}} - \frac{4}{x^3}$	46	15
$y = \frac{\sqrt[5]{x^7} + 4x - 1}{2}$ $y = \frac{1}{2}x^{\frac{7}{5}} + 2x - \frac{1}{2}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{7}{10}x^{\frac{2}{5}} - 2 = \frac{7}{10}\sqrt[5]{x^2} - 2$	46	16
$s(t) = 5t^{\frac{3}{2}} - 1.5t^2$ $\frac{ds}{dt} = \frac{15}{2}t^{\frac{1}{2}} - 3t = 7.5\sqrt{t} - 3t$ $\frac{ds}{dt} _{t=3} = 7.5\sqrt{3} - 3(3) \approx 4 \text{ m/sec}$	46	17
$\frac{dh}{dt} = 30 - 9.8t$	47	18
$\frac{dh}{dt} _{t=1} = 30 - 9.8 = 20.2 \text{ m/sec}$ $\frac{dh}{dt} _{t=2} = 30 - 19.6 = 10.4 \text{ m/sec}$	47	19
$h(t) = -16t^2 + 16t + 32 = 32$ $\Rightarrow t - t^2 = 0 \Rightarrow t(1 - t) = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ (تهمل)}, \quad t = 1$ $\frac{dh}{dt} = -32t + 16$ $\frac{dh}{dt} _{t=1} = -32 + 16 = -16 \text{ m/sec}$	47	20
$f'(x) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$ أفترض أن $t = x + h$ $t \rightarrow x \Rightarrow h \rightarrow 0$ بالتعويض في صيغة تعريف المشتقة أعلاه، فإن: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$	47	21
$h(t) = 100t - 5t^2$ $\frac{dh}{dt} = 100 - 10t = 0 \Rightarrow t = 10$ $h(10) = 100(10) - 5(10)^2 = 500 \text{ m}$	47	22
$f(x) = x^3 - 3x^2$ $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow 3x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, \quad x = 2$ إذن، المماس أفقي عند $(0, f(0)) = (0, 0)$ و عند $(2, f(2)) = (2, -4)$	47	23

الدرس 3: التزايد والتناقص لكثيرات الحدود

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
أتحقق من فهمي	49	a) $(1, f(1)) = (1, -4)$ b) $(1, h(1)) = (1, \frac{-10}{3})$, $(2, h(2)) = (2, \frac{13}{3})$
أتحقق من فهمي	52	a) متناقص في $(-\infty, 2)$ ، ومتزايد في $(2, \infty)$ b) متناقص في $(1, 3)$ ، ومتزايد في $(-\infty, 1)$ وفي $(3, \infty)$
أتحقق من فهمي	53	a) النقاط الحرجة: $(1, 7)$ ، و $(-4, 72)$ b) $(1, 7)$ صغرى محلية، و $(-4, 72)$ عظمى محلية
أتحقق من فهمي	54	الافتتان h متزايد في $(0, 3)$ ، ومتناقص في $(3, 6)$ وأقصى إرتفاع هو $h(3) = 44.9 \text{ m}$

اتدرب وأحل المسائل

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة
1	54	$(3, 1)$
2	54	$(3, -17)$
3	54	$(1, \frac{-2}{3})$, $(-1, \frac{2}{3})$
4	54	$(0, 0)$, $(2, \frac{-4}{3})$
5	55	متناقص في $(-\infty, 0)$ ، ومتزايد في $(0, \infty)$
6	55	متناقص في $(-\infty, \frac{1}{2})$ ، ومتزايد في $(\frac{1}{2}, \infty)$
7	55	متناقص في $(-\infty, 2.5)$ ، ومتزايد في $(2.5, \infty)$
8	55	متناقص في $(0, 1)$ ، ومتزايد في $(-\infty, 0)$ وفي $(1, \infty)$
9	55	متناقص في $(-\infty, 3)$ ، ومتزايد في $(3, \infty)$
10	55	متناقص في $(-\infty, 1)$ ، ومتزايد في $(1, \infty)$
11	55	متزايد في $(-\infty, \infty)$

متناقص في $(-\infty, \infty)$	55	12
متزايد في $(-\infty, \infty)$	55	13
متناقص في $(-1, 3)$ ، ومتزايد في $(-\infty, -1)$ وفي $(3, \infty)$	55	14
النقاط الحرجة: $(3, -81)$ ، و $(-2, 44)$ $(3, -81)$ صغرى محلية، و $(-2, 44)$ عظمى محلية	55	15
النقاط الحرجة: $(2, 36)$ ، و $(5, 33.3)$ $(5, 33.3)$ صغرى محلية، و $(3, 36)$ عظمى محلية	55	16
النقاط الحرجة: $(1, \frac{-14}{3})$ ، و $(-2, \frac{40}{3})$ $(1, \frac{-14}{3})$ صغرى محلية، و $(-2, \frac{40}{3})$ عظمى محلية	55	17
النقاط الحرجة: $(2, 1)$ لا يوجد قيمة عظمى أو قيمة صغرى عند $(2, 1)$ ؛ لأن الاقتران h متناقص في $(-\infty, \infty)$	55	18
الاقتران y متزايد في $(0, 2.3)$ ، ومتناقص في $(2.3, 4)$	55	19
$x = 2, x = -4$	55	20
$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3$ $= 3(x^2 - 2x + 1)$ $= 3(x - 1)^2 \geq 0, x \in (-\infty, \infty)$ إذن؛ الاقتران f متزايد لقيم x الحقيقية جميعها.	55	21
$f(2) = 4a - 8 + c = -7$ $4a + c = 1$ $f'(x) = 2ax - 4$ $f'(2) = 4a - 4 = 0 \Rightarrow$ $a = 1$ $c = -3$	55	22

اختبار نهاية الوحدة

الإجابة / الحل التفصيلي	رقم الصفحة	رقم السؤال
b) 4	56	1
a) - 4	56	2
b) $8x^4 - 15x^2$	56	3
c) $2x - 6$	56	4
b) $3x^2 + 3$	56	5
d) $\frac{8}{\sqrt[3]{x}}$	56	6
c) $x = \pm 1$	56	7
d) (0, 2)	56	8
$-\frac{1}{3}$	56	9
0	56	10
3	56	11
$\frac{3}{5}$	56	12
$\frac{2}{3}$	56	13
$\frac{1}{4}$	56	14
غير موجودة	57	15
1	57	16
0	57	17
$f(2) = 4 = \lim_{x \rightarrow 2} (3x - 2)$ أي أن الاقتران f متصل عند $x = 2$	57	18
بما أن $x = 0$ لا تنتمي لمجال الاقتران النسبي g (لأنها تجعل مقامه صفراً)، فالاقتران g غير متصل عند $x = 0$	57	19
$h(-2) = -2 + 1 = -1$ $\lim_{x \rightarrow -2^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (x + 1) = -1$ $\lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (3x + 5) = -1$ $\lim_{x \rightarrow -2} h(x) = -1$ أي أن: وبما أن: $h(2) = 4 = \lim_{x \rightarrow 2} (3x - 2)$ ، فإن الاقتران h متصل عند $x = -2$	57	20

$q(5) = 5 + 5 = 10$ $\lim_{x \rightarrow 5} q(x) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x^2 - 10x}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x(x - 5)}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} 2x = 10$ وبما أن: $q(5) = 10 = \lim_{x \rightarrow 5} q(x)$ ، فإن الاقتران q متصل عند $x = 5$	57	21
$f(x) = -x^2 + 300x + 6$ $f'(x) = -2x + 300$ $-2x + 300 = 0$ $x = 150$ إذن: نقطة حرجة لإقتران f $(150, f(150)) = (150, 22506)$	57	22
 إذن: أكبر عدد من الألعاب الإلكترونية يمكن بيعه هو 22506 عند إنفاق 15000 دينار على إعلانات الإشهار والترويج.	57	23
النقاط الحرجة: $(3, -12)$ ، و $(-1, 20)$ $(3, -12)$ صغرى محلية، و $(-1, 20)$ عظمى محلية	57	24
النقاط الحرجة: $(2, 12)$ ، و $(1, 13)$ $(2, 12)$ صغرى محلية، و $(1, 13)$ عظمى محلية	57	25
c) 0	57	26
a) $\frac{-3}{4}$	57	27
a) 10	57	28
b) 6	57	29
d) -4	57	30

الوحدة 6 : المتتاليات والمتسلسلات

الدرس 1 : المتتاليات والمتسلسلات

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
أتحقق من فهمي	62	a) $\sum_{k=1}^9 3k$ b) $\sum_{k=1}^{\infty} (2k + 1)$
أتحقق من فهمي	62	$2+7+12+17+22+27+32+37+42+47+52=297$
أتحقق من فهمي	64	$\sum_{k=1}^3 (4k + 2) = 6 + 10 + 14 = 30$ أو $\sum_{k=1}^3 (4k + 2) = 4 \times \frac{3(3 + 1)}{2} + 3(2) = 30$
أتدرب وأحل المسائل		
رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	64	$\sum_{k=1}^{\infty} (5k - 4)$
2	64	$\sum_{k=1}^{50} k$
3	64	$\sum_{k=1}^5 k^2 + 1$
4	64	$\sum_{k=1}^4 \frac{k}{k+1}$
5	64	$\sum_{k=1}^8 25k$
6	64	$\sum_{k=1}^6 5$
7	65	$3+4+5+6+7=25$
8	65	$0+3+8+15+24+35+48+63+80+99=375$
9	65	$(40)(-5) = -200$
10	65	$1+2+3+4+5=15$
11	65	$4+7+10+13=34$
12	65	$(55)(9) = 495$

$\sum_{k=1}^{20} (80 - 2k) = 78 + 76 + \dots + 40$ $= 80 \times 20 - 2 \times \frac{20(20 + 1)}{2} = 1180$	65	13
$\sum_{k=1}^n (4k - 2)$	65	14
$\sum_{k=1}^{16} (15 + 10k) = 25 + 35 + 45 + \dots + 175$ $= 16 \times 15 + 10 \times \frac{16(16 + 1)}{2} = 1600$	65	15
عملية التعويض خاطئة والصحيح هو $\sum_{k=1}^5 (2k + 7) = 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = 65$	65	16
كلها مجموعها 91 ما عدا المتسلسلة $\sum_{i=0}^5 i^2$	65	17
$\sum_{k=1}^n c = c + c + \dots + c$ (مرة n) $= c(1 + 1 + \dots + 1)$ باخراج العامل المشترك $= c(n \times 1) = n \times c$	65	18

الدرس 2 : المتتاليات والمتسلسلات الحسابية

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
أتحقق من فهمي	67	a) حسابية b) حسابية c) ليست حسابية
أتحقق من فهمي	69	a) $a_n = 25 + 5n$ b) $a_n = 2n - 31$ c) $a_n = 106 - 5n$
أتحقق من فهمي	70	$S_n = 20 \left(\frac{10 + 86}{2} \right) = 960$
أتحقق من فهمي	72	a) 13, 16, 19, ... الفرق بين كل حدين متتاليين ثابت ويساوي 3، انن تشكل متتالية حسابية b) $a_n = 3n + 10$ c) $S_n = 25 \left(\frac{13 + 85}{2} \right) = 1225$

أَتَدْرِبُ وَأَحِلُّ الْمَسَائِلَ		
رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	72	حسابية
2	72	ليست حسابية
3	72	حسابية
4	72	حسابية
5	72	حسابية
6	72	ليست حسابية
7	72	$a_n = 10n - 2$
8	72	$a_n = 50 - 5n$
9	72	$a_n = 3n - 8$
10	72	$a_n = 83 - 2n$
11	72	$a_n = 9n - 5$
12	72	$a_n = 28 - 6n$
13	72	$S_n = 25 \left(\frac{-2 + 118}{2} \right) = 1450$
14	72	$S_n = 31 \left(\frac{19 - 101}{2} \right) = -1271$
15	72	$S_n = 17 \left(\frac{7 + 23}{2} \right) = 255$
16	72	$S_n = 15 \left(\frac{15+1}{2} \right) = 120$
17	72	$S_n = 13 \left(\frac{2 + 26}{2} \right) = 182$
18	72	$S_n = 99 \left(\frac{-1 + 293}{2} \right) = 14454$
19	73	$\sum_{k=1}^6 (3k + 1) = 6 \left(\frac{4 + 19}{2} \right) = 69$
20	73	$n = 8$ $d = 20$ $a_1 = 100$ $a_n = 80 + 20n$ $S_n = 8 \left(\frac{100 + 240}{2} \right) = 1360$

$n = 12$ $d = 2$ $a_1 = 3$ $a_n = 2n + 1$ $S_n = 12 \left(\frac{3 + 25}{2} \right) = 168$	73	21
أخطأ معترف في إيجاد أساس المتتالية والصحيح هو -9 ، وأخطأ في إيجاد الحد العام والصحيح هو $a_n = a_1 + (n - 1)d$ $= 21 + (n - 1)(-9)$ $= 30 - 9n$	73	22
$\sum_{k=1}^{\infty} c = c + c + c + \dots$ أساس المتسلسلة $d = c - c = 0$ إن، المتسلسلة حسابية	73	23
$S_n = n \left(\frac{8 + 3n + 5}{2} \right) = 544$ $3n^2 + 13n - 1088 = 0$ $n = 17$	73	24
بما أن الحد العام لمتسلسلة الأعداد الفردية هو: $a_n = 2n - 1$ إن، المتسلسلة هي: $\sum_{k=1}^n (2k - 1)$ ومجموع حدودها هو: $S_n = n \left(\frac{1 + 2n - 1}{2} \right) = n^2$	73	25



الدرس 3 : المتتاليات والمتسلسلات الهندسية

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
أتحقق من فهمي	75	a) متتالية هندسية b) ليست متتالية هندسية
أتحقق من فهمي	76	a) $a_n = 32 \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ b) $a_n = 625 \left(-\frac{1}{5}\right)^{n-1}$
أتحقق من فهمي	77	$S_n = \frac{(4)(1 - 0.5^6)}{1 - 0.5} = \frac{63}{8}$
أتحقق من فهمي	79	a) $a_n = 4500(1.035)^{n-1}$ b) $a_5 = 4500(1.035)^4 = 5163.853503$ c) $a_1 = 4500$ $r = 1.035$ $S_n = \frac{(4500)(1 - 1.035^{10})}{1 - 1.035} = 52791.26922$

أتدرب وأحل المسائل

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	79	متتالية هندسية
2	79	متتالية هندسية
3	79	متتالية هندسية
4	79	ليست متتالية هندسية
5	79	متتالية هندسية
6	79	متتالية هندسية
7	79	$a_n = 4(-2)^{n-1}$
8	79	$a_n = 0.005(2)^{n-1}$
9	79	$a_n = 20(1.1)^{n-1}$
10	79	$a_n = (0.5)^{n-1}$
11	79	$a_n = 4(3)^{n-1}$
12	79	$a_n = 5(-5)^{n-1}$
13	79	$S_n = \frac{(3)(1 - 2^6)}{1 - 2} = 189$
14	79	$S_n = \frac{(1.5)(1 - 4^5)}{1 - 4} = 511.5$
15	79	$S_n = \frac{(1)(1 - 1.5^4)}{1 - 1.5} = 8.125$
16	79	$S_n = \frac{(5)(1 - 0.1^4)}{1 - 0.1} = 5.555$




$S_n = \frac{(7)(1 - 7^5)}{1 - 7} = 19607$	79	17
$S_n = \frac{(1)(1 - (-1)^{99})}{1 + 1} = 1$	79	18
$a_1 = 100$ $r = 0.8$ $S_n = \frac{(100)(1 - 0.8^{12})}{1 - 0.8} \approx 465.6$	80	19
$a_1 = 5$ $r = 2$ $a_n = 5(2)^{n-1}$	80	20
$S_n = \frac{(5)(1 - 2^4)}{1 - 2} = 75$	80	21
$a_1 = 0.1$ $r = 0.5$ $S_n = \frac{(0.1)(1 - 0.5^{15})}{1 - 0.5} \approx 0.2 \text{ mm}$	80	22
$\sum_{k=1}^{\infty} c = c + c + c + \dots$ بما أن أساس المتسلسلة: $r = \frac{c}{c} = 1, \quad c \neq 0$ إذن، المتسلسلة هندسية.	80	23
$x + 3x^2 + 9x^3 = 86$ $x = 2$	80	24
$12 = a_1 \times r$ $-768 = a_1 \times r^4$ بقسمة المعادلة الثانية على المعادلة الأولى ينتج: $r = -3, \quad a_1 = -4$ $a_n = -4(-3)^{n-1}$	80	25
$S_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$ $-rS_n = -ra - ar^2 - ar^3 - \dots - ar^n$ بالجمع ينتج أن: $S_n - rS_n = a - ar^n$ $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$	80	26

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
أتحقق من فهمي	82	a) $S_1 = \frac{1}{3}$ $S_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$ $S_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} = \frac{13}{27}$ $S_4 = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} = \frac{40}{81}$ $S_5 = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \frac{1}{243} = \frac{121}{243}$ 
أتحقق من فهمي	85	b) $S_1 = 2$ $S_2 = 2 + 2 = 4$ $S_3 = 2 + 2 + 2 = 6$ $S_4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8$ $S_5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$ 
أتحقق من فهمي	85	a) $r = \left \frac{1}{6}\right < 1$ إذن، المتسلسلة متقاربة $S_{\infty} = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}} = 1.2$ b) $r = -2 = 2 > 1$ إذن، المتسلسلة متباعدة c) $r = -0.3 = 0.3 < 1$ إذن، المتسلسلة متقاربة $S_{\infty} = \frac{9}{1 + 0.3} = \frac{90}{13}$

$\frac{14}{99}$	86	أتحقق من فهمي
$a_1 = 2$ $r = 0.77$ $S_{\infty} = \frac{2}{1 - 0.95} = 40 \text{ m}$	87	أتحقق من فهمي

أكثررب وأحل المسائل

الإجابة / الحل التفصيلي	رقم الصفحة	رقم السؤال
$S_1 = 24$ $S_2 = 24 + 12 = 36$ $S_3 = 24 + 12 + 6 = 42$ $S_4 = 24 + 12 + 6 + 3 = 45$ $S_5 = 24 + 12 + 6 + 3 + 1.5 = 46.5$ $S_6 = 24 + 12 + 6 + 3 + 1.5 + 0.75 = 47.25$ ألاحظ أن $r = 0.5 = 0.5 < 1$ ، فالمتسلسلة متقاربة	87	1
$S_1 = 2$ $S_2 = 2 + 8 = 10$ $S_3 = 2 + 8 + 32 = 42$ $S_4 = 2 + 8 + 32 + 128 = 170$ $S_5 = 2 + 8 + 32 + 128 + 512 = 682$ $S_6 = 2 + 8 + 32 + 128 + 512 + 2048 = 2730$ ألاحظ أن $r = 4 = 4 > 1$ ، فالمتسلسلة متباعدة	87	2
$S_1 = 1$ $S_2 = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$ $S_3 = 1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} = \frac{19}{9}$ $S_4 = 1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} = \frac{65}{27}$ $S_5 = 1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \frac{16}{81} = \frac{211}{81}$ $S_6 = 1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \frac{16}{81} + \frac{32}{243} = \frac{665}{243}$ ألاحظ أن $r = \left \frac{2}{3}\right = \frac{2}{3} < 1$ ، فالمتسلسلة متقاربة	87	3

$S_1 = 1$ $S_2 = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$ $S_3 = 1 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4} = \frac{19}{4}$ $S_4 = 1 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4} + \frac{27}{8} = \frac{65}{8}$ $S_5 = 1 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4} + \frac{27}{8} + \frac{81}{16} = \frac{211}{16}$ $S_6 = 1 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4} + \frac{27}{8} + \frac{81}{16} + \frac{243}{32} = \frac{599}{32}$ ، $r = \left \frac{3}{2}\right = \frac{3}{2} > 1$ ألاحظ أن فالمتسلسلة متباعدة		87	4
$S_1 = 1$ $S_2 = 1 - 1 = 0$ $S_3 = 1 - 1 + 1 = 1$ $S_4 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$ $S_5 = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 1$ $S_6 = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 = 0$ ، $r = -1 = 1 \geq 1$ ألاحظ أن فالمتسلسلة متباعدة		87	5
$S_1 = 343$ $S_2 = 343 + 49 = 392$ $S_3 = 343 + 49 + 7 = 399$ $S_4 = 343 + 49 + 7 + 1 = 400$ $S_5 = 343 + 49 + 7 + 1 + \frac{1}{7} = \frac{2801}{7}$ $S_6 = 343 + 49 + 7 + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{49} = \frac{19608}{49}$ ، $r = \left \frac{1}{7}\right = \frac{1}{7} < 1$ ألاحظ أن فالمتسلسلة متقاربة		87	6



$ r = 0.75 < 1$ إن، المتسلسلة متقاربة $S_{\infty} = \frac{1}{1 - 0.75} = 4$	87	7
$ r = \left \frac{7}{6}\right > 1$ إن، المتسلسلة متباعدة، ولا يمكن إيجاد مجموع عدد لا نهائي من حدودها	87	8
$ r = \left -\frac{1}{3}\right < 1$ إن، المتسلسلة متقاربة $S_{\infty} = \frac{5}{1 + \frac{1}{3}} = 3.75$	87	9
$ r = \left \frac{1}{10}\right < 1$ إن، المتسلسلة متقاربة $S_{\infty} = \frac{10}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{100}{9}$	87	10
$ r = 0.25 < 1$ إن، المتسلسلة متقاربة $S_{\infty} = \frac{192}{1 - 0.25} = 256$	87	11
$ r = 0.35 < 1$ إن، المتسلسلة متقاربة $S_{\infty} = \frac{1}{1 - 0.35} = \frac{20}{13}$	87	12
$a_1 = 0.7, \quad r = 0.1$ $\frac{7}{9}$	88	13
$a_1 = 0.41, \quad r = 0.01$ $\frac{41}{99}$	88	14
$a_1 = 0.4, \quad r = 0.1$ $\frac{4}{9}$	88	15

$a_1 = 0.05, \quad r = 0.1$	$\frac{1}{18}$	88	16
$a_1 = 0.86, \quad r = 0.01$	$\frac{86}{99}$	88	17
$a_1 = 0.3, \quad r = 0.1$	$\frac{10}{33}$	88	18
$a_1 = 20, \quad r = 0.7$	$a_n = 20(0.7)^{n-1}$	88	19
	$S_\infty = \frac{20}{1 - 0.7} = \frac{200}{3}$	88	20
	$S_\infty = \frac{12}{1 - 0.75} = 48$	88	21
	$S_\infty = \frac{8}{1 - 0.98} = 400$	88	22
	المتسلسلة متباعدة، لأن $ r = 2.5 > 1$ إذن، لا يمكن إيجاد مجموع عدد لا نهائي من حدودها	88	23
	إجابة محتملة: $3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \dots$ حيث $ r = \frac{1}{2} < 1$ $S_\infty = \frac{3}{1 - 0.5} = 6$	88	24
	المتسلسلة هي: $a + ar + 4 + \dots$ $4 = ar^2$ ، أي أن: $r = \pm \frac{2}{\sqrt{a}}$ $S_\infty = \frac{a}{1 - \frac{2}{\sqrt{a}}}$ أو $S_\infty = \frac{a}{1 + \frac{2}{\sqrt{a}}}$	88	25


اختبار نهاية الوحدة

رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	89	c
2	89	d
3	89	b
4	89	b
5	89	a
6	89	متسلسلة حسابية
7	89	متسلسلة هندسية
8	89	متسلسلة هندسية
9	89	متسلسلة حسابية
10	89	متسلسلة حسابية
11	89	متسلسلة هندسية
12	89	$S_1 = 14 = a_1$ $S_2 = 40 = a_1 + a_2$ $S_3 = 78 = a_1 + a_2 + a_3$ اذن المتسلسلة هي 14, 26, 38, ... وهي متسلسلة حسابية
13	89	$50 = a_1 + 17d$ $a_1 + 9d = 2(a_1 + 3d)$ $a_1 = 3d \Rightarrow d = 2.5, \quad a_1 = 7.5$ $a_n = 5 + 2.5n$
14	89	$a_1 = 2000$ $r = 1.25$ $n = 9$ المتسلسلة هي: $\sum_{n=1}^9 2000(1.25)^{n-1}$ $= 2000 + 2500 + 3125 + \dots + 2000(1.25)^8$ $S_n = \frac{2000(1 - 1.25^9)}{1 - 1.25} \approx 51604.6 \text{ JD}$
15	90	$a_1 = 5$ $d = 2$ $n = 15$ $a_n = 5 + 2(n - 1) = 2n + 3$ $a_{15} = 33$ $S_n = \frac{15(5 + 33)}{2} = 285$



$a_1 = 9$ $r = 0.75$ $a_4 = 9(0.75)^3 = 3.796875$	90	16
$a_n = 9(0.75)^{n-1}$	90	17
$a_8 = 1.20135498$ $a_9 = 0.9010162354$ إذن، ستصطدم ثماني مرات قبل ان يصبح ارتدادها أقل من 1 متر	90	18
$S_\infty = \frac{9}{1 - 0.75} = 36 \text{ m}$	90	19
$a_1 = 2700$ $r = 1.03$ $S_n = \frac{2700(1 - 1.03^{10})}{1 - 1.03} \approx 30952.5 \text{ JD}$	90	20
أعداد الأسماك التي نفقت هي: $7 + 7 + 7 + \dots + 7$ 10 مرات، وتمثلها المتسلسلة $\sum_{k=1}^{10} (7)$	90	21
c	90	22
c	90	23
a	99	24



السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	6	المجال هو جميع قيم x الحقيقية ، المدى هو جميع قيم x الحقيقية 
2	6	المجال هو جميع قيم x الحقيقية ما عدا 1 ، المدى هو جميع قيم y الحقيقية ما عدا 2 
3	7	$y = -\frac{4}{5}x + 4$
4	7	$y = \frac{1}{2}x$



الدرس 1 (الاقترانات المتشعبة)

السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	8	المجال هو جميع قيم x الحقيقية
2	8	$f(1) = 0$ ، $f(0) = 1$ ، $f(-2) = -3$
3	8	المجال هو جميع قيم x الحقيقية ، المدى هو جميع قيم y الحقيقية التي تنتمي للفترة $(-\infty, 1]$ 
4	8	$f(x) = \begin{cases} -2x - 1, & x \leq 2 \\ -x + 4, & x > 2 \end{cases}$
5	8	$f(x) = \begin{cases} -4, & x < -2 \\ x - 2, & -2 \leq x < 2 \\ -2x + 4, & x \geq 2 \end{cases}$
6	8	$f(x) = \begin{cases} 15, & 0 < x \leq 300 \\ 20, & x > 300 \end{cases}$
7	8	$f(x) = \begin{cases} 12, & 0 < x \leq 5 \\ 14, & 5 < x \leq 8 \end{cases}$

الدرس 2 (اقتران القيمة المطلقة)

السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	9	$f(x) = \begin{cases} x - 3, & x \geq 3 \\ 3 - x, & x < 3 \end{cases}$
2	9	$f(-1) = 4$ ، $f(3) = 0$ ، $f(4) = 1$
3	9	$f(x) = \begin{cases} 4 - 2x, & x < 2 \\ 2x - 4, & x \geq 2 \end{cases}$
4	9	$f(-2) = 8$ ، $f(2) = 0$ ، $f(3) = 2$
5	9	المجال هو جميع قيم x الحقيقية ، المدى هو جميع قيم y الحقيقية التي تنتمي للفترة $[0, \infty)$ 
6	9	المجال هو جميع قيم x الحقيقية ، المدى هو جميع قيم y الحقيقية التي تنتمي للفترة $[1, \infty)$ 

 المجال هو جميع قيم x الحقيقية ، المدى هو جميع قيم y الحقيقية التي تنتمي للفترة $[1, \infty)$	9	7
 المجال هو جميع قيم x الحقيقية ، المدى هو جميع قيم y الحقيقية التي تنتمي للفترة $[-1, \infty)$ 	9	8
$f(x) = x - 3 $	9	9
$f(x) = x + 3 $	9	10
$f(x) = x + 3$	9	11
$f(x) = x - 3$	9	12

السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	10	المجال هو جميع قيم x الحقيقية ، المدى هو جميع قيم y الحقيقية 
2	10	المجال هو جميع قيم x الحقيقية التي تنتمي إلى $[-2, \infty)$ المدى هو جميع قيم y الحقيقية التي تنتمي إلى $(-3, 3] \cup \{4\}$  
3	11	$3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$
4	11	$x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)$
5	11	$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$
6	11	$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$
7	11	$x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$
8	11	$2x^2 - 6x + 4 = 2(x - 1)(x - 2)$
9	11	$x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$
10	11	$2x^3 + 128 = 2(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$

الدرس 1 (النهايات والاتصال)

السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي														
1	12	$\lim_{x \rightarrow -2} h(x)$ غير موجودة														
2	12	$\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = 3$														
3	12	$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 3$														
4	12	بيانياً (من الشكل المجاور) $\lim_{x \rightarrow 1^+} (3x + 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3x + 1) = 4$ إذن؛ $\lim_{x \rightarrow 1} (3x + 1) = 4$ عددياً (من الجدول أدناه) <table><tr><td>0.9</td><td>0.99</td><td>0.999</td><td>1</td><td>1.001</td><td>1.01</td><td>1.1</td></tr><tr><td>3.7</td><td>3.97</td><td>3.997</td><td>1</td><td>4.003</td><td>4.03</td><td>4.3</td></tr></table> $\lim_{x \rightarrow 1} (3x + 1) = 4$ ، إذن؛ $\lim_{x \rightarrow 1^+} (3x + 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3x + 1) = 4$	0.9	0.99	0.999	1	1.001	1.01	1.1	3.7	3.97	3.997	1	4.003	4.03	4.3
0.9	0.99	0.999	1	1.001	1.01	1.1										
3.7	3.97	3.997	1	4.003	4.03	4.3										
5	12	بيانياً (من الشكل المجاور) $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -1$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -2$ أي أن: $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x)$ إذن؛ $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ غير موجودة عددياً (من الجدول أدناه) <table><tr><td>-0.1</td><td>-0.01</td><td>-0.001</td><td>0</td><td>0.001</td><td>0.01</td><td>0.1</td></tr><tr><td>-1.1</td><td>-1.01</td><td>-1.001</td><td></td><td>-1.999</td><td>-1.99</td><td>-1.9</td></tr></table>	-0.1	-0.01	-0.001	0	0.001	0.01	0.1	-1.1	-1.01	-1.001		-1.999	-1.99	-1.9
-0.1	-0.01	-0.001	0	0.001	0.01	0.1										
-1.1	-1.01	-1.001		-1.999	-1.99	-1.9										

$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -1$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x)$ أي أن $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -2$ إذن؛ $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ غير موجودة		
$\lim_{x \rightarrow 1} (3x^3 + x - 1)$ $= \lim_{x \rightarrow 1} (3x^3) + \lim_{x \rightarrow 1} (x) - \lim_{x \rightarrow 1} (1)$ $= 3(\lim_{x \rightarrow 1} x)^3 + \lim_{x \rightarrow 1} (x) - \lim_{x \rightarrow 1} (1)$ $= 3(1)^3 + 1 - 1$ $= 3$	12	6
$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{2x^2 + 8}$ $= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 + 8)} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2) + \lim_{x \rightarrow 2} (8)}$ $= \sqrt{2 \times (\lim_{x \rightarrow 2} (x))^2 + \lim_{x \rightarrow 2} (8)} = \sqrt{2 \times (2)^2 + 8}$ $= \sqrt{16}$ $= 4$	12	7
$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{5x - 20}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{5(x - 4)}{x - 4} = 5$	12	8
$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x + 1)(x + 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x + 1) = 0$	12	9
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{(x + 1)} = \frac{1}{2}$	12	10
$f(1) = 1 + 1 = 2$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x^2) = 2$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = f(1)$ إذن: f متصل عند $x = 1$	12	11
بما أن g غير معرف عند $x = 1$ ، فإنه غير متصل عند $x = 1$	12	12
$h(-2) = 2(-2) = -4$ $\lim_{x \rightarrow -2} h(x) = \lim_{x \rightarrow -2} (x + 2) = 0$ $h(-2) \neq \lim_{x \rightarrow -2} h(x)$ إذن: h غير متصل عند $x = -2$	12	13

$q(2) = -12$ $\lim_{x \rightarrow 2} q(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{8 - x^3}{x - 2}$ $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2 - x)(4 + 2x + x^2)}{x - 2}$ $= \lim_{x \rightarrow 2} -1(4 + 2x + x^2) = -12$ $q(2) = \lim_{x \rightarrow 2} q(x) = -12$	12	14
إذن: q متصل عند $x = 2$		

الدرس 2 (المشتقة)		
السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	13	$f'(0) = 5$
2	13	$f'(-3) = 1$
3	13	$f'(2) = 6$
4	13	$f'(1) = 10$
5	13	$f'(1) = 10$
6	13	$f'(2) = -1$
7	13	$\frac{dy}{dx} = 0$
8	13	$\frac{dy}{dx} = -\pi$
9	13	$\frac{dy}{dx} = x^2 - 10x^{-3} - 7 = x^2 - \frac{10}{x^3} - 7$
10	13	$\frac{dy}{dx} = 12x^2 + \frac{1}{3}$
11	13	$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\sqrt{x}}$
12	13	$\frac{dy}{dx} = 8\sqrt[3]{x} - \frac{8}{x^3}$
13	13	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{4\sqrt{x}}$
14	13	$\frac{dy}{dx} = 16\sqrt[5]{x^5} + 2x$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{4\sqrt{x^3}} - \frac{3}{\sqrt{x^5}}$	13	15
$\frac{dy}{dx} = 2x + 6$	13	16
$100 - 16t^2 = 0 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{100}{16}} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ sec}$ $h'(x) = -32t$ $h'(2.5) = -32(2.5) = -80 \text{ ft/sec}$	13	17

الدرس 3 (التزايد والتناقص لكثيرات الحدود)		
السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	14	للاقتزان f قيم حرجة عند $x = -1$ ، و $x = 2$ الاقتزان f متناقص في $(-\infty, -1)$ وفي $(2, \infty)$ ، ومتزايد في $(-1, 2)$
2	14	$(4, -8)$
3	14	$(-1, 1)$
4	14	$(0, 6)$ ، $(4, -26)$
5	14	$\left(2, \frac{16}{3}\right)$ ، $\left(-2, -\frac{16}{3}\right)$
6	14	$\left(-1, \frac{20}{3}\right)$ ، $(3, -4)$
7	14	$(1, 5)$ ، $(3, 1)$
8	14	متناقص في $(-\infty, 1)$ ، ومتزايد في $(1, \infty)$
9	14	متناقص في $(-1, 3)$ ، ومتزايد في $(-\infty, -1)$ وفي $(3, \infty)$
10	14	متناقص في $(3, 5)$ ، ومتزايد في $(-\infty, 3)$ وفي $(5, \infty)$
11	14	متزايد في $(-2, 2)$ ، ومتناقص في $(-\infty, -2)$ وفي $(2, \infty)$
12	14	لا يوجد نقاط حرجة لا يوجد قيم عظمى أو قيم صغرى
13	14	$(1, -2)$ نقطة حرجة ، وعندها للاقتزان قيمة صغرى محلية (ومطلقة)

(0, 0) نقطة حرجة، وعندها للاقتران قيمة عظمى محلية (2, -4) نقطة حرجة، وعندها للاقتران قيمة صغرى محلية	14	14
$(-1, \frac{7}{3})$ نقطة حرجة، وعندها للاقتران قيمة عظمى محلية $(3, -\frac{25}{3})$ نقطة حرجة، وعندها للاقتران قيمة صغرى محلية	14	15
$h(t) = 96t - 16t^2$ $h'(t) = 96 - 32t$ $96 - 32t = 0 \Rightarrow t = 3$ $h(3) = 96(3) - 16(3)^2 = 288 - 144 = 144 \text{ ft}$	14	16

الوحدة 6 : المتتاليات والمتسلسلات

أجابات أستعد لدراسة الوحدة صفحة 15، وصفحة 16

كتابة حدود متتالية علم منها أول ثلاثة حدود على الأقل	
16, 18, 20	1
-162, 486, -1458	2
تصنيف المتتالية إلى خطية أو تربيعية أو تكعيبية	
الحد العام يمثل المتتالية وهي خطية $T(75) = 224$	1
الحد العام يمثل المتتالية وهي تربيعية $T(75) = 11248$	2
الحد العام يمثل المتتالية وهي تكعيبية $T(75) = 421880$	3
الحد العام يمثل المتتالية وهي خطية $T(75) = -149$	4

إيجاد الحد العام لمتتالية	
$T(n) = 5n - 1$	1
$T(n) = n^2$	2
$T(n) = n^3 + 4$	3
$T(n) = 10n$	4
$T(n) = n^3 + 1$	5
$T(n) = n^2 + 5$	6

الدرس 1 : المتتاليات والمتسلسلات		
رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	17	متسلسلة غير منتهية $\sum_{k=1}^{\infty} (6k - 1)$
2	17	متسلسلة منتهية $\sum_{k=1}^4 (6k - 16)$
3	17	متسلسلة منتهية $\sum_{k=1}^5 (6k^2 - 1)$
4	17	متسلسلة غير منتهية $\sum_{k=1}^{\infty} 7$
5	17	متسلسلة غير منتهية $\sum_{k=1}^{\infty} (3 - 4k)$
6	17	متسلسلة منتهية



$\sum_{k=1}^6 (-9)$		
$2+9+18+23+30+37=119$	17	7
$-2+12+50+124+246=430$	17	8
$8+5+0-7=6$	17	9
$4+8+12+16+20+24=84$	17	10
$0+3+6=9$	17	11
$-2-2-2-2-2-2-2-2-2=-18$	17	12
$\sum_{k=1}^{10} (1000 - 10k)$	17	13
$\sum_{k=1}^n \frac{k(k+1)}{2}$	17	14

الدرس 2 : المتتاليات والمتسلسلات الحسابية			
رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي	
1	18	المتتالية حسابية $d = -3$	
2	18	المتتالية حسابية $d = -0.7$	
3	18	المتتالية حسابية $d = 9$	
4	18	المتتالية حسابية $d = -5$	
5	18	المتتالية حسابية $d = 9$	
6	18	المتتالية حسابية $d = 0.25$	
7	18	$a_n = 8 - 5n$	
8	18	$a_n = 58 - 7n$	
9	18	$a_n = 3.4 - 0.4n$	
10	18	$a_n = 9n - 5$	
11	18	$a_n = 3 + 2n$	
12	18	$a_n = 88 - 3n$	
13	18	$S_n = (19) \left(\frac{10 + 172}{2} \right) = 1729$	
14	18	$S_n = (22) \left(\frac{29 - 76}{2} \right) = -517$	




$S_n = (11) \left(\frac{-7 + 3}{2} \right) = -22$	18	15
$S_n = (17) \left(\frac{60 + 44}{2} \right) = 884$	18	16
$S_n = (13) \left(\frac{-5 - 65}{2} \right) = -455$	18	17
$S_n = (88) \left(\frac{3 + 3}{2} \right) = 264$	18	18
$a_n = 75 + 15n$ $S_n = (14) \left(\frac{90 + 285}{2} \right) = 2625 \text{ min}$ أي أن مجموع ساعات عملها هو 43 ساعة و45 دقيقة خلال الأسبوعين	18	19


الدرس 3 : المتتاليات والمتسلسلات الهندسية		
رقم السؤال	رقم الصفحة	الإجابة / الحل التفصيلي
1	19	المتتالية هندسية $r = -4$
2	19	المتتالية هندسية $r = 0.5$
3	19	المتتالية هندسية $r = 0.2$
4	19	المتتالية هندسية $r = 5$
5	19	المتتالية هندسية $r = 4$
6	19	المتتالية ليست هندسية
7	19	$a_n = 6(-2)^{n-1}$
8	19	$a_n = 88(0.5)^{n-1}$
9	19	$a_n = 10(3)^{n-1}$
10	19	$a_n = \frac{5}{4}(2)^{n-1}$
11	19	$a_n = (3)^{n-1}$
12	19	$a_n = -6(-2)^{n-1}$
13	19	$S_n = \frac{(2)(1 - 4^{18})}{1 - 4} \approx 4.58 \times 10^{10}$
14	19	$S_n = \frac{(0.6)(1 - 2^{17})}{1 - 2} = 78642.6$
15	19	$S_n = \frac{(1)(1 - 3.5^{20})}{1 - 3.5} \approx 3 \times 10^{10}$

$S_n = \frac{(3)(1 - 0.3^9)}{1 - 0.3} = 4.28562993$	19	16
$S_n = \frac{(5)(1 - 6^{15})}{1 - 6} \approx 4.7 \times 10^{11}$	19	17
$S_n = \frac{(1)(1 - 0.1^{12})}{1 - 0.1} = 1.111111111$	19	18
$a_n = 600(1.35)^{n-1}$ $S_n = \frac{(600)(1 - 1.35^4)}{1 - 1.35} \approx 3980$	19	19

الدرس 4 : المتسلسلات الهندسية اللانهائية		
الإجابة / الحل التفصيلي	رقم الصفحة	رقم السؤال
$S_1 = 192$ $S_2 = 192 + 48 = 240$ $S_3 = 192 + 48 + 12 = 252$ $S_4 = 192 + 48 + 12 + 3 = 255$ $S_5 = 192 + 48 + 12 + 3 + \frac{3}{4} = \frac{1023}{4}$ 	20	1
$S_1 = 2$ $S_2 = 2 + 10 = 12$ $S_3 = 2 + 10 + 50 = 62$ $S_4 = 2 + 10 + 50 + 250 = 312$ $S_5 = 2 + 10 + 50 + 250 + 1250 = 1562$ 	20	2

$S_1 = 1$ $S_2 = 1 + \frac{1}{9} = \frac{10}{9}$ $S_3 = 1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{81} = \frac{91}{81}$ $S_4 = 1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{81} + \frac{1}{729} = \frac{820}{729}$ $S_5 = 1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{81} + \frac{1}{729} + \frac{1}{6561}$ $= \frac{7381}{6561}$	20	3
$S_1 = 2$ $S_2 = 2 + \frac{2}{5} = \frac{12}{5}$ $S_3 = 2 + \frac{2}{5} + \frac{2}{25} = \frac{62}{25}$ $S_4 = 2 + \frac{2}{5} + \frac{2}{25} + \frac{2}{125} = \frac{312}{125}$ $S_5 = 2 + \frac{2}{5} + \frac{2}{25} + \frac{2}{125} + \frac{2}{625}$ $= \frac{1562}{625}$	20	4
$S_1 = 8$ $S_2 = 8 - 8 = 0$ $S_3 = 8 - 8 + 8 = 8$ $S_4 = 8 - 8 + 8 - 8 = 0$ $S_5 = 8 - 8 + 8 - 8 + 8 = 8$	20	5



$S_1 = 1029$ $S_2 = 1029 + 147 = 1176$ $S_3 = 1029 + 147 + 21 = 1197$ $S_4 = 1029 + 147 + 21 + 3 = 1200$ $S_5 = 1029 + 147 + 21 + 3 + \frac{3}{7} = \frac{8403}{7}$		20	6
$ r = \left \frac{5}{3} \right > 1$ متباعدة	20	7	
$ r = \left \frac{1}{3} \right < 1$ $S_{\infty} = \frac{3}{1 - \frac{1}{3}} = 4.5$ متقاربة	20	8	
$ r = \left -\frac{1}{2} \right < 1$ $S_{\infty} = \frac{\frac{2}{7}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{4}{21}$ متقاربة	20	9	
$ r = \left \frac{1}{3} \right < 1$ $S_{\infty} = \frac{297}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{891}{2}$ متقاربة	20	10	
$ r = \left \frac{1}{2} \right < 1$ $S_{\infty} = \frac{64}{1 - \frac{1}{2}} = 128$ متقاربة	20	11	
$ r = \left \frac{5}{4} \right > 1$ متباعدة	20	12	

$\alpha_1=0.32, r=0.01$	$\frac{32}{99}$	20	13
$\alpha_1=0.09, r=0.01$	$\frac{1}{11}$	20	14
$\alpha_1=0.8, r=0.1$	$\frac{8}{9}$	20	15
$\alpha_1=0.44, r=0.01$	$\frac{4}{9}$	20	16
$\alpha_1=0.92, r=0.01$	$\frac{92}{99}$	20	17
$\alpha_1=0.5, r=0.1$	$\frac{5}{9}$	20	18
$S_{\infty} = \frac{1.1}{1 - 0.68} = 3.4375 \text{ m}$		20	19

