



الرياضيات

الصف الثاني عشر - الفرع العلمي

الفصل الدراسي الثاني

12

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

هبة ماهر التميمي أ.د. محمد صبح صباحه يوسف سليمان جرادات

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 📠 06-5376266 ✉ P.O.Box: 2088 Amman 11941






📱 @nccdjor 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo



© Harper Collins Publishers Limited 2021.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.



1443 هـ / 2022 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

أعزّاونَا الطلبة ...

يحتوي هذا الكتاب على تمارين مُنوّعة أُعِدَّت بعناية لتفنيكم عن استعمال مراجع إضافية، وهي تُعَدُّ استكمالاً للتمارين الواردة في كتاب الطالب، وتهدف إلى مساعدة تكم على ترسيخ المفاهيم التي تتعلّمونها في كل درس، وتُنتمي مهاراتكم الحسابية.

قد يختار المعلم / المُعلّمة بعض تمارين هذا الكتاب واجباً منزلياً، ويركّز لكم بعضها الآخر لكي تحلّوها عند الاستعداد للاختبارات الشهرية واختبارات نهاية الفصل الدراسي.

أما الصفحات التي تحمل عنوان (أُستعد لدراسة الوحدة) فهي بداية كل وحدة، فإنّها تساعدكم على مراجعة المفاهيم التي درستوها سابقاً؛ ما يُعزّز قدرتكم على متابعة التعلّم في الوحدة الجديدة بسلاسة ويسر.

قد لا يتوافر فراغ كافٍ لإنهاء كل تمرين لكتابة خطوات الحلّ جميعها؛ لذا يُمكن استعمال دفتر إضافي لكتابتها بوضوح.

تمنّين لكم تعلّماً ممتعاً ومُيسّراً.

المركز الوطني لتطوير المناهج

قائمة المحتويات

الوحدة 4 التكامل

6 أستعد لدراسة الوحدة

11 **الدرس 1** تكامل اقترانات خاصة

13 **الدرس 2** التكامل بالتعويض

14 **الدرس 3** التكامل بالكسور الجزئية

15 **الدرس 4** التكامل بالأجزاء

16 **الدرس 5** المساحات والحجوم

18 **الدرس 6** المعادلات التفاضلية

قائمة المحتويات

الوحدة 5 المتجهات

19 أستعد لدراسة الوحدة

22 الدرس 1 المتجهات في الفضاء

24 الدرس 2 المستقيمات في الفضاء

27 الدرس 3 الضرب القياسي

الوحدة 6 الإحصاء والاحتمالات

30 أستعد لدراسة الوحدة

34 الدرس 1 التوزيع الهندسي وتوزيع ذي الحدين

35 الدرس 2 التوزيع الطبيعي

37 ورق منقّط متساوي القياس

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة أستعين بالمثال المعطى.

• إيجاد تكاملات غير محدودة لاقتدرات القوة

أجد كلاً من التكاملات الآتية:

1 $\int 3x^2 dx$

2 $\int (2 + x^3 + 5x^{-2}) dx$

3 $\int \left(2x^7 - \frac{4}{x^4}\right) dx$

4 $\int \left(\sqrt{x} - \frac{3}{\sqrt{x}}\right) dx$

5 $\int x(4x^3 - 4x + 1) dx$

6 $\int \left(\frac{x^3 + 7x - 2x^2}{x}\right) dx$

7 $\int (x - 1)(x + 3) dx$

8 $\int (2x + 5)^5 dx$

9 $\int \frac{x^2 - 1}{x + 1} dx$

مثال: أجد كلاً من التكاملات الآتية:

a) $\int (8x^3 - 3x + 1) dx$

$$\begin{aligned} \int (8x^3 - 3x + 1) dx &= \frac{8}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + x + C \\ &= 2x^4 - \frac{3}{2}x^2 + x + C \end{aligned}$$

تكامل اقتران القوة المضروب في ثابت، وتكامل الثابت

بالتبسيط

b) $\int \frac{x^7 - 4x^3 + 8x}{2x} dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^7 - 4x^3 + 8x}{2x} dx &= \int \left(\frac{x^7}{2x} - \frac{4x^3}{2x} + \frac{8x}{2x}\right) dx \\ &= \int \left(\frac{1}{2}x^6 - 2x^2 + 4\right) dx \\ &= \frac{1}{14}x^7 - \frac{2}{3}x^3 + 4x + C \end{aligned}$$

بقسمة كل حد في البسط على المقام

بالتبسيط

تكامل اقتران القوة المضروب في ثابت

c) $\int (\sqrt{x} + 1) dx$

$$\begin{aligned} \int (\sqrt{x} + 1) dx &= \int (x^{1/2} + 1) dx \\ &= \frac{2}{3}x^{3/2} + x + C \\ &= \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + x + C \end{aligned}$$

بكتابة المكامل في صورة أسية

تكامل اقتران القوة، والثابت

الصورة الجذرية

• إيجاد تكاملات محدودة لاقتدرات القوة

أجد قيمة كل من التكاملات الآتية:

10 $\int_{-2}^3 x^5 dx$

11 $\int_1^2 \left(\frac{2}{x^3} + 3x \right) dx$

12 $\int_1^4 \frac{2 + \sqrt{x}}{x^2} dx$

مثال: أجد قيمة: $\int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} + 4 \right) dx$

تعريف الأس السالب

تكامل اقتران القوة، وتكامل الثابت

تعريف الأس السالب

بالتعويض

بالتبسيط

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} + 4 \right) dx &= \int_1^2 (x^{-2} + 4) dx \\ &= (-1x^{-1} + 4x) \Big|_1^2 \\ &= \left(-\frac{1}{x} + 4x \right) \Big|_1^2 \\ &= \left(-\frac{1}{2} + 4(2) \right) - \left(-\frac{1}{1} + 4(1) \right) \\ &= 4\frac{1}{2} \end{aligned}$$

• إيجاد قاعدة اقتران عُلِمَت مشتقته ونقطة تحققه (الشرط الأولي)

13 أجد قاعدة الاقتران $f(x)$ إذا كان: $f'(x) = x^2 + 1$ ، ومَرَّ منحناه بالنقطة $(0, 8)$.

مثال: أجد قاعدة الاقتران $f(x)$ إذا كان: $f'(x) = x - 3$ ، ومَرَّ منحناه بالنقطة $(2, 9)$.

الخطوة 1: أجد تكامل الاقتران $f'(x)$

$$f(x) = \int (x - 3) dx$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + C$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}x^2 - 3x + C \\ 9 &= \frac{1}{2}(2)^2 - 3(2) + C \end{aligned}$$

$$C = 13$$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

تكامل اقتران القوة، وتكامل الثابت

الخطوة 2: أجد قيمة ثابت التكامل C .

قاعدة الاقتران

$$x = 2, f(2) = 9 \text{ بتعويض}$$

بحل المعادلة لـ C

إذن، قاعدة الاقتران هي: $f(x) = x^2 + 3x + 13$

إيجاد المساحة المحصورة بين منحنى اقتران والمحور x

14 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = 2x^2 - x^3$ والمحور x ، والمستقيمين: $x = 1$ و $x = 2$.

15 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = x^2 - 8x + 12$ والمحور x .

16 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = -x^3 + 4x^2 - 11x - 30$ والمحور x .

مثال: (a) أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = x^2 + 2$ والمحور x ، والمستقيمين:

$$x = -2 \text{ و } x = 1.$$

الخطوة 1: أجد الإحداثي x لنقاط تقاطع منحنى الاقتران مع المحور x في الفترة المعطاة (إن وُجدت).

لإيجاد الإحداثي x لنقاط تقاطع منحنى الاقتران في الفترة $[-2, 1]$ ، أساوي أولاً قاعدة الاقتران بالصفر، ثم أحل المعادلة الناتجة:


$$f(x) = 0$$

$$x^2 + 2 = 0$$

بمساواة الاقتران بالصفر

$$f(x) = x^2 + 2$$

بما أن $x^2 + 2 \neq 0$ ، فإن منحنى الاقتران لا يتقاطع مع المحور x كما في الشكل المجاور.



الخطوة 2: أجد المساحة عن طريق التكامل.

ألاحظ أن المساحة المطلوبة تقع فوق المحور x كما في الشكل المجاور؛ لذا أجد مساحتها كالاتي:

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

قانون المساحة التي تنحصر بين منحنى الاقتران والمحور x ، وتقع أعلى المحور x

$$= \int_{-2}^1 (x^2 + 2) dx$$

$$= \left(\frac{1}{3}x^3 + 2x \right) \Big|_{-2}^1$$

$$= \left(\frac{1}{3}(1)^3 + 2(1) \right) - \left(\frac{1}{3}(-2)^3 + 2(-2) \right)$$

$$= 9$$

$$f(x) = x^2 + 2, a = -2, b = 1$$

بالتعويض

تكامل اقتران القوة، وتكامل الثابت

بالتعويض

بالتبسيط

إذن، المساحة هي: 9 وحدات مربعة.

مثال: (b) أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = \frac{2}{x^2} - 3$ والمحور x ، والمستقيم: $x = 4$ ، و $x = 2$.

الخطوة 1: أجد الإحداثي x لنقاط تقاطع منحنى الاقتران مع المحور x في الفترة المعطاة (إن وجدت).

لإيجاد الإحداثي x لنقاط تقاطع منحنى الاقتران في الفترة $[2, 4]$ ، أساوي أولاً قاعدة الاقتران بالصفر، ثم أحل المعادلة الناتجة:


$$f(x) = 0$$

بمساواة الاقتران بالصفر

$$\frac{2}{x^2} - 3 = 0$$

$$f(x) = \frac{2}{x^2} - 3$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$$



إذن، الإحداثي x لتقاطعي تقاطع الاقتران $f(x)$ مع المحور x ليس ضمن الفترة المعطاة كما في الشكل المجاور.

الخطوة 2: أجد المساحة عن طريق التكامل.

ألاحظ أن المساحة المطلوبة تقع أسفل المحور x كما في الشكل المجاور؛ لذا أجد مساحتها كالاتي:

$$A = - \int_a^b f(x) dx$$

قانون المساحة التي تنحصر بين منحنى الاقتران والمحور x ، وتقع أسفل المحور x .

$$= - \int_2^4 \left(\frac{2}{x^2} - 3 \right) dx$$

$$f(x) = \frac{2}{x^2} - 3, a = 2, b = 4$$

$$= - \int_2^4 (2x^{-2} - 3) dx$$

تعريف الأس السالب

$$= - \left(-2x^{-1} - 3x \right) \Big|_2^4$$

تكامل اقتران القوة، وتكامل الثابت

$$= - \left(-2 \left(\frac{2}{x} \right) - 3x \right) \Big|_2^4$$

تعريف الأس السالب

$$= \left(\frac{2}{x} + 3x \right) \Big|_2^4$$

بالتبسيط

$$= \frac{2}{4} - 3(4) - \left(\frac{2}{2} + 3(2) \right)$$

بالتعويض

$$= 5.5$$

بالتبسيط

إذن، المساحة هي: 5.5 وحدة مربعة.

مثال: (c) أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = -x^3 - x^2 + 6x$ ، والمحور x .

الخطوة 1: أجد الإحداثي x لنقاط تقاطع منحنى الاقتران مع المحور x في الفترة المعطاة (إن وُجدت).

أسوي أولاً قاعدة الاقتران بالصفر، ثم أحل المعادلة الناتجة:

$$f(x) = 0$$

بمساواة الاقتران بالصفر

$$-x^3 - x^2 + 6x = 0$$

$$f(x) = -x^3 - x^2 + 6x$$

$$x(x+3)(x-2) = 0$$

بالتحليل إلى العوامل الأولية

$$x = 0 \quad \text{or} \quad x + 3 = 0 \quad \text{or} \quad x - 2 = 0$$


خاصية الضرب الصفري

$$x = 0$$

$$x = -3$$

$$x = 2$$

بحل كل معادلة x



إذن، الإحداثي x لنقاط تقاطع الاقتران $f(x)$ مع المحور x هو:

$x = -3, 0, 2$ ، كما في الشكل المجاور.

الخطوة 2: أجد المساحة عن طريق التكامل.

ألاحظ أن جزءاً من المساحة المطلوبة يقع فوق المحور x ، وأن الجزء الآخر المتبقي منها يقع أسفل هذا المحور؛ لذا أجد المساحة الكلية المطلوبة كالآتي:

$$A = -\int_{-3}^0 (-x^3 - x^2 + 6x) dx + \int_0^2 (-x^3 - x^2 + 6x) dx$$

بتجزئة المساحة إلى مجموع مساحتين فوق المحور x وأسفله

$$= -\left(-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 3x^2\right)\Big|_{-3}^0 + \left(-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 3x^2\right)\Big|_0^2$$

قاعدتا تكامل اقتران القوة المضروب في ثابت، والمجموع

$$= -\left((0) - \left(-\frac{1}{4}(-3)^4 - \frac{1}{3}(-3)^3 + 3(-3)^2\right)\right) + \left(-\frac{1}{4}(2)^4 - \frac{1}{3}(2)^3 + 3(2)^2 - 0\right)$$

بالتعويض

$$= 21.08$$

بالتبسيط

إذن، المساحة هي: 21.08 وحدة مربعة.

تكامل اقترانات خاصة

Integration of Special Functions

أوجد كلاً من التكاملات الآتية:

1 $\int 4e^{-5x} dx$

2 $\int (\sin 2x - \cos 2x) dx$

3 $\int \cos^2 2x dx$

4 $\int \frac{e^x + 4}{e^{2x}} dx$

5 $\int \left(\frac{\cos x}{\sin^2 x} - 2e^x \right) dx$

6 $\int (3 \cos 3x - \tan^2 x) dx$

7 $\int \cos x (1 + \csc^2 x) dx$

8 $\int \frac{x^2 + x - 4}{x + 2} dx$

9 $\int \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx$

10 $\int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$

11 $\int \frac{x^2 - 2x}{x^3 - 3x^2} dx$

12 $\int \ln e^{\cos x} dx$

13 $\int \sin^2 \frac{x}{2} dx$

14 $\int \frac{3}{2x - 1} dx$

15 $\int \frac{3 - 2 \cos \frac{1}{2}x}{\sin^2 \frac{1}{2}x} dx$

أوجد قيمة كلٍّ من التكاملات الآتية:

16 $\int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 4} dx$

17 $\int_1^2 \frac{dx}{3x - 2}$

18 $\int_0^{\pi/3} \sin x \cos x dx$

19 $\int_{-1}^1 |3x - 2| dx$

20 $\int_0^{\pi/4} (\cos x + 3 \sin x)^2 dx$

21 $\int_0^{\pi/4} \tan x dx$

22 $\int_0^{\pi/16} (\cos^2 2x - 4 \sin^2 x \cos^2 x) dx$


23 $\int_0^{\pi/4} \frac{(1 + \sin x)^2}{\cos^2 x} dx$

24 $\int_0^1 \frac{6x}{3x - 2} dx$

25 إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x \leq 3 \\ 10 - x, & x > 3 \end{cases}$ ، فأوجد قيمة: $\int_1^5 f(x) dx$

26 إذا كان: $\int_1^k \frac{4}{2x - 1} dx = 1$ ، فأوجد قيمة الثابت k ، حيث: $k > 0$

27 إذا كان: $\int_0^{\ln a} (e^x + e^{-x}) dx = \frac{48}{7}$ ، فأوجد قيمة الثابت a ، حيث: $a > 0$

تكامل اقترانات خاصة
Integration of Special Functions

28 يُبين الشكل المجاور جزءاً من منحنى الاقتران: $f(x) = 2 \cos^2 0.5x$.

أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران، والمحورين الإحداثيين الموجبين.

يُمثل الاقتران $f'(x)$ في كلِّ ممّا يأتي ميل المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ المارّ بالنقطة المعطاة. أستخدم المعلومات المعطاة لإيجاد قاعدة الاقتران $f(x)$:

29 $f'(x) = e^{-x} + x^2$; $(0, 4)$

30 $f'(x) = \frac{3}{x} - 4$; $(1, 0)$

يتحرّك جُسيّم في مسار مستقيم، وتعطى سرعته المتجهة بالاقتران: $v(t) = \frac{t}{1+t^2}$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتّر لكل ثانية:

31 أجد إزاحة الجُسيّم في الفترة $[0, 3]$.

32 أجد المسافة الكلية التي قطعها الجُسيّم في الفترة $[0, 3]$.

يتحرّك جُسيّم في مسار مستقيم، وتعطى سرعته المتجهة بالاقتران: $v(t) = 6 \sin 3t$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتّر لكل ثانية:

33 أجد إزاحة الجُسيّم في الفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$.

34 أجد المسافة الكلية التي قطعها الجُسيّم في الفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$.

35 يتحرّك جُسيّم في مسار مستقيم، وتعطى سرعته المتجهة بالاقتران:

$$v(t) = \begin{cases} 8t - t^2 & , 0 \leq t \leq 6 \\ 15 - \frac{1}{2}t & , t > 6 \end{cases}$$

حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتّر لكل ثانية. إذا انطلق الجُسيّم من نقطة الأصل، فأجد موقعه بعد 40 ثانية من بدء الحركة.

التكامل بالتعويض

Integration by Substitution

أوجد كلاً من التكاملات الآتية:

1 $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} dx$

2 $\int \left(1 - \cos \frac{x}{2}\right)^2 \sin \frac{x}{2} dx$

3 $\int \csc^5 x \cos^3 x dx$

4 $\int x \sin x^2 dx$

5 $\int x^3 (x+2)^7 dx$

6 $\int \frac{\ln \sqrt{x}}{x} dx$

7 $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

8 $\int \frac{\sin(\ln 4x^2)}{x} dx$

9 $\int \sec^2 x \cos^3(\tan x) dx$

أوجد قيمة كلٍّ من التكاملات الآتية:

10 $\int_6^{20} \frac{8x}{\sqrt{4x+1}} dx$


11 $\int_2^5 \frac{1}{1+\sqrt{x-1}} dx$

12 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{1+\cos x} dx$

13 $\int_1^4 \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} dx$

14 $\int_0^{\pi/4} \frac{e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx$

15 $\int_0^{\pi/3} \cos^2 x \sin^3 x dx$



16 يُبين الشكل المجاور جزءاً من منحنى الاقتران: $f(x) = x\sqrt{x+1}$. أوجد مساحة المنطقة المظللة من هذا المنحنى.

يُمثل الاقتران $f'(x)$ في كلِّ ممّا يأتي ميل المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ المارّ بالنقطة المعطاة. أَسْتَعمل المعلومات المعطاة لإيجاد قاعدة الاقتران $f(x)$:

17 $f'(x) = 16 \sin x \cos^3 x; \left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$

18 $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+5}}; (2, 1)$

19 يتحرّك جُسَيْم في مسار مستقيم، وتعطى سرعته المتجهة بالاقتران: $v(t) = \frac{-2t}{(1+t)^{3/2}}$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتري لكل ثانية. إذا كان الموقع الابتدائي للجُسَيْم هو 4 m، فأوجد موقع الجُسَيْم بعد t ثانية.

الدرس 3

التكامل بالكسور الجزئية Integration by Partial Fractions

أجد كلاً من التكاملات الآتية:

1 $\int \frac{4}{x^2 + 4x} dx$

2 $\int \frac{6}{x^2 - 9} dx$

3 $\int \frac{x^2 - 3x + 8}{x^3 - 4x + 2} dx$

4 $\int \frac{x - 10}{x^2 - 2x - 8} dx$

5 $\int \frac{2x^2 + 6x - 2}{2x^2 + x - 1} dx$

6 $\int \frac{2x^2 - x + 6}{(x^2 + 2)(x + 1)} dx$

7 $\int \frac{8x + 24}{(x + 1)(x - 3)^2} dx$

8 $\int \frac{8x}{x^3 + x^2 - x - 1} dx$

9 $\int \frac{4}{x^3 - 2x^2} dx$

10 $\int_1^5 \frac{x - 1}{x^2(x + 1)} dx$

11 $\int_7^{12} \frac{4 - x}{(x - 2)^2} dx$

12 $\int_1^2 \frac{4}{x^2 + 8x + 15} dx$



13 $\int_1^4 \frac{10x^2 - 26x + 10}{2x^2 - 5x} dx$

14 $\int_2^5 \frac{25}{(x + 1)(2x - 3)^2} dx$

15 $\int_0^5 \frac{x^2 - 3x + 10}{x^2 - x - 6} dx$

أجد قيمة كل من التكاملات الآتية:

أجد مساحة المنطقة المظللة في كل من التمثيلين البيانيين الآتيين:



أجد كلاً من التكاملات الآتية:

18 $\int \frac{e^x}{(e^{2x} + 1)(e^x - 1)} dx$

19 $\int \frac{5 \cos x}{\sin^2 x + 3 \sin x - 4} dx$

20 $\int \frac{\sec^2 x}{\tan^2 x + 5 \tan x + 6} dx$

21 أثبت أن: $\int_0^1 \frac{4x}{x^2 - 2x - 3} dx = \ln \left(\frac{16}{27} \right)$

22 أثبت أن: $\int_1^p \frac{1}{2x^2 + x - 1} dx = \frac{1}{3} \ln \frac{4p - 2}{p + 1}$ ، حيث: $p > 1$

التكامل بالأجزاء Integration by Parts

أوجد كلاً من التكاملات الآتية:

1 $\int x \cos 4x \, dx$

2 $\int x \sqrt{x+1} \, dx$

3 $\int x e^{-x} \, dx$

4 $\int (x^2 + 1) \ln x \, dx$

5 $\int \ln x^3 \, dx$

6 $\int e^{2x} \sin x \, dx$

أوجد قيمة كل من التكاملات الآتية:

7 $\int_1^e \ln x \, dx$

8 $\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} \, dx$


9 $\int_0^\pi x \cos \frac{1}{4} x \, dx$

10 $\int_0^{\pi/4} e^{3x} \cos 2x \, dx$

11 $\int_1^e \ln(x+1) \, dx$

12 $\int_0^1 x^2 e^x \, dx$


13 أثبت أن: $\int_2^4 \ln x \, dx = 6 \ln 2 - 2$



إذا كان الشكل المجاور يُمثِّل منحنى الاقتران: $f(x) = x \sin x$, حيث: $x \geq 0$, فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

14 أجد إحداثيي كل من النقطة A، والنقطة B.

15 أجد مساحة المنطقة المظللة.



إذا كان الشكل المجاور يُمثِّل منحنى الاقتران: $f(x) = x^2 \ln x$, حيث: $x \geq 0$, فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

16 أجد إحداثيي النقطة A.





17 أجد مساحة المنطقة المظللة.

الدرس 5

المساحات والحجوم Areas and Volumes

الوحدة 4: التكامل


أجد مساحة المنطقة المظللة في كل من التمثيلين البيانيين الآتيين:



5 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنىي الاقترانين: $f(x) = x^2$ و $g(x) = 2-x$.

6 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنىي الاقترانين: $f(x) = \frac{1}{x}$ و $g(x) = \frac{1}{x^2}$ ، والمستقيم $x=2$.

7 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنىي الاقترانين: $f(x) = \cos x$ و $g(x) = 1 - \cos x$ ، والمستقيمين: $x=0$ و $x=\pi$.




يُبين الشكل المجاور منحنى الاقتران: $g(x) = 3\sqrt{x} - \sqrt{x^3} + 4$ والمستقيم $y = 4 - \frac{x}{2}$. مُعتمدًا هذا الشكل، أجب عن السؤالين الآتيين تبعًا:

8 أجد إحداثيي النقطة A.

9 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى $g(x)$ والمستقيم $y = 4 - \frac{x}{2}$.

المساحات والحجوم

Areas and Volumes




يُبيّن الشكل المجاور منحنى السرعة المتجهة - الزمن لجُسيم يتحرّك على المحور x في الفترة الزمنية $[0, 7]$. إذا بدأ الجُسيم الحركة من $x = 2$ عندما $t = 0$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

10 إزاحة الجُسيم في الفترة الزمنية المعطاة.

11 المسافة التي قطعها الجُسيم في الفترة الزمنية المعطاة.

12 الموقع النهائي للجُسيم.



13 يُبيّن الشكل المجاور منحنىي الاقترانين: $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ و $g(x) = \frac{1}{2}x + 3$.


أجد حجم المُجسّم الناتج من دوران المنطقة المُظلّلة حول المحور x .

14 أجد حجم المُجسّم الناتج من دوران المنطقة المحصورة بين منحنىي الاقتران: $f(x) = \sqrt{\ln x}$ والمحور x ،

والمستقيمين: $x = e$ و $x = e^3$ حول المحور x .

15 أجد حجم المُجسّم الناتج من دوران المنطقة المحصورة بين منحنىي الاقترانين: $f(x) = \sqrt{2x}$ و $g(x) = x^2$ حول

المحور x .



16 تبرير: يُبيّن الشكل المجاور دائرة معادلتها: $x^2 + y^2 = 25$. إذا دار الجزء المُظلّل

المحصور بين الدائرة والمستقيم $y = 4$ حول المحور x لتشكيل مُجسّم، فأجد

حجم المُجسّم الناتج، مُبرّرًا إجابتي.

المعادلات التفاضلية

Differential Equations

أحلُّ كلاً من المعادلات التفاضلية الآتية:

1 $\frac{dy}{dx} = 3x^2 y$

4 $\frac{dy}{dx} = \frac{x \sec y}{y e^{x^2}}$

2 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 4}{x}$

5 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-3}{y}$

3 $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$

6 $\frac{dy}{dx} = \frac{x \ln x}{y^2}$

أجد الحلَّ الخاص الذي يُحقِّق الشرط الأولي المعطى لكل معادلة تفاضلية ممَّا يأتي:

7 $\frac{dy}{dx} = -30 \cos 4x \sin 4x; y\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0$

8 $\frac{dy}{dx} = x^2 \sqrt{y}; y(0) = 2$

9 $\frac{dy}{dx} = \frac{4\sqrt{x}}{\cos y}; y(0) = 0$

10 $\frac{dy}{dx} = x e^{y-x^2}; y(1) = 0$

11 $\frac{dy}{dx} = x e^{-y}, y(4) = \ln 2$

12 $\frac{dy}{dx} = (3x^2 + 4)y^2; y(2) = -0.1$

بكتيريا: يتغيَّر عدد الخلايا البكتيرية في مجتمع بكتيري بمُعدَّل يُمكن نمذجته بالمعادلة التفاضلية: $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2} y^{0.8}$ ، حيث y عدد الخلايا، و t الزمن بالأيام:

13 أحلَّ المعادلة التفاضلية لإيجاد عدد الخلايا البكتيرية في هذا المجتمع بعد t يوماً، علماً بأنَّ عددها الابتدائي هو 100000 خلية.

14 أجد عدد الخلايا البكتيرية في هذا المجتمع بعد أسبوع.

15 تتحرَّك سيارَة في مسار مستقيم، ويعطى تسارعها بالمعادلة التفاضلية: $\frac{dv}{dt} = -\frac{v^2}{100}, t \geq 0$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعتها المتجهة بالتر لكل ثانية. أجد السرعة المتجهة للسيارة بعد t ثانية من بدء حركتها، علماً بأنَّ سرعتها الابتدائية هي 20 m/s.


16 تُمثِّل المعادلة التفاضلية: $e^y \frac{dy}{dx} = 10 + 2 \sec^2 x$ ميل المماس لمنحنى علاقة ما. أجد قاعدة هذه العلاقة إذا علمتُ أنَّ منحنها يمرُّ بالنقطة $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$.

17 تُمثِّل المعادلة التفاضلية: $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0$ ميل المماس لمنحنى علاقة ما. أجد قاعدة هذه العلاقة إذا علمتُ أنَّ منحنها يمرُّ بالنقطة $(6, 4)$.

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة أستعين بالمثال المعطى.

• الصورة الإحداثية، ومقدار المتجه

مُعتمدًا الشكل المجاور، أكتب كلاً من المتجهات الآتية بالصورة الإحداثية، ثم أجد مقدار كلٍّ منها:




1 $\vec{AB}$

2 $\vec{BC}$

3 $\vec{CD}$

4 $\vec{DA}$



مثال: مُعتمدًا الشكل المجاور، أكتب المتجه $\vec{EF}$ بالصورة الإحداثية، ثم أجد مقداره.

نقطة بداية المتجه $\vec{EF}$ هي: $E(6, 5)$ ونقطة نهايته هي: $F(1, 2)$.

وبذلك، فإن:

$$x_2 - x_1 = 1 - 6 = -5$$

المركبة الأفقية

$$y_2 - y_1 = 2 - 5 = -3$$

المركبة العمودية

$$\vec{EF} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$$

الصورة الإحداثية

$$\vec{EF} = \langle -5, -3 \rangle$$

بالتعويض

$$|\vec{v}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

صيغة مقدار المتجه $\vec{v} = \langle a_1, a_2 \rangle$

$$|\vec{EF}| = \sqrt{(-5)^2 + (-3)^2}$$


بالتعويض

$$= \sqrt{34}$$

بالتبسيط

• جمع المتجهات، وطرحها، وضربها في عدد حقيقي هندسيًا

مُعتمدًا الشكل المجاور، أمثل كلاً مما يأتي هندسيًا:



5 $2\vec{p}$

6 $-\frac{1}{2}\vec{q}$

7 $3\vec{p} + 2\vec{q}$

8 $2\vec{q} - \vec{p}$

مثال: مُعتمدًا الشكل المجاور، أمثل كلاً ممّا يأتي هندسيًا:




1) $\vec{u} + \vec{v}$



أسحب المتجه $\vec{u}$ ست وحدات إلى اليمين، ووحدة واحدة إلى الأسفل، بحيث تنطبق نقطة نهايته على نقطة بداية المتجه $\vec{v}$ ، ثم أرسم سهمًا من نقطة بداية المتجه $\vec{u}$ إلى نقطة نهاية المتجه $\vec{v}$ ، فينتج المتجه $\vec{u} + \vec{v}$ وفق قاعدة المثلث الخاصة بجمع المتجهات.

2) $2\vec{u} + \vec{v}$



الخطوة 1: أرسم المتجه $2\vec{u}$ بنسخ المتجه $\vec{u}$ ، ثم لصق بدايته عند نهاية المتجه $\vec{u}$ الأول.

الخطوة 2: أعكس اتجاه المتجه $\vec{v}$ ، ثم أسحبه وحدة واحدة إلى الأعلى حتى تنطبق بدايته على نهاية المتجه $2\vec{u}$.

الخطوة 3: أرسم سهمًا من بداية المتجه $2\vec{u}$ إلى نهاية المتجه $-\vec{v}$ ، فينتج المتجه $2\vec{u} + (-\vec{v})$ ، أو المتجه $2\vec{u} - \vec{v}$.

• جمع المتجهات المكتوبة بالصورة الإحداثية، وطرحها، وضربها في عدد حقيقي

إذا كان: $\vec{u} = \langle 3, -2 \rangle$ ، وكان: $\vec{v} = \langle 6, 9 \rangle$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

9 $\vec{u} + \vec{v}$

10 $\vec{v} - \vec{u}$

11 $3\vec{u} + 2\vec{v}$

12 $-2\vec{u} + \vec{v}$

مثال: إذا كان: $\vec{m} = \langle 1, -3 \rangle$ ، وكان: $\vec{n} = \langle -2, 7 \rangle$ ، فأجد $2\vec{m} + 5\vec{n}$

$$\begin{aligned} 2\vec{m} + 5\vec{n} &= 2\langle 1, -3 \rangle + 5\langle -2, 7 \rangle \\ &= \langle 2(1), 2(-3) \rangle + \langle 5(-2), 5(7) \rangle \\ &= \langle 2, -6 \rangle + \langle -10, 35 \rangle \\ &= \langle 2 + (-10), -6 + 35 \rangle \\ &= \langle -8, 29 \rangle \end{aligned}$$

بالتعويض

تعريف ضرب المتجه في عدد

بالتبسيط

تعريف جمع متجهين

بالتبسيط

الضرب القياسي، والزاوية بين متجهين

أجد ناتج الضرب القياسي للمتجهين في كل مما يأتي:

13 $\vec{u} = \langle 2, -5 \rangle, \vec{v} = \langle 3, -1 \rangle$

14 $\vec{m} = \langle -3, -4 \rangle, \vec{n} = \langle 8, 6 \rangle$

15 $\vec{r} = \langle -5, 4 \rangle, \vec{s} = \langle 2, 3 \rangle$

16 $\vec{q} = \langle 11, 8 \rangle, \vec{p} = \langle -4, -5 \rangle$

أجد قياس الزاوية بين كل متجهين مما يأتي:

17 $\vec{a} = \langle 3, 7 \rangle, \vec{b} = \langle 5, 1 \rangle$

18 $\vec{c} = \langle 2, -3 \rangle, \vec{d} = \langle -6, 9 \rangle$

19 إذا كان المتجه: $\vec{a} = \langle 3n-4, -10 \rangle$ ، والمتجه: $\vec{b} = \langle 4, n \rangle$ متعامدين، فما قيمة n ؟

مثال: أجد قياس الزاوية بين المتجه: $\vec{u} = \langle 3, -2 \rangle$ ، والمتجه: $\vec{v} = \langle -4, -3 \rangle$ ؟

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} \\ &= \frac{3(-4) + (-2)(-3)}{\sqrt{3^2 + (-2)^2} \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2}} \\ &= \frac{-6}{\sqrt{13} \times \sqrt{25}} \approx -0.3328 \end{aligned}$$

$$\theta \approx \cos^{-1}(-0.3328)$$

$$\approx 109.4^\circ$$

صيغة قياس الزاوية بين متجهين

تعريف الضرب القياسي، ومقدار المتجه

بالتبسيط

تعريف معكوس جيب التمام

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، قياس الزاوية بين المتجهين هو: 109.4° تقريبًا.

المتجهات في الفضاء

Vectors in Space


أعین کلاً من النقاط الآتية في نظام الإحداثيات ثلاثي الأبعاد:

1 $A(0, 2, -3)$

2 $B(-1, 0, 4)$

3 $C(2, 4, 3)$

4 $D(-3, -2, -5)$



في متوازي المستطيلات المجاور، إذا كانت إحداثيات الرأس B هي: $(3, 5, 6)$ ، فأكتب إحداثيات كل مما يأتي:

6 الرأس C .

5 الرأس A .

8 الرأس F .

7 الرأس D .

9 مركز متوازي المستطيلات $ABCDEFGO$.

أكتب الصورة الإحداثية لكل من المتجهات الآتية، ثم أجد مقدار كل منها:

11 $\vec{EF}$ ، حيث: $E(3, 4, 6), F(6, 8, -6)$

10 $\vec{AB}$ ، حيث: $A(-2, 5, 0), B(4, 9, -3)$

12 $\vec{GH}$ ، حيث: $H(10, 7, 8), G(-2, 3, 2)$

أجد متجه وحدة في اتجاه كل متجه مما يأتي:

13 $\vec{AC} = 8\hat{i} + 5\hat{j} - 3\sqrt{5}\hat{k}$

14 $\vec{v} = \langle -5, 4, 20 \rangle$


15 أجد متجهًا له نفس اتجاه المتجه: $\vec{v} = 4\hat{i} - 12\hat{j} + 3\hat{k}$ ، ومقداره 52.

إذا كان: $\vec{u} = 3\hat{i} + 5\hat{j} - 7\hat{k}, \vec{v} = \langle -4, 3, -6 \rangle$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

16 $2\vec{u} + 4\vec{v}$

17 $3\vec{u} - 2\vec{v}$

18 ما قيمة كل من العدد الحقيقي a ، والعدد الحقيقي b اللذين يُحققان المعادلة الآتية: $a\vec{u} + 5\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ b \\ 10 \end{pmatrix}$ ؟



19 في المثلث OAB المجاور، تقع النقطة P على الضلع AB ، حيث:

$AP:PB = 5:3$ ، إذا كان: $\vec{OP} = k(3\vec{a} + 5\vec{b})$ ، فما قيمة العدد الحقيقي k ؟

المتجهات في الفضاء

Vectors in Space

الدرس

1

20 متجهها الموقع للنقطة L والنقطة M هما: $(-3, 4, -5)$ و $(0, -2, 4)$ على الترتيب. أجد متجه الموقع للنقطة N التي تقع على LM ، علمًا بأن: $\vec{LN} = \frac{1}{2} \vec{NM}$.


21 $ABCD$ متوازي أضلاع، فيه: $\vec{AB} = \vec{a}$ و $\vec{AD} = \vec{b}$ و $\vec{AC} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ و $\vec{BD} = -6\vec{i} + 7\vec{j} + 2\vec{k}$. أجد كلاً من $\vec{a}$ و $\vec{b}$ بدلالة متجهات الوحدة الأساسية.

22 إذا كان: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ ، $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ ، $\vec{c} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ، فأجد الأعداد الحقيقية: p, q, r التي تُحقق المعادلة الآتية:

$$p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c} = \begin{pmatrix} 28 \\ -12 \\ -5 \end{pmatrix}$$

في الشكل المجاور، $OABC$ متوازي أضلاع، فيه: $\vec{OA} = 6\vec{a}$ ، $\vec{OC} = 6\vec{c}$ ، والنقطة T هي منتصف الضلع BC ، والنقطة U تقع على الضلع AB ، حيث: $AU:UB = 2:1$ ، والنقطة S تقع على القطر CA ، حيث: $CS:SA = 3:2$.

أكتب كلاً من المتجهات الآتية بدلالة $\vec{a}$ و $\vec{c}$:



23 $\vec{OB}$

24 $\vec{AC}$

25 $\vec{OU}$

26 $\vec{UT}$


27 $\vec{TA}$

28 $\vec{OS}$

29 $\vec{US}$

30 $\vec{SB}$

متجهها الموقع للنقطة A والنقطة B بالنسبة إلى نقطة الأصل O هما: $\vec{a}$ و $\vec{b}$ على الترتيب. إذا كانت النقطة P تقع على امتداد $\vec{OB}$ ، حيث: $\vec{OP} = \frac{5}{4} \vec{OB}$ ، والنقطة Q تقع على $\vec{AB}$ ، حيث: $\vec{AQ} = \frac{1}{3} \vec{AB}$ ، والنقطة R تقع على $\vec{OA}$ ، حيث: $\vec{OR} = \lambda \vec{OA}$ ، و $\vec{QR} = \mu \vec{PR}$ ، فأجب عن الأسئلة الأربعة الآتية تباعاً:



31 أكتب كلاً من $\vec{OQ}$ و $\vec{PQ}$ بدلالة $\vec{a}$ و $\vec{b}$.

32 أكتب $\vec{QR}$ بدلالة λ و $\vec{a}$ و $\vec{b}$.

33 أكتب $\vec{QR}$ بدلالة μ و $\vec{a}$ و $\vec{b}$.

34 أجد قيمة كل من λ و μ .


المستقيمات في الفضاء Lines in Space

أبَيِّنْ إذا كان الشكل الرباعي $ABCD$ في الحالتين الآتيتين متوازي أضلاع أم لا، مُبرِّراً إجابتي:

1 $A(3, -2, 1), B(-4, 0, 8), C(-6, 5, 5), D(8, 1, -9)$


2 $A(12, 5, -8), B(6, 2, -10), C(-8, 1, 13), D(-2, 4, 15)$

3 إذا كانت: $A(2, 3, 1), B(6, 5, 4), C(3, 1, 5)$ وكان $ABCD$ متوازي أضلاع، فما إحداثيات D ؟



4 مثلث OAB ، فيه: $\vec{OA} = 5\vec{a}$ و $\vec{OB} = 2\vec{b}$ والنقطة T تقع على الضلع

AB ، حيث: $AT:TB = 5:1$. أبَيِّنْ أنَّ $\vec{OT}$ يوازي $2\vec{b} + \vec{a}$




5 مثلث OPQ ، فيه: $\vec{RQ} = 2\vec{PR}$ و $\vec{OS} = 3\vec{OR}$ و $\vec{OP} = \vec{a}$ و $\vec{OQ} = \vec{b}$:

6 أبَيِّنْ أنَّ: $\vec{OS} = 2\vec{a} + \vec{b}$

7 أضيفت النقطة T إلى الشكل، حيث: $\vec{OT} = -\vec{b}$. أثبت أنَّ النقاط S, P, T تقع على استقامة واحدة.

المستقيمات في الفضاء

Lines in Space



في الشكل الرباعي $OABC$ المجاور، $\vec{OA} = 8\vec{a}$ ، و $\vec{OC} = 7\vec{c}$ ، و $\vec{CB} = 12\vec{a}$ ، والنقطة P تقسم $\vec{CA}$ بنسبة $3:2$

7 أجد المتجه $\vec{OP}$.

8 أثبت أن النقاط O, P, B تقع على استقامة واحدة.

9 أجد النسبة $OP:PB$.

10 أجد معادلة متجهة للمستقيم الذي يوازي المتجه: $\vec{v} = 4\vec{j} - 2\vec{k}$ ويمر بالنقطة A التي متجه موقعها هو: $2\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$.

11 أجد معادلة متجهة للمستقيم الذي يوازي المتجه: $\vec{v} = \langle -4, 5, 8 \rangle$ ، ويمر بالنقطة A التي متجه موقعها هو: $\langle 2, -7, 11 \rangle$.

أجد معادلة متجهة للمستقيم المارّ بالنقطتين في كلٍّ مما يأتي:

12 $(1, -7), (6, 19)$

13 $(-5, 4, 15), (7, 13, -8)$

14 $(5, 22, -8), (13, 10, 3)$

15 $(0, 2, -5), (9, 4, 6)$

إذا كانت معادلة المستقيم l هي: $\vec{r} = \langle -5, 8, 4 \rangle + t\langle 3, -2, 9 \rangle$ ، فأجب عن الأسئلة الثلاثة الآتية تبعاً:

16 هل تقع النقطة $(3, 7, 11)$ على المستقيم l ؟ أبرر إجابتي.

17 إذا وقعت النقطة $(1, b, c)$ على المستقيم l ، فأجد قيمة كلٍّ من b و c .

18 ما إحداثيات نقطة تقاطع المستقيم l مع المستوى xz ؟

المستقيمات في الفضاء

Lines in Space

19 إذا كانت معادلة المستقيم l_1 هي: $\vec{r} = \langle 3, 2, 1 \rangle + t\langle 4, a, -12 \rangle$ ، ومعادلة المستقيم l_2 هي:

$$\vec{r} = \langle -2, 4, 3 \rangle + u\langle 3, -2, -9 \rangle$$

فأجد قيمة a التي تجعل $l_1 \parallel l_2$.

يمر المستقيم l بالنقطتين: $U(p, -3, -1)$ و $V(2, 5, -3)$ ، وتقع النقطة $(7, 1, q)$ على l :

20 أجد قيمة p .

21 أكتب معادلة متجهة للمستقيم l .

22 أجد قيمة q .

23 إذا كانت: $A(3, -2, 4)$ ، وكانت: $B(6, 0, 3)$ ، وكانت معادلة المستقيم l_1 هي: $\vec{r} = \langle 3, -2, 4 \rangle + \lambda\langle 1, 2, -1 \rangle$ ، وكانت النقطة D تقع على المستقيم l_1 ، حيث: $\lambda = 2$ ، فأجد معادلة المستقيم l_2 الذي يمر بالنقطة D ، ويوازي

المستقيم AB .

أحدّد إذا كان المستقيمان: l_1 و l_2 متوازيين، أو متخالفين، أو متقاطعين، ثم أجد إحداثيات نقطة التقاطع إن كانا متقاطعين في كلٍّ مما يأتي:

24 مرور المستقيم l_1 بالنقطتين: $(5, 2, 1)$ و $(4, 3, 3)$ ، و مرور المستقيم l_2 بالنقطتين: $(4, 1, 1)$ و $(5, 1, 0)$.

25 مرور المستقيم l_1 بالنقطتين: $(5, 3, 1)$ و $(3, 1, -2)$ ، و مرور المستقيم l_2 بالنقطتين: $(11, 7, -3)$ و $(9, 6, -2)$.

26 يمر المستقيم l بالنقطتين: $A(2, 1, 3)$ و $B(5, -2, 1)$. إذا وقعت النقطة C على المستقيم l ، وكان $AC = 3CB$ ، فأجد

جميع إحداثيات النقطة C الممكنة.

27 المستقيمات الآتية معادلاتها هي: $\vec{r} = \begin{pmatrix} -7 \\ 24 \\ -4 \end{pmatrix} + q \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ -1 \end{pmatrix}$ و $\vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ -10 \\ 15 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ و $\vec{r} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$. أبين

أن هذه المستقيمات تُكوّن مثلثًا، ثم أجد أطوال أضلاعه.

الضرب القياسي Scalar Product

أوجد ناتج الضرب القياسي للمتجهين في كلٍّ مما يأتي:

1 $\vec{u} = \langle 4, 5, -3 \rangle, \vec{v} = \langle -2, 3, -7 \rangle$

2 $\vec{e} = \begin{pmatrix} -13 \\ 8 \\ -5 \end{pmatrix}, \vec{f} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}$

3 $\vec{m} = 7\hat{i} + 4\hat{j} - 9\hat{k}, \vec{n} = 2\hat{i} - 5\hat{j} + 10\hat{k}$

4 إذا كان المتجه: $\vec{v} = \langle 6, 5, a \rangle$ يُعَامِد المتجه: $\vec{w} = \langle 15, 24, -7 \rangle$ ، فما قيمة a ؟

أوجد قياس الزاوية بين المتجهين في كلٍّ مما يأتي مُقَرَّبَةً إلى أقرب عُشْر درجة:

5 $\vec{a} = 5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}, \vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ 6 $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}, \vec{b} = -\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$

7 إذا كان المتجه: $\vec{a} = \lambda\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ والمتجه $\vec{b} = \lambda\hat{i} + 4\hat{j} + \lambda\hat{k}$ مُتَعَامِدَيْن، فما قيمة (قِيم) λ ؟

8 إذا كانت معادلة المستقيم l_1 هي: $\vec{r} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$ ومعادلة المستقيم l_2 هي:

$\vec{r} = \begin{pmatrix} -5 \\ 14 \\ 1 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 12 \end{pmatrix}$ ، فأوجد قياس الزاوية الحادة بين هذين المستقيمين مُقَرَّبَةً إلى أقرب عُشْر درجة.

9 يمرُّ المستقيم l_1 بالنقطتين: $(3, -5, 9)$ و $(-2, 11, 6)$ ، ويمرُّ المستقيم l_2 بالنقطتين: $(4, 3, 8)$ و $(-5, 9, 12)$. أوجد قياس الزاوية الحادة بين هذين المستقيمين مُقَرَّبَةً إلى أقرب عُشْر درجة.

10 إذا كان قياس الزاوية بين المتجه: $\langle v, 0, -1 \rangle$ والمتجه: $\langle 2, -1, 0 \rangle$ هو 60° ، فما قيمة v ؟

11 إذا كان: $A(3, -2, 6)$ ، وكان: $B(-5, 4, 1)$ ، فأوجد مساحة المثلث AOB ، حيث O نقطة الأصل.

الضرب القياسي

Scalar Product

الدرس

3


إذا مرَّ المستقيم l بالنقطتين: $E(-3, 7, 12)$ و $F(1, -3, 5)$ ، وكانت النقطة $G(0, -6, 4)$ لا تقع على المستقيم l ، فأجد كلاً مما يأتي:

12 مسقط العمود من النقطة G على المستقيم l .

13 البعد بين النقطة G والمستقيم l .



14 يُبين الشكل المجاور متوازي الأضلاع $ABCD$ ، حيث: $\vec{AB} = 6\hat{i} - 2\hat{j} + 11\hat{k}$ و $\vec{AC} = 15\hat{i} + 8\hat{j} + 5\hat{k}$. أجد مساحة متوازي الأضلاع $ABCD$.



15 **كيمياء:** تقع ذرة الكربون في جزئ الميثان في نقطة الأصل، وتقع ذرات الهيدروجين عند النقاط: P, Q, R, S في الشكل المجاور. أجد قياس الزاوية بين $\vec{OR}$ و $\vec{OS}$ اللذين يربطان ذرة الكربون بذرتي الهيدروجين عند النقطة S والنقطة R .

معادلة المستقيم l_1 هي: $\vec{r} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ -12 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ، ومعادلة المستقيم l_2 هي: $\vec{r} = \begin{pmatrix} -4 \\ 10 \\ p \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} q \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ، والنقطة $A(9, -1, -14)$.

تقع على المستقيم l_1 ، والنقطة C تقع على المستقيم l_2 :

16 إذا كان المستقيم l_1 والمستقيم l_2 متعامدين، فأجد قيمة q .

17 إذا كان المستقيم l_1 والمستقيم l_2 متقاطعين، فأجد قيمة p ، وإحداثيات نقطة تقاطعهما.

18 رُسمت دائرة مركزها النقطة C ، فقطعت المستقيم l_1 في النقطتين: A و B . أجد متجه الموقع للنقطة B .

الضرب القياسي Scalar Product

يتبع

معادلة المستقيم l هي: $\vec{r} = \begin{pmatrix} -19 \\ 14 \\ -5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ a \end{pmatrix}$ ، والنقطة $T(-2, 5, 8)$ تقع خارج المستقيم l ، والنقطة F تقع على المستقيم l ، حيث $\vec{TF}$ يُعَامِدُ المستقيم l :

19 أُبَيِّنْ أَنَّ: $t = \frac{13a + 44}{a^2 + 10}$. 20 إذا كانت $t = 5$ ، فأجد متجهي الموقع المُمكنين للنقطة F .

إحداثيات النقاط: A, B, C هي: $(3, -2, 4)$ ، و $(1, -5, 6)$ ، و $(-4, 5, -1)$ على الترتيب، والمستقيم l يمرُّ بالنقطة A ،

ومعادلته هي: $\vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix}$:

21 أُبَيِّنْ أَنَّ النقطة C تقع على المستقيم l .

22 أجد معادلة متجهة للمستقيم المارَّ بالنقطة A والنقطة B .

23 إذا وقعت النقطة D على المستقيم المارَّ بالنقطة A والنقطة B ، بحيث كانت الزاوية CDA قائمة، فأجد إحداثيات النقطة D .

إذا كانت معادلة المستقيم l_1 هي: $\vec{r} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ، ومعادلة المستقيم l_2 هي: $\vec{r} = \begin{pmatrix} -9 \\ 21 \\ -4 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ، فأجيب عن الأسئلة الثلاثة الآتية تباعاً:

24 أُبَيِّنْ أَنَّ المستقيم l_1 والمستقيم l_2 مُتعامِدان.

25 أُبَيِّنْ أَنَّ المستقيم l_1 والمستقيم l_2 يتقاطعان في النقطة $(-2, 7, 10)$.

26 يقع كل رأس من رؤوس المربع $ABCD$ إمَّا على المستقيم l_1 ، وإمَّا على المستقيم l_2 . إذا كانت إحداثيات الرأس A هي: $(-5, 13, 4)$ ، فأجد إحداثيات رؤوسه الثلاثة الأخرى.

إرشاد: لكي تقع جميع رؤوس المربع على المستقيمين المُتعامِدين l_1 و l_2 ؛ يجب أن تكون المسافة بين كل رأس ونقطة تقاطع المستقيمين متساوية.

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة أستعين بالمثال المعطى.

إيجاد التوافيق

أجد قيمة كل مما يأتي:

1 $\binom{10}{3}$

2 $\binom{50}{1}$

3 $\binom{100}{99}$

4 $\binom{1000}{0}$

5 $\binom{20}{20}$

مثال: أجد قيمة كل مما يأتي:

a) $5!$

$$5! = 5(4)(3)(2)(1)$$

$$= 120$$

b) $\binom{7}{3}$

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!(7-3)!}$$

$$= \frac{7(6)(5)4!}{3!4!}$$

$$= \frac{7(6)(5)}{6}$$

$$= 7(5) = 35$$

إيجاد التباديل

أجد قيمة كل مما يأتي:

6 $P(10, 9)$

7 $P(8, 0)$

8 $P(7, 7)$

9 $P(6, 1)$

10 $P(5, 2)$

مثال: أجد قيمة كل مما يأتي:

a) $P(9, 2)$

$$P(9, 2) = \frac{9!}{(9-2)!}$$

$$= \frac{9(8)7!}{7!}$$

$$= 9(8) = 72$$

b) $P(5, 2)$

$$P(5, 2) = \frac{5!}{(5-2)!}$$

$$= \frac{5(4)3!}{3!}$$

$$= 5(4) = 20$$

• المتغيرات العشوائية، وتوزيعها الاحتمالي

أجد قيم المتغير العشوائي، وتوزيعه الاحتمالي في كل مما يأتي:

11 في تجربة إلقاء قطعة نقد 5 مرّات، دَلّ المتغير العشوائي X على عدد مرّات ظهور الصورة.

12 في تجربة اختيار 5 كرات على التوالي من دون إرجاع من صندوق يحوي 3 كرات صفراء و4 كرات زرقاء، دَلّ المتغير العشوائي X على عدد الكرات الصفراء المسحوبة.

13 في تجربة إلقاء حجر نرد معاً، دَلّ المتغير العشوائي X على الفرق المطلق للعددين الظاهرين على حجري النرد.

مثال: في تجربة إلقاء قطعة نقد 3 مرّات متتالية، دَلّ المتغير العشوائي X على عدد مرّات ظهور الصورة مضروباً في عدد مرّات ظهور الكتابة:

(a) أجد قيم المتغير العشوائي X .

أفترض أن H تعني صورة، وأن T تعني كتابة. وبذلك، فإن:

نتائج التجربة	TTT	HTT	THT	TTH	THH	HTH	HHT	HHH
عدد مرّات ظهور الصورة	0	1	1	1	2	2	2	3
عدد مرّات ظهور الكتابة	3	2	2	2	1	1	1	0
قيم x	0	2	2	2	2	2	2	0

إذن، قيم المتغير العشوائي X هي 0، 2 فقط.

(b) أنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير X .

لإيجاد التوزيع الاحتمالي، أجد كلاً من $P(X=0)$ و $P(X=2)$.

ألاحظ أن القيمة: $X=0$ تنتج من الناتجين: $\{HHH, TTT\}$ ؛ أي إن:

$$P(X=0) = P(\{HHH, TTT\})$$

$$= \frac{2}{8}$$

أما القيمة: $X=2$ فتنتج من النواتج: $\{HTT, THT, TTH, THH, HTH, HHT\}$ ؛ أي إن:

$$P(X=2) = \frac{6}{8}$$

ومن ثَمَّ، فإن التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X هو:

x	0	2
$P(X=x)$	$\frac{2}{8}$	$\frac{6}{8}$

• إيجاد الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والتباين لمجموعة من المشاهدات

أجد الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والتباين لكل مجموعة مشاهدات مما يأتي:

14 $1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, -1, -5, 3$

15 $-2, -3, -4, 5, 2, 1, 4, 5$

مثال: أجد الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والتباين للمشاهدات الآتية: 2, 4, 6, 8.

• الوسط الحسابي هو مجموع المشاهدات مقسومًا على عددها.

إذن:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\sum x}{n} \\ &= \frac{2 + 4 + 6 + 8}{4} \\ &= 5\end{aligned}$$

• الانحراف المعياري هو: $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$

إذن:

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} \\ &= \sqrt{\frac{(2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{9 + 1 + 1 + 9}{4}} \\ &= \sqrt{5}\end{aligned}$$

• التباين هو مربع الانحراف المعياري.

إذن:

$$\sigma^2 = (\sqrt{5})^2 = 5$$

• إيجاد التوقع، والتباين، والانحراف المعياري

أجد التوقع، والتباين، والانحراف المعياري لكل توزيع احتمالي مما يأتي:

16

x	1	-1
$P(X=x)$	0.4	0.6

17

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	0.2	0.1	0.3	k

مثال: في ما يأتي التوزيع الاحتمالي لتجربة عشوائية:

x	3	-5
$P(X=x)$	0.7	0.3

(a) أجد التوقع $E(X)$.

صيغة التوقع

مجموع نواتج الضرب

بالتبسيط

$$E(X) = \sum x \cdot P(X=x)$$

$$= 3(0.7) + (-5)(0.3)$$

$$= 0.6$$

(b) أجد التباين σ^2 .

صيغة التباين

بالتعويض

بالتبسيط

$$\sigma^2 = \sum (x^2 \cdot P(x)) - (E(X))^2$$

$$= 3^2(0.7) + (-5)^2(0.3) - (0.6)^2$$

$$= 14.16$$

(c) أجد الانحراف المعياري σ .

الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين.

إذن:

$$\sigma = \sqrt{14.16} \approx 3.76$$

الدرس 1

التوزيع الهندسي وتوزيع ذي الحدين Geometric and Binomial Distributions

الوحدة 6: الإحصاء والاحتمالات

إذا كان: $X \sim Geo\left(\frac{1}{8}\right)$ ، فأجد كلاً مما يأتي، مُقَرَّبًا إجابتي إلى أقرب 3 منازل عشرية:

1 $P(X = 4)$

2 $P(X \leq 4)$

3 $P(X \geq 2)$

4 $P(3 \leq X \leq 7)$

5 $P(X < 2)$

6 $P(X > 5)$

7 $P(1 < X < 3)$

8 $P(4 < X \leq 6)$

إذا كان: $X \sim B(5, 0.4)$ ، فأجد كلاً مما يأتي، مُقَرَّبًا إجابتي إلى أقرب 3 منازل عشرية:

9 $P(X = 4)$

10 $P(X \geq 5)$

11 $P(X \leq 3)$

12 $P(3 < X \leq 5)$

13 $P(X > 2)$

14 $P(X < 3)$

15 $P(2 \leq X < 5)$

16 $P(5 < X < 8)$

أجد التوقع لكل من المتغيرين العشوائيين الآتيين:

17 $X \sim Geo(0.45)$

18 $X \sim Geo\left(\frac{2}{5}\right)$

أجد التوقع والتباين لكل من المتغيرين العشوائيين الآتيين:

19 $X \sim B(10, 0.2)$

20 $X \sim B(150, 0.3)$

أخذت نور تُراقب السيارات المارة أمام منزلها. إذا كان احتمال أن تمر أي سيارة صفراء اللون من أمام منزلها هو 0.1، فأجد كلاً مما يأتي:

21 احتمال عدم مرور أي سيارة صفراء من بين أول 5 سيارات مرّت أمام المنزل.

22 احتمال مرور أكثر من 3 سيارات حتى شاهدت نور أول سيارة صفراء.

23 إذا كان احتمال تسجيل لاعب كرة سلّة هدفًا في الرمية الواحدة هو 10%، وحاول هذا اللاعب التسجيل 15 مرّة، فأجد احتمال تسجيله هدفًا من 3 رميات فقط.


امتحانات: وجد مُعلّم الرياضيات أن 3 طلبة تقريبًا من بين كل 5 طلبة يحتاجون إلى استعمال أوراق إضافية في أثناء الامتحان. إذا تقدّم للامتحان 30 طالبًا، فأجد كلاً مما يأتي:

24 احتمال أن يحتاج 10 طلبة إلى استعمال أوراق إضافية. 25 احتمال ألا يحتاج أي من الطلبة إلى استعمال أوراق إضافية.

الدرس 2



التوزيع الطبيعي Normal Distribution

الوحدة 6: الإحصاء والاحتمالات



1 يُمثّل كلٌّ من المنحنيين المجاورين توزيعًا طبيعيًا. أقرّن بين هذين التوزيعين من حيث قيم الوسط الحسابي، والانحراف المعياري.

أجد مساحة المنطقة المظللة أسفل منحني التوزيع الطبيعي المعياري في كلٍّ مما يأتي:



أجد القيمة المعيارية z التي تُحقّق كل احتمال ممّا يأتي:

4 $P(Z < z) = 0.638$

5 $P(Z > z) = 0.6$

6 $P(0 < Z < z) = 0.45$

7 $P(-z < Z < z) = 0.8$

إذا كان: $X \sim N(30, 100)$ ، فأجد كل احتمال ممّا يأتي، مُستعملًا جدول التوزيع الطبيعي المعياري:

8 $P(X < 35)$

9 $P(X > 38.6)$

10 $P(X > 20)$

11 $P(35 < X < 40)$

12 $P(15 < X < 32)$

13 $P(17 < X < 19)$

إذا كان X مُتغيّرًا عشوائيًا طبيعيًا، ووسطه الحسابي 30، وانحرافه المعياري 10، فأجد قيمة x التي تُحقّق الاحتمال المعطى في كلٍّ مما يأتي:

14 $P(X < x) = 0.3$

15 $P(X > x) = 0.6915$

16 $P(X < x) = 0.7516$

17 $P(X > x) = 0.05$

التوزيع الطبيعي Normal Distribution


تعبئة: يُعبئ مصنع إنتاجه في حاويات مُتماثلة تجهيزاً للشحنها، ويقس كُتل هذه الحاويات جميعاً للتحقق من صلاحيتها للشحن. إذا كانت كُتل الحاويات تتبع توزيعاً طبيعياً، وسطه الحسابي 1000 kg، وانحرافه المعياري 10 kg، فأجد كلاً ممّا يأتي:

18 النسبة المئوية للحاويات التي تزيد كتلتها على 1020 kg.

19 النسبة المئوية للحاويات التي تتراوح كتلتها بين 990 kg و 1010 kg.

20 نسبة الحاويات الصالحة للشحن إذا كانت كتلة الحاوية الصالحة للشحن لا تزيد على 1020 kg.

يدلُّ المتغير العشوائي X على أطوال طالبات الصف الثاني عشر (بالستيمتر) في إحدى المدارس، حيث: $X \sim N(162, 6.3^2)$. مُعتمداً الشكل الآتي الذي يبين منحنى التوزيع الطبيعي للأطوال، أُجيب عن الأسئلة الخمسة التالية تباعاً:



21 أظلل المنطقة التي تُمثّل: $P(X > 155)$.

22 إذا اختيرت إحدى هؤلاء الطالبات عشوائياً، فأجد احتمال أن يكون طولها أكثر من 155 cm

23 أستمعمل إجابة السؤال السابق لإيجاد احتمال اختيار طالبة عشوائياً، طولها أكثر من 169 cm

أحدّد فترتين تقع في كلٍّ منهما تقريباً النسبة المعطاة للطالبات ممّا يأتي:

24 50%

25 81.5%

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development

National Center
for Curriculum Development



