



الرياضيات

الصف الثاني عشر- الفرع الأدبي

الفصل الدراسي الثاني

12

فريق التأليف

د. عمر محمد أبو غليون (رئيساً)

إبراهيم عقله القادري

أيمن ناصر صندوقه

هبة ماهر التميمي

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:



06-5376262 / 237



06-5376266



P.O.Box: 2088 Amman 11941



@nccdjor



feedback@nccd.gov.jo



www.nccd.gov.jo










© HarperCollins Publishers Limited 2021.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan


- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.



1443 هـ / 2022 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

أعزّأونا الطلبة ...

يحتوي هذا الكتاب على تمارين متنوعة أُعدّت بعناية لتفكيكم عن استعمال مراجع إضافية، وهي تُعدّ استكمالاً للتمارين الواردة في كتاب الطالب، وتهدف إلى مساعدتكم على ترسيخ المفاهيم التي تتعلمونها في كل درس، وتُتمّي مهاراتكم الحسابية.

قد يختار المعلمّ / المعلمّة بعض تمارين هذا الكتاب واجباً منزلياً، ويترك لكم بعضها الآخر لكي تحلّوها عند الاستعداد للاختبارات الشهرية واختبارات نهاية الفصل الدراسي.

أما الصفحات التي تحمل عنوان (أستعد لدراسة الوحدة) فهي بداية كل وحدة، فإنّها تساعدكم على مراجعة المفاهيم التي درستوها سابقاً؛ ما يُعزّز قدرتكم على متابعة التعلم في الوحدة الجديدة بسلاسة ويسر.

قد لا يتوافر فراغ كافٍ إناء كل تمرين للكتابة خطوات الحلّ جميعها؛ لذا يُمكن استعمال دفتر إضافي للكتابة بوضوح.

تمنّين لكم تعلّماً ممتعاً ومُيسراً.

المركز الوطني لتطوير المناهج

قائمة المحتويات

الوحدة 1 التكامل

6 أستعد لدراسة الوحدة

9 الدرس 1 التكامل غير المحدود

10 الدرس 2 الشرط الأولي

11 الدرس 3 التكامل المحدود

12 الدرس 4 المساحة

13 الدرس 5 تكامل اقترانات خاصة

14 الدرس 6 التكامل بالتعويض

قائمة المحتويات

الوحدة 3 الإحصاء والاحتمالات

15 أستعد لدراسة الوحدة

17 الدرس 1 التوزيع الهندسي

18 الدرس 2 توزيع ذي الحدين

19 الدرس 3 التوزيع الطبيعي

20 الدرس 4 التوزيع الطبيعي المعياري

21 الدرس 5 احتمال المُتغيّر العشوائي الطبيعي باستعمال الجدول

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة أستعين بالمثال المعطى.

التحويل من الصورة الأسية إلى الصورة الجذرية والعكس

أكتب الصورة الأسية في صورة جذرية، وأكتب الصورة الجذرية في صورة أسية، في كل مما يأتي:

1 $p^{\frac{1}{6}}$

2 $w^{\frac{8}{3}}$

3 $\sqrt[6]{v^5}$

4 $\sqrt[8]{u}$

مثال: أكتب الصورة الأسية في صورة جذرية، وأكتب الصورة الجذرية في صورة أسية، في كل مما يأتي:

a) $y^{\frac{1}{4}}$

$$y^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{y}$$

تعريف $a^{\frac{1}{n}}$

b) $\sqrt[6]{w}$

$$\sqrt[6]{w} = w^{\frac{1}{6}}$$

تعريف $a^{\frac{1}{n}}$

c) $x^{\frac{3}{4}}$

$$x^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{x^3}$$

تعريف $a^{\frac{m}{n}}$

d) $\sqrt[5]{b^2}$

$$\sqrt[5]{b^2} = b^{\frac{2}{5}}$$

تعريف $a^{\frac{m}{n}}$

إيجاد قيمة اقتران عند نقطة ما

أجد قيمة كل من الاقترانات الآتية عند قيمة x المعطاة:

5 $f(x) = x^2 - 5x + 9; x = 1$

6 $h(x) = \sqrt{x} + 10; x = 49$

7 $g(x) = e^x + 3x; x = 0$

مثال: أجد قيمة كل اقتران مما يأتي عند قيمة x المعطاة:

a) $f(x) = x^3 - 3x - 1; x = -1$

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) - 1 = 1$$

بتعويض $x = -1$ بالتبسيط

b) $f(x) = \sqrt{x} + e^{2x+3}; x = 0$

$$f(0) = \sqrt{0} + e^{2(0)+3} = e^3$$

بتعويض $x = 0$ بالتبسيط

• إيجاد مشتقة اقترانات مختلفة

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

8 $f(x) = 2x^3$

9 $f(x) = \sqrt{x}$

10 $y = x + \sqrt[5]{2x-5}$

11 $f(x) = (2x+3)(1-x^3)$

12 $y = 8x - \frac{x}{2x+8}$

13 $y = \frac{7}{x^3} + \frac{3}{x} - 2$

14 $f(x) = 7x - e^{2x-1}$

15 $f(x) = x^4 \ln x$

16 $f(x) = \sin 2x + 4 \cos 3x$

مثال: أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = \frac{6x-8}{x^2} + \ln x$

$$f(x) = \frac{6x-8}{x^2} + \ln x$$

$$= \frac{6x}{x^2} - \frac{8}{x^2} + \ln x$$

$$= 6x^{-1} - 8x^{-2} + \ln x$$

$$f'(x) = -6x^{-2} + 16x^{-3} + \frac{1}{x}$$

$$= -\frac{6}{x^2} + \frac{16}{x^3} + \frac{1}{x}$$

b) $y = \frac{1}{\sqrt{2x-3}} + \cos x + e^{2x}$

$$y = \frac{1}{\sqrt{2x-3}} + \cos x + e^{2x}$$

$$= (2x-3)^{-\frac{1}{2}} + \cos x + e^{2x}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2} (2x-3)^{-\frac{3}{2}} \times 2 - \sin x + 2e^{2x}$$

$$= -\frac{1}{(2x-3)^{\frac{3}{2}}} - \sin x + 2e^{2x}$$

الاقتران المعطى

بقسمة كل حد في البسط على x^2

تعريف الأس السالب

قواعد اشتقاق مضاعفات القوة، والفرق، والاقتران اللوغاريتمي الطبيعي

تعريف الأس السالب

الاقتران المعطى

بكتابة الجذر في صورة أسية

قاعدة سلسلة القوة، ومشتقة الاقتران الأسّي الطبيعي، ومشتقة اقتران جيب التمام.

تعريف الأس السالب

إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة

أعيد تعريف اقتران القيمة المطلقة: $f(x) = |3x - 9|$ مثال: أريد تعريف اقتران القيمة المطلقة: $f(x) = |2x + 4|$

الخطوة 1: أجعل ما في داخل القيمة المطلقة يساوي صفراً، ثم أحل المعادلة الناتجة.

$$2x + 4 = 0$$

$$2x + 4 - 4 = 0 - 4$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{-4}{2}$$

$$x = -2$$

بطرح 4 من طرفي المعادلة

بقسمة طرفي المعادلة على 2

بالتبسيط


الخطوة 2: أعين جذر المعادلة على خط الأعداد، ثم أحدد الإشارة على جانبيه.

أعین العدد -2 على خط الأعداد، ثم أحدد الإشارة على جانبيه بتعويض أي قيمة أقل من -2 في المقدار الجبري: $2x + 4$ ، فيكون دائماً ناتج التعويض سالباً؛ ما يعني أن إشارة المقدار سالبة يسار العدد -2. بعد ذلك أعرض أي قيمة أكبر من -2 في المقدار الجبري: $2x + 4$ ، فيكون دائماً ناتج التعويض موجباً؛ ما يعني أن إشارة المقدار موجبة يمين العدد -2:



الخطوة 3: أكتب قاعدتي الاقتران بحسب إشارة يمين جذر المعادلة ويساره.

أكتب ما في داخل القيمة المطلقة كما هو في الجزء الموجب، ثم أكتب في الجزء السالب ما في داخل القيمة المطلقة مضروباً في -1:



الخطوة 4: أكتب قاعدة الاقتران المتشعب.

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 4 & , x < -2 \\ 2x + 4 & , x \geq -2 \end{cases}$$

التكامل غير المحدود

Indefinite Integral

أجد كُلًّا من التكاملات الآتية:

1 $\int (4x + 2) dx$

2 $\int 2x^{-4} dx$

3 $\int (6x^2 - 4x) dx$

4 $\int (3 - x - 2x^5) dx$

5 $\int (x^{-2} + x^{5/2}) dx$

6 $\int (3x^2 - \frac{2}{x^2}) dx$

7 $\int (3x^{-2} + 6x^{-1/2} + x - 4) dx$

8 $\int (10x^4 + 8x^{-3}) dx$

9 $\int (\frac{2}{x^3} - 3\sqrt{x}) dx$

10 $\int (8x^3 + 6x - \frac{4}{\sqrt{x}}) dx$

11 $\int (\frac{7}{x^2} + \sqrt[3]{x^4}) dx$

12 $\int (\frac{x^2}{3} + \frac{3}{x^2}) dx$

أجد كُلًّا من التكاملات الآتية:

13 $\int \frac{4 + 2\sqrt{x}}{x^2} dx$

14 $\int \frac{4 - x^2}{2 + x} dx$

15 $\int \frac{x^2 - 1}{x^2} dx$

16 $\int x\sqrt{x} dx$

17 $\int \frac{x^2 - 1}{x - 1} dx$

18 $\int x^2(1 - x^3) dx$

19 $\int (x + 4)^2 dx$

20 $\int \frac{5 - x}{x^5} dx$

21 $\int \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1} dx$

22 $\int x(x + 1)^2 dx$

23 $\int \frac{(x + 3)^2}{\sqrt{x}} dx$

24 $\int (x - 5)(x + 5) dx$

الشرط الأولي Initial Condition

أوجد قاعدة الاقتران $f(x)$ في كلِّ ممَّا يأتي، علماً بأنَّ منحناه يمرُّ بالنقطة المعطاة:

1 $f'(x) = 3x - 2; (-1, 2)$ 2 $f'(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}}; (4, 5)$ 3 $f'(x) = -x(x+1); (-1, 5)$

4 $f'(x) = x^3 - \frac{2}{x^2} + 2; (1, 3)$ 5 $f'(x) = x + \sqrt{x}; (1, 2)$ 6 $f'(x) = -\frac{10}{x^2}; (1, 15)$

7 إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ هو: $f'(x) = \sqrt{x}$ ، فأوجد قاعدة الاقتران $f(x)$ ، علماً بأنَّ منحناه يمرُّ بالنقطة $(9, 25)$.

8 إذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقة y هو: $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x^2}$ ، فأوجد قاعدة العلاقة y ، علماً بأنَّ منحناها يمرُّ بالنقطة $(2, 4)$.

9 إذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقة y هو: $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 12x + 8$ ، ومَرَّ منحناها بنقطة الأصل، فأجد الإحداثي x لجميع نقاط تقاطع منحنى العلاقة مع المحور x ، مُبرِّراً إجابتي.

10 **الإيراد الحدي:** يُمثَّل الاقتران: $R'(x) = x^2 - 3$ الإيراد الحدي (بالدينار) لكل قطعة تباع من مُنتجات إحدى الشركات، حيث x عدد القطع المباعة، و $R(x)$ إيراد بيع x قطعة بالدينار. أوجد اقتران الإيراد $R(x)$ ، علماً بأنَّ $R(0) = 0$.

11 يتحرَّك جُسَيْم في مسار مستقيم، وتُعطى سرعته المتجهة بالاقتران: $v(t) = 3t^2 - 12t + 11$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتري لكل ثانية. إذا بدأ الجُسَيْم حركته من نقطة الأصل، فأجد موقعه بعد اثنتين من بدء الحركة.

12 يتحرَّك جُسَيْم في مسار مستقيم، ويعطى تسارعه بالاقتران: $a(t) = 6t - 30$ ، حيث t الزمن بالثواني، و a التسارع بالمتري لكل ثانية تربيع. إذا بدأ الجُسَيْم حركته من نقطة الأصل بسرعة متجهة مقدارها 72 m/s ، فأجد موقعه بعد 3 ثوانٍ من بدء الحركة.

الدرس 3

التكامل المحدود Definite Integral

أوجد قيمة كل من التكاملات الآتية:

1 $\int_1^5 10x^{-2} dx$

2 $\int_0^2 (2x^3 - 4x + 5) dx$

3 $\int_1^4 \frac{x^3 + 2x^2}{\sqrt{x}} dx$

4 $\int_3^6 \left(x - \frac{3}{x}\right)^2 dx$

5 $\int_0^5 (|x + 3| - 5) dx$

6 $\int_0^6 x(6 - x) dx$

7 $\int_1^2 \left(6x - \frac{12}{x^4} + 3\right) dx$

8 $\int_0^7 |2x - 1| dx$

9 $\int_{-3}^4 |x| dx$

10 $\int_1^2 \frac{x^2 + x^3}{x} dx$

11 $\int_3^4 (6x^2 - 4x) dx$

12 $\int_{10}^{10} \frac{x+1}{x^2} dx$

إذا كان: $\int_{-3}^2 g(x) dx = -2$, $\int_{-3}^1 f(x) dx = 4$, $\int_{-3}^2 f(x) dx = 5$, فأوجد كلاً مما يأتي:

13 $\int_2^2 f(x) dx$

14 $\int_1^2 (f(x) - 5) dx$

15 $\int_{-3}^2 (-2f(x) + 5g(x)) dx$

16 $\int_2^{-3} (g(x) + 2x) dx$

17 $\int_2^{-3} (f(x) + g(x)) dx$

18 $\int_{-3}^2 (4f(x) - 3g(x)) dx$

19 إذا كان: $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 8 - x, & x \geq 2 \end{cases}$, فأوجد قيمة: $\int_{-3}^6 f(x) dx$.

20 سكان: أشارت دراسة إلى أن عدد السكان في إحدى القرى يزداد شهرياً بمعدل يمكن نمذجته بالافتراض: $P'(t) = 5 + 3t^{2/3}$, حيث t عدد الأشهر من الآن، و $P(t)$ عدد السكان. أوجد مقدار الزيادة في عدد سكان القرية في الأشهر الثمانية القادمة.

21 إذا كان: $\int_2^3 (x^2 - a) dx = 5$, فأوجد قيمة الثابت a .


الدرس 4

المساحة Area


الوحدة 4: التكامل

أجد مساحة المنطقة المظللة في كل من التمثيلات البيانية الآتية:


1




2




3




4



5



6



7 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = 3x^2 - 3$ ، والمحور x .

8 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = x^3 - 5x^2 - 6x$ ، والمحور x .

9 أجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = x^2(2 - x)$ ، والمحور x .

تكامل اقترانات خاصة

Integration of Special Functions

أوجد كلاً من التكاملات الآتية:

1 $\int \frac{1-x^2}{5x} dx$

2 $\int (5e^x + 4) dx$

3 $\int (1 - e^{2x-3}) dx$

4 $\int (\sin 2x - \cos 2x) dx$

5 $\int \frac{3}{2x-1} dx$

6 $\int (5 - \sin(5-5x)) dx$

7 $\int \frac{1}{\frac{1}{3}x-2} dx$

8 $\int (2x-1 + \frac{8}{5x+4}) dx$

9 $\int (3 \cos x + \frac{5}{x} + \frac{4}{x^2}) dx$

10 $\int (3x+2)^5 dx$

11 $\int \frac{x+1}{x^2+2x+5} dx$

12 $\int (e^{2x} - \frac{1}{2} \sin(2x-1)) dx$

13 $\int (\sin(2x+3) + \cos(3x+2)) dx$

14 $\int (\frac{1}{8}x^{3/2} - \frac{4}{x}) dx$

15 $\int \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

أوجد قيمة كل من التكاملات الآتية:

16 $\int_0^1 \sqrt{1+7x} dx$

17 $\int_0^1 e^x (4 - e^x) dx$

18 $\int_1^3 (1 + \frac{1}{x}) dx$

19 إذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقة y هو: $\frac{dy}{dx} = 6e^{2x} + 2e^{-x}$ ، فأوجد قاعدة العلاقة y ، علماً بأن منحنىها يمر بالنقطة $(0, 2)$.

أوجد قاعدة الاقتران $f(x)$ في كل مما يأتي، علماً بأن منحنىها يمر بالنقطة المعطاة:

20 $f'(x) = e^{-x}; (0, 3)$

21 $f'(x) = \frac{3}{x} - 4; (1, 0)$

22 $f'(x) = 4e^x - 2; (0, 1)$

23 **تلوث:** يُعالج التلوث في بحيرة باستعمال مضاد للبكتيريا. إذا كان عدد الخلايا البكتيرية الضارة لكل مليلتر من الماء في البحيرة يتغير بمعدل: $N'(t) = -\frac{2000t}{1+t^2}$ ، حيث $N(t)$ عدد الخلايا البكتيرية لكل مليلتر من الماء بعد t يوماً من استعمال المضاد، فأوجد $N(t)$ ، علماً بأن العدد الابتدائي للخلايا هو 5000 خلية لكل مليلتر.

24 أحدد أوجه الاختلاف بين التكاملين الآتين من دون إيجاد التكامل:

$\int (3 \sin 3x + 1) dx$

$\int (3 \sin(3x+1)) dx$

التكامل بالتعويض

Integration by Substitution

أوجد كلاً من التكاملات الآتية:

1 $\int x\sqrt{x^2+3} dx$

2 $\int x^4 e^{x^5+2} dx$

3 $\int (x+1)(x^2+2x+5)^4 dx$

4 $\int \frac{(\ln x)^3}{x} dx$

5 $\int \frac{\cos x}{\sin^4 x} dx$

6 $\int \sin x \sqrt{1+3 \cos x} dx$


أوجد قيمة كل من التكاملات الآتية:

7 $\int_1^2 \frac{x^2}{(x^3+1)^2} dx$

8 $\int_0^1 x\sqrt{3x^2+2} dx$

9 $\int_e^{e^2} \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

10 $\int_0^1 (x+1)(x^2+2x)^5 dx$



11 أوجد مساحة المنطقة المظللة في التمثيل البياني المجاور.

12 **الإيراد الحدي:** يُمثل الاقتران: $R'(x) = 50 + 3.5xe^{-0.1x^2}$ الإيراد الحدي (بالدينار) لكل قطعة تباع من إنتاج إحدى الشركات، حيث x عدد القطع المباعة، و $R(x)$ إيراد بيع x قطعة بالدينار. أوجد اقتران الإيراد $R(x)$ ، علماً بأن $R(0) = 0$.

يُمثل الاقتران $f'(x)$ في كل ممّا يأتي ميل المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ المارّ بالنقطة المعطاة. أستمعمل المعلومات المعطاة لإيجاد قاعدة الاقتران $f(x)$:

13 $f'(x) = 2x(4x^2 - 10)^2; (2, 10)$

14 $f'(x) = x^2 e^{-0.2x^3}, (0, \frac{3}{2})$

15 يتحرك جسيم في مسار مستقيم، وتعطى سرعته المتجهة بالاقتران: $v(t) = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتري لكل ثانية. إذا بدأ الجسيم حركته من نقطة الأصل، فأجد موقعه بعد t ثانية من بدء الحركة.

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة أستعين بالمثال المعطى.

إيجاد التوافيق

أجد قيمة كل ممّا يأتي:

1 $\binom{8}{5}$

2 $\binom{10}{2} - \binom{7}{0}$

3 $\frac{\binom{13}{4}}{\binom{11}{7}}$

مثال: أجد قيمة $\binom{12}{3}$.

$$\binom{12}{3} = \frac{12!}{3!9!}$$

$$= \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9!}{3!9!}$$

$$= 220$$

تعريف التوافيق

بإستعمال تعريف مضروب العدد الكلي

بالتبسيط

المتغير العشوائي، وتوزيعه الاحتمالي

أجد قيم المتغير العشوائي، وتوزيعه الاحتمالي في كل ممّا يأتي:

4 في تجربة إلقاء 3 قطع نقدية متميزة مرّة واحدة، دّل المتغير العشوائي Y على عدد مرّات ظهور الصورة.

5 في تجربة إلقاء حجر نرد متميزين معاً، دّل المتغير العشوائي X على الفرق المطلق للعددين الظاهرين على حجري النرد.

مثال: في تجربة إلقاء قطعتي نقد عشوائياً، دّل المتغير العشوائي X على عدد مرّات ظهور الصورة. أجد مجموعة قيم X .

$$\Omega = \{(T, T), (T, H), (H, T), (H, H)\}$$

عناصر الفضاء العيني للتجربة

$$X = \begin{matrix} & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & 1 & & 1 & & 2 \end{matrix}$$

عدد الصور المرتبط بكل عنصر

إذن، مجموعة قيم المتغير العشوائي هي: $X = \{0, 1, 2\}$.

• توقُّع المُتغيِّر العشوائي، وتباينه، وانحرافه المعياري

6 إذا كان للمُتغيِّر العشوائي X التوزيع الاحتمالي الآتي:

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$

فأجد كلاً من توقُّع المُتغيِّر العشوائي X ، وتباينه.

مثال: في ما يأتي التوزيع الاحتمالي لتجربة عشوائية:

x	3	-5
$P(X=x)$	0.7	0.3

(a) أجد التوقُّع $E(X)$.

$$E(X) = \sum x \cdot P(X=x)$$

صيغة التوقُّع

$$= 3(0.7) + (-5)(0.3)$$

مجموع نواتج الضرب

$$= 0.6$$

بالتبسيط

(b) أجد التباين σ^2 .

$$\sigma^2 = \sum (x^2 \cdot P(x)) - (E(X))^2$$

صيغة التوقُّع

$$= 3^2 (0.7) + (-5)^2 (0.3) - (0.6)^2$$

مجموع نواتج الضرب

$$= 13.44$$

بالتبسيط

(c) أجد الانحراف المعياري σ .

الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين.

إذن:

$$\sigma = \sqrt{13.44} \approx 3.67$$

التوزيع الهندسي

Geometric Distribution

إذا كان: $X \sim Geo\left(\frac{1}{8}\right)$ ، فأجد كلاً مما يأتي، مُقَرَّبًا إيجابيًا إلى أقرب 3 منازل عشرية:

1 $P(X = 4)$

2 $P(X \leq 4)$

3 $P(X \geq 2)$

4 $P(3 \leq X < 5)$

5 $P(X < 2)$

6 $P(X > 5)$

7 $P(1 < X < 3)$

8 $P(4 < X \leq 6)$

9 $P(2 < X \leq 4)$

أجد التوقع لكل من المتغيرات العشوائية الآتية:

10 $X \sim Geo(0.8)$

11 $X \sim Geo(0.1)$

12 $X \sim Geo(0.75)$

أطلق عماد رصاصة نحو هدف بصورة مُتكررة، ثم توقّف بعد إصابته الهدف. إذا كان احتمال إصابته الهدف في كل مرّة هو 0.7، فأجد كلاً مما يأتي:

13 احتمال أن يصيب الهدف أوّل مرّة في المحاولة العاشرة.

14 احتمال أن يُطلق رصاصتين على الأقل حتى يصيب الهدف أوّل مرّة.

15 العدد المُتوقع من الرصاصات التي سيطلقها عماد حتى يصيب الهدف أوّل مرّة.

دوّرت هديل مُؤشّر قرص بشكل مُتكرّر، وكان القرص مُقسّمًا إلى 4 قطاعات مُتطابقة ومُلوّنة بالأحمر، والأخضر، والأزرق، والأصفر. إذا دلّ المُتغيّر العشوائي X على عدد مرّات تدوير مُؤشّر القرص حتى توقّف عند اللون الأصفر لأول مرة، فأجد كلاً مما يأتي:

16 احتمال أن تكون المرّة الثالثة هي أوّل مرّة يتوقّف فيها مُؤشّر القرص عند اللون الأصفر.

17 احتمال أن تدور هديل مُؤشّر القرص أكثر من 4 مرّات حتى يتوقّف المُؤشّر عند اللون الأصفر أوّل مرّة.

إذا كان X مُتغيّرًا عشوائيًا هندسيًا، وكان التوقع $E(X) = 2$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

18 $P(X = 1)$

19 $P(X > 3)$

الدرس 2

توزيع ذي الحدين Binomial Distribution


الوحدة 5: الإحصاء والاحتمالات.

إذا كان: $X \sim B(20, \frac{1}{8})$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

1 $P(X = 18)$

2 $P(X \leq 3)$

3 $P(1 < X \leq 3)$



يُمثل الشكل المجاور قرصاً على شكل خماسي منتظم. إذا دُور مؤشر القرص 10 مرّات، ودلّ المتغيّر العشوائي X على عدد مرّات توقّف المؤشر على الحرف A ، فأجد كلاً مما يأتي:

4 احتمال أن يتوقّف المؤشر على الحرف A ثلاث مرّات فقط.

5 احتمال أن يتوقّف المؤشر على الحرف A ثلاث مرّات على الأقل.

6 احتمال ألا يتوقّف المؤشر على الحرف A نهائياً.

طيران: يواجه الطيارون صعوبة في الرؤيا باحتمال 0.25 عند الهبوط بالطائرات في أحد المطارات خلال فصل الشتاء بسبب سوء الأحوال الجوية. إذا هبط طيار 20 مرّة في هذا المطار شتاءً، فأجد كلاً مما يأتي:

7 احتمال أن يواجه الطيار صعوبة في الرؤيا خلال الهبوط في ثلاث مرّات فقط.

8 احتمال أن يواجه الطيار صعوبة في الرؤيا خلال الهبوط في ثلاث مرّات على الأقل.

9 احتمال أن يواجه الطيار صعوبة في الرؤيا خلال الهبوط في المرات جميعها.

10 العدد المتوقّع من المرات التي سيواجه فيها الطيار صعوبة في الرؤيا خلال الهبوط.

أجد التوقع والتباين لكلّ من المتغيّرات العشوائية الآتية:

11 $X \sim B(40, 0.2)$

12 $X \sim B(280, 0.4)$


13 $X \sim B(48, \frac{1}{6})$

14 **أمراض:** وفقاً لدراسة طبية، فإنّ 9% من البالغين حول العالم مصابون بمرض السكّري. إذا اختيرت عيّنة عشوائية من البالغين تضمّ 12000 شخص، فما العدد المتوقّع من المصابين بمرض السكّري في هذه العيّنة؟

التوزيع الطبيعي Normal Distribution



إذا اتخذ التمثيل البياني لأطوال مجموعة من طلبة الصف السابع شكل المنحنى الطبيعي، فأجد كلاً مما يأتي:

- 1 النسبة المئوية للطلبة الذين تقع أطوالهم فوق الوسط الحسابي.
- 2 النسبة المئوية للطلبة الذين لا يزيد البعد بين أطوالهم والوسط الحسابي على انحراف معياري واحد.
- 3 النسبة المئوية للطلبة الذين تقل أطوالهم عن الوسط الحسابي بمقدار لا يزيد على انحرافين معياريين.
- 4 النسبة المئوية للطلبة الذين تقل أطوالهم عن الوسط الحسابي بمقدار لا يزيد على ثلاثة انحرافات معيارية، وتزيد عليه بمقدار لا يزيد على انحرافين معياريين.



- 5 يُبين الشكل المجاور منحنى توزيع طبيعي. أُعبر عن المتغير العشوائي لهذا التوزيع باستعمال الرموز.


أبين لماذا لا يُمثل أي من التمثيلين الآتين منحنى توزيع طبيعي:



إذا كان: $X \sim N(8, 0.04)$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

- 8 $P(X > 8)$
- 9 $P(7.8 < X < 8.2)$
- 10 $P(X > 8.4)$

صناعة: يُمكن نمذجة أطوال أقطار مسامير يُنتجها مصنع بمنحنى التوزيع الطبيعي المُبين في الشكل المجاور:



- 11 أجد كلاً من الوسط الحسابي، والانحراف المعياري لأطوال أقطار المسامير.

- 12 أجد النسبة المئوية للمسامير التي يزيد طول قطر كل منها على الوسط الحسابي بما لا يزيد على انحرافين معياريين.

التوزيع الطبيعي المعياري Standard Normal Distribution

أجد كلاً مما يأتي، مُستعملًا جدول التوزيع الطبيعي المعياري:

1 $P(Z < 1.42)$

2 $P(Z < 0.87)$

3 $P(Z > 1.06)$

4 $P(Z < -2.78)$

5 $P(Z > -1.33)$

6 $P(1.1 < Z < 2.1)$

7 $P(-2.65 < Z < -1.43)$

8 $P(0.24 < Z < 1.1)$

9 $P(Z < -0.54)$

10 $P(-1.8 < Z < 1.8)$

11 $P(Z < -1.75)$

12 $P(Z > 0.81)$


13 $P(-1 < Z < -0.33)$

14 $P(0.4 < Z < 1.7)$


15 $P(Z > 2.09)$

أجد مساحة المنطقة المظللة أسفل منحنى التوزيع الطبيعي المعياري في كلٍّ مما يأتي:


16




17



18



19



أجد قيمة a التي تُحقق الاحتمال المعطى في كلٍّ مما يأتي:

20 $P(Z < a) = 0.9082$

21 $P(Z < a) = 0.0314$

22 $P(Z > a) = 0.95$

23 $P(Z < a) = 0.5442$

24 $P(Z > a) = 0.2743$

25 $P(Z > a) = 0.6231$

26 إذا كان: $Z \sim N(0, 1)$ ، وكان: $P(1 < Z < c) = 0.1408$ ، فأجد قيمة الثابت c .

احتمال المتغير العشوائي الطبيعي باستعمال الجدول

Probability of Normal Random Variable Using the Table

إذا كان X متغيراً عشوائياً طبيعياً، وسطه الحسابي 89، وانحرافه المعياري 11.5، فأجد القيمة المعيارية z التي تُقابل قيمة x في كلٍّ مما يأتي:

1 $x = 81$

2 $x = 92$

3 $x = 100$

إذا كان X متغيراً عشوائياً طبيعياً، وسطه الحسابي 220، وانحرافه المعياري 10، فأجد قيمة x التي تُقابل القيمة المعيارية z في كلٍّ مما يأتي:

4 $z = 2$

5 $z = -3.5$

6 $z = 4.2$

إذا كان: $X \sim N(17, 100)$ ، فأجد كل احتمال مما يأتي، مُستعملًا جدول التوزيع الطبيعي المعياري:



7 $P(X < 25.8)$

8 $P(X > 10.5)$

9 $P(19.4 < X < 30.2)$

10 $P(4 < X < 17)$

إذا كان: $X \sim N(20, 9)$ ، فأجد مساحة المنطقة المظللة أسفل منحنى التوزيع الطبيعي للمتغير العشوائي X في كلٍّ مما يأتي:



رياضة: تتبع أطوال لاعبي كرة السلة توزيعاً طبيعياً، وسطه الحسابي 185 cm، وانحرافه المعياري 5 cm. إذا اختير لاعب عشوائياً، فأجد كلاً مما يأتي:

13 احتمال أن يزيد طول اللاعب على 175 cm.

14 احتمال أن يتراوح طول اللاعب بين 180 cm و 190 cm.

15 العدد التقريبي للاعبين الذين تزيد أطوالهم على 195 cm من بين 2000 لاعب.