



الرياضيات

الصف العاشر - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول

10

فريق التأليف

د. عمر محمد أبو غليون (رئيساً)

يوسف سليمان جرادات إبراهيم عقله القادرى هيثم زهير مرشود

نفين أحمد جوهر (منسقاً)

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسرك المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:

โทรศัพث: 06-5376262 / 237 البريد: 06-5376266 بريد إلكتروني: P.O.Box: 2088 Amman 11941

الإنستغرام: @nccdjor البريد الإلكتروني: feedback@nccd.gov.jo الموقع الإلكتروني: www.nccd.gov.jo

قرّرت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (4/2020)، تاريخ 11/6/2020 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (56/2020) تاريخ 24/6/2020 م بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 360 - 9

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2022/4/2051)

375.001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الرياضيات: الصف العاشر: كتاب الطالب (الفصل الدراسي الأول) / المركز الوطني لتطوير المناهج. - ط2؛ مزيدة
ومنقحة. - عمان: المركز، 2022

ص. (144).

ر.إ.: 2022/4/2051

الوصفات: / الرياضيات / / التعليم الاعدادي / / المناهج /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

م 1441 هـ / 2020
م 2021 - 2024 م

الطبعة الأولى (التجريبية)
أعيدت طباعته

المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسلیحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديد المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيناً على الارتقاء بمستوى الطلبة المعرفي، ومجاراة الأقران في الدول المتقدمة. ولما كانت الرياضيات إحدى أهم المواد الدراسية التي تنمو لدى الطلبة مهارات التفكير وحلّ المشكلات، فقد أُولى المركز هذا المبحث عنايةً كبيرةً، وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائق المُتبعة عالمياً على أيدي خبرات أردنية؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبية احتياجات طلبتنا.

روعي في إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بصورة سلسة، ضمن سياقات حياتية شائقة، تزيد رغبة الطلبة في التعلم. وكذلك إبراز خطة حل المسألة، وإفراد دروس مستقلة لها تتيح للطلبة التدرب على أنواع مختلفة من هذه الخطط وتطبيقاتها في مسائل متنوعة. وقد احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلم الطلبة المفاهيم والمهارات الواردة فيها وإثرائها. ولأنَ التدرب المكثف على حل المسائل يُعدُ إحدى أهم طرائق ترسیخ المفاهيم الرياضية وزيادة الطلاقة الإجرائية لدى الطلبة؛ فقد أُعدَ كتاب التمارين على نحو يُقدم للطلبة ورقة عمل في كل درس، تُحلُّ بوصفها واجباً منزليًّا، أو داخل الغرفة الصيفية إنْ توافر الوقت الكافي. ولأنَّنا ندرك جيداً حرص الكوادر التعليمية الأردنية على تقديم أفضل ما لديها للطلبة؛ فقد جاء كتاب التمارين أداةً مساعدةً تُوفَّر عليها جهد إعداد أوراق العمل وطباعتها.

من المعلوم أنَ الأرقام العربية تُستخدم في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية، ولا سيما على شبكة الإنترنت، التي أصبحت أداةً تعليميةً مُهمَّةً؛ لما تزخر به من صفحات تُقدِّم محتوى تعليميًّا تفاعليًّا ذا فائدة كبيرة. وحرصاً منا على ألا يفوت طلبتنا أيُّ فرصة، فقد استعملنا في هذا الكتاب الأرقام العربية؛ لجسر الْهُوَّة بين طلبتنا والمحفوظات الرقمي العلمي، الذي ينمو بتسارع في عالم يخطو نحو التعليم الرقمي بوتيرة متسارعة.

ونحن إذ نُقدِّم هذا الكتاب، نأمل أن ينال إعجاب طلبتنا والكوادر التعليمية الأردنية، ويجعل تعليم الرياضيات وتعلُّمها أكثر متعةً وسهولةً، ونعد بأنَ نستمر في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من ملاحظات.

قائمة المحتويات

6	الوحدة ① الأسس والمعادلات
7	مشروع الوحدة: أنظمة المعادلات في حياتنا
8	معلم برمجية جيوجبرا: حل أنظمة المعادلات بيانياً
10	الدرس 1 حل نظام مكون من معادلة خطية ومعادلة تربيعية
17	الدرس 2 حل نظام مكون من معادلتين تربيعيتين
23	الدرس 3 تبسيط المقادير الأساسية
29	الدرس 4 حل المعادلة الأساسية
34	اختبار نهاية الوحدة
36	الوحدة ② الدائرة
37	مشروع الوحدة: استعمالات علمية لخصائص الدائرة
38	الدرس 1 أوتار الدائرة، وأقطارها، ومماساتها
45	الدرس 2 الأقواس والقطاعات الدائرية
51	الدرس 3 الزوايا في الدائرة
58	الدرس 4 معادلة الدائرة
65	الدرس 5 الدوائر المتماسة
71	معلم برمجية جيوجبرا: توسيع: الدوائر المتماسة
73	اختبار نهاية الوحدة

قائمة المحتويات

76	الوحدة 3 حساب المثلثات
77	مشروع الوحدة: إنشاء نظام إحداثي جديدٍ
78	الدرس 1 النسب المثلثية
86	الدرس 2 النسب المثلثية للزوايا ضمن الدورة الواحدة
94	الدرس 3 تمثيل الاقترانات المثلثية
100	الدرس 4 حل المعادلات المثلثية
108	اختبار نهاية الوحدة
110	الوحدة 4 تطبيقات المثلثات
111	مشروع الوحدة: صنع كلينومتر واستعماله
112	الدرس 1 الاتجاه من الشمال
118	الدرس 2 قانون الجيب
125	الدرس 3 قانون جيب التمام
131	الدرس 4 استعمال جيب الزاوية لإيجاد مساحة المثلث
136	الدرس 5 حل مسائل ثلاثة الأبعاد
142	اختبار نهاية الوحدة

الأسس والمعادلات

Exponents and Equations

ما أهمية هذه الوحدة؟

تُستخدم أنظمة المعادلات في كثير من مجالات الحياة. فخبراء الأرصاد الجوية - مثلاً - يُعبرون عن العلاقة بين درجة الحرارة، وسرعة الرياح، والضغط الجوي، ومعدل الهطل، باستخدام نظام معادلات غير خطية؛ ذلك أنَّ أيَّ تغيير في أحد هذه العوامل يؤدّي إلى تغيير في العوامل الأخرى.

سأتعلم في هذه الوحدة:

- حل نظام مُكوَّنٍ من معادلة خطية، وأخرى تربيعية.
- حل نظام مُكوَّنٍ من معادلتين تربيعيتين.
- الأسس النسبية، وخصائصها.
- حل أنظمة معادلاتٍ أسيّة.

تعلّمت سابقاً:

- ✓ حل معادلاتٍ تربيعية باستعمال التحليل.
- ✓ حل معادلاتٍ تربيعية باستعمال القانون العام.
- ✓ حل أنظمة معادلاتٍ تتضمَّنُ معادلتين خطيتين بمتغيرين.
- ✓ قواعد الأسس الصحيحة.

مشروع الوحدة

أنظمة المعادلات في حياتنا

البحث عن أنظمة معادلات في نماذج حياتية.

فكرة المشروع



شبكة الإنترنت، برمجية جيوجبرا.

المواد والأدوات



خطوات تنفيذ المشروع:

1 أبحث مع أفراد مجموعتي في شبكة الإنترنت عن صور لنماذج حياتية تظهر فيها منحنيات ومستقيمات متقطعة (مثل: الجسور، ونوافير المياه، وخرائط الطرق)، أو التقط صوراً لذلك، ثم أحفظها في ملف على جهاز الكمبيوتر.

2 أستعمل برمجية جيوجبرا لإيجاد معادلة كل من المنحنيات المتقطعة التي تظهر في الصور باتباع الخطوات الآتية:

• أنقر على أيقونة من شريط الأدوات، ثم اختار الصورة التي حفظتها.

• أعدل موقع الصورة، وأختار مقاساً مناسباً لها بتحريك النقطتين A و B اللتين تظهران عليهما.

• أجد معادلة أحد المنحنيات التي تظهر في الصورة، وذلك بتحديد بعض النقاط عليه باستخدام أيقونة من شريط الأدوات.

• أكتب الصيغة $\text{FitPoly } (\{C, D, E, F, G, H, I, J, K, L\}, n)$ في شريط الإدخال، ثم أنقر ليظهر منحنى فوق الصورة، ومعادلة في شريط الإدخال.

• أستعمل المؤشر فوق المعادلة لضبط المنحنى الظاهر، بحيث ينطبق تماماً على المنحنى الذي في الصورة.

• أكرر الخطوات السابقة لتحديد معادلات المنحنيات الأخرى التي تظهر في الصورة.

3 أكتب مع أفراد مجموعتي نظام معادلات يمثل منحنين متقطعين في كل صورة، ثم نختار إحدى هذه الأنظمة لحلها جبرياً، ثم نتحقق من صحة الحل بإظهار نقاط تقاطع المنحنين في برمجية جيوجبرا.

عرض النتائج:

أعد مع أفراد مجموعتي عرضاً تقديمياً نبيّن فيه ما يأتي:

• خطوات تنفيذ المشروع موضحة بالصور (نستعمل خاصية طباعة الشاشة).

• بعض الصعوبات التي واجهناها في أثناء العمل بالمشروع، ومعلومة جديدة تعرّفناها في أثناء العمل بالمشروع.

حل أنظمة المعادلات بيانياً

Solving Systems of Equations Graphically


يمكنني استعمال برمجية جيوجبرا (GeoGebra) لتمثيل أنظمة المعادلات، وحلّها بيانياً. أستعمل الرابط [www.geogebra.org /download](http://www.geogebra.org/download) لتنزيل نسخة GeoGebra Classic 6 من هذه البرمجية على جهاز الكمبيوتر. يمكنني أيضاً استعمال النسخة المتوافرة في شبكة الإنترنت من دون حاجة إلى تثبيتها في جهاز الكمبيوتر عن طريق الرابط الإلكتروني: www.geogebra.org /classic

نشاط

أحلُّ نظام المعادلات التربيعية الآتي بيانياً باستعمال برمجية جيوجبرا.

$$x^2 + y^2 = 13$$

$$x^2 - y = 7$$



الخطوة 1: أمثل بيانياً المعادلة التربيعية: $x^2 + y^2 = 13$.

أدخل المعادلة في حاسبة جيوجبرا، بالنقر على المفاتيح الآتية:

x x² + y x² = 1 3 ↵

الخطوة 2: أمثل بيانياً المعادلة التربيعية: $x^2 - y = 7$.


أدخل المعادلة في حاسبة جيوجبرا، بالنقر على المفاتيح الآتية:

x x² - y = 7 ↵

الاحظ أنَّ منحنَّيَ المعادلتين يتقاطعان في أربع نقاطٍ؛ ما يعني وجود أربعة حلولٍ لنظام المعادلات.

الخطوة 3: أُحدِّدُ إحداثيات نقاط التقاءِي بين منحنيَي المعادلتين. أختارُ  من شريط الأدوات، ثم أنقرُ

على منحنيَي المعادلتين، فتظهرُ إحداثيات نقاط التقاءِي.



إحداثيات نقاط التقاءِي هي: $(-3, 2), (3, 2), (2, -3), (-2, -3)$ ؛ ما يعني أن حلول نظام المعادلات هي:

$$x = 3, y = 2 \quad \text{الحلُّ الثاني:}$$

$$x = -2, y = -3 \quad \text{الحلُّ الرابع:}$$

$$x = -3, y = 2 \quad \text{الحلُّ الأول:}$$

$$x = 2, y = -3 \quad \text{الحلُّ الثالث:}$$

أتدرب



أَحْلُلُ كُلَّ نظامِ معادلَاتٍ ممَّا يأْتِي بِيَانًاً باسْتِعْمَالِ بِرْمَجِيَّةِ جِيُوجِرَا:

1) $y = x - 4$

$$2x^2 + 3y^2 = 12$$

2) $y = x^2$

$$x^2 + 2y^2 = 34$$

3) $x + y = 16$

$$x^2 - y^2 = 20$$

4) $3x + 4y = 1$

$$y = x^2 + 5$$

5) $y = 6x$

$$x^2 + y^2 = 9$$

6) $x = 7 + y$

$$y = 3x^2 - 2$$

حل نظام مكون من معادلة خطية ومعادلة تربيعية Solving a System of Linear and Quadratic Equations

فكرة الدرس



مسألة اليوم



حل نظام مكون من معادلة خطية ومعادلة تربيعية.

تُمثل المعادلة $3 - x = y$ طریقاً مستقیماً داخل إحدى المدن، في حين تُمثل المعادلة $x^2 - 3x - 10 = y$ طریقاً آخر منحنیاً داخل المدينة نفسها. هل يتقاطع هذان الطريقان أم لا؟

يمکنني حل نظام مكون من معادلة خطية وأخرى تربيعية باستعمال طریقة التعویض، وذلك بكتابیة أحد المتغيرین في المعادلة الخطیة بدلاًة الآخر، ثم تعویضه في المعادلة التربيعیة وحلها.

مثال 1

أحلُّ نظام المعادلات الآتي، ثم أتحقق من صحة الحل:

$$x - y = 1$$

$$x^2 + y^2 = 5$$

يمکنني استعمال برمجیة جیوجبرا (GeoGebra)، أو حاسة بیانیة، لتمثیل المعادلتین بیانیاً على المستوى الإحداثی نفیه كما في التمثیل البیانی المجاور. الاحظ أن منحنیي المعادلتین يتقاطعان في نقطتين؛ ما يعني أن للنظام حلین مختلفین. أتحقق من ذلك جریاً باستعمال طریقة التعویض:

الخطوة 1 أكتب المعادلة الخطیة بالصورة القياسیة.

$$x - y = 1$$

المعادلة الخطیة

$$y = x - 1$$

بكتابیة y بدلاًة x

الخطوة 2 أُعوّض قيمة y من المعادلة الخطیة في المعادلة التربيعیة:

$$x^2 + (x - 1)^2 = 5$$

تعویض قيمة y في المعادلة التربيعیة

$$x^2 + x^2 - 2x + 1 = 5$$


بفك القوسین

$$2x^2 - 2x - 4 = 0$$

بالتبییط

$$x^2 - x - 2 = 0$$

بالقسمة على 2



الخطوة 3 أحل المعادلة الناتجة باستعمال التحليل:

$$(x+1)(x-2)=0$$

بالتحليل

$$x+1=0 \quad \text{or} \quad x-2=0$$

خاصية الضرب الصفرى

$$x=-1 \quad \text{or} \quad x=2$$

بحل المعادلين

الخطوة 4 أعوّض قيمة x لإيجاد قيمة y :

الحالة الأولى: عندما $x = -1$:

$$y = x - 1$$

بتعويض $-1 = x$ في المعادلة الخطية

$$\text{الحل الأول: } (x, y) = (-1, -2)$$

للتتحقق من صحة الحل الأول، أعوّض الزوج المُرتب $(-1, -2)$ في كل من المعادلة الخطية والتربيعية:

$$x - y = -1 - (-2) = 1 \quad \checkmark$$

بتعويض في المعادلة الخطية

$$x^2 + y^2 = (-1)^2 + (-2)^2 = 1 + 4 = 5 \quad \checkmark$$

بتعويض في المعادلة التربيعية

الحالة الثانية: عندما $x = 2$:

$$y = 2 - 1 = 1$$

بتعويض $2 = x$ في المعادلة الخطية

$$\text{الحل الثاني: } (x, y) = (2, 1)$$

للتتحقق من صحة الحل الثاني، أعوّض الزوج المُرتب $(2, 1)$ في كل من المعادلة الخطية والتربيعية:

$$x - y = 2 - 1 = 1 \quad \checkmark$$

بتعويض في المعادلة الخطية

$$x^2 + y^2 = (2)^2 + (1)^2 = 4 + 1 = 5 \quad \checkmark$$

بتعويض في المعادلة التربيعية

أتحقق من فهمي

أحل نظام المعادلات الآتى، ثم أتحقق من صحة الحل:

$$2x + y = 12$$

$$y = x^2 + 5x - 6$$

أذكر

توجد طائق عدّة لحل معادلة تربيعية، منها: التحليل إلى العوامل، والقانون العام.

إرشاد

يجب تعويض الحل في كلتا معادلتي النظام؛ لكيلا يكون الحل غير صحيح، بحيث يتحقق إحدى المعادلين من دون الأخرى.

يوجد حلّان لنظام المعادلات في المثال السابق. ولكن، هل يوجد نظام معادلات له حلّ واحد؟ لمعرفة الإجابة، أدرس المثال الآتى.

مثال 2

أَحْلُّ نَظَامَ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتَيِّ:

$$y - x^2 = 7 - 5x$$

$$4y - 8x = -21$$

عند تمثيل معادلتي النظيم في المستوى الإحداثي نفسه، يلاحظ وجود نقطة تقاطع واحدة كما في التمثيل البياني المجاور؛ ما يعني أن للنظام حلًا واحدًا فقط. أتحقق من ذلك جريًا باستعمال طريقة التعويض:

1 أكتب المعادلة الخطية بالصورة القياسية (بدالة y).

$$4y - 8x = -21$$


المعادلة الخطية

$$4y = 8x - 21$$

جمع $8x$ للطرفين

$$y = 2x - 5.25$$

بقسمة الطرفين على 4



2 أَعُوْضُّ قِيمَةَ y مِنَ الْمَعَادِلَةِ الْخَطِّيَّةِ فِي الْمَعَادِلَةِ التَّرْبِيعِيَّةِ:

$$y - x^2 = 7 - 5x$$

المعادلة التربيعية

$$(2x - 5.25) - x^2 = 7 - 5x$$

بتعويض قيمة y من المعادلة الخطية

$$x^2 - 7x + 12.25 = 0$$

بالتبسيط

3 أَحْلُّ الْمَعَادِلَةِ النَّاتِجَةِ:

لِحَلِّ الْمَعَادِلَةِ باسْتِعْمَالِ الْقَانُونِ الْعَامِ، أَحَدِّدُ قِيمَ الْمَعَامِلَاتِ:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

القانون العام

$$= \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4(1)(12.25)}}{2(1)}$$

بتعويض

$$= \frac{7 \pm \sqrt{49-49}}{2} = 3.5$$

بالتبسيط

آتذكر

أَسْتَعْمَلُ الْقَانُونَ الْعَامَ لِحَلِّ الْمَعَادِلَاتِ الَّتِي يَصُعبُ تَحْلِيلُهَا.

4 أَعُوْضُّ قِيمَةَ x لِإِيجادِ قِيمَةِ y :

$$y = 2x - 5.25$$

المعادلة الخطية

$$= 2(3.5) - 5.25$$

بتعويض

$$= 1.75$$

بالتبسيط

إِذْنُ، حُلُّ النَّظَامُ هُوَ الزَّوْجُ الْمُرْتَبُ $(3.5, 1.75)$

أتحقق من فهمي

$$\begin{aligned} y &= 2x + 1 \\ x^2 + y^2 &= 10 \end{aligned}$$

أَحُلُّ نظامَ المعادلَاتِ المجاورِ، ثُمَّ أَتَحَقَّقُ مِنْ صِحَّةِ الْحَلِّ:

لاحظتُ في المثالينِ السابقيْنِ وجودَ حَلٌّ أَوْ حَلَّيْنِ لِنَظَامِ المعادلَاتِ، ولكنْ، هلْ تَوْجُدُ أَنْظَمَةُ معادلَاتٍ لِيَسَ لَهَا حَلٌّ؟ لِمَعْرِفَةِ الإِجَابَةِ، أَدْرُسُ المَثَالَ الآتَى.

مثال 3

أَحُلُّ نظامَ المعادلَاتِ الآتَى:

$$\begin{aligned} y + x &= 5 \\ x^2 + y^2 &= 9 \end{aligned}$$

يَتَبَيَّنُ مِنَ التَّمثِيلِ الْبَيَانِيِّ الْمَجاوِرِ أَنَّ مَنْحَنِيَّ الْمَعادلَتَيْنِ لَا يَتَقَاطِعُانِ فِي أَيِّ نَقْطَةٍ؛ مَا يَعْنِي عَدَمَ وَجُودِ حَلٍّ لِنَظَامِ الْمَعادلَاتِ. أَتَحَقَّقُ مِنْ ذَلِكَ جَبْرِيًّا بِاسْتِعْمَالِ طَرِيقَةِ التَّعْوِيْضِ:

$$y + x = 5$$

$$x = 5 - y$$

$$(5 - y)^2 + y^2 = 9$$

$$25 - 10y + y^2 + y^2 = 9$$

$$2y^2 - 10y + 16 = 0$$


المعادلة الخطية

بِتَابَةِ x بِدَلَالَةِ y

بِتَعْوِيْضِ قِيمَةِ x فِي الْمَعادِلَةِ التَّرْبِيعِيَّةِ

بِإِجَادِ الْمَفْكُوكِ

بِالْتَّبَسيْطِ



اتذّكر

يَعْتَمِدُ عَدْدُ جُذُورِ الْمَعادِلَةِ وَأَنْواعُهَا عَلَى قِيمَةِ الْمُمِيَّزِ الَّذِي يُرْمَزُ إِلَيْهِ بِالرِّمْزِ (Δ)، حَيْثُ:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

اتذّكر

لَا يَوْجُدُ عَدْدٌ حَقِيقِيٌّ مَرَبُوْعٌ عَدْدٌ سَالِبٌ.

أتحقق من فهمي

$$\begin{aligned} x - y &= 0 \\ y &= x^2 + 3x + 2 \end{aligned}$$

أَحُلُّ نظامَ الْمَعادلَاتِ الْمَجاوِرِ:

عدد حلول نظام مكون من معادلة خطية وأخرى تربيعية

نتيجة

لأي نظام يتكون من معادلة خطية وأخرى تربيعية، تكون واحدة من العبارات الآتية
صحيحةً:

- 3 وجود حلٌّ واحدٌ مختلفين. 2 عدم وجود حلٌّ.

توجد تطبيقات حياتية كثيرة لحل الأنظمة التي تتكون من معادلة خطية وأخرى تربيعية.

مثال 4: من الحياة



سجاد مستطيلة الشكل مصنوعة يدوياً، مجموع بعديها m 7، وطول قطريها 5 m أجد كلاً من طولها، وعرضها.

معلومة



لإيجاد بعدي السجادة، أكتب نظام معادلات يمثل المسألة، ثم أحله.
أفترض أن طول السجادة هو x ، وأن عرضها هو y ، وبما أن مجموع بعدي السجادة هو 7 ، فإن $x + y = 7$ ، وبما أن قطر السجادة هو 5 m ، فإن (باستعمال نظرية فيثاغورس): $x^2 + y^2 = 25$

قد تستغرق صناعة السجادة اليدوية الصغيرة 4 أشهر من العمل المتواصل.

$$y + x = 7$$

$$x^2 + y^2 = 25$$

والآن، سأحل النظام باستعمال طريقة التعويض:

$$x + y = 7$$

المعادلة الخطية

$$y = 7 - x$$

بكتابة y بدلالة x

$$x^2 + (7 - x)^2 = 25$$

بتعويض قيمة y في المعادلة التربيعية

$$2x^2 - 14x + 24 = 0$$

بالتبسيط

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

بالقسمة على 2

أحل المعادلة التربيعية بالتحليل إلى العوامل:

$$(x - 4)(x - 3) = 0$$

بالتحليل

$$x - 4 = 0 \text{ or } x - 3 = 0$$

خاصية الضرب الصفرية

$$x = 4 \text{ or } x = 3$$

بحل كل معادلة

آتذكر

أتحقق من صحة التحليل
باستعمال خاصية التوزيع.

الوحدة 1

أعوّض قيم x في المعادلة الخطية لإيجاد قيمة y :

$$y = 7 - 3$$

بتعويض قيمة 3 = x في المعادلة الخطية

$$y = 4$$

قيمة y الأولى

$$y = 7 - 4$$

بتعويض قيمة 4 = x في المعادلة الخطية

$$y = 3$$

قيمة y الثانية

إذن، حلّ النظام هو: (3, 4) و (4, 3).

بما أنَّ طول السُّجَادَةَ أَكْبَرُ مِنْ عَرْضِهَا، فَإِنَّ الطَّوْلَ هُوَ 4 m، وَالعَرْضُ هُوَ 3 m

أتحقق من فهمي

مزرعة مستطيلة الشكل، طول قُطُرِها 50 m، ومحيطها 140 m. أَجِدُ بُعدَيِّ المزرعة.

أتدرب وأحل المسائل



أَحْلُّ كُلَّاً مِنْ أَنْظَمَةِ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةِ، ثُمَّ أَتَحَقَّقُ مِنْ صَحَّةِ الْحَلِّ:

1) $y = x^2 + 4x - 2$

$$y + 6 = 0$$

2) $y = x^2 + 6x - 3$

$$y = 2x - 3$$

3) $y = x^2 + 4$

$$x - y = -1$$

4) $y = x^2 + 4x - 1$

$$7x + 2y = 6$$

5) $y = x^2 + 4x + 7$

$$y - 3 = 0$$

6) $y = x^2 - 2x + 4$

$$y = x$$

7) $x^2 + y^2 = 34$

$$2x - y = 1$$

8) $y = x^2 + 2x + 1$

$$y = 0$$

9) $x^2 + y^2 = 4$

$$x + y = 5$$

10) $x^2 + y^2 = 10$

$$x - y = 2$$

11) $x^2 + (y - 1)^2 = 17$

$$x = 1$$

12) $2x + 3y = 5$

$$2y^2 + xy = 12$$

بركة: بركة ماءٍ قاعدتها مستطيلة الشكل، ومحيطها 16 m، والفرق بين مربعيه بُعدُيهما 16 m². أَجِدُ بُعدَيِّها.

13)

أعداد: أَجِدُ العددين الموجبين اللذين مجموعهما 12، والفرق بين مربعيهما 24

14)

هندسة: دائتان مجموع محبيتهما 12π cm، ومجموع مساحتهما 20π cm². أَجِدُ قُطْرَيِّهما.


15)

أعماّر: قال شيماء: «عمرى أكبر بأربع سنوات من عمر أخي ريان، ومجموع مربعين عمرينا هو 346 عاماً». ما عمر شيماء؟ 16



لوحة: لوحة مستطيلة الشكل، طولها يساوي مثلي عرضها، وطول قطرها $\sqrt{1.25}$ m، أحاط بها إطار، تكلفة المتر الطولي الواحد منه بالدينار 2.25. أجد تكلفة الإطار. 17

زراعة: قسم فيصل $41m^2$ من مزرعته إلى منطقتين مربعتين الشكل، ثم زرعهما بمحصولي الطماطم والبطاطا. إذا زاد بعْد المنطقت المزروعة بالطماطم متراً واحداً على بعْد المنطقت المزروعة بالبطاطا، فما مساحة المنطقت المزروعة بكل محصول؟ 18




تمثل المعادلة $y = 2 + 0.12x - 0.002x^2$ مسار قذيفة مدفع تم إطلاقها نحو تلة. أجد إحداثيات النقطة التي اصطدمت عندها القذيفة بسطح التلة؛ إذا علمت أنه مستقيم ومعادلته $y = 0.15x$. 19

مهارات التفكير العليا

تبرير: صممت نافورة بصورة يخرج منها الماء بحسب العلاقة: $10 = y + x^2$ ، إذا وضعت وحدة إنارة على المستقيم الذي معادلته: $x + 12 = y$ ، فهل يصل ماء النافورة إلى وحدة الإنارة؟ أبّرر إجابتي. 20

تحدّ: إذا علمت أنَّ المستقيم الذي معادلته: $p = 3x + y$ يقطع المنحني: $5 - y = 2x^2 + 3x$ في نقطة واحدة فقط، فما قيمة p ؟ 21



تحدّ: أجد مساحة شبه المنحرف المرسوم باللون الأزرق أسفل منحني الاقتران $4 + 0.3x^2 = y$ في الشكل المجاور. 22

حل نظام مكون من معادلتين تربيعيتين

Solving a System of Two Quadratic Equations

فكرة الدرس



مسألة اليوم



حل نظام مكون من معادلتين تربيعيتين بمتغيرين.



استعملت خبيرة تسويق المعادلتين التربيعيتين الآتية لتمثيل مقدار كل من العرض والطلب لسلعة تجارية؛ بغية تحديد نقاط التوازن التي يتساوى عندها العرض مع الطلب في السوق، حيث يمثل x سعر الوحدة، ويمثل y عدد الوحدات المبيعة. هل يمكنني مساعدة الخبرة على تحديد نقاط التوازن؟

$$y = x^2 + 6x$$

$$y = -x^2 + 24x$$

لحل نظام يتكون من معادلتين تربيعيتين، ساوي أو لا المعادلتان بعضهما بعض لتكوين معادلة تربيعية واحدة.

مثال 1

أحل نظام المعادلات الآتي، ثم أتحقق من صحة الحل:

$$y = x^2 + 4x - 3$$

$$y = -x^2 + 2x - 3$$

عند تمثيل معادلتي النظام على المستوى الإحداثي نفسه، يلاحظ أن منحنيهما يتقاطعان في نقطتين كما في الشكل المجاور؛ ما يعني أن للنظام حلتين مختلفتين. أتحقق من ذلك جبرياً.

بدايةً، يجب مساواة معادلتي النظام المعطى، ثم حل المعادلة التربيعية الناتجة:

$$x^2 + 4x - 3 = -x^2 + 2x - 3$$

بمساواة المعادلتين

$$2x^2 + 2x = 0$$

بجمع الحدود المتشابهة، والتبسيط

أحل المعادلة التربيعية الناتجة باستعمال التحليل:


$$2x(x + 1) = 0$$

بتحليل المعادلة التربيعية الناتجة

$$x = 0 \quad \text{or} \quad x = -1$$

حل المعادلة

لإيجاد قيمة y ، أوضّع قيمتي x في أي من معادلتي النظام:



أذكر

يمكنني حل المعادلة التربيعية الناتجة باستعمال القانون العام أيضاً.

الحالة الأولى: إذا كانت $x = 0$

بتعويض $x = 0$ في إحدى المعادلتين

$$y = -3$$

بالتبسيط

إذن، الحل الأول للنظام هو: $(x, y) = (0, -3)$.

الحالة الثانية: إذا كانت $x = -1$

بتعويض $x = -1$ في إحدى المعادلتين

$$y = -6$$

بالتبسيط

إذن، الحل الثاني للنظام هو: $(x, y) = (-1, -6)$.

إذن، حل النظام هو: $(0, -3)$ ، $(-1, -6)$.

أتحقق من فهمي

أحلل نظام المعادلات الآتي، ثم أتحقق من صحة الحل:

$$y = -x^2 - 2x + 3$$

$$y = x^2 + 2x - 3$$

إرشاد

لتحقق من صحة الحل، أوضّع قيمتي x و y في كل من معادلتي النظام.

قد يتقاطع منحنيا معادلتين تربيعيتين في نقطة واحدة فقط، وعندئذ يكون لنظام المعادلات الذي تكونه هاتان المعادلتان حل واحد.

مثال 2: من الحياة

سباقات: في أحد سباقات المراحل، سلك متسابق مساراً تمثله المعادلة التربيعية $y = x^2$ في حين سلك متسابق آخر مساراً تمثله المعادلة $y = x^2 + 3x - 2$. أجد نقطة التقاطع بين مساري المتسابقين.


أكتب المعادلة $x^2 + 3x - 2 = y + x^2$ بالصورة القياسية (بدالة y).

$$x^2 + 3x - 2 = y$$

بطرح 2 من الطرفين

$$y = x^2 + 3x - 2$$

باستعمال الخاصية التبديلية



عند تمثيل المعادلتين بيانياً كما في الشكل المجاور، يلاحظ وجود نقطة تقاطع واحدة بين منحنيهما؛ ما يعني أن لنظام المعادلات حل واحداً. أتحقق من ذلك جبرياً.

بدايةً، يجب مساواة معادلتي النظام المعطى، ثم حل المعادلة التربيعية الناتجة:

معلومة



تجرى سباقات المراحل على مدار أيام، وهي تقام على مسارات متنوعة من حيث التضاريس، مثل: الطرق المُنسَطَّة، والطريق الجبلي.

الوحدة 1

$$x^2 + 3x - 2 = x^2$$

بمساواة المعادلتين

$$x^2 + 3x - 2 - x^2 = 0$$

طرح x^2 من كلا الطرفين

$$3x - 2 = 0$$

بجمع الحدود المتشابهة، والتبسيط

$$x = \frac{2}{3}$$

بعد ذلك أجد قيمة y ، وذلك بتعويض قيمة $x = \frac{2}{3}$ في أي من معادلتي النظام:

$$y = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 3\left(\frac{2}{3}\right) - 2$$

تعويض $\frac{2}{3} = x$ في المعادلة الثانية

$$y = \frac{4}{9}$$

بالتبسيط

إذن، حل نظام المعادلات هو: $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{4}{9}$ ، ونقطة تقاطع المنحنيين هي: $(\frac{2}{3}, \frac{4}{9})$.

معلومة



أتحقق من فهمي

نزلج: تمثل المعادلة $y = x^2 + 2x$ مساراً مُنزلجاً على الجليد، في حين تمثل المعادلة $y = x^2 - x + 5$ مساراً مُنزلجاً آخر. أبحث عن جميع النقاط التي قد يصطدم عندها المُنزلجان إذا لم يكونا حذرين.

رياضة النزلج هي إحدى أسرع الرياضات غير الآلية؛ فقد تصل سرعة المُنزلج إلى

200 km/h

عرضنا في المثالين السابقين أنظمة معادلات تربيعية لها حلان أو حل واحد. ولكن، هل يوجد دائماً حل لنظام المكون من معادلتين تربيعيتين؟ أدرس المثال الآتي.

مثال 3

أحل حل نظام المعادلات الآتي:

$$y = x^2 + x + 2$$

$$y = -x^2 - x + 1$$

عند تمثيل المعادلتين بيانياً كما في الشكل المجاور، يلاحظ عدم وجود نقاط تقاطع بين منحنيهما؛ ما يعني عدم وجود حل لنظام المعادلات. أتحقق من ذلك جبرياً.


بدايةً، يجب مساواة معادلتي النظام المعطى، ثم حل المعادلة التربيعية الناتجة لإيجاد قيمة x :

$$x^2 + x + 2 = -x^2 - x + 1$$

بمساواة المعادلتين

$$2x^2 + 2x + 1 = 0$$

بالتبسيط



بعد ذلك أجد قيمة المميز $\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4(2)(1) = -4$ لتحديد إذا كان للمعادلة التربيعية الناتجة حل أم لا.

قيمة المعاملات هي: $a = 2, b = 2, c = 1$. وبالتعويض في صيغة المميز يتوج:

$$\Delta = (2)^2 - 4(2)(1) = -4$$

قيمة المميز سالبة. إذن، لا يوجد حل للمعادلة. ومن ثم، فلا يوجد حل لهذا النظام.

أتحقق من فهمي

أحل نظام المعادلات الآتي:

$$y = x^2 + 4$$

$$y = -x^2 + 2$$

عرضنا في الأمثلة السابقة أنظمة لها حلان، أو حل واحد، أو ليس لها حل. ولكن، هل يوجد نظام مكون من معادلتين تربيعتين، له ثلاثة حلول، أو أربعة؟ أدرس المثال الآتي.

مثال 4

أحل نظام المعادلات التربيعية الآتي، ثم أتحقق من صحة الحل:

$$x^2 + y^2 = 13$$

$$x^2 - y = 7$$

عند تمثيل المعادلتين بيانياً كما في الشكل المجاور، يلاحظ وجود 4 نقاط تقاطع بين منحنيهما؛ ما يعني وجود أربعة حلول لنظام المعادلتين. أتحقق من ذلك جبرياً.


يظهر المتغير x في كلتا المعادلتين بالقوة نفسها؛ لذا يمكنني استعمال الحذف للتخلص من هذا المتغير، ثم حل المعادلة التربيعية الناتجة التي تحوي متغيراً واحداً هو y :

$$x^2 + y^2 = 13$$

$$(-) \quad x^2 - y = 7$$

$$\hline$$

$$y^2 + y - 6 = 0$$



بالطرح

طرح 6 من كلا الطرفين

يمكنني حل المعادلة التربيعية الناتجة باستعمال القانون العام، أو التحليل:

$$(y + 3)(y - 2) = 0$$

بالتحليل

$$\text{إذن: } y = -3, y = 2$$

أعوض قيمتي y في إحدى معادلتي النظام لإيجاد قيم x :

$$x^2 = -3 + 7$$

$$\text{بتعويض قيمة } y = -3$$

فيزياء: قذفت كرتان رأسياً في الوقت نفسه من موقعين مختلفين. إذا كانت المعادلة: $10 - 2t^2 + 12t + y = 0$ تمثل ارتفاع الكرة الأولى بالأمتار بعد مرور t ثانية، وكانت المعادلة: $42 - 2t^2 + 4t + y = 0$ تمثل ارتفاع الكرة الثانية، فأجد الزمن الذي يتساوى عنده ارتفاع كل من الكرتين، ثم أجد ارتفاع كل كرة في تلك اللحظة.

ثقافة مالية: بالعودة إلى مقدمة الدرس، أستعمل نظام المعادلات المعطى لإيجاد نقاط التوازن التي يتساوى عندها العرض والطلب.

14 أحل نظام المعادلات الآتي:

$$x^2 - 3xy + 2y^2 = 0$$

$$x^2 + xy = 6$$

مهارات التفكير العليا

15 تبرير: قالت زينب إنه لا يوجد حل لنظام المعادلات الآتي:

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$x^2 + y^2 = 9$$

هل قول زينب صحيح؟ أبّرّ إجابتي.

16 مسألة مفتوحة: أكتب نظاماً مكوناً من معادلتين تربيعيتين ليس له حل.

17 تحدّ: قطعة أرض على شكل مثلث متطابق الصاعين، طول ضلعه المتطابق 50 m، ومساحته 1200 m^2 . أجد طول قاعدته، وارتفاعه.

18 مسألة مفتوحة: أكتب نظاماً من معادلتين تربيعيتين؛ على أن تكون النقطة $(3, 5)$ أحد حلوله.



19 تحدّ: قطعة من ورق مقوى مستطيلة الشكل، مساحتها 216 cm^2 ، ثي طولها، ولصقا معًا، فتشكل أنبوب أسطواني حجمه 224 cm^3 . أجد بعد قطعة الورق.



الدرس

3

تبسيط المقادير الأسيّة

Simplifying Exponential Expressions

معرفة الأسس النسبية وتبسيطها.

فكرة الدرس



الأُس النسبيّ.

المصطلحات



مسألة اليوم



حديقة مربعة الشكل، طول نصف ضلعها معطى بالحد الجبري $2x^{\frac{2}{5}}y^{\frac{1}{3}}z^4$ ، ما مساحتها بالوحدات المربعة؟



التحويل من الصيغة الأسيّة إلى الصيغة الجذرية

مراجعة المفاهيم

لأي عدد حقيقي a ، إذا كان n و m عددين صحيحين موجبين ($n > 1$)، فإنَّ:
 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ ، إلا إذا كانت $0 < a$ ، و n عدداً زوجياً، فإنَّ الجذر يكون غير معروف.

مثال 1

أجد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة:

$$\begin{aligned} 1. \quad 27^{\frac{1}{3}} \\ 27^{\frac{1}{3}} &= (\sqrt[3]{27})^1 \\ &= \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} \\ &= 3 \end{aligned}$$

بكتابة المقدار في صورة الجذر الثالث

بتحليل العدد 27 إلى عوامله الأولية

$$\begin{aligned} 2. \quad 4^{\frac{3}{2}} \\ 4^{\frac{3}{2}} &= (\sqrt{4})^3 \\ &= (\sqrt{2 \times 2})^3 \\ &= (2)^3 \\ &= (2 \times 2 \times 2) \\ &= 8 \end{aligned}$$

بكتابة المقدار في صورة الجذر التربيعي مرفوعاً للأُس 3

بتحليل العدد 4 إلى عوامله الأولية

تعريف الأسس

أذكّر

لأي عدد حقيقي a ، إذا كان n عدداً صحيحاً موجباً، فإنَّ $a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_n$ ، و يُسمى a الأساس، و n الأُس.

3 $(81)^{-\frac{5}{4}}$

$$(81)^{-\frac{5}{4}} = (\sqrt[4]{81})^{-5}$$

$$= (\sqrt[4]{3 \times 3 \times 3 \times 3})^{-5}$$

$$= (3)^{-5}$$

$$= \frac{1}{(3)^5}$$

$$= \frac{1}{(3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3)}$$

$$= \frac{1}{243}$$

الصورة الجذرية

تحليل العدد 81 إلى عوامله الأولية

تعريف الأس السالب

تعريف الأس

آتذكر

لأي عدد حقيقي $a \neq 0$ ،
فإن $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. وإذا كان
 a مرفوعاً لأس سالب ويقع
في المقام، فإن $\frac{1}{a^{-n}} = a^n$:

4 $(-8)^{\frac{7}{3}}$

$$(-8)^{\frac{7}{3}} = (\sqrt[3]{-8})^7$$

الصورة الجذرية

تحليل العدد -8 إلى عوامله الأولية

$$= (\sqrt[3]{-2 \times -2 \times -2})^7$$

$$= (-2)^7$$

$$= -128$$

أتحقق من فهمي

أجد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة:

a) $32^{\frac{1}{5}}$

b) $9^{\frac{5}{2}}$

c) $(16)^{-\frac{5}{4}}$

خصائص ضرب القوى وقسمتها

مراجعة المفاهيم

لأي عددين حقيقيين a و b و عددين صحيحين n و m ، فإن:

1) $a^n \times a^m = a^{n+m}$ ضرب القوى

2) $(a^n)^m = a^{n \times m}$ قوة القوى

3) $(ab)^n = a^n \times b^n$ قوة ناتج الضرب

4) $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$, $a \neq 0$ قسمة القوى

5) $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, $a, b \neq 0$ قوة ناتج القسمة

الوحدة 1

تنطبق خصائص ضرب القوى وقسمتها التي درستها سابقاً للأسس الصحيحة على الأسس النسبية (rational exponents) أيضاً.

مثال 2

أجد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة:

1) $y^{-\frac{5}{2}} \times y^{\frac{3}{2}}$

$$y^{-\frac{5}{2}} \times y^{\frac{3}{2}} = y^{-\frac{5}{2} + \frac{3}{2}}$$

$$= y^{-1}$$

$$= \frac{1}{y}$$

ضرب القوى

بجمع الأسس

تعريف الأس السالب

2) $(x^{\frac{4}{3}})^{\frac{1}{2}}$

$$(x^{\frac{4}{3}})^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{4}{3} \times \frac{1}{2}}$$

$$= x^{\frac{2}{3}}$$

$$= \sqrt[3]{x^2}$$

بالتبسيط

الصورة الجذرية

3) $(a \times b^2)^{\frac{3}{2}}, a > 0$

$$(a \times b^2)^{\frac{3}{2}} = a^{\frac{3}{2}} \times b^{2 \times \frac{3}{2}}$$

$$= \sqrt{a^3} \times b^3$$

قوّة ناتج الضرب

الصورة الجذرية

4) $\frac{z^{\frac{7}{8}}}{z^{-\frac{1}{8}}}$

$$\frac{z^{\frac{7}{8}}}{z^{-\frac{1}{8}}} = z^{\frac{7}{8} - \frac{1}{8}}$$

$$= z^{\frac{6}{8}}$$

$$= z^{\frac{3}{4}}$$

$$= \sqrt[4]{z^3}$$

قسمة القوى

بالتبسيط

بالتبسيط

الصورة الجذرية

أتعلم

تنقسم الجذور بحسب دليل الجذر إلى نوعين، هما: الجذور الفردية، والجذور الزوجية. مثلاً:

جذور فردية:

$$\sqrt[3]{7}, \sqrt[5]{x^2 + 1}$$

جذور زوجية:

$$\sqrt{18}, \sqrt[6]{9 + 3y}$$

5) $\left(\frac{x^4}{y^2}\right)^{\frac{3}{4}}$

$$\left(\frac{x^4}{y^2}\right)^{\frac{3}{4}} = \frac{x^{4 \times \frac{3}{4}}}{y^{2 \times \frac{3}{4}}}$$

$$= \frac{x^3}{y^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \left(\frac{x}{\sqrt{y}}\right)^3$$

قوَّةُ ناتجِ القسمةِ

قوَّةُ القوىِ

الصورةُ الجذريةُ

6) $\frac{\sqrt[5]{x^4}}{\sqrt[3]{x^2}}$

$$\frac{\sqrt[5]{x^4}}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{x^{\frac{4}{5}}}{x^{\frac{2}{3}}}$$

$$= x^{\frac{4}{5} - \frac{2}{3}}$$

$$= x^{\frac{2}{15}}$$

$$= \sqrt[15]{x^2}$$

تعريفُ الأسِ النسبيِّ

قسمةُ القوىِ

بالتبسيطِ

الصورةُ الجذريةُ

أتحقق من فهمي

أَجِدُ قيمةَ كُلِّ مَا يَأْتِي فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ:

a) $a^{\frac{2}{3}} \times a^{-\frac{3}{7}}$

b) $\left(x^{\frac{5}{2}}\right)^{-\frac{7}{5}}$

c) $(y \times z)^{\frac{5}{4}}$

d) $\frac{x^{\frac{9}{2}}}{x^{\frac{8}{5}}}$

e) $\left(\frac{x}{y^2}\right)^{-\frac{3}{2}}$

f) $\frac{\sqrt[5]{x^2}}{\sqrt[7]{x^3}}$

تبسيطِ العباراتِ الأسِيةِ

مفهومُ أساسِيٍّ

تَكُونُ الْعَبَارَةُ الْأَسِيَّةُ فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ إِذَا:

1) ظَهَرَ الْأَسَاسُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَتِ الْأَسِسُ جَمِيعُهَا مُوجَبَةً.

2) لَمْ تَتَضَمَّنِ الْعَبَارَةُ قَوَّةً قَوَىً.

3) كَانَتِ الْكَسُورُ وَالْجَذْرُوُرُ جَمِيعُهَا فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ.

مثال 3

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة، علماً بأنّ جميع المُتغيّرات أعدادٌ حقيقيةٌ موجبةٌ:

$$1) \frac{(6x^{\frac{4}{3}})(y^{\frac{-7}{5}})}{(2x^{\frac{-8}{3}})(y^{\frac{-2}{5}})}$$

$$\frac{6x^{\frac{4}{3}}y^{\frac{-7}{5}}}{2x^{\frac{-8}{3}}y^{\frac{-2}{5}}} = \left(\frac{6}{2}\right) \times \left(x^{\frac{4}{3} - \frac{-8}{3}}\right) \times \left(y^{\frac{-7}{5} - \frac{-2}{5}}\right)$$

$$= 3x^4 y^{-1}$$

$$= \frac{3x^4}{y}$$

قسمة القوى

بالتبسيط

تعريف الأسّ السالب

$$2) \frac{(3xy^{\frac{3}{2}})(6y^{\frac{2}{5}})}{(9x^{\frac{-3}{2}})(x^{\frac{5}{2}}y^{\frac{4}{10}})}$$

$$\frac{(3xy^{\frac{3}{2}})(6y^{\frac{2}{5}})}{(9x^{\frac{-3}{2}})(x^{\frac{5}{2}}y^{\frac{4}{10}})} = \frac{3 \times 6}{9} \times \frac{x}{x^{\frac{-3}{2} + \frac{5}{2}}} \times \frac{y^{\frac{3}{2} + \frac{2}{5}}}{y^{\frac{4}{10}}}$$

$$= 2 \times \frac{x}{x^1} \times \frac{y^{\frac{19}{10}}}{y^{\frac{4}{10}}}$$

$$= 2x^{1-1} y^{\frac{19}{10} - \frac{4}{10}}$$

ضرب القوى

بالتبسيط

قسمة القوى

تعريف الأسّ الصفرّي

الصورة الجذرية

$$3) \sqrt[3]{64x^{12}y^3}$$

$$\sqrt[3]{64x^{12}y^3} = (64x^{12}y^3)^{\frac{1}{3}}$$

$$= (64)^{\frac{1}{3}} (x)^{\frac{12}{3}} (y)^{\frac{3}{3}}$$

$$= 4x^4 y$$

صورة الأسّ النسبيّ

قوّة ناتج الضرب

بالتبسيط

أفهم

إذا كانت $n = m$ فإنّ:

$$1 = \frac{a^n}{a^m} = a^{n-n} = a^0$$

إذن، $a^0 = 1$

أتحقق من فهمي

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة، علماً بأنّ جميع المُتغيّرات أعدادٌ حقيقيةٌ موجبةٌ:

$$a) \frac{9x^{-\frac{3}{4}}y}{3x^{\frac{7}{2}}y^{-\frac{5}{3}}}$$

$$b) \frac{(125y^{-\frac{9}{2}})(10xy^{\frac{10}{3}})}{(5x^{\frac{5}{2}}y)(y^{-\frac{3}{7}})}$$

$$c) \sqrt[4]{16x^{18}y^{22}}$$



أَجِدُّ قِيمَةَ كُلِّ مَمَّا يَأْتِي فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ:

1) $512^{\frac{1}{9}}$

2) $125^{\frac{2}{3}}$

3) $36^{-\frac{1}{2}}$

4) $(-243)^{\frac{6}{5}}$

5) $(25)^{\frac{3}{2}}$

6) $(-64)^{\frac{7}{3}}$

أَجِدُّ قِيمَةَ كُلِّ مَمَّا يَأْتِي فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ:

7) $z^{-\frac{4}{2}} \times z$

8) $(x^5)^{\frac{5}{7}}$

9) $(a^3 \times b)^{\frac{2}{3}}$

10) $\frac{x^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{7}{2}}}$

11) $\frac{\sqrt[6]{y^3}}{\sqrt[6]{y^9}}$

12) $\frac{k^{\frac{1}{2}} \times k^{\frac{3}{2}}}{k^2}$

أَكْتُبُ مَا يَأْتِي فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ، عَلَمًا بِأَنَّ جَمِيعَ الْمُتَغَيِّرَاتِ أَعْدَادٌ حَقِيقِيَّةٌ مُوجَّهَةٌ:

13) $\left(\frac{40x^{\frac{3}{4}}y^{-\frac{7}{3}}}{5x^{-\frac{3}{2}}y^{-\frac{16}{3}}} \right)^{-\frac{2}{5}}$

14) $\frac{27x^{\frac{7}{3}}y^{-\frac{4}{2}}xz^2}{(3x^2y^{\frac{5}{2}})(3x^{\frac{5}{3}}y^{-5})}$

15) $\frac{(a^2b^3)^{-2} \times ab^4}{a^{-1}b^2}$

16) $\frac{(8p^{-6}q^3)^{\frac{2}{3}}}{(27p^3q)^{-\frac{1}{3}}}$

17) $\frac{(x^2y)^{\frac{1}{3}}(xy^2)^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}}}$

18) $\frac{(4x^{-1}y^{\frac{1}{3}})^{\frac{3}{2}}}{(xy)^{\frac{3}{2}}}$

مهارات التفكير العليا



تَحْدِيدٌ: أَجِدُّ قِيمَةَ الْمَقْدَارِ الْأَسْيَّ الْأَتِيِّ: 19)

$$(-5)^{43} + (-1)^{43} + (5)^{43}$$

تَبَرِّيرٌ: تَضَاعُفُ عَيْنَةٍ فِي الْمَخْتَبِرِ 3 مَرَّاتٍ كُلَّ أَسْبُوعٍ. إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ 7300 خَلِيَّةً بَكْتِيرِيَّةً، فَكُمْ خَلِيَّةً سِيَصْبُحُ فِيهَا بَعْدَ مَرْورِ 5 أَسَابِيعٍ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

تَحْدِيدٌ: أَكْتُبُ مَا يَأْتِي فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ، عَلَمًا بِأَنَّ أَيَّاً مِنَ الْمُتَغَيِّرَاتِ لَا يَسَاوِي صُفْرًا:

21) $\frac{r^{\frac{3}{2}} + r^{\frac{5}{2}}}{r^2 + r^3}$

22) $\frac{y^{-\frac{1}{2}} - 2y^{-\frac{3}{2}}}{y^{\frac{1}{2}} - 2y^{-\frac{1}{2}}}$

23) $\frac{1+x}{2x^{\frac{1}{2}}} + x^{\frac{1}{2}}$

تَبَرِّيرٌ: أَفَارِنُ بَيْنَ الْعَدْدَيْنِ: 2^{175} و 5^{75} اعْتِمَادًا عَلَى خَصَائِصِ الْأَسْسِ، مِنْ دُونِ اسْتِعْمَالِ الْآلَةِ الْحَاسِبَةِ. أَبْرُرُ إِجَابَتِي. 24)

الدرس

4

حل المعادلة الأسيّة

Solving Exponential Equation

حل معادلاتِ أَسْيَة، حل أنظمةِ معادلاتِ أَسْيَة.

فكرةُ الدرس



المعادلةُ الأَسْيَة.

المصطلحات



مسألةُ اليوم



تستغرقُ الزنبقُ المائيةُ 26 يوماً لتنمو ب بصورةٍ كاملةٍ. إذا علِمْتُ أنَّ الزهرةَ تنمو يومياً بقدرِ الضعفِ عنِ اليومِ السابقِ، فكم يوماً يلزمُها لتصلَ إلى نصفِ مرحلةِ النمو؟



المعادلةُ الأَسْيَةُ (exponential equation) هيَ معادلةٌ تتضمَّنُ قَوَى أُسُّها مُتغِيراتٌ، ويُتطلَّبُ حلُّها كتابةً طرفيَّةً للمعادلةِ بصورةٍ قوَّةٍ للأسَاسِ نفسهِ، ثمَّ المقارنةُ بينَ أُسَيِّ الطرفينِ، وَفقَ القاعدةِ التي نُصِّها: "إذا تساوتْ قوَّاتُ لُهُما الأسَاسُ نفسهُ، فإنَّ أُسَيِّهما متساويانِ".

مثال 1

أَحْلُلُ المعادلاتِ الأَسْيَةَ الآتيةَ:

$$1 \quad 5^{3x+2} = 25^{x-1}$$

$$5^{3x+2} = (5^2)^{x-1}$$

$$5^{3x+2} = 5^{2(x-1)}$$

$$3x + 2 = 2x - 2$$

$$x = -4$$

$$5^2 = 25$$

الأسنان متساويان

بمساواةِ الأسسِ

بِحَلِّ المعادلةِ

$$2 \quad 8^x = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

$$(2^3)^x = 2 \times (2^{-1})^x$$

$$2^{3x} = 2 \times 2^{-x}$$

$$2^{3x} = 2^{-x+1}$$

$$3x = -x + 1$$

$$x = \frac{1}{4}$$

قوَّةُ القوى

ضربُ القوى

بمساواةِ الأسسِ

بِحَلِّ المعادلةِ



أَبْحُثُ: قوَّةُ العدِ 2
أو 2^x مهمَّةٌ جَدًّا في علمِ
الحاسوبِ، لماذا؟

أتحقق من فهمي

أَحْلُّ المعادلاتِ الْأُسْيَّةِ الْآتِيَّةِ:

a) $4^{x-5} = 32^{2x+1}$

b) $9^x = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x$

c) $625^{2x+1} = \frac{5}{\sqrt{5}}$

تُوجَدُ تَطْبِيقَاتٌ حَيَاتِيَّةٌ كَثِيرَةٌ لِحَلِّ الْمَعَادِلَاتِ الْأُسْيَّةِ.

مَثَال٢: مِنَ الْحَيَاةِ

بكتيريا: تمثل المعادلة $y = 3(4^{\frac{x}{2}})$ عدد الخلايا البكتيرية بعد x ساعة في تجربة مخبرية. ما الزمن اللازم ليصبح في العينة 192 خلية؟

$$y = 3(4^{\frac{x}{2}})$$

المعادلة المعطاة

$$192 = 3(4^{\frac{x}{2}})$$

بتعويض $y = 192$ في المعادلة

$$64 = (4^{\frac{x}{2}})$$

بقسمة طرفي المعادلة على 3

$$4^3 = (4^{\frac{x}{2}})$$


$$64 = 4^3$$

$$3 = \frac{x}{2}$$

بمساواة الأسس

$$x = 6$$

بحل المعادلة الخطية الناتجة



قد يحتوي الغرام الواحد من التربة على نحو 10^{10} خلية بكتيرية مختلفة الأنواع.



ازداد استعمال المواقع التعليمية بما نسبته 900% منذ

عام 2000م.

تعليم: يزداد عدد الاشتراكات في موقع تعليمي على الانترنت عاماً بعد عام، وتُستعمل المعادلة $y = 2(3^{2x})$ لحساب عدد الاشتراكات لا بالآلاف بعد مرور x عاماً من إطلاق الموقع. ما الزمن اللازم ليصبح عدد الاشتراكات في الموقع 162 ألف اشتراك؟

أتحقق من فهمي

يمكنني حل نظام مكون من معادلتين أسيتين بكتابة طرفي المعادلة الأولى في صورة قوّة للأساس نفسه، ثم مساواة أسيي الطرفين، ثم تكرار ذلك في المعادلة الثانية، فيكون نظام من معادلتين.

مثال 3

أَحْلُّ نظامَ المعادلاتِ المجاورِ:

$$4^{2x} \times 2^y = 64$$

$$9^x \times 3^y = 81$$

$$4^{2x} \times 2^y = 64$$

$$(2^2)^{2x} \times 2^y = 2^6$$

$$2^{4x} \times 2^y = 2^6$$

$$2^{4x+y} = 2^6$$

$$4x + y = 6$$

يُطْبِقُ الْخُطُواتِ نَفْسِهَا عَلَى الْمَعَادِلَةِ الثَّانِيَةِ تَتَجُّعُ الْمَعَادِلَةُ الْخَطِيَّةُ $2x + y = 4$

أَحْلُّ نظامَ المعادلاتِ الْخَطِيَّيِّ النَّاتِجُ بِالْحَذْفِ:

$$4x + y = 6$$

$$(-) \quad 2x + y = 4$$

$$\underline{2x = 2}$$

$$x = 1$$

بِمَسَاوَةِ الْأَسْسِ

قَوَّةُ الْقُوَى

صَرْبُ الْقُوَى

أَتَذَكَّرُ

يُمْكِنُنِي حَلُّ نَظَامِ
الْمَعَادِلَاتِ الْخَطِيَّيِّ
بِالْحَذْفِ، أَوِ التَّعْوِيْضِ.

بِطْرِ الْمَعَادِلَتَيْنِ

بِالْقِسْمَةِ عَلَى 2

بِتَعْوِيْضِ قِيمَةِ x فِي الْمَعَادِلَةِ الثَّانِيَةِ

$$4(1) + y = 6$$

$$4 + y = 6$$

$$y = 2$$

بِحَلِّ الْمَعَادِلَةِ

إِذْنُ، حَلُّ نَظَامِ الْمَعَادِلَاتِ هُوَ: $x = 1$, $y = 2$

أَتَحْقِقُ مِنْ فَهْمِي

أَحْلُّ نظامَ المعادلاتِ المجاورِ:

$$\frac{4^x}{256^y} = 64$$

$$3^{2x} \times 9^y = 243$$

قَدْ لَا يَكُونُ مِنَ الْمُمْكِنِ كِتَابَةُ أَحَدٍ طَرَفِيِّ الْمَعَادِلَةِ الْأَسْسِيَّةِ عَلَى صُورَةِ قَوَّةٍ لِلْأَسَاسِ نَفْسِهِ،
عَنْدَئِذٍ يَمْكُنُ حَلُّ الْمَعَادِلَةِ بِيَانِيَّ بِاسْتِعْمَالِ بِرْمَجِيَّةٍ حَاسُوبِيَّةٍ أَوْ آلَةٍ حَاسِبَةٍ بِيَانِيَّةٍ.

مثال 4


أَحْلُّ الْمَعَادِلَةِ الْأَسْسِيَّةِ الْآتِيَّةِ $3^{x-1} = 5$ بِيَانِيَّ.

أَلَاحْظُ أَنَّهُ لَيَسَّ مِنَ الْمُمْكِنِ كِتَابَةُ طَرَفِيِّ الْمَعَادِلَةِ بِصُورَةِ قَوَّةٍ لِلْأَسَاسِ نَفْسِهِ، لِذَلِكَ أَحْلُّ
الْمَعَادِلَةِ بِيَانِيَّ.

1 **الخطوة** أكتب نظام معادلات باستعمال طرفي المعادلة.

$$y = 5$$
$$y = 3^{x-1}$$

المعادلة 1
المعادلة 2



2 **الخطوة** أمثل المعادلتين بيانياً في المستوى نفسه باستعمال برمجية جيو جبرا.

3 **الخطوة** أجد إحداثي نقطه تقاطع المنحنين.

أختار أيقونة من شريط الأدوات، ثم أنقر على كلا المنسحبين فيظهر إحداثياً نقطة التقاطع $(2.46, 5)$.
إذن، حل المعادلة هو $x = 2.46$.

أتحقق من فهمي

أحل كلاً من المعادلتين الأسية الآتية:

a) $3^x = -6^{x+2} + 1$

b) $5 = 4^{x+1}$

أتدرب وأحل المسائل

أحل المعادلات الأسية الآتية:

1) $64 = (32)^{3-x}$

2) $81^{5x+1} = 27^{4x-3}$

3) $128^{x-5} = \frac{2}{\sqrt{2}}$

4) $64^{7x+1} = \frac{2}{16^{4x-3}}$

5) $\left(\frac{11}{\sqrt{11}}\right)^{3x+1} = (11)^{x+7}$

6) $(\sqrt{7})^{4x+5} = \left(\frac{\sqrt{28}}{2}\right)^{7x-2}$

7) $9^{x^2} \times 27^{x^2} = 243$

8) $5^{2x} \times 25^x = 125$

9) $2^{x^2} \times 2^{6x} = \frac{1}{32}$

أَحْلُّ أَنْظَمَةَ الْمَعَادِلَاتِ الْأَسْيَّةِ:

10) $5^y = 25^{x-3}$

$125^y = 25^{x-1}$

11) $3^y = 3^{2x+y}$

$27^y = 27^{x+3}$

12) $5^{2x} \times 25^y = 125$

$\frac{8^x}{2^y} = 16$

13) $9^{2-x} = 81^{6y}$

$\left(\frac{1}{216}\right)^{-2x-3} = 36^{3y}$

14) $\frac{16^{-x}}{64^{-3x}} = 16^{-3y-3}$

$8^{x^2} = \left(\frac{1}{2^{y+1}}\right)^2$

15) $\frac{1}{27} \times 9^{2-n} = 3^{m^2-2}$

$2^{m^2} \times 2^n = 64$

أَحْلُّ كُلَّاً مِنَ الْمَعَادِلَاتِ الْأَسْيَّةِ الْأَتِيَّةِ بِيَانِيًّا:

16) $4^{x+3} = 6$

17) $2^x = 1.8$

18) $4 = 8^x$


19) $\left(\frac{3}{4}\right)^{x+2} = 10$

20) $2^{-x-3} = 3^{x+1}$

21) $5^x = -4^{x+4}$

22) تصوّر: سُتعَمِّلُ الْمَعَادِلَةُ $2^{x+2} = y$ لِحَسَابِ مَقَاسِ وَرَقَّةٍ y بَعْدَ تَكْبِيرِهَا بِنَسْبَةِ 100% عَدَدَ x مِنَ الْمَرَّاتِ، مَقَارِنَةً بِمَقَاسِهَا الْأَصْلِيِّ، بِاسْتِعْمَالِ آلَةٍ نَاسِخَةٍ. كَمْ مَرَّةً يَجِبُ تَكْبِيرُ صُورَةٍ لِيَصْبُحَ مَقَاسُهَا 32 ضَعْفَ مَقَاسِهَا الْأَصْلِيِّ؟

23) بَكْتِيرِيَا: يُمْثِلُ الْمَقْدَارُ 3^{t-2} عَدَدَ الْخَلَائِيَّاتِ الْبَكْتِيرِيَّاتِ فِي تَجْرِيَةٍ مَخْبِرِيَّةٍ بَعْدَ مَرْوِرِ t مِنَ السَّاعَاتِ. مَا الزَّمْنُ الْلَّازِمُ لِيَصْبُحَ عَدُدُ الْخَلَائِيَّاتِ الْبَكْتِيرِيَّاتِ 2187 خَلَيْةً؟



24) هَنْدَسَةٌ: أَكْتُبُ فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ عَبَارَةً أَسْيَّةً تُمَثِّلُ حِجْمَ الشَّكْلِ الْمَجَاوِرِ.

مهارات التفكير العليا

25) تَبَرِّيرٌ: هَلْ يُمْكِنُ حَلُّ الْمَعَادِلَةِ الْأَسْيَّةِ الْأَتِيَّةِ: $1 = 2 + 2^x$ ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

26) تَبَرِّيرٌ: أَحْلُّ الْمَعَادِلَةَ: $x^{\frac{1}{2}} + 3x^{-\frac{1}{2}} = 4$ ، مُبِرِّرًا خطُواتِ الْحَلِّ.

27) تَحدٌ: أَحْلُّ نَظَامَ الْمَعَادِلَاتِ الْأَسْيَّةِ الْأَتِيَّةِ:

$$2^x + 3^y = 10$$

$$2^{x+1} + 3^{y+1} = 29$$

اختبار نهاية الودعه

المقدار الجبرى الذى يجب وضعه في المربع الفارغ **5**

$$\frac{8x^2y^3}{\square} = \left(\frac{2y}{x}\right)^2$$

- a) $2x^4y$ b) $4x^4y^2$
 c) $2xy$ d) x^2y^2

أحل كل نظام معادلات مما يأتي، ثم أتحقق من صحة الحل:

6 $y = 4x$
 $y = 5 - x^2$

7 $y - x = 15$
 $x^2 + y^2 = 64$

8 $y = x^2 - 4x + 5$
 $y = -x^2 + 5$

9 $y = -x^2 - x + 12$
 $y = x^2 + 7x + 12$

إذا كان c ثابتا في نظام المعادلات الآتى،

$$x - 2y = 1$$

$$x^2 - y^2 = c$$

فأجد:

10 حل هذا النظام، علمًا بأن $8 = c$

11 جميع قيم c الممكنة التي لا تجعل للنظام أي حل.

12 أجد مجموعة حل المتباعدة: $6x^2 - 7x < 3 - 3$ بحل نظام

المعادلات الآتى:

$$y = 3 - 7x$$

$$y = 6x^2$$

أختار رمز الإجابة الصحيحة لـ كل مما يأتي:

1 أي الأزواج المترتبة الآتية تمثل حل لنظام المعادلات:

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$3x + y = 6$$

- a) $(1, 3)$ b) $(0, 2)$
 c) $(2, 0)$ d) $(-2, -2)$

2 أي الأزواج المترتبة الآتية تمثل حل لنظام المعادلات:

$$y = x^2 - 5x + 6$$

$$y = -x^2 + 2x + 3$$

- a) $(0, 3)$ b) $(1, 2)$
 c) $(2, 0)$ d) $(3, 0)$

3 أي الأزواج المترتبة الآتية تمثل حل لنظام المعادلات:

$$3^{5x} \times 9^y = 27$$

$$5^{3x} \times 5^y = 25$$

- a) $(-1, -1)$ b) $(1, 1)$
 c) $(-1, 1)$ d) $(1, -1)$


4 يمثل $x = -1$ حلل للمعادلة الأسيّة:

a) $5^{2x+1} = 25$ b) $3^{1+x} = 81$

c) $7^{3-2x} = 49$ d) $4^{2-x} = 64$

26 يمثل كُل مِن X, Y عدَيْن مفقودَيْن في الرُّقْم السُّرِّيِّ $XY1290$. إذا كان مجموع العدَيْن المفقودَيْن 12 ومجموع مربعَيْهِما يساوي 90، فأجُد قيمة كُلِّ منهُما.

27 **تنس**: ملعب تنس طولُه x مترًا وعرضُه y مترًا ومساحَتُه 224 m^2 ، إذا تَمَّت زيادَةُ عرضه بِمقدار 1 m وتقليل طوله بِمقدار 1 m فازدادَت مساحَتُه بِمقدار 1 m^2 كما في الشَّكْل الآتِي، فأجُد أبعادَ ملعبِ التنسِ.



تدريب على الاختبارات الدولية

28 أجُد جميع قيم p التي تجعل منحنى المعادلة الخطية $y = 2x + p$ لا يقطع منحنى المعادلة $. y = x^2 + 3x - 1$

أجُد الأعداد الصحيحة الموجبة a, b, c إذا كان $(ab^c)^3 = 27b^{21}$

30 أجُد العدَيْن اللَّذِيْن ناتِجُ جمِيع القوَةِ الخامِسَةِ لأحِدِهِما مَعَ مَرْبِعِ العدِيْدِ الثَّانِي يساوي 268

أكْتُب كُلًا مِمَّا يأتِي في أبْسِط صُورَةٍ، علَمًا بِأَنَّ جمِيعَ المُنْغِيرَاتِ أَعْدَادٌ حَقِيقِيَّةٌ موجِّبةٌ:

$$13 \quad \frac{2}{2^3 \times 2^{-4}}$$

$$14 \quad \left(\frac{64}{27}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$15 \quad \frac{(16p^4 q^{-2})^{-\frac{3}{2}}}{(64p^2 q^{-1})^{-\frac{1}{2}}}$$

$$16 \quad \frac{(27a^{\frac{3}{2}} b^{-6})^{-\frac{1}{3}}}{(729a^4 b^{-2})^{-\frac{1}{2}}}$$

تحْدِيد: أجُد قيمة كُلِّ مِن a و b في كُلِّ مِمَّا يأتِي:

$$17 \quad 3^a x^b = \frac{27x^{\frac{7}{3}}}{x^{\frac{1}{2}}}$$

$$18 \quad \frac{x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}}{x - x^2} = x^a$$

أَحْلُل كُلًا مِنَ المعادلاتِ الأسِّيَّةِ الآتِيَّةِ:

$$19 \quad 5^{\frac{t}{2}} = 5^{2t-1}$$

$$20 \quad 27^{-\frac{1}{c}} = \left(\frac{1}{9}\right)^{c-\frac{5}{2}}$$

$$21 \quad 432 = 3^{x+1} \times 2^{2x}$$

$$22 \quad 500 = \frac{2^{\frac{1}{2}-x}}{5^{2x}}$$

أَحْلُل كُلَّ نظامِ معادلاتِ مِمَّا يأتِي:

$$23 \quad 36^{x+4} = 6^y$$

$$36^y = 36^{x+6}$$

$$24 \quad 5^{2x+4} = 5^{y-3}$$

$$7^{y-x} = 49$$

25 عدَانِي مجموع مربعَيْهِما 85 ومرْبِعُ مجموعِهِما 121، ما هُمَا؟

الدائرة

Circle

ما أهمية هذه الوحدة؟

تُعدّ الدائرة أحد أكثر الأشكال ظهوراً على سطح الأرض، بل في جميع الكون. فهي تظهر جلياً في بؤبؤ العين، وفي الفاكهة، وجذوع الأشجار، وغير ذلك من المخلوقات. وقد استفاد الإنسان من الخصائص الفريدة لهذا الشكل المعقّد في مجالات عدّة، مثل: الهندسة، والصناعة.

سأَتَعَلَّمُ في هذه الوحدة:

- ◀ حساب طول القوس، ومساحة القطاع الدائري.
- ◀ العلاقات بين الزوايا في الدائرة، والإفادة منها في إيجاد زوايا مجهولة.
- ◀ كتابة معادلة الدائرة، وإيجاد المركز ونصف القطر من معادلة دائرة معلومة.
- ◀ العلاقة بين دائرة تين، وماهية المماسات المشتركة.

تعلّمت سابقاً:

- ✓ إيجاد محيط الدائرة، ومساحتها.
- ✓ تمييز حالات تطابق المثلثات، وتشابهها.
- ✓ إيجاد مجموع قياس زوايا كلّ من المثلث، والشكل الرباعي.
- ✓ إيجاد المسافة بين نقطتين في المستوى الإحداثي، وإحداثيات نقطة المتصرف.

مشروع الوحدة

استعمالاتٌ علميةٌ لخصائص الدائرة

البحثُ عنِ استعمالاتٍ علميةٍ لخصائصِ الدائرةِ، ووصفِها، ونمذجتها.

فكرةُ المشروع



شبكةُ الإنترنٌت، برمجيةٌ جيوجبرا.

الموادُ والأدواتُ



خطواتُ تنفيذِ المشروعِ:



1 أبحثُ معَ أفرادِ مجموعتي في مكتبةِ المدرسةِ (أو في شبكةِ الإنترنٌت) عنِ نموذجٍ علميٍّ أو حياديٍّ تُسْتَعْمَلُ فيه إحدى الخصائصِ الآتيةِ للدائرةِ:

- العلاقةُ بينَ الزوايا المركزيةِ والزوايا المحيطيةِ.
- العلاقةُ بينَ الزاويةِ المماسيةِ والزاويةِ المحيطيةِ المُشترِكةِ معَها في القوسِ نفسهِ.
- الدوائرُ المُتماسَةُ.
- معادلةُ الدائرةِ.

2 أكتبُ في مستندِ ممعالجِ النصوصِ (ورود) فقرةً أَصِفُّ فيها النموذجَ الحياديَّ أوِ العلميَّ الذي اخترتهُ، مُحدّداً خصائصَ الدائرةِ الموجودةِ في هذا النموذج، ثُمَّ أفسّرُها.

3 أُضِيفُ إلى المستندِ صوراً توضيحيةً للنموذجِ، ذاكراً مصدرَ المعلوماتِ والصورِ.

4 أُسْتَعْمَلُ برمجيةً جيوجبرا الرسمِ شكلٍ يُوضّحُ استعمالَ الخاصيةِ في النموذجِ، وأضعُ عليه قياساتِ الزوايا وأطوالَ الأضلاعِ جميعَها. وهذه بعضُ الإرشاداتِ التي قد تُساعِدُ على رسمِ الشكلِ التوضيحيِّ باستعمالِ برمجيةِ جيوجبرا:

- لرسمِ دائرةٍ، أنقرُ على أيقونة منْ شريطِ الأدواتِ.

- لإيجادِ قياسِ زاويةٍ، أنقرُ على أيقونة ، ثُمَّ على ضلعين ابتداءَ الزاويةِ، وضلعين انتهاءَها.

- لإيجادِ طولِ قطعةٍ مستقيمةٍ، أنقرُ على أيقونة ، ثُمَّ على القطعةِ المستقيمةِ.

- لرسمِ مماسٍ للدائرةِ منْ نقطةٍ خارجَها، أحَدِّدُ أولاً النقطةَ بالنقرِ على أيقونة ، ثُمَّ أيقونة .

عرضُ النتائجِ:

أعِدُّ معَ أفرادِ مجموعتي عرضاً تقدِيمياً نُبَيِّنُ فيه ما يَأْتِي:

- خطواتُ تنفيذِ المشروعِ مُوضّحةً بالصورِ والرسومِ، بما في ذلكَ صورةُ الشكلِ الذي رُسِّمَ باستعمالِ برمجيةِ جيوجبرا.
- معلوماتٌ جديدةٌ تعرَّفناها في أثناءِ العملِ بالمشروعِ، واقتراحٌ لتوسيعةِ المشروعِ.

أوْتَارُ الدَّائِرَةِ، وَأَقْطَارُهَا، وَمَمَاسَّهَا

Chords, Diameters and Tangents of a Circle

معرفة الوتر، والقطير، والمماس، وخصائص كل منها، وال العلاقات التي تربط بعضها ببعض، وتوظيف ذلك في إيجاد أطوال مجهولة وقياسات زوايا مجهولة.

فكرة الدرس^٩



الدائرة، مركز الدائرة، الوتر، القوس، القطر، نصف القطر، المماس، نقطة التماس، القاطع.

المطالبات^٩



في حديقة منزل عبير طاولة دائيرية، وهي تريد عمل فتحة عند مركزها لتشييّت عمود يحمل مظلة بها. كيف يمكن لعيّر تحديد مركز الطاولة؟

مسألة ٩ اليوم



الدائرة (circle) هي المحل الهندسي لنقطة تحرّك في المستوى، بحيث تظل على البعد نفسه عن نقطة محددة تسمى مركز الدائرة (center). أمّا الوتر (chord) فهو قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة، ويسمى الوتر الذي يمرّ بمركز الدائرة القطر (diameter). ويطلق على القطعة المستقيمة التي تصل مركز الدائرة نقطة عليها اسم نصف القطر (radius).

القاطع (secant) هو مستقيم يقطع الدائرة في نقطتين، ويحوي وترًا فيها. أمًا المستقيم الذي يشتراكُ مع الدائرة في نقطةٍ واحدةٍ فقط فُيسمى المماس (tangent). ويُطلقُ على نقطةِ التقائه المماس بالدائرة اسم نقطةِ التماس (point of tangency).

مثال 1

يُمثّل الشكل المجاور دائرةً مركّزاً لها O . أسمّي:


مماً لل دائم ١

LM

أربعة أنصاف أقطارٍ. 2

رِمَوْزِ رِيَاضِيَّةٍ

- ترمز LM إلى المستقيم \overleftrightarrow{LM}
 - ترمز LM إلى طول LM
 - القطعة المستقيمة $.LM$
 - فترمز LM إلى القطعة \overline{LM}
 - المستقيمة نفسها.




قطراً للدائرة. 3

\overline{ZT}

وترًا للدائرة. 4

$\overline{SR}, \overline{ZT}$

أتحقق من فهمي



يُبيّن الشكل المجاور دائرةً مرکزها O . أُسّمّي:


(a) قاطعاً للدائرة.

(b) وترًا للدائرة.

(c) مماساً للدائرة.

أوتار الدائرة


نظريات



الوتران المُتطابقان يُعدان المسافة نفسها عن مركز الدائرة. والوتران اللذان يُعدان المسافة نفسها عن مركز الدائرة مُتطابقان. 1


مثال: بما أن $OM = ON$, $CD = AB$, فإن

وإذا كان $AB = CD$, فإن $OM = ON$



المُنصف العمودي لأي وتر في الدائرة يمر بمركزها. 2

مثال: في الشكل المجاور، يقع مركز الدائرة على الخط المُتقطع.




نصف القطر العمودي على وتر في دائرة يُنصف ذلك الوتر. 3

مثال: بما أن $MC = MD$, فإن $CD \perp AB$, فإن $CD \perp AB$. وإذا

مرّ القطر بمنتصف وتر فإنه يعادل.

رموز رياضية

يدل الرمز \perp على تعاًد قطعتين، أو مستقيمين.



مثال 2

في الشكل المجاور، \overline{EF} و \overline{CD} وتران في دائرة مركزها O . إذا كان $EF = 8 \text{ cm}$ ، و $ON = OX$ ؟

$ON = OX$ يمثلان بعدي الوتران CD و EF عن مركز الدائرة، وهم متطابقان.

$$ON = OX$$

من معطيات السؤال

$$CD = EF$$

إذا تساوى بعدي وتران عن مركز الدائرة، فهم متطابقان

$$NC = \frac{1}{2} CD$$

نصف القطر العمودي على وتر ينصفه

$$= \frac{1}{2} EF$$


الوتران \overline{EF} و \overline{CD} متطابقان

$$= \frac{1}{2} (8) = 4 \text{ cm}$$

بالتعمير


أتحقق من فهمي

في الشكل المجاور، $OM = ON$ وتران في دائرة مركزها O . إذا كان $OM = ON$ ، و $CN = 12 \text{ cm}$ ، فما طول \overline{AB} ؟




عماسات الدائرة

نظريات



1 مماس الدائرة يكون عمودياً على نصف القطر المرسوم من نقطة التماس.

مثال: نصف القطر \overleftrightarrow{OX} عمودي على المماس \overleftrightarrow{AB} .
 $\overleftrightarrow{OX} \perp \overleftrightarrow{AB}$



2 القطعتان المماسيتان المرسومتان للدائرة من نقطة خارجها لهما الطول نفسه.

مثال: $PS = PT$ لهما الطول نفسه.

رموز رياضية

\overleftrightarrow{PT} على مماس \overleftrightarrow{OX} على دائرة. أما \overline{PT} فيدل على القطعة المستقيمة الواقعة بين النقطة P ونقطة T التماس، ويدل الرمز PT على طول هذه القطعة.

مثال 3

في الشكل المجاور، \overleftrightarrow{TP} و \overleftrightarrow{TQ} مماسان لدائرة مركزها O :

أجد قيمة x . ①

قطعتان مماسيان مرسومتان للدائرة من نقطة خارجها

$2x + 3 = 4x - 6$ بالتعويض

$2x + 3 + 6 - 2x = 4x - 6 + 6 - 2x$ بإضافة $-2x - 6$ إلى الطرفين

$9 = 2x$ بالتبسيط

$$x = \frac{9}{2}$$

أجد قياس الزاوية $\angle POQ$. ②

أفترض أن قياس الزاوية $\angle POQ$ هو y :

$$m\angle OQT = m\angle OPT = 90^\circ$$

مماس الدائرة يتعامد مع نصف

القطر في نقطة التماس

مجموع قياس الزوايا الداخلية

للسكل الرباعي هو 360°

التبسيط

$$90^\circ + 70^\circ + 90^\circ + y = 360^\circ$$

طرح 250° من الطرفين

$$250^\circ + y = 360^\circ$$

$$y = 360^\circ - 250^\circ = 110^\circ$$


رموز رياضية

يرمز الحرف m في $m\angle OQT$ إلى قياس الزاوية $\angle OQT$.

في الشكل المجاور، \overleftrightarrow{TP} و \overleftrightarrow{TQ} مماسان لدائرة مركزها O :

أجد قياس الزاوية $\angle PTQ$. (b)

أجد قيمة x . (a)




مثال 4: من الحياة

أبراج: يرتفع برج مراقبة 50 m عن مستوى الأرض.

ما بعد نقطة على الأرض يمكن مشاهدتها من قمة البرج،

بافتراض أن الأرض كره طول نصف قطرها 6400 km تقريباً؟

أرسم مخططاً يمثل المسألة.



الدائرة تمثل الأرض، والنقطة T تمثل قمة البرج، والمماس TD يمثل خط البصر، ونقطة التماس D هي أبعد نقطة يمكن مشاهدتها من قمة البرج. ارتفاع البرج $50\text{ m} = 0.05\text{ km}$

$$m\angle TDC = 90^\circ$$

المماس يعادل نصف قطر عند نقطة التماس

نظريّة فيثاغورس

$$(CT)^2 = (TD)^2 + (CD)^2$$

$$(6400 + 0.05)^2 = (TD)^2 + (6400)^2$$

$$40960640.0025 = (TD)^2 + 40960000$$

$$640.0025 = (TD)^2$$

$$25.3 \approx TD$$

باستعمال الآلة الحاسبة

بطرح 40960000 من الطرفين

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

إذن، المسافة التي تمثل أبعد نقطة على الأرض يمكن مشاهدتها من قمة البرج هي: 25 km تقريباً.


أتذكر

نظريّة فيثاغورس: إذا كان

المثلث ABC قائم الزاوية

في B ، فإنَّ:


$$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$$



أتحقق من فهمي

برج مراقبة: تبعد أقصى نقطة يمكن مشاهدتها من قمة برج مراقبة مسافة 32 km عنه. ما ارتفاع قمة البرج عن سطح الأرض، بافتراض أن الأرض كره طول نصف قطرها 6400 km تقريباً.

أتدرب وأحل المسائل




يتمثل الشكل المجاور دائرةً مركبها O . أسمّي:

نصفٌ قُطْرٌ. 1

وترٌ. 2

مماسٌ. 3

قاطعاً. 4




ووتران لهما الطول نفسه في دائرةً مركبها O :

ما نوع المثلث AOB ? أبُرُ إجابتني. 5


هل المثلثان AOB و COD مُتطابقان؟ أبُرُ إجابتني. 6

إذا كان قياس الزاوية OAB هو 65° ، فما قياس الزاوية COD ? 7


الوحدة 2




- 8 في الشكل المجاور، \overline{AB} و \overline{CB} وتران مُتطابقان في دائرة مركزها O . إذا كان $OD = 3x + 9$ ، و $OE = x + 7$ ، فما قيمة x ؟




- في الشكل المجاور، \overline{EF} وتر في دائرة مركزها O ، والنقطة M هي منتصف الوتر \overline{EF} :
- 9 هل المثلثان EOM ، FOM مُتطابقان؟ أُبَرِّرُ إجابتي.
- 10 هل الزاوية EMO قائمة؟ أُبَرِّرُ إجابتي.
- 11 إذا كان قياس الزاوية MOF هو 72° ، فما قياس الزاوية MEO ؟ أُبَرِّرُ إجابتي.



- في الشكل المجاور، \overrightarrow{PY} و \overrightarrow{PX} مماسان لدائرة مركزها O :
- 12 هل قياس الزاوية PXO هو 90° ؟ أُبَرِّرُ إجابتي.
- 13 أَيْنُ أَنَّ المثلثين XPO و YPO مُتطابقان.
- 14 إذا كان قياس الزاوية XPO هو 17° ، فما قياس الزاوية XOY ؟






- 15 في الشكل المجاور، \overline{AB} وتر طوله 6 cm في دائرة مركزها O . إذا كان قياس الزاوية ACO هو 90° ، و $OC = 4\text{ cm}$ ، فما طول نصف قطر الدائرة؟




- 16 أَحْلُّ المسألة الواردة في بداية الدرس.
- 17 في الشكل المجاور، \overrightarrow{ZY} و \overrightarrow{ZX} مماسان لدائرة مركزها O . أَجِد قيمة a .

يَظْهُرُ فِي كُلِّ مِنَ الشَّكْلَيْنِ الآتَيْنِ مَمَاسٌ لَدَائِرَةٍ مَرْكُزُهَا O . أَجِدْ قِيمَةَ x وَ y فِي كُلِّ حَالَةٍ.



20 فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ، \overleftrightarrow{AB} مَمَاسٌ لَدَائِرَةٍ مَرْكُزُهَا O فِي النَّقْطَةِ C .
لِمَاذَا يُعَدُّ الْمُثَلِّثُ BCD مُتَطَابِقُ الْضَّلِعَيْنِ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

21 كِمْ مَمَاسًا يُمْكِنُ أَنْ يُرَسَّمَ لَدَائِرَةٍ مِنْ نَقْطَةٍ عَلَيْهَا، وَمِنْ نَقْطَةٍ خَارِجَهَا، وَمِنْ نَقْطَةٍ دَاخِلَهَا؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.



مهارات التفكير العليا

22 تَحْدِيد: \overleftrightarrow{AB} وَتُرُّ مشترِكٌ بَيْنَ دَائِرَتَيْنِ مُتَقَاطِعَتَيْنِ، وَهُوَ عُمُودٌ عَلَى الْقَطْعَةِ \overline{ON} الْوَاصِلَةِ بَيْنَ مَرْكَزَيْهِمَا. إِذَا كَانَ $AB = 14\text{ cm}$ ، فَمَا طُولُ الْمُسْتَقِيمَةِ \overline{ON} ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

23 بَرَهَانٌ: \overleftrightarrow{AB} وَ \overleftrightarrow{CD} وَتَرَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي دَائِرَةٍ مَرْكُزُهَا N . أُثِبْ أَنَّ لَهُمَا الْبُعْدَ نَفْسَهُ عَنِ النَّقْطَةِ N .

24 تَبَرِيرٌ: \overleftrightarrow{AB} مَمَاسٌ لَدَائِرَةٍ مَرْكُزُهَا N فِي النَّقْطَةِ A ، وَطُولُ نَصْفِ قُطْرِهَا 3 cm ، وَ $BA = 5\text{ cm}$. قَالَتْ سَارَةُ إِنَّ $BN = 4\text{ cm}$ ؛ لِأَنَّ $(BN)^2 = (BA)^2 - (AN)^2 = (5)^2 - (3)^2 = 16$. هُلْ قُولُ سَارَةَ صَحِحٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

الأقواس والقطاعات الدائرية

Arches and Sectors

حساب طول القوس، ومساحة القطاع الدائري، وحل مسائل تتعلق بهما.



القوس، القطاع.

فكرة الدرس



المصطلحات




مسألة اليوم



أعد سعيد فطيرة بيتزا في وعاء دائري طول قطره 24 cm. وبعد أن خبزها أحدث فيها شقين من المركز إلى الطرف، بحيث كان قياس الزاوية بينهما 45° . كيف يمكن إيجاد مساحة الجزء الذي قطعه سعيد من الفطيرة؟

القوس (arc) هو جزء من الدائرة محدد بنقطتين عليهما. والقطاع (sector) هو الجزء الممحض

بين قوسٍ منها ونصفي القطرين اللذين يمران بطرفي القوس.




تمثيل الزاوية AOB في الشكل المجاور زاوية القطاع الذي يُعد كسرًا من الدائرة. ويمكن استعمال قياس زاوية القطاع لكتابته هذا الكسر، وذلك بقسمة قياس الزاوية على الدورة الكاملة؛ أي: $\frac{\theta}{360^\circ}$ ، حيث θ قياس زاوية القطاع.

مثال 1

يُمثل الشكل المجاور قطاعاً دائرياً. أجد:

طول القوس (أكتب الإجابة بدلاً من π).

1




القطاع كسرٌ من الدائرة، وهذا الكسر هو $\frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{6}$. وبما أنَّ طول

قطر الدائرة 24 cm، فإنَّ طول محطيها: $24 \times \pi = 24\pi$ cm

إذن، طول القوس يساوي $\frac{1}{6}$ طول محطي الدائرة؛ أي:

$$24\pi \div 6 = 4\pi \text{ cm}$$




مساحة القطاع 2

مساحة الدائرة هي: $\pi \times 12^2 = 144\pi \text{ cm}^2$

مساحة القطاع تساوي $\frac{1}{6}$ مساحة الدائرة؛ أي: $144\pi \div 6 = 24\pi \text{ cm}^2$

أتحقق من فهمي


يُمثلُ الشكُلُ المجاورُ قطاعاً دائريًّا. أَجِدْ طولَ القوسِ، ومساحةَ القطاعِ الدائريِّ.



تعرَّفنا في المثالِ السابِقِ أنَّ القطاعَ هو كسرٌ من الدائرةِ، وأنَّهُ يُمكِّنُ دائمًا استعمالَ قياسِ زاويةِ القطاعِ لحسابِ طولِ القوسِ ومساحةِ القطاعِ الدائريِّ.

طولُ قوسِ القطاعِ الدائريِّ ومساحته

مفهومٌ أساسيٌّ




إذا كانَ قياسُ زاويةِ القطاعِ θ° ، وطُولُ نصفِ قُطْرِ الدائرةِ r ،

وطُولُ القوسِ l ، ومساحةُ القطاعِ A ، فإنَّ:

$$l = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$$

$$A = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$



أَجِدْ طولَ القوسِ ومساحةَ القطاعِ في الشكُلِ المجاورِ.

زاويةُ القطاعِ هي 28° ، وطُولُ نصفِ القُطْرِ هو 5 وحداتٍ طولٍ:

$$l = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$$

قانونُ طولِ القوسِ

$$l = \frac{28^\circ}{360^\circ} \times \pi \times 2 \times 5$$

بتعويضِ 5 , $r = 5$

≈ 2.4

باستعمالِ الآلةِ الحاسِنةِ

إذن، طُولُ هذا القوسِ مُقرَّباً إلى أقربِ منزلَةٍ عشريةٍ واحدةٍ هو: 2.4 وحدة طولٍ.

$$A = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$

قانونُ مساحةِ القطاعِ

$$= \frac{28^\circ}{360^\circ} \times \pi \times 5^2$$

بتعويضِ 5 , $\theta = 28^\circ$

≈ 6.1

باستعمالِ الآلةِ الحاسِنةِ

مثال 2


أَجِدْ طولَ القوسِ ومساحةَ القطاعِ في الشكُلِ المجاورِ.

زاويةُ القطاعِ هي 28° ، وطُولُ نصفِ القُطْرِ هو 5 وحداتٍ طولٍ:


إذن، مساحة هذا القطاع مُقرّبة إلى أقرب منزلة عشرية واحدة هي: 6.1 وحدة مربعة.

أتحقق من فهمي

أجد طول القوس ومساحة القطاع في الشكل المجاور.




محيط القطاع الدائري



محيط القطاع الدائري (L) هو المسافة حول القطاع، وهي تساوي طول قوس القطاع، مضاعفًا إليه مثلاً طول نصف قطر الدائرة:

$$L = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r + 2r$$

مفهوم أساسى



أجد محيط القطاع الدائري في الشكل المجاور، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب منزلة عشرية واحدة.

زاوية القطاع هي 140° ، وطول نصف قطر هو 15 وحدة طولٍ:

$$L = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r + 2r$$

$$= \left(\frac{140^\circ}{360^\circ} \times 2 \times \pi \times 15 \right) + 2 \times 15$$

$$\approx 66.6519$$

قانون محيط القطاع

$$r = 15, \theta = 140^\circ$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، محيط هذا القطاع مقرّبًا إلى أقرب منزلة عشرية واحدة هو: 66.7 وحدة طولٍ.

رموز رياضية


يرمزُ الحرف l إلى طول القوس، ويرمزُ الحرف L إلى محيط القطاع.

أتحقق من فهمي

أجد محيط قطاع دائري زاويته 225° ، في دائرة طول نصف قطرها 50 cm، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب منزلة عشرية واحدة.

مثال 4: من الحياة

حديقة منزلٍ وُضعَ في أحد أطرافها مَرْشٌ للماء، يدورُ حولَ الرأسِ بزاويةٍ مقدارُها 135° ، فيصلُ الماء إلى مسافة 5 m منَ المرش. أجد مساحة المنطقة التي سيرويها هذا المَرْشُ، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب منزلة عشرية واحدة.



تُمثّل المنطقةُ التي سير ويها المرشّ قطاعاً دائرياً زاويّة 135°، وطُول نصف قطره 5 m:

$$A = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$

$$= \frac{135^\circ}{360^\circ} \times \pi \times 5^2$$

$$\approx 29.5$$

قانون مساحة القطاع

$$r = 5, \theta = 135^\circ$$


باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، مساحة هذه المنطقة مُقرّبة إلى أقرب منزلة عشرية واحدة هي: 29.5 m²

أتحقق من فهمي

طُول عقرب الدقائق في ساعة حائط هو 15 cm. ما مساحة المنطقة التي يُغطيها العقرب في أثناء حركته من العدد 9 إلى العدد 2؟

أتدرب وأحل المسائل



يُمثّل الشكل المجاور قطاعاً دائرياً:


1 أُعّبر بكسير عن الجزء الذي يُمثّله هذا القطاع من الدائرة.

2 أَجِد طول القوس، مُقرّباً إجابتي إلى أقرب منزلة عشرية واحدة.


3 أَجِد مساحة القطاع، مُقرّباً إجابتي إلى أقرب منزلة عشرية واحدة.

أَجِد طول القوس ومساحة القطاع في كلٍ من الأشكال الآتية (أَكْتُب الإجابة بدلالة π):


4





5



6




7




8 أَجِد مساحة نصف الدائرة المجاورة، ثم أَجِد محيطها.

الوحدة 2



أَجِد مساحة الجزء المظلل في الشكل المجاور (أكتب الإجابة بدلالة π). أُبْرِر إجابتني. 9




أَحْلِي المسألة الواردة في بداية الدرس. 10

يُمثّل الشكل المجاور 3 أنصاف دوائر:


أَجِد محيط الشكل (أكتب الإجابة بدلالة π). 11

أَجِد مساحة الشكل (أكتب الإجابة بدلالة π). 12




تُمثّل النقطة O مركز دائرة، طول نصف قطرها 12.5 وحدة طول. 13

أَجِد طول القوس ACB .



يُمثّل الشكل المجاور ربع دائرة. أَجِد مساحة الجزء المظلل في الشكل (أكتب الإجابة بدلالة π). 14




يُمثّل الشكل المجاور المربع $ABCD$ الذي طول ضلعه 8 cm، ويُمثّل APC و AQC قوسين من دائرتين مركزاهما D و B على التوالي. أَجِد مساحة الجزء المظلل (أكتب الإجابة بدلالة π). 15

صمم مهندس مياه لري منطقة مساحتها 100 m^2 على هيئة قطاع دائري طول نصف قطره 15 m. ما زاوية دوران هذا المرش؟ 16



سياراتٌ: يُبيّن الشكلُ المجاورُ مساحةَ الزجاجِ الأماميِّ لسيارة. إذا كانَ طولُ شفَّرةِ الماسحةِ 40 cm ، وطُولُ شفَّرةِ الماسحةِ معَ ذراعِها 66 cm ، فما مساحةُ الزجاجِ التي تُنطِّفُها الماسحةُ، مُقرَّبًا إلى أقربِ منزلةٍ عشريةٍ واحدةٍ؟ 17

مهارات التفكير العليا




تحدّد: أجدُ محيطَ الشكلِ المجاورِ ومساحَتَه. 18



تحدّد: اشتَرَتْ عفافُ فطيرَةَ بيتزا دائِرِيَّةَ الشكلِ طولُ قُطُّرِها 36 cm ، ثُمَّ قسَّمَتْها إلى قطْعَ متساوِيَّةٍ. بعدَ ذلِكَ أكلَتْ منها قطْعَتَيْنِ تُمَثَّلُانِ معاً 180 cm^2 منها. أجدُ قياسَ الزاوِيَّةِ لقطْعَةِ البيتزا الواحدَةِ، مُقرَّبًا إجابَتِي إلى أقربِ عددٍ كليٍّ. 19

تحدّد: يُمثِّلُ الشكلُ المجاورُ مثلثًا مُتطابِقَ الأَضلاعِ، طُولُ ضلعِه 6 cm . إذا كانتِ النقطَانِ P و Q تُنْصَفَانِ الضلعِينِ \overline{AC} و \overline{AB} على التوالي، وكانَ APQ قطاعًا دائِرِيًّا منْ دائِرَةٍ مرْكُزُها A ، فاجِدُ مساحةَ الجُزءِ المُظلَّ. 20



الزوايا في الدائرة

Angles in a Circle


معرفة العلاقات بين الزوايا في الدائرة، وتوظيفها في إيجاد زوايا مجهولة وحل مسائل حياتية.

فكرة الدرس



الزاوية المركزية، الزاوية المحيطية، القوس المقابل، الزاوية المُقابلة لقطر الدائرة، الرباعي الدائري، الزاوية المماسية.

المصطلحات



يُمثل الشكل المجاور تصميمًا مكونًا من نجمة خماسية منتظمة محاطة بدائرة يحيط بها مربع. ماذا تسمى الزوايا عند رؤوس النجمة؟ كيف نجد قياس كل منها؟


مسألة اليوم



تسمى الزاوية التي يكون رأسها في مركز الدائرة، وضلعها نصف قطر لدائرة زاوية مركزية

(central angle). ففي الشكل الآتي، $\angle AOB$ زاوية مركزية في الدائرة التي مركزها O ،

ويُسمى القوس \widehat{AB} القوس المقابل (subtended arc).



يُسمى القوس \widehat{AB} الأصغر،
ويُسمى \widehat{ACB} القوس الأكبر.

تسمى الزاوية التي يقع رأسها على الدائرة، ويكون ضلعها وتر في الدائرة زاوية محيطية


(inscribed angle). ففي الشكل السابق، الزاوية $\angle ACB$ محيطية، والزاوية $\angle AOB$ مركزية،

وهما مرسومتان على القوس \widehat{AB} . عند قياس هاتين الزاويتين سنجد أن قياس الزاوية

المركزية $\angle AOB$ يساوي مثلي قياس الزاوية المحيطية $\angle ACB$.

الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

نظريّة



قياس الزاوية المركزية يساوي مثلي قياس الزاوية المحيطية المرسومة على القوس نفسه:


$$m\angle AOB = 2m\angle ACB$$

أُفکر

ما قياس الزاوية المحيطية المقابلة للقطر؟

الزوايا المحيطية المرسومة على قوسٍ واحدٍ


نظريّة



جميعُ الزوايا المحيطية المرسومة على قوسٍ واحدٍ في دائرة لها القياسُ نفسهُ:

$$m\angle ACB = m\angle AC_1B = m\angle AC_2B = m\angle AC_3B$$

مثال 1



إذا كانت النقطة O هي مركز الدائرة في الشكل المجاور،
فما قياس الزاويتين المشار إليهما بالحرفين a و b ؟

المثلث OPQ مُتطابقُ الصلعين؛ لأن \overline{OP} و \overline{OQ} نصفا قطرين في الدائرة و مجموع قياسات زوايا المثلث هو 180° . إذن:

$$m\angle POQ + m\angle OQP + m\angle OPQ = 180^\circ$$

$$a + 25^\circ + 25^\circ = 180^\circ$$

$$a + 50^\circ = 180^\circ$$

$$a + 50^\circ - 50^\circ = 180^\circ - 50^\circ$$

$$a = 130^\circ$$

$$b = 130^\circ \div 2$$

قياس الزاوية المركزية يساوي مثلي قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس نفسه

$$= 65^\circ$$

بالتبسيط



طرح 50° من الطرفين

أتذكر


زاويا قاعدة المثلث مُتطابق
الصلعين متساويان في
القياس.

أتحقق من فهمي

إذا كانت النقطة O هي مركز الدائرة في الشكل المجاور، فما قيمة كل من x و y ؟



قد يكون قياس الزاوية المركزية أكبر من 180° . ففي الشكل المجاور، الزاوية AOB مُقابلة لقوس ADB ، وقياسها 190° ، وهو ضعف قياس الزاوية المحيطية ACB .



$$m\angle PQT = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$$

$$a + b = 360^\circ$$

$$b = 2 \times 108^\circ = 216^\circ$$

$$a + 216^\circ = 360^\circ$$

$$a = 360^\circ - 216^\circ = 144^\circ$$

الزاويتان PQT, RQT تشكلا في زاوية مستقيمة

مجموع قياسات الزوايا حول نقطة هو 360°

قياس الزاوية المركزية يساوي مثلي قياس الزاوية المحيطية المرسومة على القوس نفسه


بتعويض قيمة b

بطرح 216° منَ الطرفين

مثال 2

آتذکر

- قياس الزاوية المستقيمة هو 180°
 - مجموع قياسات الزوايا حول نقطة هو 360°




إذا كانت النقطة O هي مركز الدائرة في الشكل المجاور، والنقط A, B, C على استقامة واحدة، فما قيمة x ؟

إذا وقعتْ رؤوسُ مُضلعٍ رباعيٍ على دائرةٍ، فإنَّه يُسمَّى رباعيَا دائريًّا (cyclic quadrilateral).
وإذا حسِّينا مجموَعَ قياسَيِّ كلِّ زاويَتَين متقابلَتَين فِيهِ، فانَّه يَكُونُ 180° .

المُضلعُ الرباعيُّ الدائريُّ

۹



مجموع قياسَيٌ كُلُّ زاويَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِي المُضَلَّعِ الرَّبَاعِيِّ
الدَّائِرِيِّ هُوَ 180° :

$$b + d = 180^\circ, a + c = 180^\circ$$

مثال 3

إذا كانت النقطة O هي مركز الدائرة في الشكل المجاور، فما قيمة كل من x و y ؟

$$m\angle ACO = 43^\circ$$

$$\gamma + m\angle ACO = 90^\circ$$


المثلث ACO مُتطابقُ الضلعين

الزاوية ACD محيطة مشتقة مع الزاوية

المركزية AOD بالقوس نفسه

$$\gamma + 43^\circ = 90^\circ$$

بالتعميّض



$$\begin{aligned} y &= 90^\circ - 43^\circ \\ &= 47^\circ \end{aligned}$$


طرح 43° من الطرفين

$$\begin{aligned} x + m\angle ADC &= 180^\circ \\ m\angle ADC &= y = 47^\circ \\ x + 47^\circ &= 180^\circ \\ x &= 180^\circ - 47^\circ \\ &= 133^\circ \end{aligned}$$


الشكل $ABCD$ رباعي دائري
المثلث OCD مُتطابق الضلعين
بتعيين قيمة y
طرح 47° من الطرفين

أتحقق من فهمي

إذا كانت النقطة O هي مركز الدائرة في الشكل المجاور، فما قيمة كل من x و y ؟



في الشكل المجاور، \overleftrightarrow{PQ} هو مماس للدائرة عند النقطة T ، و \overline{TA} هو وتر للدائرة. تسمى الزاوية المحصورة بين المماس والوتر المار ب نقطة التماس **الزاوية المماسية** (angle between a tangent and a chord). وهذه الزاوية تحصر القوس \widehat{TA} ، ويمكن ملاحظة أن قياس الزاوية المماسية PTA يساوي قياس الزاوية **المحيطية المرسومة** على القوس \widehat{ABT} نفسه.



الزاوية المماسية والزاوية المحيطية

نظريّة


قياس الزاوية المماسية يساوي قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس:

$$m\angle ATP = m\angle ABT$$

مثال 4


في الشكل المجاور، \overleftrightarrow{AB} مماس للدائرة في T . أجد قياس كل من الزوايا ATS و TSR و ATR .
 $m\angle ATS = m\angle TRS = 80^\circ$
 $m\angle TSR = m\angle BTR = 70^\circ$

زاويا مماسية و محيطية مشتركة في القوس
 زاويا مماسية و محيطية مشتركة في القوس







أتحقق من فهمي

في الشكل المجاور، \overleftrightarrow{AB} مماس للدائرة في T . أجد قياس كل من الزوايا: TQP ، TPQ ، و QTP .





أَجِدْ قِيمَةَ x فِي كُلِّ مَا يَأْتِي:







إِذَا كَانَتِ النَّقْطَةُ O هِيَ مَرْكَزُ الدَّائِرَةِ فِي الشَّكْلِ الْمُجَارِ، فَأَجِدْ كُلَّ مَا يَأْتِي:

4 $m\angle EGF.$

5 $m\angle DEG.$

6 $m\angle EDF.$

إِذَا كَانَتِ النَّقْطَةُ O هِيَ مَرْكَزُ الدَّائِرَةِ، فَأَجِدْ قِيَاسَ الزَّوَافِيَّا الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِالْحُرْفَيْنِ x وَ y فِي كُلِّ مِنَ الدَّوَائِرِ الْآتِيَّةِ:



فِي الشَّكْلِ الْمُجَارِ دَائِرَةٌ مَرْكُزُهَا O ، وَقِيَاسُ الزَّوَافِيَّةِ ABO هُوَ x° ، وَقِيَاسُ الزَّوَافِيَّةِ CBO هُوَ y° :


أَجِدْ قِيَاسَ الزَّوَافِيَّةِ BAO 10

أَجِدْ قِيَاسَ الزَّوَافِيَّةِ AOD 11


أَثِبْ أَنَّ قِيَاسَ الزَّوَافِيَّةِ الْمَرْكَزِيَّةِ يَسَاوِي مِثْلَيْ قِيَاسِ الزَّوَافِيَّةِ الْمُحِيطِيَّةِ الْمُرْسُومَةِ عَلَى الْقَوْسِ نَفْسِيَّهُ.

أَجِدُّ قياسَ الزوايا المشارِ إليها بـأَحْرَفٍ في كُلِّ مِنَ الدَّوَائِرِ الْأَتِيَّةِ:


13



14



15



فِي الشَّكْلِ الْرَّبَاعِيِّ الدَّائِرِيِّ $PQRT$ ، قِيَاسُ الزَّاوِيَةِ ROQ هُوَ 38° ، حِيثُ O مَرْكُزُ الدَّائِرَةِ، وَ POT قُطْرٌ فِيهَا يَوْازِي QR . أَجِدُّ قِيَاسَ كُلِّ مِنَ الزَّاوِيَةِ الْأَتِيَّةِ:


16 ROT .

17 QRT .

18 QPT .


يُمَثِّلُ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ دَائِرَةً مَرْكُزُهَا O :

$$?3x - 30^\circ = 180^\circ \quad 19$$



أَجِدُّ قِيَاسَ الزَّاوِيَةِ CDO المُشارِ إِلَيْهَا بـأَحْرَفٍ y ، مُبَرِّرًا كُلَّ خطوةٍ فِي حَلَّيِ.


20




يُمَثِّلُ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ $ABCE$ مَتَوَازِيَّ أَضْلاَعٍ. أَيْنُ أَنَّ قِيَاسَ الزَّاوِيَةِ AED يَسَاوِي قِيَاسَ الزَّاوِيَةِ ADE ، مُبَرِّرًا كُلَّ خطوةٍ فِي حَلَّيِ.

أَجِدُّ قِيَاسَ الزَّاوِيَةِ المُشارِ إِلَيْهَا بـأَحْرَفٍ في كُلِّ مِنَ الدَّوَائِرِ الْأَتِيَّةِ:




22



23




أَجِدْ قِيمَةَ x فِي كُلِّ مِنَ الشَّكْلَيْنِ الآتَيْنِ:




26 تُمَثِّلُ النَّقْطَةُ O مَرْكَزَ الدَّائِرَةِ فِي الشَّكْلِ الْأَتَيِّ، وَيُمَثِّلُ مَمَاسًا لِلْدَّائِرَةِ عِنْدَ A . إِذَا كَانَتِ النَّقَاطُ B وَ C وَ X تُمَثِّلُ خطًا عَلَى إِسْتِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَثَيَّتْ أَنَّ الْمُثَلَّثَ ACX مُنْتَطَابِقُ الْضَّلَعَيْنِ، مُبِرِّرًا إِجَابَتِيًّا.

27 تَبَرِّيرٌ: قَالَتْ فَاتَنْ إِنَّ الْزاوِيَةَ الْمُحِيطَيَّةَ الْمَرَسُومَةَ عَلَى قُطْرِ الدَّائِرَةِ زَاوِيَّةٌ قَائِمَةٌ. هُلْ قُولُ فَاتَنَ صَحِيحٌ؟
أَبْرُرُ إِجَابَتِيًّا.



28 تَبَرِّيرٌ: فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ، \overleftrightarrow{PT} مَمَاسٌ لِدَائِرَةٍ مَرْكُزُهَا O . إِذَا كَانَ قِيَاسُ الزَّاوِيَةِ PBA هُوَ x° ، فَأَثَيَّتْ أَنَّ قِيَاسَ الزَّاوِيَةِ APT يَسَاوِي قِيَاسَ الزَّاوِيَةِ ABP ، مُبِرِّرًا خُطُوَاتِ الْحَلَّ.



29 تَحْدِيدٌ: أَجِدْ قِيمَةَ x فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ.

معادلة الدائرة

Equation of a Circle



كتابة معادلة الدائرة، وإيجاد المركز ونصف القطر من معادلة دائرة معلومة.

معادلة الدائرة، الصورة القياسية، الصورة العامة.

تمثل النقطة $(7, 4)$ موقع محطة إذاعية ينقط بثها في دائرة نصف قطرها 224 km . إذا كان فوّاز يقيم في بيت تمثله النقطة $(75, 95)$ على مستوى إحداثي وحدته 1 km ، فكيف يستطيع معرفة إن كان بث هذه الإذاعة يصل بيته أم لا؟

فكرة الدرس



المصطلحات




مسألة اليوم



معادلة الدائرة (equation of the circle) هي العلاقة التي تربط بين الإحداثي x والإحداثي y

لكل نقطة واقعة على الدائرة. فإذا عرض إحداثياً نقطة في المعادلة، وكانت النتيجة عبارةً صحيحةً، فهذا يعني أن تلك النقطة تقع على الدائرة.



يُمثل الشكل المجاور دائرةً مركبها النقطة (a, b) ، وطول نصف قطرها r . والنقطة (x, y) تقع على الدائرة. لا يُحظى أنه يمكن تكوين مثلث قائم الزاوية الذي طول ضلعه الأفقي $(x - a)$ ، وطول ضلعه الرأسي $(y - b)$ ، وطوله r . وبتطبيق نظرية فيثاغورس تنتهي المعادلة $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ التي تُسمى الصورة القياسية (standard form) لمعادلة الدائرة.

معادلة الدائرة

مفهوم أساسي

1 الصورة القياسية لمعادلة الدائرة التي مركبها النقطة (a, b) ، وطول نصف قطرها r ، هي: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

2 معادلة الدائرة التي مركبها نقطة الأصل $(0, 0)$ ، وطول نصف قطرها r ، هي: $x^2 + y^2 = r^2$

مثال 1

أكتب معادلة الدائرة في كلٍ من الحالات الآتية:

المركز هو النقطة $(-2, 7)$ ، وطول نصف القطر 6 وحداتٍ.

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

الصورة القياسية لمعادلة الدائرة

$$(x - (-2))^2 + (y - 7)^2 = 6^2$$

$$(a, b) = (-2, 7), r = 6$$

$$(x + 2)^2 + (y - 7)^2 = 36$$

المركز هو نقطة الأصل، وطول نصف القطر 5 وحداتٍ.

الصورة القياسية لمعادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$r = 5$$

$$x^2 + y^2 = 25$$

الدائرة المرسومة في المستوى الإحداثي المجاور.

عند النظر إلى الدائرة يتبيَّن أنَّ مركزها النقطة $(-3, 5)$ ، وأنَّ طول نصف قطرها 4 وحداتٍ.

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

الصورة القياسية لمعادلة الدائرة

$$(x - (-3))^2 + (y - 5)^2 = 4^2$$

$$(a, b) = (5, -3), r = 4$$


$$(x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

أتحقق من فهمي

أكتب معادلة الدائرة في الحالتين الآتتين:

(a) المركز هو النقطة $(0, 4)$ ، وطول نصف القطر 9 وحداتٍ.

(b) المركز هو نقطة الأصل، وطول القطر 8 وحداتٍ.



إذا عُلِمَ مركز الدائرة ونقطة واقعةٌ عليها، فإنهُ يُمكِّن إيجاد طول نصف القطر باستعمال قانون المسافة بين نقطتين، ثمَّ كتابةُ معادلة الدائرة.

طول القطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين

مراجعة المفهوم

إذا كانَ طول القطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين (x_1, y_1) و (x_2, y_2) ، هو d فإنَّ:

$$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

مثال 2

أَجِدُّ معادلة الدائرة التي مر كُزُها النقطة $(-7, 13)$ ، وتمرُّ بالنقطة $(4, 5)$.
أَجِدُّ طول نصف القُطْرِ باستعمال قانون المسافة بين نقطتين:

$$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

قانون المسافة بين نقطتين

$$r^2 = (5 - (-7))^2 + (4 - 13)^2$$

بالتعويض

$$= 144 + 81$$

بالتبسيط

$$= 225$$

$$r = \sqrt{225} = 15$$

بأخذ الجذر التربيعي

واليآن، أُعوّض إحداثيّي المركز r وقيمة r^2 في الصورة القياسية لمعادلة الدائرة، فأَجِدُّ أنَّ معادلة هذه الدائرة هي:

$$(x + 7)^2 + (y - 13)^2 = 225$$

أتحقق من فهمي

أَجِدُّ معادلة الدائرة التي مر كُزُها النقطة $(-3, 4)$ ، وتمرُّ بالنقطة $(0, 2)$.

إذا علمنا معادلة دائرة بالصورة القياسية $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ، حيث $r > 0$ فإنَّه يُمكنُ فك الأقواس وإعادة الترتيب، فتنتُج المعادلة: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$.
يمكِّنُ أيضًا كتابة هذه المعادلة بالصورة الآتية:

$$x^2 + y^2 + 2fx + 2gy + c = 0$$

حيث: $f = -a$, $g = -b$, $c = a^2 + b^2 - r^2$ ، وهي تُسمى **الصورة العامة** (general form).
لمعادلة الدائرة.

إذا علمنا الصورة العامة لمعادلة أيّ دائرة، فإنَّه يُمكنُ تحويلُها إلى الصورة القياسية $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. وذلك بإكمال المربع.

إكمال المربع

مراجعة المفهوم

لإكمال المربع للحدَّين $x^2 + ax$ ، يضاف $\left(\frac{a}{2}\right)^2$ ، ثم يُطْرَح، فينتُج مربع كامل هو $\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$. وبذلك يتحوَّل $x^2 + ax$ إلى $\left(x + \frac{a}{2}\right)^2$.

مثال 3

أَجِدُّ إحداثياتِ المركِزِ، وطُولَ نصِفِ القُطْرِ لِلدائِرَةِ $0 = x^2 + y^2 - 8x + 6y - 56$.

بِإِكْمَالِ المَرْبَعِ لِلحدِودِ التِي تَحْوِي x يَتَسْلُجُ: $x^2 - 8x = (x - 4)^2 - 16$ ، وَبِإِكْمَالِ المَرْبَعِ لِلحدِودِ التِي تَحْوِي y يَتَسْلُجُ: $y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9$.

وَبِذَلِكَ يُمْكِنُ تَحْوِيلُ المعادِلَةِ $0 = x^2 + y^2 - 8x + 6y - 56$ إِلَى: $(x - 4)^2 - 16 + (y + 3)^2 - 9 - 56 = 0$

$$(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 81$$

بِمَقَارَنَةِ هَذِهِ الْمَعَادِلَةِ بِالصُّورَةِ الْقِيَاسِيَّةِ $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ، نَجُدُ أَنَّ:

$$a = 4, b = -3, r = 9$$

إِذْنُ، مَرْكُزُ هَذِهِ الدَّائِرَةِ هُوَ النَّقْطَةُ $(-3, 4)$ ، وَطُولُ نصِفِ قُطْرِهَا 9 وَحدَاتٍ.

أتحقق من فهمي

أَجِدُّ إحداثياتِ المركِزِ، وطُولَ نصِفِ القُطْرِ لِلدائِرَةِ $0 = x^2 + y^2 + 2x - 10y - 10 = 0$.

تَعَلَّمْتُ فِي درْسٍ سَابِقٍ أَنَّ مَمَاسَ الدَّائِرَةِ يُشَرِّكُ مَعَ الدَّائِرَةِ فِي نَقْطَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطُّ، وَأَنَّهُ يَتَعَامِدُ مَعَ نصِفِ القُطْرِ الْمَارِ بِنَقْطَةِ التَّمَاسِ . وَهَذَا يَفِيدُ فِي التَّحْقِيقِ مِنْ أَنَّ مَسْتَقِيمًا مَعْطَى هُوَ مَمَاسٌ لِلدائِرَةِ مَعْطَى، وَحْسَابِ طُولِ قطْعَةِ مَمَاسِيَّةٍ كَمَا فِي الْمَثَالَيْنِ الْآتَيْنِ .

مثال 4

أَجِدُّ طُولَ القطْعَةِ المَمَاسِيَّةِ المَرْسُومَةِ مِنَ النَّقْطَةِ $(-6, 6)$ ، P ، التِي تَمَسُّ الدَّائِرَةَ الَّتِي مَعَادِلُهَا $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 25$.

أَرَسْمُ مُخْطَطًا، وَلْتَكُنِ النَّقْطَةُ X مَرْكُزَ الدَّائِرَةِ، وَ T نَقْطَةُ التَّمَاسِ .

لِحْسَابِ طُولِ القطْعَةِ المَمَاسِيَّةِ \overline{PT} ، ثُمَّ أَطْبِقُ نَظَرِيَّةَ فِيَثَاغُورُسَ عَلَى المُثَلِّثِ الْقَائِمِ XTP ، الَّذِي يُمْكِنُ إِيَجادُ طُولِيْ ضَلَعِيْنِ فِيهِ، هَمَا: نصِفُ القُطْرِ \overline{XT} ، وَالْوَتْرُ \overline{XP} .


طُولُ نصِفِ القُطْرِ XT هُوَ 5. وَلِحْسَابِ XP ، أَجِدُّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ مَرْكُزِ الدَّائِرَةِ $(-5, 4)$ وَالنَّقْطَةِ $(-6, 6)$ P بِاستِعْمَالِ قَانُونِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ نَقْطَتَيْنِ:

$$(XP)^2 = (6 - 4)^2 + (-6 + 5)^2 = (11)^2 + (-10)^2 = 221$$

وَبِتَطْبِيقِ نَظَرِيَّةِ فِيَثَاغُورُسَ عَلَى المُثَلِّثِ XTP :

$$(PT)^2 = (XP)^2 - (XT)^2$$

نَظَرِيَّةُ فِيَثَاغُورُس



$$= 221 - 25$$

بالتعميض

$$= 196$$

بالتبسيط

$$PT = \sqrt{196} = 14$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

إذن، طول القطعة المماسية 14 وحدة.

أتحقق من فهمي 

أجد طول القطعة المماسية المرسومة من النقطة $(4, 7)$ P ، التي تمثل الدائرة التي معادلتها

$$(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 81$$

مثال 5

أثبت أن المستقيم $y = 2x + 3$ هو مماس للدائرة التي معادلتها $(x - 10)^2 + (y - 8)^2 = 45$ أحل النظام المكون من المعادلتين: $y = 2x + 3$ ، و $(x - 10)^2 + (y - 8)^2 = 45$ ؛ لإيجاد عدد نقاط تقاطع المستقيم والدائرة. فإذا كان عدد نقاط التقاطع واحداً فقط، فإن المستقيم يكون مماساً للدائرة.

$$(x - 10)^2 + (2x + 3 - 8)^2 = 45 \quad \text{بتعويض } y \text{ في معادلة الدائرة}$$

$$(x - 10)^2 + (2x - 5)^2 = 45 \quad \text{بالتبسيط}$$

$$x^2 - 20x + 100 + 4x^2 - 20x + 25 = 45$$

بفك الأقواس

$$5x^2 - 40x + 80 = 0 \quad \text{بجمع الحدود المتشابهة،}$$

وجعل الطرف الأيمن صفرًا

$$x^2 - 8x + 16 = 0 \quad \text{بقسمة الطرفين على 5}$$

$$(x - 4)^2 = 0 \quad \text{بالتحليل}$$

$$x = 4$$

$$y = 2(4) + 3 = 11 \quad \text{بتعويض قيمة } x \text{ في إحدى المعادلتين لإيجاد قيمة } y$$

بما أن هذا المستقيم يقطع الدائرة في نقطة واحدة فقط هي $(4, 11)$ ، فإنه مماس للدائرة.

أتحقق من فهمي 

أثبت أن المستقيم $5 - 4x = y$ هو مماس للدائرة التي معادلتها

$$(x + 5)^2 + (y - 9)^2 = 68$$



أكتب معادلة الدائرة في كل من الحالات الآتية:

- 1 المركز هو نقطة الأصل، وطول نصف قطرها 7 وحدات.
- 2 المركز هو النقطة $(3, -1)$ ، وطول نصف قطرها 5 وحدات.
- 3 المركز هو النقطة $(-2, -3)$ ، وطول قطرها 10 وحدات.

أجد معادلة الدائرة المعطى مركزها وإحداثيات نقطة تمر بها في كل مما يأتي:

- 4 المركز $(2, -1)$ ، وتمر بالنقطة $(5, 3)$.
- 5 المركز نقطة الأصل، وتمر بالنقطة $(-4, -9)$.

أجد إحداثي المركز، وطول نصف القطر لكل من الدوائر الآتية:

6 $(x + 5)^2 + (y - 8)^2 = 36$

7 $(x - 19)^2 + (y - 33)^2 = 400$

8 $x^2 + (y + 4)^2 = 45$

9 $(x - 3)^2 + (y + 10)^2 = 28$

أجد إحداثي المركز، وطول نصف القطر لكل من الدوائر الآتية:

10 $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 30 = 0$

11 $x^2 + y^2 + 8x = 9$

12 $2x^2 + 2y^2 + 20x + 36y + 158 = 0$

13 $x^2 + y^2 - 18x + 14y = 14$


أكتب معادلة الدائرة بالصورتين: $x^2 + y^2 + 2fx + 2gy + c = 0$ ، $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ، حيث f ، g ، c و r

أعداد صحيحة في الحالات الآتية:

- 14 المركز $(-1, -11)$ ، وطول القطر 26 وحدة.

- 15 المركز $(3, 0)$ ، وطول نصف القطر $4\sqrt{3}$ وحدات.

- 16 المركز $(7, -4)$ ، وتمر بالنقطة $(1, 3)$.



أجد معادلة الدائرة المبنية في الرسم البياني المجاور.

أصل المسألة الواردة في بداية الدرس.

أجد إحداثيي المركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها: $(2x - 4)^2 + (2y + 6)^2 = 100$. 19

الدائرة عن نقطة الأصل. 20

تُمثّل النقطتان $(9, 2)$, D , و $(-7, 14)$, E نهايَتِي قُطْرٍ لدائِرَةٍ مركُزُها: C

أَجِدُّ إِحْدَاثِيَّ الْمَرْكَزِ C 21

أَجِدْ طولَ نصفِ القُطْرِ. 22

أَكْتُبْ مُعَادِلَةَ الدَّائِرَةِ. 23

أثبت أن المستقيم $3x - 2y = 108$ هو مماس للدائرة التي معادلتها: $x^2 + y^2 + 4x - 24y + 108 = 0$ 24

رُسِّمَ مماسٌ من النقطة $P(8, 5)$ للدائرة التي معادلتها: $x^2 + y^2 + 8x - 6y - 75 = 0$. أَجِدْ طول القطعة المستقيمة التي تصلُّ النقطة P بنقطة التَّمَاسِ.

مهارات التفكير العليا

تبريرٌ: قال عبد الرحمن إن $x^2 + y^2 - 14x + 6y + 59 = 0$ ليس معاًدلة دائرة. هل قول عبد الرحمن صحيح؟

أبرر إجابتي.

تحدد: ممُّ دائرٍ مُحصورٌ بينَ دائرتَينِ لهُما المركُزُ نفسُهُ، وَهُوَ النقطةُ (3, 7). إذا كانتِ الدائرةُ الكبُرِي تمسُّ المحورَ x ، والصغُرِي تمسُّ المحورَ y ، فَأكتبُ معادلَتَي الدائرتَينِ اللَّتِي تُشكِّلُانِ المحيطَ الخارجيَّ والمحيطَ الداخليَّ للمنْعِمِ، ثُمَّ أجدُ مساحةَ الممُّ بالوحداتِ المربَّعةِ.

28 تحديداً: رسم من النقطة $(8, 21)$ A مماساً للدائرة التي مركزها C ، فمساها عند نقطتين D ، B . إذا كانت معادلة الدائرة هي $49 = (x-9)^2 + (y+4)^2$ ، فما مساحة الشكل الرباعي $ABCD$ ؟


تحدد: أكتب الصورة القياسية لمعادلة الدائرة $x^2 + y^2 + 8x - 10y + 24 = 0$ دون استعمال طريقة إكمال المربع.

الدوايَرُ المتماسَةُ

Tangent Circles

استنتاج العلاقة بين دائريَن، وتعُرُّف المماسات المشتركة، وتوظيف ذلك في حل مسائل حياتية.

الدائريَن المتماسَان، المماس المشتركُ الخارجيُّ، المماس المشتركُ الداخليُّ.



يدور حزام مطاطيٌّ حول بكرتيَن دائريَن، طول نصفي قطريِهما 8 cm، و 3 cm على التوالي. إذا كان طول الحزام بين نقطتي التَّماس مع البكرتيَن 25 cm، فما المسافة بين مركزيِي البكرتيَن؟

فكرةُ الدرس



المصطلحات



مسألةُ اليوم




يمُكِّن أن تتقاطع الدائريَان المرسومتان في مستوى واحدٍ في نقطةٍ واحدةٍ، أو نقطتين، وقد لا تتقاطعان أبداً. وُسُمِّيَ الدائريَان المُتقاطِعتان في نقطةٍ واحدةٍ فقط دائريَن متماسَيْن (tangent circles).

الدائريَان المرسومتان في مستوى واحدٍ


مفهومُ أساسِيٍّ

إذا رسمت دائريَان في مستوى واحدٍ، فإنَّ وضعَهُما بالنسبة إلى بعضِهما ينحصرُ في الحالاتِ الآتية:

4 مُشترِكتان في نقطةٍ واحدةٍ؛ أي إنَّهما متماسَان. ولهذا الوضع صورتان:




متماسَان منَ الخارجِ.




1 مُتباعدَان.

الحالاتِ الآتية:

2 مُتقاطِعتان في نقطتين.




3 إحداهُما داخلَ الأخرى.



متماسَان منَ الداخِلِ.


إذا كان المستقيم مماساً لكلٍ من دائريْن، فإنه يسمى **مماساً مشتركاً** (common tangent).

وإذا قطع المماس المشترك القطعة المستقيمة الواقعة بين مركزي الدائريْن، فإنه يسمى **المماس المشترك الداخلي** (common internal tangent)، وإلا فإنه يسمى **المماس المشترك الخارجي** (common external tangent). ففي الشكل المجاور، AB مماس مشترك خارجي، و CD مماس مشترك داخلي.




يمكن رسم مماس واحد فقط للدائرة عند نقطةٍ عليها، ويمكن أيضاً رسم مماسين للدائرة من نقطةٍ خارجها، فما عدد المماسات المشتركة التي يمكن رسمها للدائريْن؟ تعمد إجابة هذا السؤال على وضع الدائريْن بالنسبة إلى بعضهما.

مثال 1



كم مماساً مشتركاً يمكن رسمه للدائريْن في الشكل الآتي؟ أرسم المماسات، ثم أصنفها إلى خارجية وداخلية.





أرسم القطعة المستقيمة الواقعة بين مركزي الدائريْن، ثم أرسم المماسات التي تقطعها بلون أحمر، والمماسات التي لا تقطعها بلون أزرق.

الاحظ أنه يوجد للدائريْن مماسان داخليان، وآخران خارجيان.



أتحقق من فهمي

كم مماساً مشتركاً يمكن رسمه للدائريْن في الشكل الآتي؟ أرسم المماسات، ثم أصنفها إلى خارجية وداخلية.



الوحدة 2

يمكن حساب طول القطعة المماسية المشتركة (المسافة بين نقطتي التماس على الدائرتين) بطريقة مماثلة لحساب طول القطعة المماسية المرسومة من نقطة خارج الدائرة إلى نقطة عليها.



مثال 2

أجد طول \overline{AB} في الشكل المجاور.

أفكار

هل يمكن إيجاد طول \overline{AB} باستخدام تشابه المثلثات أيضاً؟

$$m\angle NBA = m\angle BAC = 90^\circ$$

المماس عمودي على نصف

القطر المار بنقطة التماس

$$\overline{MA} \text{ عمودي على } \overline{NC}$$

$$m\angle ACN = 90^\circ$$

مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي 360°

$$m\angle BNC = 90^\circ$$

إذن، الشكل الرباعي $ACNB$ مستطيل؛ لأن زواياه الأربع قوائم.

$$AB = NC$$

ضلعان متقابلان في المستطيل

واليآن، أطبق نظرية فيثاغورس على المثلث قائم الزاوية MCN لأجد CN :

$$(CN)^2 = (MN)^2 - (MC)^2$$

نظرية فيثاغورس

$$= 28^2 - (6 + 10)^2$$

بالتعمير

$$(CN)^2 = 784 - 256 = 528$$

بالتبسيط

$$CN = \sqrt{528} \approx 23$$


بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$AB = CN \approx 23 \text{ cm}$$


أتحقق من فهمي

أجد طول \overline{ST} في الشكل المجاور، علمًا بأن:


$$PT = 12 \text{ cm}, OS = 4 \text{ cm}, PO = 34 \text{ cm}$$



مثال 3: من الحياة



دراجات: تلتف في دراجة هوائية سلسلة معدنية على عجلتين مسنتين دائريتين، نصف قطر الصغرى على عجلة المماسة، ونصف قطر الكبيرة 12 cm ، والمسافة بين مراكزهما 55 cm . أجد طول السلسلة بين نقطتي تماسها مع المسنتين.



المطلوب هو حساب طول \overline{DE} . أرسم من M عموداً على \overline{NE} , ثم أسمى نقطة تقاطعه معها F كما في الشكل المجاور.



ركوب الدراجة الهوائية فوائد صحية وبيئية كثيرة، منها: تقوية عضلات الجسم، والتقليل من التلوث الناجم عن استعمال وسائل النقل التقليدية.

$$m\angle NED = m\angle MDE = 90^\circ$$

المماس يتعامد مع نصف القطر المار ب نقطة التماس

$$m\angle MFE = 90^\circ$$

عمودي على \overline{MF}

$$m\angle DMF = 90^\circ$$

مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي 360°

إذن، الشكل الرباعي $MDEF$ مستطيل؛ لأن زواياه الأربع قوائم.

والآن، أطبق نظرية فيثاغورس على المثلث قائم الزاوية MFN لاجد طول MF :

$$(MF)^2 = (MN)^2 - (FN)^2$$

نظرية فيثاغورس

$$= 55^2 - (12 - 4)^2$$

بالتعميض

$$(MF)^2 = 3025 - 64 = 2961$$

بالتبسيط

$$MF = \sqrt{2961} = 54.4$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين




$$DE = MF = 54.4 \text{ cm}$$

أتحقق من فهمي




أجد طول نصف قطر العجلة المسننة الكبيرة في دراجة، علماً بأن طول السلسلة بين نقطتي تماسها مع المسنتين 40 cm ، وطول نصف قطر العجلة المسننة الصغرى 5 cm ، والمسافة بين مراكز العجلتين المسنتين 41 cm .




أُحدِّدُ إذا كانَ المماسُ داخليًّا أم خارجيًّا في كُلِّ ممّا يأتي:




كم مماسًا مشترٍّ كَيْمَكِنُ رسمُهُ لـكُلِّ مِنْ أَزْوَاجِ الدَّوَائِرِ الْأَتِيَّةِ؟ أَرْسِمُهَا، ثُمَّ أَصْنِفُهَا إِلَى خَارِجِيٍّ وَدَاخِلِيٍّ.



يُبَيَّنُ الشَّكْلُ الْمُجَارُّ مَمَاسَيْنِ مِنَ النَّقْطَةِ A لِدَائِرَتَيْنِ مَمَاسَيْنِ مِنَ الْخَارِجِ. أَجِدُ طَوْلَ \overline{CB} بِاسْتِعْمَالِ الْقِيَاسَاتِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الشَّكْلِ.




يُبَيَّنُ الشَّكْلُ الْمُجَارُّ دَائِرَتَيْنِ مَمَاسَيْنِ مِنَ الْخَارِجِ، وَالْمَمَاسَاتِ \overline{AC} , \overline{AB} , \overline{AD} ، إِذَا كَانَ $5 = AB = 3x + 2$ ، $AC = 2x - 2$ ، فَمَا قِيمَتُ x ؟



أَجِدْ طُولَ \overline{AB} باستعمالِ القياساتِ المُبَيَّنةِ في الشَّكْلِ المجاَوِرِ. 9




حَزَامُ نَاقِلٌ: يَمُرُّ حَزَامٌ حَوْلَ دُولَائِينِ دائِرَيْنِ، نَصْفُ قُطْرِ الصَّغِيرِ مِنْهُمَا 15 cm ، وَنَصْفُ قُطْرِ الْكَبِيرِ 25 cm . إِذَا كَانَ طُولُ الْحَزَامِ بَيْنَ نَقْطَتَيِ التَّمَاسِ مَعَ الدُّولَائِينِ 2 m ، فَمَا الْمَسَافَةُ بَيْنَ مَرْكَزَيِ الدُّولَائِينِ؟ 10

أَحَدُّدْ وَضَعَ الدَّائِرَتَيْنِ بِالنَّسَبَةِ إِلَى بَعْضِهِمَا إِذَا كَانَتْ مَعَادِلَتَاهُمَا: $x^2 + y^2 - 6x + 8y - 11 = 0$, $x^2 + y^2 = 25$. 11



أَجِدْ قِيمَةَ كُلِّ مِنْ x وَ y فِي الشَّكْلِ المجاَوِرِ. 12

تَحْدِيدٌ: يُمِثِّلُ الشَّكْلَانِ الآتَيَانِ طَرِيقَتَيْنِ لِرَسَمِ دَائِرَةٍ تُلَامِسُ كُلَّا مِنَ الدَّائِرَةِ الْزَّرَقاءِ، وَالْخَضْرَاءِ، وَالْحَمْرَاءِ. 13
أَجِدْ 6 طَرَائِقَ أُخْرَى لِرَسَمِ هَذِهِ الدَّائِرَةِ.



بَرْهَانٌ: تُمِثِّلُ \overline{RS} فِي الشَّكْلِ المجاَوِرِ مَمَّا دَاخِلِيًّا مُشَتَّرَكًا لِدَائِرَتَيْنِ مَرْكَزَاهُمَا A ، وَ B عَلَى التَّوَالِي. أُثِبْتُ أَنَّ: $\frac{RC}{SC} = \frac{AC}{BC}$ 14


توسيع: الدوائر المتماسة

Extension: Tangent Circles

يمكنني استعمال برمجية جيوجبرا (GeoGebra) لرسم دائرتين، أنصاف قطرهما محددة، وإيجاد البعد بين مركزيهما.

أرسم الشكل الآتي باستعمال برمجية جيوجبرا، ثم أجد AC .

نشاط 1



الخطوة 1: أختار أيقونة من شريط الأدوات.

الخطوة 2: أنقر زر الفأرة الأيسر مع السحب لرسم دائرة مركزها A . ستظهر معادلة الدائرة بالصورة القياسية في شريط الإدخال، وسيظهر مركزها على شكل زوج مرتب.

الخطوة 3: أكرر الخطوتي (1) و(2) لرسم دائرة مركزها C ، وإيجاد نصف قطرها.

الخطوة 4: لأجد البعد بين مركز كل من الدائرتين، أختار من شريط الأدوات، ثم أنقر على المركز A ، وأقرأ البعد بين المركزين من شريط الإدخال.

يمكنني استعمال برمجية جيوجبرا لاستكشاف العلاقة بين نصف قطري الدائرتين، وموقع كلاً منهما بالنسبة إلى الأخرى.






نشاط 2

أرسم كلاً من الدوائر المميزة في الجدول الآتي باستعمال برمجية جيوجبرا.

إذا كان طول نصف قطر الدائرة الكبيرة r_1 ، وطول نصف قطر الدائرة الصغيرة r_2 ، فأستعمل برمجية جيوجبرا لأكمل الجدول الآتي.

أُقارنُ بينَ قيمِ $r_1 + r_2$ ، $r_1 - r_2$ ، و AC ، ثُمَّ أُستنِجُ العلاقةَ بينَها وبينَ وضعِ الدائِرَتَيْنِ بالنسبةِ إلى بعضِهِما.

3

الاستنتاج	$r_1 + r_2$	$r_1 - r_2$	AC	r_2	r_1	وضعُ الدائِرَتَيْنِ
						
						
						
						
						

أُدْرَب



أُحدِّدُ وضعَ الدائِرَتَيْنِ بالنسبةِ إلى بعضِهِما في كُلِّ منَ الحالاتِ الآتِيَةِ دونَ رسمِهِما:

1 $r_1 = 9$, $r_2 = 5$, $AC = 3$

2 $r_1 = 11$, $r_2 = 5$, $AC = 6$


3 $r_1 = 6$, $r_2 = 3$, $AC = 17$

4 $r_1 = 8$, $r_2 = 5$, $AC = 3$

اختبار نهاية الودعه


4 طول القوس الأصغر \widehat{AB} بدلالة π في الشكل الآتي

هو:




- a) $\frac{9\pi}{8}$
- b) $\frac{3\pi}{2}$
- c) $\frac{9\pi}{2}$
- d) $\frac{3\pi}{4}$

5 قيمة x في الشكل الآتي هي:



- a) 61°
- b) 24°
- c) 34°
- d) 95°

6 قياس الزاوية DCA في الشكل الآتي هو:




- a) 55°
- b) 35°
- c) 45°
- a) 41°

أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1 في الشكل الآتي وتران في دائرة مركزها O .


إذا كان $OT = 3\text{ cm}$ ، $AS = 4\text{ cm}$ ، و \overline{BC} طول

بالستيمترات هو:




- a) 6
- b) 7
- c) 8
- d) 10

2 اعتماداً على الشكل الآتي، فإن طول \overline{LM} هو:



- a) 5
- b) 8
- c) 10
- d) 13


3 اعتماداً على الشكل الآتي، فإن طول نصف قطر الدائرة هو:




- a) 5.75
- b) 12
- c) 4
- d) 8

أَجِدُّ المساحةَ والمحيطَ لِكُلِّ مِنَ الْقَطَاعَيْنِ الآتَيْنِ:


12



13



14 **أَقْمَارٌ صَنَاعِيَّةٌ:** يَرْتَفِعُ قَمْرٌ صَنَاعِيٌّ مَسَافَةً 640 km عَنْ سطحِ الْأَرْضِ الَّتِي نَصَفُ قُطْرِهَا \overrightarrow{SB} وَيُمْكِنُ مِنْهُ مَشَاهِدَةُ الْمَنْطَقَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْمَمَاسَيْنِ \overrightarrow{SA} وَ \overrightarrow{SB} مِنْ سطحِ الْأَرْضِ. مَا الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْقَمَرِ الصَّنَاعِيِّ وَأَبْعَدِ نَقْطَةٍ يُمْكِنُ مَشَاهِدَتُهَا مِنْهُ عَلَى سطحِ الْأَرْضِ؟



15 **حَزَامٌ مَطَاطِيٌّ:** يَدُورُ حَزَامٌ مَطَاطِيٌّ حَوْلَ بَكْرَتَيْنِ دَائِرَيْتَيْنِ، طَوْلُ نَصْفِيْ قُطْرِيْهِمَا 8 cm وَ 3 cm عَلَى التَّوَالِي. إِذَا كَانَ طَوْلُ الْحَزَامِ بَيْنَ نَقْطَتَيِ التَّمَاسِ مَعَ الْبَكْرَتَيْنِ 25 cm ، فَمَا الْمَسَافَةُ بَيْنَ مَرْكَزَيِ الْبَكْرَتَيْنِ؟

7 النَّقْطَةُ الَّتِي لَا تَقْعُدُ عَلَى الدَّائِرَةِ الَّتِي مَعَادِلُهَا

$$(x+2)^2 + (y-4)^2 = 25$$

a) $(-2, -1)$

b) $(1, 8)$

c) $(3, 4)$

d) $(0, 5)$

8 عَدُّ الْمَمَاسَاتِ الْمُشَرَّكَةِ الَّتِي يُمْكِنُ رَسْمُهَا لِدَائِرَتَيْنِ

مُتَمَاسَتَيْنِ مِنَ الدَّاخِلِ هُوَ:

a) 3

b) 2

c) 1


d) 0

9 أَكْتُبُ مَعَادِلَةَ الدَّائِرَةِ الَّتِي تُمَثِّلُ النَّقْطَيْنِ $(3, -4)$ وَ $(6, 9)$ طَرْفَيْ قُطْرِهِ فِيهَا.

يُمْثِلُ الشَّكْلُ التَّالِي قَطَاعَيْنِ دَائِرَيْتَيْنِ مِنْ دَائِرَتَيْنِ لِهُمَا الْمَرْكُزُ O . إِذَا كَانَ نَصْفُ قُطْرِ الدَّائِرَةِ الصَّغِيرِ $2x$ ، وَ نَصْفُ قُطْرِ الدَّائِرَةِ الْكَبِيرِ $3x$ ، وَ قِيَاسُ الزَّاوِيَّةِ AOB هُوَ 43° ، وَ مَسَاحَةُ الْمَنْطَقَةِ $ABCD$ هِيَ 30 cm^2 ، فَأَجِدُّ:


10 قيمةً x .

11 الفَرْقُ بَيْنَ طَوْلَيِ الْقَوْسِيْنِ CD ، وَ AB .



تدريب على الاختبارات الدولية

- 18 يُمثل الشكل الآتي دائرتين متماستين من الخارج، رسم لهما مماس مشترك من النقطة A الواقعة على المستقيم المار بالمركزين N و M . إذا كان نصفا قطرى الدائرتين 4 وحدات و 9 وحدات، فأى العبارات التالية صحيحة:



. \overline{AC} طول يساوى طول \overline{AN} (a)


. \overline{BC} طول يساوى 13 وحدة (b)

$$. AC = \frac{9}{4} AB \quad (c)$$

$$. AC = \frac{4}{9} AB \quad (d)$$


- 19 أجد طول \overline{AM} في السؤال السابق مبيّنا خطوات الحل.

- 20 يُمثل الشكل الآتي مضمراً للجري من ثمانية مسارب، كل منها يتكون من جزأين مستقيمين متوازيين، ونصف دائرتين متصلتين بهما. إذا كان عرض كل مسرب 1 m، فبكم يزيد طول الحد الداخلي من المسرب الثالث على طول الحد الداخلي من المسرب الأول؟



- 16 تقاطع دائرتان مركزاهما A, D في النقطتين \overline{AD} . إذا كان $AB = EC = 10 \text{ cm}$ ، فما طول \overline{CE}

بالستيمترات؟




a) $5\sqrt{2}$

b) $10\sqrt{3}$

c) $10\sqrt{2}$

d) $5\sqrt{3}$

- 17 النقطتان N و M هما مركزا الدائرتين في الشكل الآتي. إذا كانت مساحة المظللة في الدائرة الكبرى 9 وحدات مربعة، فما مساحة المظللة في الدائرة الصغرى بالوحدات المربعة؟



a) 3

b) 4

c) 5

d) 7

ما أهمية هذه الوحدة؟

تُعد دراسة العلاقات بين أطوال أضلاع المثلث وقياسات زواياه (أو ما يُسمى علم المثلثات) أحد أهم فروع الرياضيات وأقدمها؛ إذ ساعد هذا العلم قدماء المصريين على بناء الأهرامات ودراسة الفلك، وقد استمر الاهتمام به حتى اليوم؛ فكان أساساً للكثير من العلوم الأخرى.

سأعلم في هذه الوحدة:

- ماهية دائرة الوحدة، ووضع الزاوية القياسية.
- إيجاد النسب المثلثية لزوايا ضمن الدورة الواحدة.
- تمثيل الاقترانات المثلثية في المستوى الإحداثي، واستنتاج خصائصها.
- حل معادلات مثلثية، بحيث تكون مجموعه الحل ضمن الدورة الواحدة.

تعلمت سابقاً:

- مفهوم جيب الزاوية الحادة، وجيب تمامها، وظلها بوصفها نسباً بين أضلاع المثلث قائم الزاوية.
- استخدام العلاقة $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ في حل مسألة عن مثلث قائم الزاوية.
- حل معادلات خطية وتربيعية ضمن مجموعة الأعداد الحقيقية.

مشروع الوحدة


إنشاء نظام إحداثي جديد

إنشاء نظام إحداثي جديد، يعتمد البعد عن نقطة مرجعية، وقياس زاوية الميل على الخط الأفقي.

فكرة المشروع




أوراق، مسطرة، منقلة، فرجار، آلة حاسبة.



نظام الإحداثيات القطبية: يمكن تحديد موقع أي نقطة في المستوى باستعمال الزوج المركب (r, θ) ، حيث:

١: بعد النقطة عن نقطة مرجعية تسمى القطب.
 θ : الزاوية بين الشعاع المار بالنقطة والقطب، والمحور القطبي، وهو الشعاع الأفقي من القطب باتجاه اليمين. يلاحظ من الشكل المجاور أن إحداثي النقطة A هما: $(6, 30^\circ)$. تسمى هذه الطريقة نظام الإحداثيات القطبية.



تحويل الإحداثيات القطبية إلى إحداثيات ديكارطية: لتحويل الإحداثيات القطبية إلى إحداثيات ديكارتية، أرسم عموداً من النقطة التي يراد تحويل إحداثيّها إلى المحور الأفقي، ثم أستعمل النسب المثلثية لحساب طولي ضلعي المثلث الناتج، كما في الشكل المجاور، للحصول على الإحداثيين x و y لتلك النقطة. للتحويل من النظام الديكارتي إلى النظام القطبي، أجد قيمة كل من r و θ بطريقة عكسية، وذلك باستعمال النسب المثلثية.

خطوات تنفيذ المشروع:

١ أستعمل مسطرة وفرجاراً لرسم نسخة مكبرة للمستوى القطبي أعلاه، محدداً عليه موقع 6 نقاط تمثل رؤوس سداسي منتظم، ثم أجد إحداثياتها القطبية (r, θ) ، والديكارتية (x, y) .

٢ أصلب بين النقاط الستة بلون مختلف، ثم أستعمل قانون المسافة بين نقطتين لإيجاد محيط الشكل السداسي.

عرض النتائج:

أصمّ مع أفراد مجموعتي مجلة أو لوحة تتضمن ما يأتي:

- خطوات تنفيذ المشروع موضحة بالصور والرسوم.

- وصف لتطبيق حيّاً تُستعمل فيه الإحداثيات القطبية.

الدرس

1

النسب المثلثية

Trigonometric Ratios

فكرة الدرس

تعرف الوضع القياسي للزاوية، وربط النسب المثلثية بدائرة الوحدة، وإيجادها للزوايا الرباعية، وإيجاد النسبتين المثلثتين الأساسيةين الباقيتين في حال معرفة إحدى النسب المثلثية الأساسية للزاوية.



المصطلحات




مسألة اليوم



صلع الابتداء، صلع الانتهاء، الوضع القياسي، دائرة الوحدة، الزاوية الرباعية.

تعلمت سابقاً إيجاد النسب المثلثية لزوايا حادة، مثل النسب بين أطوال أضلاع المثلث قائم الزاوية. ولكن، كيف يمكن إيجاد النسب المثلثية لزاوية أكبر من 90° ، مثل الزاوية بين شفرات مروحة توليد الطاقة الكهربائية؟


الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نقطة البداية نفسها. والنقطة المشتركة تُعرف برأسِ الزاوية، أما الشعاعان فيُسمى أحدهما **صلع الابتداء** (initial side)، والآخر **صلع الانتهاء** (terminal side). يوجد قياسان لأي زاوية؛ أحدهما موجب عندما يدور صلع الانتهاء عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، والآخر سالب حين يدور صلع الانتهاء مع اتجاه حركة عقارب الساعة.




إرشاد

اتجاه حركة عقارب الساعة.
عكس حركة عقارب الساعة.

تكون الزاوية المرسومة في المستوى الإحداثي في **الوضع القياسي** (standard position) إذا كان رأسها عند نقطة الأصل $(0, 0)$ ، وصلع ابتدائهما مُنطبقاً على محور x الموجب.



زاوية ليست في وضع قياسي.




زاوية في وضع قياسي.

مثال 1


أُحدّد إذا كانت الزوايا الآتىان في وضع قياسي أم لا، مُبيّنا السبب:

1



الزاوية AOB ليست في وضع قياسي؛ لأنَّ ضلع ابتدائهما لا ينطبق على محور x الموجب.

2




الزاوية COD في وضع قياسي؛ لأنَّ ضلع ابتدائهما ينطبق على محور x الموجب، ورأسها على نقطة الأصل O .


أتحقق من فهمي

أُحدّد إذا كانت الزوايا الآتىان في وضع قياسي أم لا، مُبيّنا السبب:


1



2




إذا دارَ ضلُعُ انتهاءِ زاويةٍ في الوضعِ القياسيِّ دورَةً كاملَةً عكَسَ اتجاهَ حركةِ عقاربِ الساعَةِ، فإنَّهُ يصنُّ زوايا قياسُها بينَ 0° و 360° . وإذا استمرَّ في دورانِه، فإنَّهُ يصنُّ زوايا قياسُها أكبرُ من 360° .



مثال 2


أرسمُ في الوضعِ القياسيِّ الزاويةَ المعطى قياسُها في ما يأتي، مُحدّداً مكانَها:

1 130°



أرسمُ المحورَينِ الإحداثيَّينِ، ومنْ نقطةِ الأصلِ أرسمُ ضلُعَ الابتداءِ مُنطَقِّاً على محورِ x الموجِّب، ثُمَّ أضعُ مرْكَزَ المُنْقلَةِ على نقطَةِ الأصلِ، وتدريجَ المُنْقلَةِ 0° على ضلُعِ الابتداءِ، ثُمَّ أُعِينُ نقطَةَ مقابلَ التدريجِ 130° . بعدَ ذَلِكَ أرسمُ ضلُعَ انتهاءِ منْ نقطَةِ الأصلِ إلى النقطَةِ التي عيَّنْتها، فَاجِدُ أنَّ ضلُعَ انتهاءِ الزاويةِ يقعُ في الربعِ الثاني.

2 580°



بما أنَّ $220^\circ + 360^\circ = 580^\circ$ ، فإنَّ ضلُعَ انتهاءِ الزاويةِ 580° هو نفسُهُ ضلُعُ انتهاءِ الزاويةِ 220° الذي يقعُ في الربعِ الثالثِ.


إرشادٌ

المُنْقلَةُ ذاتُ شَكْلِ نصفِ الدائِرَةِ لها تدريجٌ مُنْعَكِسٌ، يبدأُ كُلُّ مِنْهُما من 0° ، ويَتَهَيَّى عندَ 180° ؛ لذا يجُبُ دائمًا وضعُ التدريجِ على ضلُعِ الابتداءِ الزاويَّةِ عندَ قياسِها، أو رسمِها.

أتحققُ منْ فهُمي

أرسمُ زاويةً قياسُها 460° في الوضعِ القياسيِّ، مُحدّداً مكانَها.

دائرة الوحدة (unit circle) هي دائرة مرکزها نقطة الأصل، وطول نصف قطرها وحدة واحدة. فإذا رسمت الزاوية θ في الوضع القياسي، فإن ضلع انتهائها يقطع دائرة الوحدة في نقطة وحيدة هي $P(x, y)$. ومع تغيير قياس الزاوية يتغير موقع النقطة P على الدائرة، وتغيير إحداثياتها.



يمكن تعريف النسب المثلثية الأساسية للزاوية θ بدالة إحداثي P كما يأتي:

$$\sin \theta = \frac{y}{1} = y$$

$$\cos \theta = \frac{x}{1} = x$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}, x \neq 0$$

لغة الرياضيات

الحرف اليوناني θ يقرأ: ثيتا، وهو يستعمل للدلالة على قياس الزاوية.

رموز رياضية

يدل الرمز $\sin \theta$ على نسبة جيب الزاوية θ ، والرمز $\cos \theta$ على نسبة جيب التمام، والرمز $\tan \theta$ على نسبة ظل الزاوية θ .

مثال 3

أجد النسب المثلثية الأساسية للزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي، التي يقطع ضلع انتهائها دائرة الوحدة في النقطة الواردة في ما يأتي:

1) $P(-0.6, 0.8)$

$$\sin \theta = y = 0.8, \quad \cos \theta = x = -0.6, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{0.8}{-0.6} = -\frac{4}{3}$$

2) $P\left(\frac{5}{13}, -\frac{12}{13}\right)$

$$\sin \theta = y = -\frac{12}{13}, \quad \cos \theta = x = \frac{5}{13}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{-12/13}{5/13} = -\frac{12}{5}$$

إرشاد

النسب المثلثية الأساسية $\sin \theta$ هي: $\cos \theta$ ، و $\tan \theta$.

أتحقق من فهمي

أجد النسب المثلثية الأساسية للزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي، التي يقطع ضلع انتهائها دائرة الوحدة عند النقطة


$$P\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

عند رسم الزاوية θ في الوضع القياسي، قد يقع ضلع انتهائهما في أحد الأرباع الأربع، فيقال عندئذ إنَّ الزاوية θ واقعة في الربع كذا، وقد ينطبق ضلع انتهائهما على أحد المحورين الإحداثيين، فتسمى الزاوية θ في هذه الحالة زاوية ربعية (quadrantal angle).

الزوايا الربعية

مفهوم أساسي

الزوايا الربعية في دائرة الوحدة:



يمكن تحديد النسب المثلثية للزوايا الربعية من إحداثيات نقاط تقاطع دائرة الوحدة مع المحورين الإحداثيين. فمثلاً، يتقاطع ضلع انتهاء الزاوية 90° في الوضع القياسي مع دائرة الوحدة في النقطة $P(0, 1)$. وبذلك، فإن: $\sin 90^\circ = 1$, $\cos 90^\circ = 0$, ويكون $\tan 90^\circ$ غير معروف لأنَّه لا تجور القسمة على صفر.

مثال 4

أين يقطع ضلع انتهاء الزاوية التي قياسُها 180° دائرة الوحدة إذا رسمت في الوضع القياسي؟
أحد النسب المثلثية الأساسية لها.

يقطع ضلع انتهاء الزاوية التي قياسُها 180° دائرة الوحدة في النقطة $C(-1, 0)$ ، إذن:

$$\sin 180^\circ = y = 0, \quad \cos 180^\circ = x = -1, \quad \tan 180^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{-1} = 0$$

أتحقق من فهمي

أحد النسب المثلثية الأساسية للزوايا 270° و 360° على الترتيب.

الوحدة 3

إذا كانت θ زاوية حادة، فإنه يمكن رسم مثلث قائم الزاوية تكون θ إحدى زواياه.

$$(AB)^2 + (BC)^2 = (AC)^2$$


نظريّة فيثاغورس

$$\frac{(BC)^2}{(AC)^2} + \frac{(AB)^2}{(AC)^2} = \frac{(AC)^2}{(AC)^2}$$

بقسمة الطرفين على $(AC)^2$

$$\left(\frac{BC}{AC}\right)^2 + \left(\frac{AB}{AC}\right)^2 = 1$$


بتطبيق قوانين الأسس



$$(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 = 1$$

بالتعریض

تظل هذه النتيجة صحيحة بقطع النظر عن قياس الزاوية θ ، وهي تستعمل لإيجاد إحدى هاتين النسبتين إذا علمت الأخرى ولكن يجب مراعاة إشارات النسب المثلثية؛ فهي تختلف بحسب الربع الذي يقع فيه ضلع انتهاء الزاوية في الوضع القياسي كما هو موضح في الشكل المجاور.



مثال 5

أجد قيمة النسبتين الأساسيةين الباقيتين إذا كان:

$$\sin \theta = -\frac{1}{5}, \text{ وقع ضلع انتهاء } \theta \text{ في الوضع القياسي في الربع الثالث.} \quad 1$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

نتيجة لنظرية فيثاغورس

$$\cos^2 \theta + \left(-\frac{1}{5}\right)^2 = 1$$

بتعويض قيمة $\sin \theta$

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25}$$

بطرح $\frac{1}{25}$ من الطرفين

$$\cos \theta = \pm \frac{\sqrt{24}}{5}$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{24}}{5}$$

في الربع الثالث يكون $\cos \theta$ سالبا

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-1/5}{-\sqrt{24}/5} = \frac{1}{\sqrt{24}}$$

$\tan \theta = -3.5$ 2 ، وقع ضلع انتهاء θ في الوضع القياسي في الربع الثاني.

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -3.5$$

$$\sin \theta = -3.5 \cos \theta$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$\cos^2 \theta + (-3.5 \cos \theta)^2 = 1$$

$$\cos^2 \theta + 12.25 \cos^2 \theta = 1$$

$$13.25 \cos^2 \theta = 1$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{13.25}$$

$$\cos \theta = \pm \sqrt{\frac{1}{13.25}} \approx \pm 0.2747$$

$$\cos \theta = -0.2747$$

$$\sin \theta = -3.5 \times -0.2747$$

$$= 0.96145 \approx 0.96$$

بالتعويض

بضرب الطرفين في $\cos \theta$

نتيجةً لنظرية فيثاغورس

بتعويض قيمة $\sin \theta$

بالتربيع

بالتبسيط

بقسمة الطرفين على 13.25

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، واستعمال الآلة الحاسبة

في الربع الثاني يكون $\cos \theta$ سالباً

بتعويض قيمة $\cos \theta$



برع عالم الفلك والرياضيات المسلمين محمد بن جابر الباتاني في علم المثلثات، واكتشف العديد من العلاقات المهمة بين النسب المثلثية، مثل:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

أتحقق من فهمي

أجد قيمة كل من $\sin \theta$ و $\tan \theta$ إذا كان $\cos \theta = 0.8$ و θ في الوضع القياسي في الربع الرابع.

أتدرب وأحل المسائل

أرسم الزوايا الآتية في الوضع القياسي:

1 225°

2 160°

3 330°

4 240°

5 285°

6 75°

7 100°

8 265°

أحدد الربع الذي يقع فيه ضلع انتهاء كل زاوية مما يأتي إذا رسمت في الوضع القياسي:

الوحدة 3

أُحدِّد الربع (أو الأرباع) الذي يقع فيه ضلُعُ انتهاء الزاوية θ في الوضع القياسي إذا كانَ:

9) $\sin \theta > 0$

10) $\cos \theta > 0$

11) $\tan \theta < 0$

12) $\sin \theta < 0$ و $\cos \theta < 0$

أُحدِّد الربع (أو الأرباع) الذي يقع فيه ضلُعُ انتهاء الزاوية θ في الوضع القياسي إذا كانَ:

13) $\sin \theta = -0.7$

14) $\tan \theta = 2$

15) $\cos \theta = -\frac{1}{2}$

16) $\tan \theta = -1$

17) $\cos \theta = 0.45$

18) $\sin \theta = 0.55$

19) $\sin \theta = 0.3$, $\cos \theta < 0$ 20) $\tan \theta = -4$, $\sin \theta > 0$

أَجِد النسب المثلثية الأساسية للزاوية θ إذا قطع ضلُعُ انتهائِها في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقاط الآتية:

21) $P(0, -1)$

22) $P(0.5, 0.5\sqrt{3})$

23) $P\left(\frac{-8}{17}, \frac{15}{17}\right)$

24) $P\left(\frac{20}{29}, \frac{-21}{29}\right)$

أَجِد النسب المثلثية الأساسية الباقيَين في الحالات الآتية:

25) $\sin \theta = \frac{3}{4}$, $90^\circ < \theta < 180^\circ$

26) $\tan \theta = 0.78$, $-1 < \sin \theta < 0$

27) $\cos \theta = -0.75$, $\tan \theta < 0$

28) $\sin \theta = -0.87$, $270^\circ < \theta < 360^\circ$

مهارات التفكير العليا



29) **تبرير:** ما أكبر قيمة لجيب الزاوية؟ ما أصغر قيمة له؟ أبُرِّرُ إجابتي.

30) **اكتشف الخطأ:** حل كل من أمجد وزينة المسألة الآتية. إذا كان $\tan x = 0.75$ ، وكانت x بين 180° و 360° ، فما

قيمة $\sin x + \cos x$ ؟

زينة:

$$\sin x + \cos x = -1.4$$

أمجد:

$$\sin x + \cos x = 0.2$$

أُحدِّد أيهما كانت إجابته صحيحةً، مُبِّرِّرًا إجابتي.

الدرس


2

النسبة المثلثية للزوايا ضمن الدورة الواحدة

Trigonometric Ratios for Angles between 0° and 360°

إيجاد النسبة المثلثية الأساسية لأي زاوية بين 0° و 360° ، وإيجاد الزاوية إذا عرفت إحدى نسبها المثلثية.

فكرة الدرس



الزاوية المرجعية، معكوس النسبة المثلثية.

المصطلحات



دار ضلع انتهاء زاوية قياسها 60° في الوضع القياسي بزاوية 150° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. كيف نجد إحداثي نقطة تقاطع ضلع الانتهاء مع دائرة الوحدة في موقعه الجديد؟

مسألة اليوم



تعرّفنا في الدرس السابق كيفية إيجاد النسبة المثلثية لزاوية مرسومة في الوضع القياسي باستخدام إحداثي نقطة تقاطع ضلع انتهاءها مع دائرة الوحدة، وستعرّف في هذا الدرس كيف نجد النسبة المثلثية إذا علم قياس الزاوية بالدرجات.

إذا وقع ضلع انتهاء الزاوية θ في الربع الأول (أي كانت $90^\circ < \theta < 0^\circ$ ، فإنه يمكن إيجاد النسبة المثلثية لهذه الزاوية باستخدام الآلة الحاسبة، أو بما نحفظه من نسبة مثلثية للزوايا الخاصة: $(30^\circ, 45^\circ, 60^\circ)$.

النسبة المثلثية للزوايا الخاصة

مراجعة المفاهيم


θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	غير معروف

الوحدة 3

أما إذا وقع ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي في أيٍ من الأرباع الثلاثة الأخرى، فإنَّ نسبتها المثلثية تكون مُرتبطةً بالنسبة المثلثية للزاوية المرجعية θ' (reference angle)، وهي الزاوية الحادة الممحصورة بين ضلع انتهاء الزاوية θ والمحور x .

الزاوية المرجعية

مفهوم أساسٍ



النسب المثلثية للزاوية θ تساوي النسب المثلثية لزاوتها المرجعية θ' مع اختلاف الإشارة أحياناً بحسب الربع الذي يقع فيه ضلع انتهاء الزاوية θ .

لإيجاد النسب المثلثية لأي زاوية θ ، فإننا نتَّبع الخطوات الثلاث الآتية:

الخطوة 1: إيجاد الزاوية المرجعية θ' .

الخطوة 2: إيجاد النسبة المثلثية للزاوية المرجعية θ' .

الخطوة 3: تحديد إشارة النسبة المثلثية للزاوية θ بحسب الربع الذي يقع فيه ضلع انتهائِها.

آنذاك

الربع الثاني	الربع الأول
$\sin \theta$ +	$\sin \theta$ +
$\cos \theta$ -	$\cos \theta$ +
$\tan \theta$ -	$\tan \theta$ +

الربع الثالث	الربع الرابع
$\sin \theta$ -	$\sin \theta$ -
$\cos \theta$ -	$\cos \theta$ +
$\tan \theta$ +	$\tan \theta$ -

مثال 1

أَجِدْ قِيمَةَ كُلِّ مَمَّا يَأْتِي:

1 $\sin 150^\circ$

يَقُوْ ضَلْعُ الْأَنْتَهَى لِلْزاوِيَّة 150° فِي الْرَّبِيعِ الثَّانِي؛ لِذَلِكَ أَسْتَعْمَلُ زَاوِيَّةَ الْمَرْجِعِيَّة:

$$\begin{aligned}\theta' &= 180^\circ - \theta \\ &= 180^\circ - 150^\circ \\ &= 30^\circ\end{aligned}$$


إِيجَادُ قِيَاسِ الزَّاوِيَّةِ الْمَرْجِعِيَّةِ

$$\theta = 150^\circ$$

بِالْتَّبَسِيرِ

$$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = 0.5$$

الْجَيْبُ مُوجَّبٌ فِي الْرَّبِيعِ الثَّانِي



2 $\cos 225^\circ$

يَقُوْ ضَلْعُ الْأَنْتَهَى لِلْزاوِيَّة 225° فِي الْرَّبِيعِ الثَّالِث؛ لِذَلِكَ نَسْتَعْمَلُ زَاوِيَّةَ الْمَرْجِعِيَّةَ:

$$\begin{aligned}\theta' &= \theta - 180^\circ \\ &= 225^\circ - 180^\circ \\ &= 45^\circ\end{aligned}$$

إِيجَادُ قِيَاسِ الزَّاوِيَّةِ الْمَرْجِعِيَّةِ


$$\theta = 255^\circ$$

بِالْتَّبَسِيرِ

$$\cos 225^\circ = -\cos 45^\circ$$

جَيْبُ التَّمَامِ سَالِبٌ فِي الْرَّبِيعِ الثَّالِث

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}}$$



3 $\tan 300^\circ$

يَقُوْ ضَلْعُ الْأَنْتَهَى لِلْزاوِيَّة 300° فِي الْرَّبِيعِ الرَّابِع؛ لِذَلِكَ نَسْتَعْمَلُ زَاوِيَّةَ الْمَرْجِعِيَّةَ:

$$\begin{aligned}\theta' &= 360^\circ - \theta \\ &= 360^\circ - 300^\circ \\ &= 60^\circ\end{aligned}$$

إِيجَادُ قِيَاسِ الزَّاوِيَّةِ الْمَرْجِعِيَّةِ


$$\theta = 300^\circ$$

بِالْتَّبَسِيرِ

$$\tan 300^\circ = -\tan 60^\circ$$

الظُّلُّ سَالِبٌ فِي الْرَّبِيعِ الرَّابِع

$$= -\sqrt{3}$$



أتحقق من فهمي

أَجِدُّ قيمةَ كُلّ مَمَّا يَأْتِي:

- a) $\sin 120^\circ$ b) $\tan 240^\circ$
 c) $\cos 315^\circ$ d) $\sin 210^\circ$

جميعُ الزوايا في المثالِ السابِق مُرتبطةُ بزوايا مرجعيةٍ مأْلوفةٍ، مثلٌ: 30° , 45° , 60° , وَهِيَ زوايا خاصَّةٌ عرَفْنَا قِيمَ النسِبِ المثلثيةَ لِهَا. وَلَكِنْ، كَيْفَ نَجُدُ النسِبَ المثلثيةَ لِأيِّ زواياٍ أُخْرَى؟

يُمْكِنُ إِيجادُ النسِبَةِ المثلثيةَ لِلزاوِيَةِ المَرْجِعِيَّةِ باسْتِعْمَالِ الْآلَةِ الحاسِبَةِ، ثُمَّ تَحْدِيدُ الإِشَارةِ الْمُنَاسِبَةِ تَبَعًا لِلرِّبعِ الَّذِي يَقُعُ فِيهِ ضلَّعُ اِنْتِهَاءِ الزاوِيَةِ.

انتبه

يُجْبِي ضَبْطُ الْآلَةِ الحاسِبَةِ عَلَى خِيَارِ درَجَاتِ (DEGREES) قَبْلَ استِعْمَالِهَا. أَسْأَلُ مُعَلِّمِي / مُعَلِّمِي.

مثال 2

أَجِدُّ قيمةَ كُلّ مَمَّا يَأْتِي باسْتِعْمَالِ الْآلَةِ الحاسِبَةِ، مُقْرَبًا إِيجابِيًّا إِلَى أَقْرَبِ ثلَاثِ منازلٍ عَشْرِيَّةٍ:

1 $\sin 255^\circ$

يَقُعُ ضلَّعُ اِنْتِهَاءِ لِلزاوِيَةِ 255° فِي الْرِّبَعِ الثَّالِثِ؛ لَذَا أَسْتِعْمَلُ زَاوِيَّهَا المَرْجِعِيَّةَ:

$$\theta' = \theta - 180^\circ$$

إِيجادُ قِيَاسِ الزاوِيَةِ المَرْجِعِيَّةِ

$$\theta' = 255^\circ - 180^\circ$$

$$\theta = 255^\circ$$

$$= 75^\circ$$

بِالتبسيطِ

$$\sin 255^\circ = -\sin 75^\circ$$

الجيُّبُ سالِبٌ فِي الْرِّبَعِ الثَّالِثِ

وَالآنَ، أَسْتِعْمَلُ الْآلَةِ الحاسِبَةِ لِإِيجادِ $\sin 75^\circ$ كَمَا يَأْتِي:

أَضْغَطُ عَلَى مَفْتَاحِ \sin ، ثُمَّ أَدْخِلُ القيمةَ 75 ، ثُمَّ أَضْغَطُ عَلَى مَفْتَاحِ $=$ ، فَتَظَهُرُ التَّيْجَةُ:

sin 7 5 = 0.965925826

بِالتَّقْرِيبِ إِلَى ثلَاثِ منازلٍ عَشْرِيَّةٍ، تَكُونُ التَّيْجَةُ: 0.966

إِذْنُ، $\sin 255^\circ \approx 0.966$

يمكن أيضًا إيجاد $\sin 255^\circ$ مباشرةً باستعمال الآلة الحاسبة من دون إيجاد الزاوية المرجعية على النحو الآتي :

أضغط على مفتاح \sin ، ثم أدخل القيمة 255 ، ثم أضغط على مفتاح $=$ ، فظهور النتيجة :

$\sin \ 2 \ 5 \ 5 \ = \ -0.965925826$

بالتقريب إلى ثلاث منازل عشرية، تكون النتيجة -0.966 ، وهي النتيجة نفسها التي توصلت إليها آنفًا.

2 $\tan 168^\circ$

أضغط على مفتاح \tan ، ثم أدخل القيمة 168 ، ثم أضغط على مفتاح $=$ ، فظهور النتيجة :

$\tan \ 1 \ 6 \ 8 \ = \ -0.212556561$

بالتقريب إلى ثلاث منازل عشرية، تكون النتيجة -0.213

إذن، $\tan 168^\circ \approx -0.213$

أتحقق من فهمي

أجد قيمة كل مما يأتي باستعمال الآلة الحاسبة، مقرًّا إجابتي إلى أقرب ثلاث منازل عشرية:

a) $\sin 320^\circ$

b) $\cos 175^\circ$

c) $\tan 245^\circ$

يمكن استعمال الآلة الحاسبة لإيجاد قياس أي زاوية حادة (في الربع الأول) علّمت إحدى نسبيها المثلثية، وذلك باستعمال **معكوس النسبة المثلثية** (inverse trigonometric ratio). فإذا علّم جيب الزاوية استعمل معكوس الجيب (\sin^{-1})، وإذا علّم جيب تمام الزاوية استعمل معكوس جيب تمام (\cos^{-1})، وإذا علّم ظل الزاوية استعمل معكوس ظل (\tan^{-1}). وبالطريقة نفسها، يمكن إيجاد قياس أي زاوية في الأربع الباقيه باستعمال مفهوم الزاوية المرجعية وإشارات النسب المثلثية في الأربع الاربعه.

لغة الرياضيات

- نقرأ معكوس الجيب .sine inverse

- نقرأ معكوس جيب تمام .cosine inverse

- نقرأ معكوس ظل .tan inverse

مثال 3

أَحِدُ قِيمَةَ (أَوْ قِيمَ) θ فِي مَا يَأْتِي، عَلَمًا بِأَنَّ $360^\circ \leq \theta \leq 0^\circ$ ، مُقْرَبًا إِجَابِيًّا إِلَى أَقْرَبِ عُشْرِ درَجَةٍ:

1 $\sin \theta = 0.98$

$$\theta = \sin^{-1}(0.98)$$

θ هي الزاوية التي نسبة الجيب لها 0.98

وَالآن، أَسْتَعْمَلُ الْآلَةِ الْحَاسِبَةَ لِإِيجَادِ $\sin^{-1}(0.98)$ كَمَا يَأْتِي:

SHIFT sin 0 . 9 8 = 78.521659

وَبِالتَّقْرِيبِ إِلَى أَقْرَبِ عُشْرِ درَجَةٍ، تَكُونُ النَّتِيْجَةُ: 78.5° ، وَهِيَ زَاوِيَّةٌ مَرْجِعِيَّةٌ لِزاوِيَّةٍ أُخْرَى؛ لَأَنَّهَا تَقْعُدُ فِي الْرِّبِيعِ الْأَوَّلِ. وَبِمَا أَنَّ الجَيْبَ مُوجَبٌ فِي رَبِيعَيْنِ (الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَقْطُهُ)، فَإِنَّ الزَّاوِيَّةَ الْأُخْرَى θ تَكُونُ فِي الْرِّبِيعِ الثَّانِي، وَيُمْكِنُ إِيجَادُهَا بِاستِعْمَالِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الزَّاوِيَّةِ الْمَرْجِعِيَّةِ وَالزاوِيَّةِ الْمَنَاظِرَةِ فِي الْرِّبِيعِ الثَّانِي الَّتِي تَعْرَفُهَا آنَّفًا.

$$\theta' = 180^\circ - \theta$$

العلاقة بين الزاوية المرجعية والزاوية

المناظرة في الربع الثاني

$$\theta' = 78.5^\circ$$

$$78.5^\circ = 180^\circ - \theta$$

$$\theta = 101.5^\circ$$

بِحَلِّ الْمَعَادِلَةِ

$$\theta = 101.5^\circ, \theta = 78.5^\circ$$

2 $\tan \theta = -1.2$

$$\theta = \tan^{-1}(-1.2)$$

θ هي الزاوية التي نسبة الظل لها تساوي -1.2

وَالآن، أَسْتَعْمَلُ الْآلَةِ الْحَاسِبَةَ لِإِيجَادِ $\tan^{-1}(-1.2)$ كَمَا يَأْتِي:

SHIFT tan 1 . 2 = 50.1944289

أَفْكِرْ

أَتَجَاهُلُّ إِلَيْسَارَةَ السَّالِبَةِ.

لِمَاذَا؟

وَبِالتَّقْرِيبِ إِلَى أَقْرَبِ عُشْرِ درَجَةٍ، تَكُونُ النَّتِيْجَةُ: 50.2° ؛ وَلَأَنَّ الظلَّ يَكُونُ سَالِبًا فِي رَبِيعَيْنِ (الثَّانِي وَالرَّابِعُ)؛ فَإِنَّ الزَّاوِيَّةَ 50.2° لَيَسَّرُ مِنَ الْحَلُولِ، وَإِنَّمَا زَاوِيَّةٌ مَرْجِعِيَّةٌ لَهَا.

إذا استعملنا العلاقة بين الزاوية المرجعية والزوايا الم対اظرة في الربعين الثاني والرابع، فإننا

سنجد هاتين الزاويتين:

$$\text{زاوية الربع الثاني: } 180^\circ - 50.2^\circ = 129.8^\circ$$

$$\text{زاوية الربع الرابع: } 360^\circ - 50.2^\circ = 309.8^\circ$$

أتحقق من فهمي

أحد قيمة (أو قيم) θ في كل مما يأتي، علمًا بأن $360^\circ \leq \theta \leq 0^\circ$ ، مقاربًا إجابتي إلى أقرب

عشر درجة:


a) $\cos \theta = -0.4$

b) $\tan \theta = 5.653$

c) $\sin \theta = -0.5478$

مثال 4: من الحياة

نوعي: يمثل الشكل الآتي ناعورة ماء تدور بسرعة ثابتة، وتمثل S في الشكل أخفض نقطة تبلغها الناعورة تحت الماء، في حين تمثل النقطة O مركز الناعورة. إذا دارت الناعورة بزاوية θ ، فإن ارتفاع صندوق الماء الذي موقعه النقطة A عن أخفض نقطة تبلغها الناعورة يعطى بالعلاقة: $h = 7.5 - 7.5 \cos \theta$ حيث h الارتفاع بالأمتار. أجد طول قطر الناعورة.



عندما يصل الصندوق إلى النقطة الواقعة فوق S مباشرةً، فإن ارتفاعه عن أخفض موقع له يساوي طول قطر الناعورة، ويكون قياس θ في تلك اللحظة 180° :

$$h = 7.5 - 7.5 \cos 180^\circ$$

بتعويض قيمة θ

$$= 7.5 - 7.5 (-1)$$

$$\cos 180^\circ = -1$$

$$= 7.5 + 7.5 = 15$$

بالتبسيط

إذن، طول قطر الناعورة هو: 15 m

أتحقق من فهمي

أحد ارتفاع صندوق الماء الذي موقعه النقطة A عندما تصبح 235°



الناعورة آلة مائية دائريّة تحرّك بفعل جريان مياه الأنهار، وترفع الماء بوساطة صناديق إلى حوضٍ علويٍّ، فينساب في قنوات نحو البساتين على ضفة النهر.



أَجِدْ قِيمَةَ كُلِّ مَمَّا يَأْتِي:

1 $\cos 270^\circ$

2 $\tan 120^\circ$

3 $\tan 315^\circ$

أَجِدْ قِيمَةَ كُلِّ مَمَّا يَأْتِي بِاستِعْمَالِ الْآلَةِ الْحَاسِبَةِ، مُقْرَبًا إِجَابَتِي إِلَى أَقْرِبِ ثَلَاثِ مَنَازِلِ عَشْرِيَّةٍ:

4 $\sin 130^\circ$

5 $\sin 325^\circ$

6 $\cos 250^\circ$

أَجِدْ فِي مَا يَأْتِي زَوْاِيَّةً ثَانِيَّةً بَيْنَ 0° وَ 360° ، لَهَا نَسْبَةُ الْجِيَبِ نَفْسُهَا، مُثَلَّ الزَّوْاِيَّةِ الْمُعْطَى:

7 325°

8 84°

9 245°

أَجِدْ فِي مَا يَأْتِي زَوْاِيَّةً ثَانِيَّةً بَيْنَ 0° وَ 360° ، لَهَا نَسْبَةُ الْجِيَبِ التَّامِ نَفْسُهَا، مُثَلَّ الزَّوْاِيَّةِ الْمُعْطَى:

10 280°

11 150°

12 215°

أَجِدْ فِي مَا يَأْتِي زَوْاِيَّةً ثَانِيَّةً بَيْنَ 0° وَ 360° ، لَهَا نَسْبَةُ الظِّلِّ نَفْسُهَا، مُثَلَّ الزَّوْاِيَّةِ الْمُعْطَى:

13 75°

14 300°


15 235°

أَجِدْ فِي مَا يَأْتِي قِيمَةً (أُوْ قِيمَ) θ ، عَلَمًا بِأَنَّ $360^\circ \leq \theta \leq 0^\circ$ ، مُقْرَبًا إِجَابَتِي إِلَى أَقْرِبِ عَشْرِ درَجَةٍ (إِنْ لَرَمْ):

16 $\sin \theta = 0.55$

17 $\cos \theta = -0.05$

18 $\tan \theta = 0$



19 **تر فيه:** يُمثِّلُ الشَّكْلُ الْأَتَى دُولَابًا دَوَارًا فِي مَدِينَةِ الْعَابِ يَدْوَرُ بِسَرْعَةٍ ثَابِتَةٍ، وَتُمَثِّلُ S فِي الشَّكْلِ نَقْطَةً صَعُودِ الرَّاكِبِ الَّذِي مَوْقِعُهُ الْآنَ عَنْ النَّقْطَةِ A ، فِي حِينِ نُمَثِّلُ النَّقْطَةَ O مَرْكَزَ الدَّوَلَابِ. إِذَا دَارَ الدَّوَلَابُ بِزَوْاِيَّةِ θ ، فَإِنَّ ارْتِفَاعَ الرَّاكِبِ عَنِ الْأَرْضِ (h) بِالْأَمْتَارِ يُعْطَى بِالْعَلَاقَةِ: $h = 12.5 - 12.5 \cos \theta = 12.5 - 12.5 \cos 345^\circ$. أَجِدْ ارْتِفَاعَ الرَّاكِبِ عَنِ سَطْحِ الْأَرْضِ عَنْدَمَا تَصْبُحُ $\theta = 345^\circ$.

20 أَحْلُّ الْمَسَأَلَةِ الْوَارَدَةَ فِي بَدَائِيَّةِ الْدَّرَسِ.

مهارات التفكير العليا



21 **تحدّ:** أَجِدْ مَجْمُوعَةَ قِيمِ θ الَّتِي تَجْعَلُ الْمَتَبَاينَةَ الْأَتَى صَحِيَّةً، عَلَمًا بِأَنَّ $90^\circ < \theta < 180^\circ$:

$$\cos \theta + \sin \theta < 0$$

22 **اكتشفُ الخطأً:** حَسِبَتْ سَنَدَسُ نَسْبَةَ جِيَبِ إِحْدَى الزَّوَالِيَّاتِ فِي الْرَّبِيعِ الثَّانِي، فَكَانَتْ قِيمَتُهَا 1.4527.

هُلْ إِجَابَةُ سَنَدَسَ صَحِيَّةً؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

23 **تَبَرِّرُ:** أَجِدْ قِيمَةَ مَا يَأْتِي، مُبَرِّرًا إِجَابَتِي:

$$\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \dots + \cos 357^\circ + \cos 358^\circ + \cos 359^\circ + \cos 360^\circ$$

تمثيل الاقترانات المثلثية

Graphing Trigonometric Functions

فكرة الدرس



مسألة اليوم



تمثيل اقترانات مثلثية مجالها الفترة $[0^\circ, 360^\circ]$ بيانياً.

يرتبط عمق الماء عند نقطة معينة في أحد الموانئ بالزمن حسب العلاقة:

$$y = \sin x, x \geq 0$$



حيث: y عمق الماء بالأمتار، و x الزمن بالساعات بعد منتصف الليل. هل يمكن رسم منحنى يبين تغير عمق الماء في الميناء مع مرور الوقت؟

تُستخدم الاقترانات المثلثية في تمثيل مواقف حياتية مرتبطة بالحركة الدورية، مثل: موجات الصوت، وضغط الدم في جسم الإنسان، وارتفاع معد في دولاب دوار، وتغيير عدد ساعات النهار خلال عام، وغير ذلك. ولكن، هل يمكن رسم منحنى اقتران يبين كيف تبدو الحركة الدورية التي تمثلها هذه الاقترانات؟

تعلمت سابقاً كيفية تمثيل اقترانات خطية وتربيعية في المستوى الإحداثي بإنشاء جدول قيم للمتغيرين x و y ، وتمثيل كل زوج (x, y) بنقطة في المستوى، ثم رسم المنحنى الذي يصل هذه النقاط بعضها. وفي هذا السياق، يمكن اتباع الطريقة نفسها لتمثيل الاقترانات المثلثية.

مثال 1

أرسم منحنى كل من الاقترانين الآتيين ثم أصفه، علماً بأن $360^\circ \leq x \leq 0^\circ$:


1 $y = \sin x$

الخطوة 1: أكون جدولأً أكتب فيه زوايا شائعة، نسبها المثلثية معروفة، مثل: الزوايا الرباعية، والزوايا التي زاويتها المرجعية 30° .

الخطوة 2: أجد قيمة $\sin x$ لكل زاوية x ، ثم أكتبها في الجدول:

x	0°	30°	90°	150°	180°	210°	270°	330°	360°
$y = \sin x$	0	0.5	1	0.5	0	-0.5	-1	-0.5	0

الخطوة 3: أُعِينُ الأزواج المُرتبَة: $(0^\circ, 0), (30^\circ, 0.5), (90^\circ, 1), \dots, (360^\circ, 0)$



في المستوى الإحداثي.

الخطوة 4: أَصْلُ بمنحنى أَمْلَسَ بَيْنَ النَّقَاطِ، فَيَتَّسِعُ رَسْمُ كَمَا في الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ.

من التمثيل البياني لاقتران $\sin x$ ، أَلْاحِظُ أَنَّ:

أَفَكُرُ

ما العلاقة بين منحنى اقتران الجيب والزايا المرجعية التي تعلّمْتها في الدرس السابق؟

- أَكْبَرَ قِيمَة لاقتران x هي 1، وأَصْغَرَ قِيمَة لَهُ هي -1.
- $\sin x$ يكون موجبا إذا كانت $0^\circ < x < 180^\circ$ ، وسالبا إذا كانت $180^\circ < x < 360^\circ$.


2 $y = \cos x$.

الخطوة 1: أَكْوُنْ جَدَوْلًا أَكْتُبُ فِيهِ زَوْاِيَا شَائِعَةً.

الخطوة 2: أَجِدُّ قِيمَة $\cos x$ لِكُلِّ زَوْاِيَّة x ، ثُمَّ أَكْتُبُهَا فِي الْجَدُولِ:

x	0°	60°	90°	120°	180°	240°	270°	300°	360°
$y = \cos x$	1	0.5	0	-0.5	-1	-0.5	0	0.5	1

الخطوة 3: أُعِينُ الأزواج المُرتبَة: $(0^\circ, 1), (60^\circ, 0.5), (90^\circ, 0), \dots, (360^\circ, 1)$ في المستوى الإحداثي، وأَصْلُ بَيْنَ النَّقَاطِ بمنحنى أَمْلَسَ.



من التمثيل البياني لاقتران $\cos x$ ، أَلْاحِظُ أَنَّ:

- أَكْبَرَ قِيمَة لاقتران $\cos x$ هي 1، وأَصْغَرَ قِيمَة لَهُ هي -1.

إِرْشَادٌ


يُمْكِنُ استعمال برمجية جيوجبرا لتمثيل الاقتران $\cos x$ ، وملاحظة أَكْبَرَ قِيمَة لَهُ، وأَصْغَرَ قِيمَة لَهُ أيضًا.

• يكون موجباً إذا كانت $0^\circ \leq x < 90^\circ$ ، و $270^\circ < x < 360^\circ$ ، و سالباً إذا كانت $90^\circ < x < 270^\circ$.

أتحقق من فهمي

أرسم منحنى الاقتران $y = \sin x$ ، علماً بأن $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ ، مستعملاً زوايا مختلفة عن تلك التي في الجدول السابق، ثم أجد قيمة الجيب لهذه الزوايا باستعمال الآلة الحاسبة.

تعرّفت آنّه توجد زوايا أكبر من 360° . فإذا دار ضلع انتهاء الزاوية (في الوضع القياسي) أكثر من دورة واحدة عكس اتجاه عقارب الساعة، فإنه يكون زوايا أكبر من 360° ، وإذا دار مع اتجاه عقارب الساعة، فإنه يكون زوايا قياسها سالب؛ ولهذا، فقد يكون قياس الزاوية أي عدد حقيقي، علماً بأنّه يمكن تمثيل الاقترانات المثلثية للأعداد الحقيقية جميعها، وليس فقط للزوايا الواقعية بين 0° و 360° . الاحظ منحنى اقتران الجيب الآتي.



كاشف الاهتزاز (الأوسيلسكوب) هو جهاز يرسم جهد الإشارات الإلكترونية على شكل مخطط يُسمى التمثيل البياني لاقتران الجيب، ويُستخدم لاكتشاف أعطال الأجهزة الكهربائية.

والآن، سأرسم منحنى الاقتران $y = \tan x$ ، ملاحظاً الفرق بينه وبين منحنى الاقترانين $\sin x$ و $\cos x$.

مثال 2


أرسم منحنى الاقتران $y = \tan x$ ، ثم أصفه علماً بأن $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$

الخطوة 1: أكون جدولًا، ثم أكتب فيه زوايا شائعة.

الخطوة 2: أجد قيمة $\tan x$ لكل زاوية x ، ثم أكتبها في الجدول:

x	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	360°
$\tan x$	0	1	غير معروف	-1	0	1	غير معروف	-1	0

الخطوة 3: أُعِينُ النقاطَ في المستوى الإحداثيِّ، مُلَاحِظًا صعوبةَ التوصيلِ بينَ النقاطِ بمنحنى واحدٍ؛ لأنَّ قيمةَ $\tan x$ غير مُعرَّفةٍ لزوايتيْنِ 90° و 270° ؛ لذاً أَصْلُ النقاطَ قبلَ الزاويَةِ 90° بعِصْها، والنقطَاتَ بينَ الزاويتيْنِ 90° و 270° بعِصْها، والنقطَاتَ بعدَ الزاويَةِ 270° بعِصْها، فيتَّسِعُ رسمُ كُمَا في الشكِيلِ الآتِي.



يُبَيِّنُ الشكِيلُ أَنَّ منحنى $\tan x$ غير مُتَصِّلٍ؛ فهُوَ مُكَوَّنٌ مِنْ عَدَّةٍ قطْعٍ، وَأَنَّ الظَّلَّ مُوجِّبٌ بَيْنَ الزاويتيْنِ 0° و 90° ، وَبَيْنَ الزاويتيْنِ 180° و 270° ، وَأَنَّهُ يَكُونُ سالِبًا بَيْنَ الزاويتيْنِ 90° و 180° ، وَبَيْنَ الزاويتيْنِ 270° و 360° .

أَتَعْلَمُ

يُسَمِّي كُلُّ مِنَ الْمُسْتَقِيمَيْنِ $x = 270^\circ$ و $x = 90^\circ$ خطَّ تَقَارِبٍ رَأْسِيٍّ لِمَنْحَنِي $\tan x$ ؛ لِأَنَّ الْمَنْحَنِيَّ يَقْتَرُبُ كَثِيرًا مِنْهُمَا، لَكِنَّهُ لَا يَقْطَعُهُمَا.

أَتَدْقِقُ مِنْ فَهْمِي

أَرَسَمْتُ مَنْحَنِيَ الاقْتَرَانِ $y = \tan x$ ، عَلَمًا بِأَنَّ $270^\circ < x < 90^\circ$ ، مُسْتَعِمِلًا زُوَايَا مُخْتَلَفَةً عَنْ تِلْكَ الَّتِي فِي الْجَدْوِلِ السَّابِقِ، ثُمَّ أَجْدُ قِيمَ الظَّلَّ لِهَذِهِ الزُّوَايَا بِاسْتِعْمَالِ الْآلَةِ الْحَاسِبَةِ.

أَتَدْرِبُ وَأَهْلُ الْمَسَائِلِ


أَرَسَمْتُ مَنْحَنِيَ الاقْتَرَانِ لِكُلِّ مَا يَأْتِي فِي الْفَتْرَةِ الْمُعَطَّةِ، ثُمَّ أَصِفُّهُ:

1) $y = \sin x \quad 0^\circ \leq x \leq 270^\circ$


2) $y = \cos x \quad 0^\circ \leq x \leq 180^\circ$

3) $y = \sin x \quad 0^\circ \leq x \leq 180^\circ$

4) $y = \tan x \quad 0^\circ \leq x \leq 180^\circ$




يُبيّن الشكل المجاور جزءاً من التمثيل البياني للاقتران $y = \cos x$. بناءً على هذا الشكل، أقدر قيمتين للمتغير x يكون عندهما $\cos x = -0.5$. 5



يُبيّن الشكل المجاور جزءاً من التمثيل البياني للاقتران $y = \sin x$. بناءً على هذا الشكل، أقدر قيمتين للمتغير x يكون عندهما $\sin x = -0.5$. 6

استعمل التمثيلات البيانية الآتية لأجد جميع القيم الممكنة لـ a, b, c, d, e, f, g, h من: $a = \sin 0^\circ, b = \sin a^\circ, c = \sin b^\circ, d = \sin 60^\circ, e = \sin 30^\circ, f = \sin 45^\circ, g = \sin 210^\circ, h = \sin 60^\circ$.




$$\sin 0^\circ = \sin a^\circ = \sin b^\circ$$

$$\sin 30^\circ = \sin c^\circ$$

$$\sin 60^\circ = \sin d^\circ$$


$$\sin 210^\circ = \sin e^\circ$$



$$\tan 0^\circ = \tan e^\circ = \tan f^\circ$$

$$\tan 45^\circ = \tan g^\circ$$

$$\tan 60^\circ = \tan h^\circ$$





يُبيّن الشكل المجاور جزءاً من التمثيل البياني للاقتران $y = \cos x$ الذي يقطعه المستقيم $y = -0.5$ في النقاطين B, C : 7


أجد إحداثيات النقطة A . 9

أجد إحداثيات النقاطين B, C باستخدام الآلة الحاسبة. 10

أَجِدُ إِحْدَاثِيَّاتِ النَّقْطَيْنِ A و B فِي كُلِّ شَكْلٍ مَمَّا يَأْتِي بِاستِعْمَالِ الْآلَةِ الْحَاسِبَةِ:



13 يُبَيِّنُ الشَّكْلُ الْأَتَيِّ جَزْءًا مِنَ التَّمثِيلِ الْبَيَانِيِّ لِلْاقْتَرَانِ x , $y = \tan x$, حِيثُ يَقْطُعُ الْمَسْتَقِيمُ $y = 1$ مَنْحَنِيَّ $y = \tan x$ فِي النَّقْطَيْنِ: P , و Q . أَكْتُبُ إِحْدَاثِيَّ x لِكُلِّ مِنَ النَّقْطَيْنِ: P , و Q .



مهارات التفكير العليا



14 تَحْدُّ: أَرْسِمُ مَنْحَنِيَّ الْاقْتَرَانِينِ $y = \cos x$ و $y = 2 \cos x$ فِي الْمَسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ نَفْسِيهِ، فِي الْفَتَرَةِ $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ ، ثُمَّ أَقْارِنُ بَيْنَهُمَا.

15 أَكْتُبُ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْحَنِيَّ الْجِيبِ وَجِيبِ التَّمَامِ؟

الدرس

4

حل المعادلات المثلثية

Solving Trigonometric Equations

حل معادلات تضمن النسب المثلثية الأساسية، وتكون فيها مجموعة الحل ضمن دورة واحدة.

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



ساعة حائط كبيرة معلقة على جدار غرفة. إذا كان طول عقرب الساعات فيها 16 cm، وبُعد رأس العقرب عن سقف الغرفة يمثل دائمًا بالعلاقة: $d = -60 \cos(30x) + 110$ ، حيث d هو البُعد بالستيمتر، و x الوقت بالساعات، فما الوقت الذي يبعد فيه رأس عقرب الساعات 118 cm عن السقف؟

المعادلة المثلثية (trigonometric equation) هي معادلة مُتغيّرها نسب مثلثية لزاوية مجهولة. وحل المعادلة المثلثية يعني إيجاد الزاوية (أو الزوايا) التي تتحقق هذه المعادلة، وتجعل منها عبارة صحيحة.

من الأمثلة على المعادلات المثلثية:

$$\sin x = 0.5$$

$$\tan x = 2.435$$

$$2 + \cos x = 3 - 2 \cos x$$

$$2 \sin^2 x = 3$$

يمكن حل بعض المعادلات، مثل: $\cos x = a$ ، $\sin x = a$ ، $\tan x = a$ ، باستخدام الآلة الحاسبة، أو استخدام ما نذكره من نسب الزوايا الخاصة.

مثال 1

أحل المعادلتين الآتىتين، علمًا بأن $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$:

1 $2 \sin x = 1$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

$$x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ$$

ولأن الجيب يكون أيضًا موجباً في الربع الثاني؛ فإنه يوجد حل آخر للمعادلة هو:

$$180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$

إذن، لهذه المعادلة حلان ضمن الفترة المعطاة في المسألة، هما: 30° و 150° .

اتذكر

يكون جيب الزاوية موجباً في الربعين: الأول، والثاني.

الوحدة 3

2 $3 \cos x - 1 = 2$

$$3 \cos x = 3$$

بإضافة 1 إلى الطرفين

$$\cos x = 1$$

بقسمة طرفي المعادلة على 3

$$x = \cos^{-1}(1) = 0^\circ$$

باستعمال الآلة الحاسبة

لهذه المعادلة حلان ضمن الفترة المعطاة في المسألة، هما: 0° و 360°

أتحقق من فهمي

أحل المعادلتين الآتيتين، علمًا بأن $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$:

a) $2 \cos x = \sqrt{3}$

b) $2 \tan x + 3 = 1$

يتطلب حل بعض المعادلات مزيدًا من التبسيط والمعالجة قبل استعمال الآلة الحاسبة.

مثال 2

أحل المعادلتين الآتيتين، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب عشر درجة:

1 $2(\tan x - 3) + 4 = 12, 0^\circ \leq x \leq 360^\circ$

$$2 \tan x - 6 + 4 = 12$$

باستعمال الخاصية التوزيعية

$$2 \tan x = 14$$

بالتبسيط

$$\tan x = 7$$

بقسمة طرفي المعادلة على 2

$$x = \tan^{-1}(7)$$

تعريف معكوس الظل

$$x \approx 81.9^\circ$$

باستعمال الآلة الحاسبة

ولأن الظل يكون أيضًا موجبا في الربع الثالث؛ فإنه يوجد حل آخر لالمعادلة هو:

$$180^\circ + 81.9^\circ \approx 261.9^\circ$$

إذن، لهذه المعادلة حلان ضمن الفترة المعطاة في المسألة، هما: 81.9° و 261.9° .

آنذكر

الزاوية المرجعية هي
الزاوية المحصورة بين
ضلع انتهاء الزاوية θ العادة
المرسومة في الوضع
القياسي والمحور x .

2 $1 + 4 \sin(3x) = 2.5, 0^\circ \leq x \leq 90^\circ$

$$4 \sin(3x) = 2.5 - 1$$

$$\sin(3x) = \frac{1.5}{4}$$

$$\sin \theta = \frac{1.5}{4} = 0.375$$

$$\theta = \sin^{-1}(0.375)$$

$$\theta \approx 22.0^\circ$$

$$22^\circ \approx 3x \Rightarrow x \approx 7.3^\circ$$

ولأنَّ الجيبَ يكونُ أيًضاً موجِباً في الربعِ الثاني؛ فإنَّه يوجدُ حلٌّ آخرٌ للمعادلةِ هو:

$$180^\circ - 22^\circ \approx 158^\circ$$

الزاويةُ في الربعِ الثاني

$$\theta = 3x \approx 158^\circ$$

بالتعمييضِ

$$x \approx 52.7^\circ$$

بقسمة طرفيِّ المعادلةِ على 3

إذن، للمعادلةِ $1 + 4 \sin(3x) = 2.5$ حَلَانِ ضمِنَ الفترةِ المُعطَاةِ في المسألةِ، هما:

$$52.7^\circ \text{ و } 7.3^\circ$$

أتحقق من فهمي

أحلُّ المعادلتينِ الآتتينِ، مُقرّباً إجابتي إلى أقربِ عشرَ درجةٍ:

a) $3(\sin x + 2) = 3 - \sin x, 0^\circ \leq x \leq 360^\circ$

b) $3 \cos(2x) - 1 = 0, 0^\circ \leq x \leq 180^\circ$

يمكِّن حلُّ المعادلاتِ المثلثيةِ التربيعيةِ بطرائقٍ مشابهةٍ لطرائقِ حلِّ المعادلاتِ التربيعيةِ الجبريةِ، أبرزُها: إيجادُ العاملِ المشترِكِ، والتحليلُ إلى ناتِجٍ ضربِ قوسينِ، وغيرِ ذلكِ منَ الطرائقِ التي تعرَّفناها سابقاً.

معلومةٌ أساسيةٌ

إذا كانتْ $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ ،
 $0^\circ \leq 3x \leq 270^\circ$ فإنَّ

مثال 3

أحل المعادلتين الآتيتين، علماً بأن $360^\circ < x \leq 0^\circ$ ، مقرّباً إجابتي إلى أقرب عشرة درجة (إن لزم):

1 $3 \sin x \cos x - 2 \sin x = 0$

تحوي هذه المعادلة نسبتين مثلثتين، ويلاحظ أن $\sin x$ تكرر في حد المعادلة، ما يعني أنها تُشَبِّهُ المعادلة $0 = 2y - 3yz$; لذا يمكن تحليلها بإخراج عامل مشترك:

$$\sin x (3 \cos x - 2) = 0$$

بإخراج العامل المشترك $\sin x$

$$3 \cos x - 2 = 0, \sin x = 0$$

خاصية الضرب الصفرية

وبذلك أتوصل إلى معادلتين بسيطتين، ثم أحل كل معادلة على حدة:

$$\sin x = 0$$

المعادلة الأولى

باستعمال الآلة الحاسبة، أو جدول الزوايا الخاصة

$$3 \cos x - 2 = 0$$

المعادلة الثانية

$$3 \cos x = 2$$

بإضافة 2 إلى الطرفين

$$\cos x = \frac{2}{3}$$

بقسمة الطرفين على 3

$$x = \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$$

تعريف معكوس جيب التمام

$$x \approx 48.2^\circ$$

باستعمال الآلة الحاسبة

ولأن جيب التمام يكون أيضاً موجباً في الربع الرابع؛ فإنه يوجد حل آخر لالمعادلة هو:

$$x \approx 360^\circ - 48.2^\circ \approx 311.8^\circ$$

إذن، حلول هذه المعادلة هي: $0^\circ, 180^\circ, 48.2^\circ, 311.8^\circ$

2 $3 \sin^2 x = 2 \sin x + 1$

أجعل الطرف الأيمن من المعادلة صفرًا بطرح $(2 \sin x + 1)$ من الطرفين:

$$3 \sin^2 x - 2 \sin x - 1 = 0$$

هذه المعادلة تُشَبِّهُ المعادلة الجبرية $0 = 1 - 2y - 3y^2$; لذا يمكن حلها بالتحليل إلى العوامل:

$$(3 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$$

بالتحليل إلى العوامل

$$3 \sin x + 1 = 0, \sin x - 1 = 0$$

خاصية الضرب الصفرية

أتذكر

يكون جيب تمام الزاوية موجباً في الربعين: الأول، والرابع.

$$3 \sin x + 1 = 0$$

المعادلة الأولى

$$3 \sin x = -1$$

طرح 1 من الطرفين

$$\sin x = -\frac{1}{3}$$

بقسمة الطرفين على 3

$$x = \sin^{-1} \left(-\frac{1}{3} \right)$$

تعريف موكوس الجيب

$$x \approx 19.5^\circ$$

باستعمال الآلة الحاسبة، وتجاهل الإشارة السالبة

يُمثل ما سبق الزاوية المرجعية للحلّ، لأنّ الجيب سالب في الربعين: الثالث، والرابع.

$$180^\circ + 19.5^\circ \approx 199.5^\circ$$

$$360^\circ - 19.5^\circ \approx 340.5^\circ$$

$$\therefore \sin x = -1$$

$$\sin x = 1$$

بإضافة 1 إلى الطرفين

$$x = \sin^{-1}(1)$$

تعريف موكوس الجيب

$$x = 90^\circ$$

باستعمال الآلة الحاسبة، أو جدول الزوايا الخاصة

إذن، حلول هذه المعادلة هي: $90^\circ, 199.5^\circ, 340.5^\circ$

أتحقق من فهمي

أحلّ المعادلتين الآتيتين، علمًا بأنّ $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ ، مُقرّبًا إجابتي إلى أقرب عشر درجة (إن لزم):

a) $4 \sin x \tan x + 3 \tan x = 0$

b) $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$


مثال 4: من الحياة

مدفع هواء يملي عن الأرض بزاوية قياسها θ . انطلق من فوقه بالون مملوء بالماء بسرعة ابتدائية مقدارها 12 m/s ، فسقط على بعد 9 m من المدفع. إذا كانت العلاقة

التي تمثل المسافة الأفقية d التي يقطعها البالون هي:

$$d = \frac{1}{10} v^2 \sin 2\theta$$

حيث v سرعة البالون الابتدائية، فما قيمة θ ? أقرب إجابتي إلى أقرب عشر درجة.



الخطوة 1: أُعوّض القيم المعطاة في المسألة في المعادلة المعطاة، ثم أَحْلُّها لإيجاد قيمة θ .

$$9 = \frac{1}{10} (12)^2 \sin 2\theta$$

الخطوة 2: لتسهيل الحسابات، أفترض أن $2\theta = x$ ، ثم أَحْلُّ المعادلة:

$$9 = \frac{1}{10} (12)^2 \sin x \quad \text{المعادلة}$$

$$90 = 144 \sin x \quad \text{بضرب الطرفين في 10، والتبسيط}$$

$$\sin x = \frac{90}{144} \quad \text{بقسمة الطرفين على 144}$$

$$x = \sin^{-1} \frac{90}{144} = 38.7^\circ \quad \text{باستعمال الآلة الحاسبة، والتقرير إلى أقرب عشر درجة}$$

الخطوة 3: أَجِدُّ الحلّ الآخر في الربع الثاني، وهو: $180^\circ - 38.7^\circ = 141.3^\circ$

الخطوة 4: أَجِدُّ الآن قيمة θ :

$$x = 2\theta \quad \text{العلاقة بين } x \text{ و } \theta$$

$$\theta = \frac{38.7^\circ}{2} = 19.4^\circ \quad \text{أو} \quad \theta = \frac{141.3^\circ}{2} = 70.7^\circ \quad \text{بالقسمة على 2، والتعويض}$$

إذن، يصنع المدفع مع الأرض زاوية قياسها 19.4° ، أو 70.7° تقريرياً.

أتحقق من فهمي

فيزياء: فرق الجهد E (بالفولت) في دارة كهربائية يُعطى بالعلاقة: $E = 20 \cos(180t)$ ،

حيث t الزمن (بالثوانی):

(a) أفترض أن $t = 180$ ، وأَحْلُّ المعادلة $20 \cos x = 12$ ، علمًا بأن $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ مُقرّباً إجابتي إلى أقرب عشر درجة.

(b) أَجِدُّ الزمن t (حيث $2 \leq t \leq 0$) عندما يكون فرق الجهد volt 12، مُقرّباً إجابتي إلى أقرب جزء من مائة من الثانية.



الكهرباء موجودة في جسم الإنسان أيضًا؛ فعضلات القلب مثلاً تقضي بتغيير تيارات كهربائية تصل إليها عبر العقد والوصلات العصبية.



أَحْلِيَّ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةَ، عَلَمَا بِأَنَّ $360^{\circ} \leq x \leq 0^{\circ}$ ، مُقْرَّبًا إِجَابِيًّا إِلَى أَقْرَبِ عُشْرِ درَجَةٍ (إِنْ لَزِمَّ):

1 $\sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

2 $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$

3 $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

4 $7 + 9 \cos x = 1$

5 $2 \sin x + 1 = 0$

6 $1 - 2 \tan x = 5$

أَحْلِيَّ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةَ، عَلَمَا بِأَنَّ $90^{\circ} \leq x \leq 0^{\circ}$ ، مُقْرَّبًا إِجَابِيًّا إِلَى أَقْرَبِ عُشْرِ درَجَةٍ (إِنْ لَزِمَّ):

7 $5 - 2 \cos(4x) = 4$

8 $3 + 4 \tan(2x) = 6$

9 $13 \sin(3x) + 1 = 6$

أَحْلِيَّ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةَ، مُفْتَرِضًا أَنَّ قِيَاسَ الزَّاوِيَّةِ الْمَجْهُولَةِ يَقُعُ فِي الْفَتْرَةِ $[0^{\circ}, 360^{\circ}]$ ، مُقْرَّبًا إِجَابِيًّا إِلَى أَقْرَبِ عُشْرِ درَجَةٍ (إِنْ لَزِمَّ):

10 $2(\sin x - 2) + 1 = 3 \sin x$

11 $\tan x - 3(2 \tan x - 1) = 10$

12 $15 \tan x - 7 = 5 \tan x - 3$

13 $5(\cos x - 1) = 6 + \cos x$

14 $\tan^2 x - 9 \tan x + 20 = 0$

15 $2 \cos^2 x - \cos x = 0$

16 $4 \sin^2 x - 3 \sin x = 1$


17 $2 \sin^2 x - 1 = 0$

18 $4 \cos^2 x - 4 = 15 \cos x$

19 $\cos x = \sin x$

سَاعَاتٌ: أَحْلِيَّ الْمَسَائِلَةِ الْوَارِدَةَ فِي بَدَائِيَّةِ الْدُّرُسِ.

20



سِبَاحَةٌ: سَبَحَ حَامِدُ مَسَافَةَ 90 m مِنَ النَّقْطَةِ A عَلَى الضَّفَافِ الشَّمَالِيَّةِ لِنَهْرٍ إِلَى النَّقْطَةِ B عَلَى الضَّفَافِ الْمُقَابِلَةِ، ثُمَّ دَارَ بِزاوِيَّةٍ قَائِمَةٍ، وَسَبَحَ مَسَافَةَ 60 m إِلَى نَقْطَةٍ أُخْرَى C عَلَى الضَّفَافِ الشَّمَالِيَّةِ. إِذَا كَانَ قِيَاسُ الزَّاوِيَّةِ CAB هُوَ θ ، وَقِيَاسُ الزَّاوِيَّةِ ACB هُوَ $(90^{\circ} - \theta)$ ، وَطُولُ الْعُمُودِ مِنَ B إِلَى C يَسَاوِي عَرَضَ النَّهْرِ d، فَأُعْبُرُ عَنْ d بِدَلَالَةِ θ مَرَّةً، وَبِدَلَالَةِ $(90^{\circ} - \theta)$ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ أَكْتُبُ مَعَادِلَةً وَأَحْلُلُهَا لِيَجَادِلِ قِيمَةَ θ ، ثُمَّ أَجِدُ عَرَضَ النَّهْرِ، مُقْرَّبًا إِجَابِيًّا إِلَى أَقْرَبِ

عَدِّ صَحِيحٍ.

الوحدة 3



دولاًب: يعطى ارتفاع الراكب عن الأرض في دولاًب دوار بالمعادلة: 22

$$h = 27 - 25\cos \theta$$
, حيث h الارتفاع بالأمتار، و θ قياس الزاوية التي دارها الدولاًب. متى يكون ارتفاع الراكب عن الأرض 49 m؟

حركة مقدوفات: المسافة الأفقية التي تقطعها مقدوفة في الهواء (من دون افتراض وجود مقاومة الهواء) تعطى بالمعادلة: 23

$$d = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$
, حيث: v_0 السرعة الابتدائية، و θ الزاوية التي تطلق بها المقدوفة، و g تسارع الجاذبية الأرضية (9.8 m/s²). إذا قُذفت كرة بسرعة ابتدائية مقدارها 40 m/s, فما الزاوية التي توجّه بها الرمية لكي تقطع الكرة مسافةً أفقيةً مقدارها 110 m قبل سقوطها على الأرض؟ ما بعد نقطة يمكن أن تصلها الكرة إذا قُذفت بهذه السرعة الابتدائية؟ أقرب إجابة إلى أقرب عشر درجة.

مهارات التفكير العليا

اكتشف الخطأ: حل كل من علياء وسمير المعادلة: 24

$$2\sin x \cos x = \sin x$$
, حيث: $0^\circ \leq x < 360^\circ$

سمير

الحلانـ هـما: $300^\circ, 60^\circ$ لأنـ:

$$\frac{2\sin x \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{\sin x}$$

$$2 \cos x = 1$$

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = 60^\circ, 300^\circ$$

علياء

الحلـلـ هيـ: $0^\circ, 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$, لأنـ:

$$\sin x (2 \cos x - 1) = 0$$

$$\sin x = 0$$

$$x = 0^\circ, 180^\circ$$

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = 60^\circ, 300^\circ$$

أيهـما إجـابةـ صـحـيـحةـ؟ أـبـرـرـ إـجـابـتيـ.

تحـدـ: أـحـلـ المعـادـلـةـ: 25

$$0^\circ \leq x \leq 360^\circ$$
, $2 \sin x \cos x + \sin x + 2 \cos x + 1 = 0$

تحـدـ: أـحـدـدـ عـدـدـ حلـلـ المعـادـلـةـ: 26

$$0^\circ \leq x < 360^\circ$$
, $\cos x - \sin x - 1 = 0$, حيث:

أَجِدُ النسبَ المثلثيةَ الأساسيةَ للزاويةِ x المرسومةَ في الوضعِ القياسيِّ، التي يقطعُ ضلُعَ انتهائِها دائِرَةَ الوحدَةِ عندَ كُلِّ منَ النقاطِ الآتِيَّةِ:

6) $(0.6, 0.8)$

7) $\left(\frac{5}{13}, -\frac{12}{13}\right)$

8) $(-1, 0)$

9) $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$


10) $(0, 1)$

11) $(-0.96, 0.28)$

يُبَيَّنُ الشَّكُلُ التَّالِي جزءًا مِنَ التَّمثِيلِ الْبَيَانِيِّ لِلَاقْتِرَانِ الْمُثْلِثِيِّ $y = \cos x$ الَّذِي يَقْطِعُ الْمُسْتَقِيمَ $y = 0.5$ فِي النَّقْطَتَيْنِ B وَ C :

أَجِدُ إِحْدَاثِيَّاتِ النَّقْطَةِ A . 12)

أَجِدُ إِحْدَاثِيَّاتِ النَّقْطَتَيْنِ: B ، وَ C . 13)



أَجِدُ النسبَ المثلثيةَ الأساسيةَ الْمُتَبَقِّيَّةَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

14) $\sin x = -\frac{1}{2}$, $270^\circ \leq x \leq 360^\circ$

15) $\cos x = 0.4$, $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$

16) $\tan x = 3$, $180^\circ \leq x \leq 360^\circ$

17) $\sin x = -\cos x$, $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$

أَخْتَارُ رِمْزَ الْإِجَابَةِ الصَّحِيحةِ لِكُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

إِذَا كَانَ $\cos \theta = -0.5$, فَإِنَّ ضلُعَ انتهَاءِ الزَّاوِيَةِ θ فِي

الوضعِ القياسيِّ يَقُعُ فِي:

(a) الْرَّبِيعُ الْأَوَّلِ. (b) الْرَّبِيعُ: الثَّانِي، وَالثَّالِثُ.

(c) الْرَّبِيعُ الْأَرْبَعُ. (d) الْرَّبِيعُ: الثَّانِي، وَالرَّابِعُ.

إِذَا قَطَعَ ضلُعُ انتهَاءِ الزَّاوِيَةِ θ فِي الوضعِ القياسيِّ دائِرَةَ

الْوَحْدَةِ فِي النَّقْطَةِ $P\left(-\frac{40}{41}, \frac{9}{41}\right)$, فَإِنَّ قِيمَةَ $\sin \theta$ هِيَ:

a) $-\frac{40}{41}$ b) $\frac{9}{40}$

c) $-\frac{9}{41}$ d) $\frac{9}{41}$

قِيَاسُ الزَّاوِيَةِ الْمَرْجِعِيَّةِ لِلزاوِيَةِ 230° هُوَ: 3)

a) 130° b) 40°

c) 50° d) 140°

إِذَا كَانَتْ $180^\circ < x < 90^\circ$, وَكَانَ $\sin x = \frac{8}{17}$, فَإِنَّ

قِيمَةَ $\tan x$ هِيَ:

a) $-\frac{8}{15}$ b) $\frac{8}{15}$

c) $\frac{15}{17}$ d) $-\frac{15}{8}$


حَلُّ الْمُعَادَلَةِ $\sin^{-1}(-1) = x$ هُوَ: 5)

a) 0° b) 90°


c) 270° d) 360°

تدريب على الاختبارات الدولية

في تجربة علوم لاكتشاف خصائص الضوء، وضع مصدر ضوئي لبزري على بعد 35 cm من قرص دائري مثقوب من مركزه، وكان طول نصف قطره 10 cm كما في الشكل الآتي. أجد زاوية الشعاع الذي يمر خلال ثقب مركز هذا القرص.



33 لاستغلال طاقة الرياح وخفض استهلاك الوقود، ربط شراع طائر بسفينة. ما الطول المناسب لحبل الشراع كي يسحب السفينة بزاوية 58° ، ويكون الشراع على ارتفاع رأسى مقداره 150 m كما هو مبين في الشكل الآتي؟



- a) 177 m
- b) 283 m
- c) 160 m
- d) 244 m

أجد قيمة كل مما يأتي:

- 18 $\sin 140^\circ$ 19 $\cos 173^\circ$
 20 $\tan 219^\circ$ 21 $\sin 320^\circ$
 22 $2\sin 150^\circ + \tan 135^\circ$
 23 $\sin^2 150^\circ + \cos^2 150^\circ$

أجد حل المعادلات الآتية، علمًا بأن $360^\circ \leq x \leq 0^\circ$ ، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب عشر درجة (إن لزم):

- 24 $3 \cos^2 x - 1 = 0$
 25 $\sin x = -1.3212 \cos x$
 26 $4 + 5 \sin^2 x = 9 \sin x$
 27 $\tan x = 4 \sin x$
 28 $3 \tan^2 x \cos x = 3 \tan^2 x$

29 إذا كانت x زاوية في الربع الأول، وكان $\sin x + \sin (180^\circ - x) = 1.4444$ الزاوية x ، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب عشر درجة.

30 لعبة مدفع: يطلق مدفع قذائف بالونات مائة في مسابقة للتسليه. إذا كان البعد الأفقي لقذيفة أطلقت من المدفع بزاوية قياسها x مع المستوى الأفقي، وبسرعة ابتدائية مقدارها 7 m/s، يعطى بالأمتار حسب العلاقة: $d = 7 + 2 \sin\left(\frac{3x}{5}\right)$ ، مما المسافة الأفقي التي قطعتها قذيفة أطلقت بزاوية مقدارها 50° ؟

31 أجد أصفار الاقتران $3 - 4(\sin x)^2 = y$ ، علمًا بأن $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$.

تطبيقات المثلثات

Triangle Applications

ما أهمية
هذه الوحدة؟

للنسب المثلثية استعمالات كثيرة في العلوم، والهندسة، والإلكترونيات، مثل حساب ارتفاعات قمم الجبال والمباني، وتحديد اتجاهات تحليق الطائرات على الخريطة وغيرها.

سأتعلم في هذه الوحدة:

- تفسير الاتجاه من الشمال، وإيجاده لنقطة ما بالنسبة إلى نقطة معينة.
- حل المثلث باستخدام قانون الجيب، وجيب التمام.
- استعمال جيب الزاوية لإيجاد مساحة المثلث.
- إيجاد أطوال زوايا مجهولة في أشكال ثلاثة الأبعاد.

تعلمت سابقاً:

- إيجاد النسب المثلثية (الجيب، جيب التمام، الظل) في الأربع الأربعة.
- استخدام العلاقة: $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ في حل مسألة عن مثلث قائم الزاوية.
- نماذج مسائل حياتية باستخدام مثلث قائم الزاوية، تتضمن قياسات الزوايا والأطوال لأضلاع مجهولة.

مشروع الوحدة

صنع كلينومتر واستعماله


صنع جهاز بسيط لإيجاد قياسات زوايا الارتفاع والانخفاض، ثم استعماله.

فكرة المشروع



ماصة شراب، منقلة، خيط، كتلة (مفتاح، أو ممحاة)، لاصق شفاف، شريط قياس.

المواد والأدوات



خطوات تنفيذ المشروع:

1 صنع الكلينومتر: أثبت ماصة الشراب على الحافة المستقيمة للمنقلة باستعمال لاصق شفاف، ثم أثبت طرف الخيط في مركز المنقلة، وأربط بطرفه الآخر كتلة صغيرة، مثل: المفتاح، أو المشابك المعدنية؛ على أن تتدلى رأسياً إلى أسفل مثل خط الشاقول.


2 استعمال الكلينومتر: استعمل أنا وأفراد مجروعي الكلينومتر لإيجاد ارتفاع بناية أو شجرة باتباع الخطوات الآتية:

● اختار شيئاً لأقيس ارتفاعه، ولتكن شجرة.

● أقف على مسافة من قاعدة الشجرة، ممسكاً بماصة الشراب.

● أنظر من فتحة ماصة الشراب إلى قمة الشجرة، ثم أطلب إلى زميلي/ زميلتي أن يقرأ الزاوية x التي يشير إليها الخيط، ملاحظاً أن هذه الزاوية تقع بين خط النظر والخط الرأسى. وبذلك، تكون زاوية ارتفاع قمة الشجرة: $(90^\circ - x)$.

● أقيس المسافة بين المكان الذي أقف عنده وقاعدة الشجرة.



● أستعمل القياسات التي دونتها لإيجاد ارتفاع الشجرة فوق مستوى عيني، باستعمال العلاقة الآتية:

$$\tan(90^\circ - x) = \frac{h}{l} \Rightarrow h = l \tan(90^\circ - x)$$

● أضيف المسافة بين الأرض ومستوى عيني إلى القيمة التي توصلت إليها لإيجاد ارتفاع الشجرة فوق سطح الأرض.

عرض النتائج:

أكتب مع أفراد مجروعي تقريراً يتضمن ما يأتي:

● صورة لجهاز الكلينومتر المصنوع.

● صور لجميع الأشياء التي قيست ارتفاعاتها، وتدوين الحسابات التي تم في أثناء القياس بجانب كل منها.

الاتجاه من الشمال

Bearing

تفسير الاتجاه من الشمال، وإيجاده لنقطة ما بالنسبة إلى نقطة أخرى بالرسم، والقياس، والحساب باستعمال العلاقات بين الزوايا.



حلّقت طائرة من عمان إلى العقبة، وقد صنع مسارها المستقيم زاوية قياسها 200° مع خط الشمال الجغرافي. ما قياس الزاوية بين مسار عودة الطائرة إلى عمان وخط الشمال الجغرافي؟

فكرة الدرس




المصطلحات




مسألة اليوم



الاتجاه من الشمال (bearing) للنقطة B من النقطة A هو قياس الزاوية التي ضلّع ابتدائهما خط الشمال الجغرافي المرسوم من النقطة A ، وضلّع انتهائهما المستقيم AB ، وذلك عند قياس الزاوية في اتجاه حركة عقارب الساعة. يكتب الاتجاه من الشمال باستعمال عدد من ثلاثة أرقام (منازل) بين 000° و 360° .




يُبيّن الشكل المجاور أنَّ الاتجاه من الشمال للنقطة B من النقطة A هو 060° .




الاتجاه من الشمال للنقطة H من النقطة G

هو 330° .



الاتجاه من الشمال للنقطة F من النقطة E

هو 110° .



الاتجاه من الشمال للنقطة D من النقطة C


هو 048° .



يُستخدم الاتجاه من الشمال كثيراً في تحديد خطوط الملاحة البحرية والجوية.

توجد أربعة اتجاهات رئيسية يجب تذكرها دائمًا، هي:

1. الشمال (N)، واتجاهه من مركز البوصلة هو 000° .
2. الشرق (E)، واتجاهه من مركز البوصلة هو 090° .
3. الجنوب (S)، واتجاهه من مركز البوصلة هو 180° .
4. الغرب (W)، واتجاهه من مركز البوصلة هو 270° .



اعتمد الإنسان قديماً على الشمس والقمر والنجوم في معرفة الاتجاهات، ثم أخذ يعتمداليوم على البوصلة التي تحدد اتجاه الشمال، ومنه تحدد بقية الاتجاهات.

توجد أربعة اتجاهات أخرى مشهورة تقع بين الاتجاهات الأربع الرئيسية يجب تذكرها دائمًا، هي:

1. الشمال الشرقي (NE)، واتجاهه من مركز البوصلة هو 045° .
2. الجنوب الشرقي (SE)، واتجاهه من مركز البوصلة هو 135° .
3. الجنوب الغربي (SW)، واتجاهه من مركز البوصلة هو 225° .
4. الشمال الغربي (NW)، واتجاهه من مركز البوصلة هو 315° .

مثال 1

يتمثل الشكل المجاور موقع ثلاث مدن، هي: A، B، و C. أكتب اتجاه المدينة B من المدينة A واتجاه المدينة C من المدينة A.

اتجاه المدينة B من المدينة A هو 070° ، واتجاه المدينة C من المدينة A هو 245° .


أَعْلَمُ

سنستعمل في بقية الدرس كلمة (اتجاه) وحدتها للدلالة على الاتجاه من الشمال.

أتحقق من فهمي

يتمثل الشكل المجاور موقع ثلاث سفن، هي: E، F، و G. أكتب اتجاه السفينة G من السفينة E، واتجاه السفينة F من السفينة E.

إذا علمَ اتجاهُ النقطةِ S منَ النقطةِ R ، فيُمكِّن حسابُ اتجاهِ النقطةِ R منَ النقطةِ S .



مثال 2

أَجِدُ اتجاهَ النقطةِ R منَ النقطةِ S في الشكلِ المجاورِ.

الطريقةُ الأولى: استعمالُ الرسمِ.

أَرْسَمُ خطًّا رَأْسِيًّا يُبَيِّنُ اتجاهَ الشَّمَالِ الجُغرَافِيِّ

عَنْدَ النَّقطَةِ S ، ثُمَّ أَسْتَعْمَلُ مِنْقَلَةً لِأَقِيسِ الزَّاوِيَةِ

الَّتِي رَأْسُهَا S ، وَضَلَّاعَهَا خَطُّ الشَّمَالِ (SN)

وَالْمُسْتَقِيمُ SR .

سَأَجُدُّ أَنَّ قِيَاسَ هَذِهِ الزَّاوِيَةِ هُوَ 60° ، إِذْنُ، اتجاهُ

النَّقطَةِ R مِنَ النَّقطَةِ S هُوَ 060° .

الطريقةُ الثانية: استعمالُ الجبرِ.

يُمْكِنُ إِيجادُ اتجاهِ النَّقطَةِ R مِنَ النَّقطَةِ S باسْتِعْمَالِ الْعَلَاقَاتِ بَيْنَ الزَّوَالِيَّا.

$$m \angle NRS = 360^\circ - 240^\circ = 120^\circ$$

مجموعُ قياسِ الزَّوَالِيَّا حَوْلَ نَقْطَةِ

360°

$$m \angle NSR = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

خطُّ الشَّمَالِ مُتَوَازِيَّانِ؛ لِذَلِكَ،

فَالَّذِي اتَّبَعْتُمُوهُ

NSR، وَ NRS مُتَكَامِلَتَانِ

أتحقق من فهمي

إذا كانَ اتجاهُ النَّقطَةِ X مِنَ النَّقطَةِ Z هُوَ 295° ، فَمَا اتجاهُ النَّقطَةِ Z مِنَ النَّقطَةِ X ؟



مرِبِّمُ الجِيلِيُّ هِيَ عَالِمٌ
رِيَاضِيَّاتٍ وَفَلَكِيَّاتٍ مُسْلِمٌ
عاشَتْ فِي حَلَبَ زَمْنَ
الْمُوْلَى الْعَبَاسِيَّةِ، وَاخْتَرَعَتْ
الْأَسْطَرَلَابَ الْمُعَقَّدَ؛ وَهُوَ آلَةٌ
فَلَكِيَّةٌ مُهِمَّةٌ بُنِيَتْ عَلَيْهَا آلَةٌ
عَمِلَ أَنْظَمَةَ الْمَلَاحَةِ الْحَدِيثَةِ
(GPS).

أتذَكَّرُ

الْمُتَكَامِلَاتَانِ
هُمَا زَوَالِيَّانِ مُجْمَعُ
قِيَاسِيهِمَا 180°

مثال 3: من الحياة



أَسْتَعْمِلُ الْخَرِيْطَةَ الْمُجاوِرَةَ لِتَحْدِيدِ اِتِّجَاهِ الْعَاصِمَةِ عَمَّانَ مِنْ مَدِينَةِ الْقَدِيسِ الشَّرِيفِ.



الخطوة 1: أَرْسِمُ قَطْعَةً مُسْتَقِيمَةً بَيْنَ مَدِينَتِيِّ الْقَدِيسِ الشَّرِيفِ وَعَمَّانَ.



الخطوة 3: أَسْتَعْمِلُ الْمُنْقَلَةَ لِإِيجَادِ قِيَاسِ الزَّاوِيَةِ بَيْنَ خَطِّ الشَّمَالِ الْجُغرَافِيِّ وَالْقَطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الْوَاصِلَةِ بَيْنَ الْمَدِيْتَيْنِ بَاتِّجَاهِ حَرْكَةِ عَقَارِبِ السَّاعَةِ. سَأَجِدُ أَنَّ قِيَاسَ هَذِهِ الْزاوِيَةِ هُوَ 78° .

إِذْنُ، اِتِّجَاهُ الْعَاصِمَةِ عَمَّانَ مِنْ مَدِينَةِ الْقَدِيسِ الشَّرِيفِ هُوَ 078° .

تُعَدُّ مَدِينَةُ الْقَدِيسِ وَاحِدَةً مِنْ أَقْدَمِ مَدِينَاتِ الْعَالَمِ؛ فَتَارِيْخُهَا يَرْجُعُ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ سَنَةٍ. وَلِلْقَدِيسِ أَسْمَاءُ عَدِيدَةُ، مِنْهَا: بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَأُولَى الْقِبَلَتَيْنِ، وَالْقَدِيسُ الشَّرِيفُ.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

أَسْتَعْمِلُ الْخَرِيْطَةَ فِي الْمَثَالِ السَّابِقِ لِتَحْدِيدِ اِتِّجَاهِ مَدِينَةِ حِيفَا مِنْ مَدِينَةِ الْقَدِيسِ الشَّرِيفِ.

أَتَدْرِبُ وَأَهْلُ الْمَسَائِلِ




أَجِدُ كُلَّا مِنَ الْاتِّجَاهَاتِ الْآتِيَةِ بِاستِعْمَالِ الْمُنْقَلَةِ:

1 اِتِّجَاهُ النَّقْطَةِ D مِنَ النَّقْطَةِ E .

2 اِتِّجَاهُ النَّقْطَةِ G مِنَ النَّقْطَةِ A .

3 اِتِّجَاهُ النَّقْطَةِ M مِنَ النَّقْطَةِ D .



أرسُم شكلاً يوضُّح كُلّ موقِفٍ ممّا يأتي:

اتجاه النقطة C من النقطة H هو 170° . 4

أرسُم شكلاً لحلّ المسائل الآتية:

اتجاه A من B هو 070° . أجد اتجاه B من A . 6


تقع النقطة A شماليّ النقطة C ، وتقع النقطة B شرقيّ النقطة A ، واتجاه النقطة B من النقطة C هو 045° . أرسُم شكلاً يبيّن موقَعَ النقاطِ الثلاثِ. 8

ملاحة بحرية: أبحَرَ قاربٌ حَوْلَ الأَضْلاعِ الْأَرْبَعَةِ لِمِرَبْعِ مَسَاحَتِهِ كِيلُو مِترٍ مَرْبَعٍ وَاحِدٌ:


إذا بدأ الإبحار في اتجاه الشمال، فما الاتجاهاتُ الْأَلْآتِيَّةُ التَّالِيَّةُ التي سلَكَها حتَّى أكملَ رحلَتَهُ حَوْلَ المِرَبْعِ باتجاه حركة عقاربِ الساعة؟ 9

إذا بدأ الإبحار في اتجاه 090° ، فما الاتجاهاتُ الْأَلْآتِيَّةُ التَّالِيَّةُ التي سلَكَها حتَّى أكملَ رحلَتَهُ حَوْلَ المِرَبْعِ بعكسِ اتجاه حركة عقاربِ الساعة؟ 10

خرائط: تبيّنُ الخريطةُ الْأَتِيَّةُ رحلَةَ قاربٍ حَوْلَ إِحْدَى الْجُزُرِ، بدأَتْ مِنَ الموقِع S ، وانتَهَتْ عَنْدَهُ. إذا كانَ كُلُّ 1 cm على الخريطة يُمثِّل 20 km ، فما طُولُ كُلِّ مَرْحلَةٍ مِنْ مَراحلِ الرحلَةِ واتجاهُها؟ أنسُخِ الجدولَ الْأَتِيَّ، ثُمَّ أكملُهُ:



الاتجاه	المسافة الحقيقية	المرحلة
		1
		2
		3
		4
		5



موانئ: يبيّنُ المُخْطَطُ المُجاوِرُ للمِينَاءِ P وَالْمَرْفَأَيْنِ X وَ Y عَلَى السَّاحِلِ:

أبحَرَ قاربٌ صَدِّيَّ مِنَ المِينَاءِ P إِلَى الْمَرْفَأِ X . ما اتجاهُ الْمَرْفَأِ X مِنْ P ؟ 12

أبحَرَ يختٌ مِنَ المِينَاءِ P إِلَى الْمَرْفَأِ Y . ما اتجاهُ الْمَرْفَأِ Y مِنَ المِينَاءِ P ؟ 13

مقاييس الرسم: كل 1 cm يمثل 200 m



موقع جغرافي: يُبيّن المُخطّطُ المجاورُ موقعَ بيتِ أريجَ عندَ النقطةِ H


والناديِ الرياضيِ الذي ترتادُه عندَ النقطةِ C :

أَستعملُ مقاييسِ الرسمِ المعطى لإيجادِ المسافةِ الحقيقيةِ بينَ بيتِ أريجَ والناديِ الرياضيِ.

أَستعملُ منقلةً لإيجادِ اتجاهِ الناديِ منْ بيتِ أريجَ.

16 يبعدُ السوقُ التجاريُّ S مسافةً 600 m عنْ بيتِ أريجَ، وباتجاهٍ 150° منْ بيتها. أَعِينُ موقعَ السوقِ التجاريِّ S على نسخةِ منَ المُخطّطِ.

17 **ملاحةٌ جوية:** في أثناءِ تحليقِ طائرةٍ باتجاهٍ 072° ، طُلبَ إلى قائدها التوجُّهُ إلى مطارٍ صوبَ الجنوبِ. ما الزاويةُ التي س يستديرُ بها؟



18 **خرائط:** تُمثّلُ A و B و C ثلثَ قرَى تقعُ على رؤوسِ مربَّعٍ في خليجٍ ما. إذا كانَ اتجاهُ القريةِ B منَ القريةِ A هو 030° ، فما اتجاهُ القريةِ A منَ القريةِ C ؟

أَحُلُّ المسألةَ الواردةَ في بدايةِ الدرسِ.

مهارات التفكير العليا

20 **مسألةٌ مفتوحة:** أرسمُ مثلثًا ذا قاعدةٍ أفقيةٍ أُسَمِّيَّ ABC ، ثمَّ أقيِسُ زواياهُ، ثُمَّ أَجِدُ اتجاهَ A منْ B ، واتجاهَ C منْ B .

تحدّ: أبحَرَتْ سفينةٌ منَ الميناءِ P مسافةً 57 km باتجاهِ الشمالِ، ثُمَّ تحولَتْ إلى اتجاهٍ 045° ، وقطعَتْ مسافةً 38 km . إذا كانَ موقعُ السفينةِ الحاليُّ هو S ، فَأَجِدُ:

. SP 21

22 اتجاهَ موقعِ السفينةِ منَ الميناءِ P .

قانون الجيب

Law of Sines

فكرة الدرس



استعمال قانون الجيب لإيجاد طول ضلع، أو قياس زاوية في مثلث، علماً فيه ضلعان وزاوية مقابلة لأحد هما، أو زاويتان وضلع.

المصطلحات




مسألة اليوم



إذا كانت جرش والزرقاء ومأدبا تشكل رؤوس مثلث على الخريطة، والمسافة بين مدینتیي الزرقاء وجرش 44 km، وقياس الزاوية التي تقع عند رأسها مدینة جرش 52° ، وقياس الزاوية التي تقع عند رأسها مدینة الزرقاء 93° ، فهل يمكن بهذه المعلومات حساب المسافة بين مدینتیي جرش ومأدبا؟

يوجد في أي مثلث سته قياسات، هي: ثلاثة أضلاع، وثلاث زوايا. وإيجاد هذه القياسات يُعرف باسم حل المثلث (solving a triangle)؛ إذ تساعد قياسات الزوايا على حل المثلث في حال كانت بعض قياساتها معروفة، وذلك باستعمال نسبة الجيب لإيجاد علاقات بين أطوال الأضلاع.



ففي المثلث ABC المرسوم جانبًا، يمثل h الارتفاع من النقطة A ؛ لذا فهو عمودي على القاعدة BC .

يمكن الاستفادة من تعريف الجيب في استنتاج بعض العلاقات كما يأتي:

$$\sin B = \frac{h}{c}$$

تعريف الجيب

$$h = c \sin B$$

بالضرب التبادلي

$$\sin C = \frac{h}{b}$$

تعريف الجيب

$$h = b \sin C$$

بالضرب التبادلي

$$c \sin B = b \sin C$$

بالمساواة


$$\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$$

بقسمة الطرفين على $\sin B$ ، ثم على $\sin C$

رموز رياضية

تشير الأحرف الكبيرة A, B, C إلى رؤوس المثلث وزواياه، في حين تشير الصغيرة منها a, b, c إلى أطوال الأضلاع. فمثلاً، طول الضلع المقابل للزاوية A يشار إليه بالحرف a وهكذا.

الوحدة 4



وبالمثل، يمكن استنتاج العلاقات الآتية عند رسم ارتفاع المثلث من النقطة B بشكل عمودي على AC ، أو رسم ارتفاعه من النقطة C عموديا على AB .

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

عند دمج هذه العلاقات الثلاث معًا، يتبع **قانون الجيوب** (law of sines).

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$




يُستعمل قانون الجيوب لحل المثلث الذي علّمْت ثلاثة من قياساته، وذلك في الحالتين الآتية:

أولاً

لماذا يتعدّل حل المثلث الذي علّمْت فقط قياسات زواياه جميعاً؟

1 ضلّع واحد وزاويتان (SAA ، أو ASA).

2 ضلّاع وزاوية مقابلة لأحد هما (SSA).



يُبيّن الشكل الآتي هاتين الحالتين:

إرشاد

توجد صيغة أخرى لقانون الجيوب هي:


$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

إرشاد

- الحرف S هو اختصار **Side**، وتعني الكلمة **الضلّاع**.

- الحرف A هو اختصار **Angle**، وتعني الكلمة **الزاوية**.

مثال 1



$$\frac{x}{\sin 84^\circ} = \frac{25}{\sin 47^\circ}$$

$$x = \frac{25 \sin 84^\circ}{\sin 47^\circ}$$

$$\approx 34 \text{ cm}$$

أجد قيمة x في المثلث ABC .


قانون الجيوب

بضرب الطرفين في $\sin 84^\circ$

باستعمال الآلة الحاسبة

أتحقق من فهمي

أجد قيمة x في المثلث RST المُبيّن جانباً.



يمكن أيضًا استعمال قانون الجيب لإيجاد قياس زاوية مجهولة في المثلث.

مثال 2

أجد قيمة x في المثلث ABC .


$$\frac{\sin x}{7} = \frac{\sin 40^\circ}{6}$$

$$\sin x = \frac{7 \sin 40^\circ}{6}$$

$$\approx 0.7499$$

$$x = \sin^{-1}(0.7499)$$

$$\approx 48.6^\circ$$



قانون الجيب


بضرب الطرفين في 7

معكوس الجيب

باستعمال الآلة الحاسبة

تحقق من فهمي

أجد قيمة x في المثلث RST .




أتعلم

توجد قيمتان لـ $\sin^{-1} 0.7499$ ضمن

الدورة الواحدة هما 48.6° و 131.4° ، نختار 48.6° لأن 131.4° ملائمة القيمة 48.6° لأن الزاوية x تبدو حادة في الشكل المعطى.

عندما نظر إلى طائرة في السماء، فإن الزاوية المحصورة بين الخط الواصل بين عيني والطائرة وخط نظري أفقياً تسمى زاوية الارتفاع. وإذا وقفت على تلة ساحلية، ثم نظرت إلى قارب أسفل مني، فإن الزاوية المحصورة بين الخط الواصل بين عيني والقارب وخط نظري أفقياً تسمى زاوية الانخفاض. ولها تين زاويتين أهمية كبيرة عند حل المسائل الحياتية باستعمال النسب المثلثية.




مثال 3: من الحياة

يقع برج ارتفاعه h متر على تلة، وقد رصدت قمة البرج A من النقطة B التي تبعد عن قاعدة البرج 25 m فكان قياس زاوية ارتفاعها 50° ، ثم رصدت قمة التلة من النقطة B نفسها بزاوية ارتفاع مقدارها 20° . ما ارتفاع البرج h ؟



الوحدة 4



أَجِدُ أَوْلًا قياسَ الزاوية $:ABC$

$$m\angle ABC = 50^\circ - 20^\circ = 30^\circ$$

ثُمَّ أَجِدُ قياسَ الزاوية $:BAD$:

$$m\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$$

ارتفاع البرج هو طول الضلع AC في المثلث BAC . أَسْتَعْمِلُ قانوْنَ الْجِيُوبِ لِحَلِّ هَذَا المثلث.

بَعْدَ ذَلِكَ أَسْتَعْمِلُ قانوْنَ الْجِيُوبِ فِي المثلث BAC لِإِيجَادِ ارتفاعِ البرجِ:

$$\frac{h}{\sin 30^\circ} = \frac{25}{\sin 40^\circ}$$

قانوْنُ الْجِيُوبِ

$$h = \frac{25 \sin 30^\circ}{\sin 40^\circ}$$

بِضَربِ الْطَرْفَيْنِ فِي \sin 30^\circ



$$h \approx 19.45 \text{ m}$$

بِاستِعْمَالِ الْآلَةِ الْحَاسِبِيَّةِ

إِذْنُ، ارتفاعُ البرج هو: 19.45 m


أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

رَصَدَ لِيُّثُ زَوْيَّةَ قَمَّةِ بَنَاءٍ مِنَ النَّقْطَةِ A ، فَكَانَتْ 37° ، ثُمَّ سَارَ مَسَافَةً 20 m بِاتِّجَاهِ الْبَنَاءِ حَتَّى النَّقْطَةِ C ، ثُمَّ رَصَدَ زَوْيَّةَ قَمَّةِ الْبَنَاءِ بِزَوْيَّةِ ارتفاعٍ مُقَدَّرُهَا 67° . أَجِدُ ارتفاعَ الْبَنَاءِ.



مثال 4: من الحياة

التقطَتْ محَطَّةُ خَفْرِ السَّوَالِ A و B نَدَاءَ اسْتِغْاثَةٍ مِنْ سَفِينَةٍ عَنْدَ النَّقْطَةِ C فِي الْبَحْرِ، وَقَدْ حَدَّدَتِ الْمَحَطَّةُ A اِتِّجَاهَ السَّفِينَةِ عَنْدَ 040° ، وَحَدَّدَتِ الْمَحَطَّةُ B اِتِّجَاهَ السَّفِينَةِ عَنْدَ 330° . إِذْنُ، كَانَتِ B شَرْقِيَّ A وَكَانَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَحَطَّتَيْنِ 120 km ، فَكُمْ تَبَعُّدُ السَّفِينَةُ عَنِ الْمَحَطَّةِ A ؟



يَجُبُ أَوْلًا إِيجَادُ قياسِ الزَّاوِيَّةِ $:C$:

قياسُ الزَّاوِيَّةِ BAC هُوَ 50° (لَاَنَّهَا مُتَمَمَّةٌ لِلْزَاوِيَّةِ الَّتِي قِيَاسُهَا (40°)).

وَقِياسُ الزَّاوِيَّةِ ABC هُوَ 60° ($60^\circ = 270^\circ - 330^\circ$). إِذْنُ:

$$m\angle ACB = 180^\circ - 60^\circ - 50^\circ = 70^\circ$$

ثم استعمال قانون الجيب:

قانون الجيب

بالتعويض

بضرب الطرفين في $\sin 60^\circ$

باستعمال الآلة الحاسبة

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{b}{\sin 60^\circ} = \frac{120}{\sin 70^\circ}$$

$$b = \frac{120 \times \sin 60^\circ}{\sin 70^\circ}$$

$$\approx 110.59 \text{ km}$$

باستعمال الآلة الحاسبة

أتحقق من فهمي


أجد بعد السفينة عن المحطة B في المثال السابق.

أتدرب وأحل المسائل




أجد قيمة x في كل من المثلثات الآتية:


1




2




3




4




5



6



A




أجد قياس الزاوية المنفرجة CBA في الشكل المجاور.

7

خراط: أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.


8

الوحدة 4




٩ بحّار: ترصد سفينتان في البحر قمة جبل كما في الشكل المجاور. إذا كانت المسافة بين السفينتين 1473 m، فما ارتفاع الجبل من مستوى سطح البحر؟


١٠ علم الفلك: رصد عامر وهشام من متلهمما نجما في السماء في اللحظة نفسها. إذا كانت زاوية رصد هشام للنجم 49.8974°، وزاوية رصد عامر له 49.9312°، والمسافة بين متلهمما 300 km، فأقدر بُعد النجم عن الأرض.




١١ مدينة الألعاب: في مدينة الألعاب، جلسَتْ سلمى ورهف على مقعدَيْن منفصلَيْن في لعبة الدوّاب الدوّاب كما في الشكل المجاور. أَجِد المسافة x بينهما.




١٢ رياضة التزلج: يتكون مسار تزلج من جزء مائل، وآخر مستقيم. إذا تزلج محمود من النقطة Q إلى النقطة P ، ثم وصل خط النهاية عند النقطة R ، وكانت زاوية ارتفاع مسار التزلج عن الأرض 25°، والمسافة بين النقطتين P و R هي 500 m، وزاوية رصد الحكم من نقطة النهاية للمرتلي الذي يقف عند نقطة البداية 15°، فما طول QP ؟



١٣ أَجِد قيمة x في الشكل المجاور، مُقرّبًا إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة.




14 تبرير: أطلق قناص وقناص النار على هدف متحرك في السماء في لحظة ما. إذا كانت زاوية إطلاق القناص 35° ، وزاوية إطلاق القناص 40° ، والمسافة بينهما 100 m ، فما سيصيب الهدف أولاً؟ أبّر إجابتي.



15 تحدّ: مرّ قارب أسفل جسر طوله 250 m . وقد رصد الشخص الذي في القارب الزاويتين اللتين تقعان عند طرفي الجسر، فكانتا 69.2° و 65.5° . أجد ارتفاع الجسر عن القارب.

16 تبرير: توجّهت طائرة من المدينة P إلى المدينة Q ، وبعد أن قطعت مسافة 50 km أدرك الطيار وجود خطأ في زاوية الانطلاق مقداره 10° ، فاستدار في الحال، وقطع الطائرة مسافة 70 km حتى وصلت المدينة Q . إذا كانت سرعة الطائرة ثابتة وتساوي 250 km/h ، فما الوقت الإضافي الذي استغرقه الطيار بسبب خطأه في زاوية الانطلاق؟



قانون جيوب التمام Law of Cosines



استعمال قانون جيوب التمام لإيجاد طول ضلع، أو قياس زاوية في مثلث.

فكرة الدرس



قانون جيوب التمام.

المصطلحات



انطلقت حافلتان من محطة واحدة في الوقت نفسه، وقد توجهت الأولى شرقاً بسرعة 60 km/h ، وانطلقت الثانية في مسار يصنع زاوية 30° مع مسار الحافلة الأولى بسرعة 50 km/h . هل يمكن حساب المسافة بين الحافلتين بعد م مضي 3 ساعات على انطلاقهما؟

مسألة اليوم



تعززت في الدرس السابق قانون الجيوب، وكيف يستعمل لحل مثلثات علم فيها ضلع واحد وزاويتان (ASA، أو ضلعان وزاوية مقابلة لأحد هما (SSA)).

تُستعمل أيضاً نسبة جيب التمام لإيجاد علاقات أخرى بين أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا؛ ما يساعد على حل بعض المثلثات التي لا يمكن حلها باستعمال قانون الجيوب.

ففي الشكل المجاور، يمثل h الارتفاع المرسوم من B عمودياً على AC . وباستعمال نظرية فيثاغورس وتعريف جيب التمام، يمكن استنتاج بعض العلاقات على النحو الآتي:

$$h^2 = c^2 - x^2$$

باستعمال نظرية فيثاغورس في المثلث ADB

$$h^2 = a^2 - (b - x)^2$$

باستعمال نظرية فيثاغورس في المثلث BDC

$$c^2 - x^2 = a^2 - (b - x)^2$$


بمساواة المعادلتين

$$c^2 - x^2 = a^2 - b^2 + 2xb - x^2$$

بفك القوس

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2xb$$

بالتبسيط



لإدخال جيب التمام في المعادلة: $\cos A = \frac{x}{c}$ ، فإننا نكتب x بدلالة $\cos A$:

$$\cos A = \frac{x}{c}$$

تعريف جيب التمام

$$x = c \times \cos A$$

بالضرب التبادلي

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

بتعويض قيمة x في المعادلة

وبذلك، نتوصل إلى العلاقة الآتية بين أطوال أضلاع المثلث وقياسات زواياه باستعمال جيب التمام:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

وبطريقة مشابهة، يمكن التوصل إلى العلاقات الآتية:



$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

تُسمى هذه العلاقات **قانون جيب التمام** (Law of Cosines)، ويُستعمل هذا القانون لحل أي مثلث علماً بثلاثة من قياساته في الحالات الآتية:

1. ضلعان وزاوية محصورة بينهما (SAS).

2. ثلاثة أضلاع (SSS).



أَتَعْلَم

يمكن كتابة قانون جيب التمام كما يأتي:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

مَثَلٌ 1

أَجِدُّ قيمة x في المثلث المجاور.

قانون جيب التمام

باستعمال الآلة الحاسمة

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

باستعمال الآلة الحاسمة

$$x^2 = 6^2 + 10^2 - 2 \times 6 \times 10 \cos 80^\circ$$

$$x^2 = 115.16$$



$$x = \pm \sqrt{115.16}$$

$$x = \pm 10.7 \text{ cm}$$

إذن، $x = 10.7$ ؛ لأن قيمة x لا يمكن أن تكون سالبة.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

أَجِدُّ قيمة x في المثلث المجاور.



يُستعمل قانون جيب التمام أيضاً لإيجاد قياس زاوية مجهولة في المثلث.

مثال 2

أَجِدْ قِيمَةَ x فِي الْمُثَلِّث RST الْمُجاوِرِ.

$$8^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \times 5 \times 7 \cos x$$

$$\cos x = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \times 5 \times 7}$$

$$\cos x = 0.1428$$


$$x = 81.8^\circ$$

قانونُ جِيُوبِ التَّمَامِ

بِكَتَابَةِ $\cos x$ مُوضِعُ القَانُونِ

بِاسْتِعْمَالِ الْآلَةِ الْحَاسِبَةِ

مُعْكُوسُ جِيُوبِ التَّمَامِ



أَتَحَقَّقَ مِنْ فَهْمِي

فِي الْمُثَلِّث ABC ، إِذَا كَانَ $AB = 16$, $BC = 12$, $AC = 20$ فَأَثْبِتُ أَنَّ الزَّاوِيَةَ B قَائِمَةً.

قُدْ نَحْتَاجُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ إِلَى اسْتِعْمَالِ قَانُونِيِّ الْجِيُوبِ وَجِيُوبِ التَّمَامِ مَعًا لِإِيَاجَادِ الْقِيَاسَاتِ الْمَطْلُوبَةِ.

مثال 3: من الحياة

شُوِهِدَتْ طَائِرَةٌ مَرْوِحَيَّةٌ تُحَلِّقُ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ X وَ Y فِي الْلَّهُظَةِ نَفْسِهَا. إِذَا كَانَ بُعْدُ الطَّائِرَةِ عَنِ الْقَرِيَةِ X هُوَ 8.5 km ، وَعَنِ الْقَرِيَةِ Y هُوَ 12 km ، وَكَانَتِ الْقَرِيَتَيْنِ فِي مَسْتَوَى أَفْقَىٰ وَاحِدٍ، وَزَوْاِيَّةُ ارْتِفَاعِ الطَّائِرَةِ مِنَ الْقَرِيَةِ Y هِيَ 43° ، فَمَا الْمَسَافَةُ بَيْنَ هَاتِيْنِ الْقَرِيَتَيْنِ؟

لِإِيَاجَادِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْقَرِيَتَيْنِ، يَجْبُ مَعْرِفَةُ قِيَاسِ الزَّاوِيَةِ بَيْنَ الضَّلَاعِيْنِ الَّذِيْنِ يُمَثَّلُانِ بُعْدَيِّ الطَّائِرَةِ عَنِ الْقَرِيَتَيْنِ كَمَا يَأْتِي:

الخطوة 1: اسْتِعْمَالُ قَانُونِ الْجِيُوبِ لِإِيَاجَادِ قِيَاسِ الزَّاوِيَةِ X فِي الْمُثَلِّث HYX .

$$\frac{\sin 43^\circ}{8.5} = \frac{\sin X}{12}$$

$$\sin X = \frac{12 \sin 43^\circ}{8.5}$$

$$\sin X \approx 0.963$$

$$X = \sin^{-1} 0.963$$

$$\approx 74.3^\circ$$

قانونُ الْجِيُوبِ


بِضَرِبِ الْطَّرْفَيْنِ فِي 12

بِاسْتِعْمَالِ الْآلَةِ الْحَاسِبَةِ

مُعْكُوسُ \sin

بِاسْتِعْمَالِ الْآلَةِ الْحَاسِبَةِ

الخطوة 2: إِيَاجَادُ قِيَاسِ الزَّاوِيَةِ H .



أَتَعْلَمُ

تَوَجُّدُ قِيمَتَانِ لـ $\sin^{-1} 0.963$ ضِمِنَ الدُّورَةِ الْوَاحِدَةِ هُمَا 74.3° و 105.6° ، نَخْتَارُ مِنْهُمَا القيمةَ 74.3° لِأَنَّ الزَّاوِيَةَ x تَبَدُّو حَادَّةً فِي الشَّكْلِ المُعْطَى.

$$m\angle H = 180^\circ - 43^\circ - 74.3^\circ = 62.7^\circ$$

مجموع قياس زوايا المثلث 180°

الخطوة 3: استعمال قانون جيب التمام لإيجاد المسافة بين القرىتين.

$$(XY)^2 = 12^2 + 8.5^2 - 2(12)(8.5) \cos 62.7^\circ$$

قانون جيب التمام

$$(XY)^2 = 122.7$$

باستعمال الآلة الحاسبة

$$XY = \pm \sqrt{122.7} = \pm 11.1$$

بحساب الجذر التربيعي للطرفين


إذن، المسافة بين المدينتين 11.1 km تقريرًا.

أتحقق من فهمي

سفن: أبحرت سفينة من الميناء A باتجاه الشمال، قطعت مسافة 240 km ، ثم انحرفت بزاوية 50° ، وقطعت مسافة 160 km حتى وصلت إلى الميناء B. ما المسافة بين الميناء A والميناء B؟

مثال 4: من الحياة

أقلعت طائرة بزاوية 100° عن الشمال من المدينة A، قطعت مسافة 400 km ، ثم انعطفت يميناً، فأصبحت الزاوية بين خط مسارها الجديد والشمال 170° ، ثم قطعت مسافة 500 km لتصل إلى المدينة B. ما المسافة بين هاتين المدينتين؟ يمكن حساب المسافة بين المدينتين (طول القطعة المستقيمة AB) بإيجاد قياس الزاوية AMB .



من الملاحظ أن الزاوية AMN_2 مكملة للزاوية 1 , وهي تساوي 80° .

$$m\angle AMB = 360^\circ - (80^\circ + 170^\circ) = 110^\circ$$

مجموع الزوايا حول نقطة

$$(AB)^2 = (400)^2 + (500)^2 - 2 \times 400 \times 500 \cos 110^\circ$$

قانون جيب التمام

$$(AB)^2 = 546808.0573$$

باستعمال الآلة الحاسبة

$$AB = \sqrt{546808.0573} \approx 739.5$$

بأخذ الجذر التربيعي

إذن، المسافة بين المدينتين 739.5 km تقريرًا.


أتحقق من فهمي

سار قطار من المحطة A في اتجاه 080° إلى المحطة B التي تبعد عنها 120 km ، ثم تحوّل إلى اتجاه 070° ، وسار مسافة 90 km إلى المحطة C. ما المسافة بين المحطة A والمحطة C؟




أَجِدْ قِيمَةَ x فِي كُلِّ مِنَ الْمُثَلَّثَاتِ الْآتِيَّةِ:


1




2




3





4




5




6



7 ملاحة جوية: أبحرت سفينة من أحد الموانئ مسافة 50 km في اتجاه 050°، ثم غير القبطان خط سيرها إلى اتجاه 150° وقطع مسافة 40 km، ثم توقفت بسبب إصابة أحد أفراد الطاقم. ما المسافة التي ستقطعها مروحية الإنقاذ من الميناء لتصل إلى السفينة في أقصر وقت ممكِّن؟




8 كرة قدم: يُبيّن الشكل المجاور موقع لاعب كرة قدم يركّل الكرة نحو مرمى عرضه 5.5 m. أَجِدْ قِياسَ الزاوِيَّةِ التي يُسْتَطِعُ مِنْهَا اللاعبُ أَنْ يُرْكِلَ الكرة لتسدِّيْدَ هدْفِ، علَمَا بِأَنَّهُ يَبعُدُ عَنْ طَرَفِيِّ المرْمى مسافَةَ 26 m وَ 23 m.



- ٩) **خرائط طيران**: أفلعت طائرة من المدينة A في اتجاه 000° مسافة 150 km ، ثمَّ اتجهَت إلى 050° ، وسارت مسافة 100 km حتى وصلت المدينة C كما في الشكل المجاور. ما أقصُر مسافة ممكِنةٍ بين المدينتين إذا كان مسموحاً للطائرة اتّخاذ المسار الذي تريده؟

- ١٠) **ساعات**: طول عقربيٍّ ساعيٍّ 3 cm ، و 4 cm . أَجِد المسافة بين رأسِي العقربين عندما يشيران إلى الساعة 4 تماماً.




- ١١) **مروحة إنقاذ**: أرسَلت مروحة إنقاذٍ من القاعدة A لإسعافِ رجلٍ على جبلٍ عند النقطة M إلى الشمالِ من هذه القاعدة، ثمَّ أوصَلتُه إلى المستشفى H الذي يبعد عن القاعدة مسافة 38 km كما يظهرُ في الشكل المجاور. أَجِد المسافة من الجبل إلى المستشفى بطريقَيْن.


مهارات التفكير العليا



- ١٢) **تحدٌ**: أَجِد قياسَ أصغر زاويةٍ في مثلثٍ أطوالُ أضلاعِه $3a, 5a, 7a$ ، حيث a عددٌ حقيقيٌّ موجبٌ.



- ١٣) **تحدٌ**: يمثُّل الشكل $ABCD$ المجاورُ حقلَ نخيلٍ تريُدُّ مالكتُه إحاطته بسياجٍ. أَجِد طولَ السياج.



- ١٤) **تحدٌ**: يرتفع برج 500 m على تَلَّةٍ تميلُ بزاوية 5° عن المستوى الأفقيِّ كما في الشكل المجاورِ. أرادَتِ المهندسةُ صفاء تثبيت البرج بسلكينِ من قمَّته إلى نقطتينِ على الأرضِ، تبعدُ كُلُّ منْهُما مسافة 100 m عن قاعدةِ البرج. أَجِد طولَ السلكينِ.

استعمال جيب الزاوية لإيجاد مساحة المثلث

Using Sine to Find the Area of a Triangle

فكرة الدرس



مسألة اليوم



إيجاد مساحة مثلث علماً فيه طولاً ضلعين، وقياس الزاوية المحصورة بينهما.




لدي مزراع قطعة أرض مثلث الشكل، طول أحد أضلاعها 84 m وطول ضلع آخر 110 m، وقياس الزاوية المحصورة بينهما 145° ، وقد أراد زراعتها ببطاطا، فلماً 0.15 kg من درنات البطاطا لكل متر مربع. كيف يستطيع المزارع حساب كمية درنات البطاطا اللازمة لزراعة أرضه؟

تعلّمت سابقاً كيفية حساب مساحة المثلث بضرب نصف طول قاعدته في ارتفاعه، غير أنه يتعدّر استعمال هذه الطريقة إذا كان الارتفاع مجهولاً، لذا يمكن استخدام النسبة المثلثية في إيجاد قانون آخر لحساب مساحة المثلث باستعمال أطوال أضلاعه وقياسات زواياه. ففي الشكل المجاور، نلاحظ أن BD هو ارتفاع المثلث ABC ، وأنه عمودي على القاعدة AC . فإذا كان $AC = b$ ، و $BD = h$ ، فإن مساحة هذا المثلث هي:

$$K = \frac{1}{2} AC \times BD \\ = \frac{1}{2} bh$$

نلاحظ أيضاً من المثلث BDC ما يأتي:

تعريف جيب الزاوية



بضرب طرفي المعادلة في a

بالتعويض عن h في قانون مساحة المثلث $b \times c \times \sin A$

$$h = a \sin C$$

$$K = \frac{1}{2} b (a \sin C) \\ = \frac{1}{2} ab \sin C$$

يمكن رسم العمود من الرأس A إلى الضلع الذي يقابل BC ، ومن الرأس C إلى الضلع الذي يقابل AB ، لبيان أن مساحة هذا المثلث تساوي $\frac{1}{2} ab \sin C$ ، وأنها تساوي أيضاً

$$\frac{1}{2} bc \sin A$$

مساحة المثلث

مفهوم أساسى

مساحة المثلث تساوي نصف ناتج ضرب طولي أي ضلعين فيه متصوّرًا في جيب الزاوية المحسورة بينهما:

$$K = \frac{1}{2} bc \sin A \quad K = \frac{1}{2} ac \sin B \quad K = \frac{1}{2} ab \sin C$$

مثال 1


أَجِد مساحة المثلث ABC بالوحدات المربعة في الشكل المجاور.

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} ab \sin C \\ &= \frac{1}{2} \times 8 \times 6 \times \sin 30^\circ \\ &= 12 \end{aligned}$$

قانون مساحة المثلث


بالتعميض

إذن، مساحة المثلث 12 وحدة مربعة.



أتحقق من فهمي

أَجِد مساحة المثلث بالوحدات المربعة في الشكل المجاور.



تعلّمْت في المثال السابق كيف أَجِد مساحة مثلث علِم في طولا ضلعين، وقياس الزاوية المحسورة بينهما، وسأتعلّم الآن كيفية حساب مساحة مثلث علِمْت فيه أطوال أضلاعه الثلاثة.

مثال 2

أَجِد مساحة المثلث ABC في الشكل المجاور.

يعتَّنُ أولاً إيجاد قياس إحدى الزوايا باستعمال قانون جيب التمام، ثم حساب المساحة.

إذن، أَستعمل قانون جيب التمام لإيجاد قياس الزاوية C :

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

قانون جيب التمام

$$= \frac{13^2 + 19^2 - 8^2}{2 \times 13 \times 19}$$


بالتعميض

$$= 0.9433$$

باستعمال الآلة الحاسبة

$$C = \cos^{-1} 0.9433 = 19.4^\circ$$

معكوس \cos ، واستعمال الآلة الحاسبة



أطبق قانون المساحة:

قانون مساحة المثلث


بالتعمييض

باستعمال الآلة الحاسبة

أتحقق من فهمي

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} ab \sin C \\ &= \frac{1}{2} \times 13 \times 19 \times \sin 19.4^\circ \\ &= 41.0 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

أجد مساحة المثلث DEF ، علمًا بأن $DE = 10 \text{ cm}$ ، و $DF = 12 \text{ cm}$ ، و $EF = 9 \text{ cm}$



مثال 3: من الحياة

المسافة بين عمان والأزرق 103 km ، وبين عمان والمفرق 70 km ، وبين المفرق والأزرق 98 km . أجد مساحة المثلث الذي تقع عند رؤوسه هذه المدن الثلاث.

الخطوة 1: إيجاد قياس إحدى الزوايا، ولتكن B ، باستعمال قانون جيب التمام.

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ &= \frac{98^2 + 70^2 - 103^2}{2 \times 98 \times 70} \\ &= 0.2839 \end{aligned}$$

باستعمال الآلة الحاسبة

معكوس جيب التمام، واستعمال الآلة الحاسبة

الخطوة 2: تطبيق قانون المساحة.

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} ac \sin B \\ &= \frac{1}{2} \times 98 \times 70 \times \sin 73.5^\circ \\ &= 3288.8 \text{ km}^2 \end{aligned}$$

باستعمال الآلة الحاسبة

التخزين في ذاكرة الآلة الحاسبة

استعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قياس الزاوية في هذا السؤال، ثم أضغط على الأزرار (بالترتيب من اليسار): SHIFT → RCL → B

فتحفظ الزاوية في الذاكرة. ولاستعمالها في حساب مساحة المثلث، أدخل: $\frac{1}{2} \times 98 \times 70 \times$ ثم أضغط على الأزرار: sin → ALPHA → B → =، فتظهر النتيجة: 3288.8

أتحقق من فهمي

قطعة رخام مثلثة الشكل، أبعادها: 50 cm , 85 cm , و 70 cm . ما مساحتها؟



أَجِد مساحةَ كُلِّ مِنَ الْمُثَلَّثَاتِ الْآتِيَّةِ:

1) المثلث ABC الذي فيه $AC = 8 \text{ cm}$ ، $BC = 7 \text{ cm}$ ، وقياسُ الزاوية ACB فيه 59° .

2) المثلث ABC الذي قياسُ الزاوية BAC فيه 85° ، و $AC = 6.7 \text{ cm}$ ، و $AB = 8 \text{ cm}$.

3) المثلث PQR الذي فيه $PR = 19 \text{ cm}$ ، $QR = 27 \text{ cm}$ ، وقياسُ الزاوية QRP فيه 109° .

4) المثلث XYZ الذي فيه $XY = 231 \text{ cm}$ ، $XZ = 191 \text{ cm}$ ، وقياسُ الزاوية YXZ فيه 73° .


5) المثلث LMN الذي فيه $LM = 39 \text{ cm}$ ، $LN = 63 \text{ cm}$ ، وقياسُ الزاوية NLM فيه 85° .

6) إذا كانت مساحةُ المثلث ABC هي 27 cm^2 ، $BC = 14 \text{ cm}$ ، وقياسُ الزاوية BCA فيه 115° ، فما طولُ AC ؟


7) إذا كانت مساحةُ المثلث LMN هي 133 cm^2 ، $MN = 21 \text{ cm}$ ، $LM = 16 \text{ cm}$ ، وقياسُ الزاوية LMN حادةً، فما قياسُ كُلِّ من الزاويتين: MNL ، LMN ، و MNL ؟

9) لوحةٌ على شكلٍ مثلثٍ، أطوالُ أضلاعِه: 60 cm ، 70 cm ، و 80 cm . أَجِد مساحةَ اللوحةِ.


10) دائِرَتَانِ، مرْكُزُ إِحْدَاهُما P ومرْكُزُ الْأُخْرَى Q ، وطُولُ نَصْفِ قُطْرِ إِحْدَاهُما 6 cm وَالْأُخْرَى 7 cm . إِذَا تَقَاطَعَتَا فِي النَّقْطَتَيْنِ X وَ Y ، وَكَانَ $PQ = 9 \text{ cm}$ ، فَما مساحةُ المثلث $?PQX$ ؟



11) طائِرَةٌ ورَقِيَّةٌ: صُنِعَ سَلِيمٌ طائِرَةٌ ورَقِيَّةٌ كَمَا فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ . أَجِد مساحةَ المادَةِ الْلَّازِمَةِ لصُنْعِ الطائِرَةِ بِالْوَحْدَاتِ الْمَرْبُعَةِ .



12) مُنْتَزَّهٌ وَطَنِيٌّ: يَرَادُ إِنْشَاءُ مُنْتَزَّهٍ وَطَنِيٌّ عَلَى قطْعَةِ أَرْضٍ مُثَلَّثَةِ الشَّكْلِ ABC . إِذَا كَانَتِ النَّقْطَةُ B فِي اِتِّجَاهِ 324° مِنَ النَّقْطَةِ A ، وَالنَّقْطَةُ C فِي اِتِّجَاهِ 042° مِنَ النَّقْطَةِ A ، فَما مساحةُ الْمُنْتَزَّهِ بِالْوَحْدَاتِ الْمَرْبُعَةِ؟



حقول: يمثل الشكل المجاور أبعاد حقلٍ رباعي الأضلاع:


أثبت أن طول BD هو 66 m ، مقرّباً إجابتي إلى أقرب متر. 13

أحد قياس الزاوية C . 14

أحسب مساحة الحقل. 15

أحل المسألة الواردة في بداية الدرس. 16

المثلث ABC قائم الزاوية ، والمثلث DEF مُنطابق الأضلاع وللمثلثين المحيط نفسه. أجد مساحة المثلث DEF . 17



جغرافيا: برمودا منطقة مثلثة الشكل ، تقع في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي ، رؤوسها مدينة ميامي ، وبرمودا ، وسان خوان. وقد شهدَ مثلث برمودا وقوع عدٍ من حوادث اختفاء السفن والطائرات. إذا كانت المسافة بين ميامي وسان خوان 1674 km تقريباً ، وبين ميامي وبرمودا نحو 1645 km ، وبين سان خوان وبرمودا قرابة 1544 km ، فما مساحة مثلث برمودا من دون اعتبار لتوؤس الأرض؟ 18

مهارات التفكير العليا

تحدد: أجد مساحة المثلث ABC الذي قياس الزاوية A فيه 70° ، وقياس الزاوية B فيه 60° ، وطول الضلع AB فيه .4 cm 19

اكتشف الخطأ: مثلث ABC فيه $AB = 9\text{cm}$ ، $BC = 8\text{cm}$ ، وقياس الزاوية A فيه 30° . أرادت نور إيجاد مساحتَه إلى أقرب عشرة ، فكان حلّها كما يأتي:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} \times 8 \times 9 \sin 30^\circ \\ &= 18 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

اكتشف الخطأ في حل نور ، ثم أصحّه.

حل مسائل ثلاثة الأبعاد

Solving Problems in Three Dimensions

فكرة الدرس



إيجاد أطوال وقياسات لروابي مجهرة في أشكال ثلاثة الأبعاد باستعمال نظرية فيثاغورس والنسب المثلثية.


مسألة اليوم



شيد الهرم الأكبر في مدينة الجيزة بمصر عام 2500 قبل الميلاد تقريباً، وتمثل قاعدته مربعاً طول ضلعه 232.6 m، وطول الضلع الواصل بين قمة الهرم وأي من رؤوس المربع 221.2 m. أجد ارتفاع هذا الهرم.

تشتمل المسائل ثلاثة الأبعاد (في الفضاء) على ثلاثة مستويات؛ أفقية، ورأسي، ومائل. ويطلب حل هذه المسائل رسم مخطط يوضح المسألة، ويمثل المعلومات المعطاة فيها، ثم البحث عن مثلثات قائمة الزاوية فيها. وإذا لم تجدها المثلثات، فإننا نرسم بعضها، بحيث تكون بعض عناصرها معلومة، فضلاً عن تحديد العنصر المطلوب إيجاده فيها؛ على أن نرسم كل منها بمنتهى عن المخطط المذكور آنفًا، ليسهل علينا معرفة العلاقة التي نستخدمها في الحل.

مثال 1



يمثل الشكل المجاور متوازي مستويات.
أجد قياس الزاوية AHF ، مقرباً إجابتي إلى
أقرب منزلة عشرية واحدة.

المثلث AFH قائم الزاوية في F ، ومعلوم فيه طول AF ؛ لذا يجب معرفة عنصر آخر لإيجاد القياس المطلوب.

الخطوة 1: إيجاد طول FH من المثلث قائم الزاوية FEH ؛ المرسوم وحدة جانبًا.


$$\begin{aligned}(FH)^2 &= (EF)^2 + (EH)^2 \\ &= 5^2 + 12^2\end{aligned}$$

$$(FH)^2 = 169$$

$$FH = \sqrt{169} = 13$$

نظرية فيثاغورس
بالتعويض
بالتبسيط

بحساب الجذر التربيعي للطرفين




الخطوة 2: رسم المثلث AHF وحدّه، ثم استعمالظلّ (\tan) لإيجاد قياس الزاوية θ .

$$\tan \theta = \frac{7}{13} = 0.5385$$

$$\theta = \tan^{-1}(0.5385) = 28.3^\circ$$

بالتقريب إلى منزلة عشرية واحدةٍ




أتحقق من فهمي

أجد BE ، وقياس الزاوية EBG في المثال السابق.

يمكن نمذجة كثيّر من المواقف الحياتية باستعمال المثلثات، ثم إيجاد قياسات مجهولة فيها باستعمال النسب المثلثية.

مثال 2: من الحياة

تقع النقاط A ، B ، و C في مستوىً أفقِيًّا واحدًى على الأرض، وتقع النقطة C على بعد 50 km شرقيًّا النقطة B التي تقع شماليًّا النقطة A ، وتقع النقطة C في اتجاه 050° من النقطة A . رُصِدَتْ من النقطة A حركة طائرة في موقعين مختلفين على الارتفاع نفسه عن الأرض؛ الأول: عندما كانت فوق النقطة B مباشرةً، وكانت زاوية ارتفاعها 12° . والثاني: عندما كانت فوق النقطة C . أجد زاوية ارتفاع الطائرة عندما كانت فوق النقطة C .



الخطوة 1: أرسم مخططاً يُمثّل المعلومات المعطاة.

أتدّرك

تُسمى الزاوية الممحصورة بين خط البصر والخط الأفقي المارّ بعين الناظر زاوية الارتفاع.

الخطوة 2: أرسم المثلث قائم الزاوية ABC ، ثم استخدمه في إيجاد AB ، AC ، و θ .

$$\tan 50^\circ = \frac{50}{AB}$$

$$AB = \frac{50}{\tan 50^\circ} = 41.95 \text{ km}$$

$$\sin 50^\circ = \frac{50}{AC}$$


$$AC = \frac{50}{\sin 50^\circ} = 65.27 \text{ km}$$

تعريف ظلّ الزاوية

باستعمال الآلة الحاسبة

تعريف جيب الزاوية

باستعمال الآلة الحاسبة




الخطوة 3: أرسم المثلث قائم الزاوية ABX ، ثم أستخدمه في إيجاد BX ، ومنه يمكن إيجاد CY ، فهما متساويان؛ لأنَّ الشكَل $BXYC$ مستطيل.

$$\tan 12^\circ = \frac{BX}{41.95}$$

$$BX = 41.95 \tan 12^\circ = 8.917 \text{ km}$$

تعريفُ ظلِّ الزاوية

باستعمالِ الآلةِ الحاسبة




الخطوة 4: أستعمل المثلث قائم الزاوية ACY لإيجاد زاوية الارتفاع θ .

$$\tan \theta = \frac{8.917}{65.27} = 0.1366$$

تعريفُ ظلِّ الزاوية

معكوسُ الظلِّ

إذن، زاوية ارتفاع الطائرة عندما كانت فوق النقطة C هي: 7.8° ، مُقرَّبةً إلى منزلة عشرية واحدة.




اتُّحِقَّ مِنْ فَهْمِي

رَصَدَ أَحْمَدُ قَمَّةَ مَئْذِنَةٍ مِنْ نَقْطَةٍ عَلَى الْأَرْضِ تَقْعُدُ جَنُوبَ الْمَئْذِنَةِ، فَكَانَتْ زَوْيَةُ ارْتِفَاعِهَا 38.4° ، ثُمَّ سَارَ شَرْقًا مَسَافَةً 85 m ، وَرَصَدَ قَمَّةَ الْمَئْذِنَةِ مَرَّةً أُخْرَى. إِذَا كَانَ ارْتِفَاعُ الْمَئْذِنَةِ 67 m ، أَجِدُ زَوْيَةَ ارْتِفَاعِ قَمَّةِ الْمَئْذِنَةِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ.

مَثَال٣: مِنْ الْحَيَاةِ

رُصِدَ الْمَنْزِلُ A فِي اِتِّجَاهِ الشَّرْقِ مِنْ قَمَّةِ بَرْجٍ يَرْتَفِعُ 80 m ، وَكَذَلِكَ الْمَنْزِلُ B فِي اِتِّجَاهِ الْجَنُوبِ. إِذَا كَانَتْ زَوْيَةُ انْخِفَاضِ الْمَنْزِلِ A مِنْ قَمَّةِ الْبَرْجِ 37° ، وَزَوْيَةُ انْخِفَاضِ الْمَنْزِلِ B مِنْ قَمَّتِهِ 25° ، فَمَا الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَنْزَلَيْنِ؟



الخطوة 1: أرسم مُخْطَطًا، علَمًا بِأَنَّ الْبَرْجَ DC يَصْنُعُ زَوْيَةَ قَائِمَةً مَعَ الْأَرْضِ، وَأَنَّ اِتِّجَاهَ كُلِّ مَنْ شَرْقٌ وَالْجَنُوبِ يَصْنَعُانِ مَعًا زَوْيَةَ قَائِمَةً.

الوحدة 4

بما أنَّ زاوية انخفاض المنزل A هي 37° ، فإنَّ الزاوية DAC هي 37° ، وبما أنَّ زاوية انخفاض المنزل B هي 25° ، فإنَّ الزاوية DBC هي 25° .

الخطوة 2: أستعمل المثلث قائم الزاوية ABC لإيجاد AB ، وهذا يحتم معرفة AC ، وـ BC .

الخطوة 3: أرسم المثلث ADC . ولإيجاد AC ، أستعمل ظلَّ الزاوية 37° .

$$\tan 37^\circ = \frac{80}{AC}$$


تعريفُ ظلَّ الزاوية

$$AC = \frac{80}{\tan 37^\circ}$$

بالتبسيط

$$AC = 106.2 \text{ m}$$

باستعمالِ الآلة الحاسبة



الخطوة 4: أرسم المثلث BCD . ولإيجاد BC ، أستعمل ظلَّ الزاوية 25° .

$$\tan 25^\circ = \frac{80}{BC}$$


تعريفُ ظلَّ الزاوية

$$BC = \frac{80}{\tan 25^\circ}$$

بالتبسيط

$$BC = 171.6 \text{ m}$$

باستعمالِ الآلة الحاسبة



الخطوة 5: أستعمل نظرية فيثاغورس في المثلث ACB لإيجاد AB .

$$(AB)^2 = (AC)^2 + (BC)^2$$

نظريةُ فيثاغورس


$$= (106.2)^2 + (171.6)^2 = 40725$$

بالتعمييض

$$AB = \sqrt{40725} = 201.8$$


بأخذِ الجذرِ التربيعي

إذن، المسافةُ بينَ المُنْزَلَيْنِ هي: 201.8 m ، مُقرَّبَةً إلى أقربِ منزلَةٍ عشريةٍ واحدةٍ.




أتحقق من فهمي

أبحَرَت السفينة A وـ B منَ الميناء P في اتجاهيْن مُتعامِدِيْن. وقدْ رصَدَت طائرةٌ عموديَّةٌ تُحلقُ فوقَ الميناءِ هاتيْن السفينةيْن في اللحظةِ نفسِها، فكانتْ زاويةُ انخفاضِ السفينة A هي 40° ، وزاويةُ انخفاضِ السفينة B هي 54° . إذا كانَ ارتفاعُ الطائرةِ عنْ سطحِ البحر 600 m ، فما المسافةُ بينَ السفينةيْن لحظةَ رصدهِما؟




- 1 **سارية العلم:** نصبت سارية علم عمودياً عند ركن ساحة مستطيلة الشكل $ABCD$. أجد زاوية ارتفاع قمة السارية P من النقطة C .




يُمثل الشكل المجاور هرماً قائماً قاعدته $ABCD$ مستطيلة الشكل، بعدها: 20 cm ، 24 cm ، 15 cm . إذا كان طول كل من الأحرف الواقعة بين قمة الهرم ورؤوس القاعدة 24 cm ، وكانت القمة V تقع رأسياً فوق مركز القاعدة المستطيلة، فأخذ:

- 3 قياس الزاوية VAC .
4 طول القطر AC .
5 ارتفاع الهرم.



- 5 **منارة:** شاهد صياد من قارب قاعدة منارة على حافة صخرية بزاوية ارتفاع قياسها 34° . إذا كان ارتفاع قاعدة المنارة عن مستوى عيني الصياد 150 m ، فكم يبعد الصياد عن هذه القاعدة؟


- 6 إذا كان ارتفاع المنارة 50 m ، فما زاوية ارتفاع نظر الصياد نحو قمة المنارة؟



يُمثل الشكل المجاور سقف بناية، قاعدته المستطيل الأفقي $ABCD$ الذي بعدها: 7 m ، 4 m . وتمثل نهايات السقف مثلثين متطابقين الأضلاع، في حين يمثل كل من جانبين السقف شبه منحرف متطابق الساقين. إذا كان طول الحافة العلوية EF هو 5 m ، فأخذ:

- 7 طول EM ، حيث M نقطة متصف AB .
8 قياس الزاوية EBC .
9 قياس الزاوية بين EM والقاعدة $ABCD$.

الوحدة 4




مستطيلٌ رأسٍ $ABCD$ ، وَ EDC مثلثٌ أفقٌ. إذا كانَ قياسُ الزاوية CDE هو 90° ، وَ $ED = 9 \text{ cm}$ ، $BC = 4 \text{ cm}$ ، وَ $AB = 10 \text{ cm}$ ، فَأَجِدُ:

قياسَ الزاوية AED 10

قياسَ الزاوية DEC 11

طُولَ \overline{EC} 12

قياسَ الزاوية BEC 13





يُمثِّلُ الشكُلُ المجاورُ الهرم $XABCD$ الذي له قاعدةٌ مستطيلةٌ الشكُلِ.

أَجِدُ قياسَ الزاوية بينَ الحافَةِ XD وَقُطْرِ القاعدةِ DB .

أَحُلُّ المسألةَ الواردةَ في بدايةِ الدرسِ. 15

مهارات التفكير العليا

اكتشفُ الخطأً: تَقْفُ هَدِي عَلَى بُعْدٍ 14 m شَرْقِيَّ شَجَرَةً، زَاوِيَّةُ ارْتِفَاعِ قَمَّتِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ 30° ، وَيَقْفُ جَمَّالُ عَلَى بُعْدٍ 28 m غَرْبِيَّ الشَّجَرَةِ، وَهُوَ يَرِي أَنَّ زَاوِيَّةَ ارْتِفَاعِ قَمَّةِ الشَّجَرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ يَجُبُ أَنْ تَكُونَ 15° ؛ لَأَنَّهُ يَعْدُ عَنِ الشَّجَرَةِ مِثْلَيِّ الْمَسَافَةِ الَّتِي تَبْعُدُهَا هَدِي. هُلْ رَأَيُ جَمَّالٍ صَحِيحٌ؟ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَأْيُهُ صَحِيحًا، فَمَا زَاوِيَّةُ الْأَرْتِفَاعِ؟



تحْدِيد: رُصِدَ القاربَانِ A وَ B فِي الْبَحْرِ مِنْ قَمَّةِ مَنَارَةٍ عَلَى الشَّاطَئِ، ارْتِفَاعُهَا 44 m ، فِي الْلَّهُظَةِ نَفِسَهَا، فَكَانَتْ زَاوِيَّةُ انْخِفَاضِ الْقَارِبِ A 37° ، وَ زَاوِيَّةُ انْخِفَاضِ الْقَارِبِ B هِيَ 53° ، وَ قياسُ الزَّاوِيَّةِ AMB هِيَ 37° ، وَ قياسُ الزَّاوِيَّةِ B هُوَ 120° ، حِيثُ M قَاعِدَةُ الْمَنَارَةِ. أَجِدُ الْمَسَافَةَ بَيْنَ الْقَارِبَيْنِ.

٤ إحدى الصيغ الآتية تُستعمل لإيجاد مساحة المثلث

:ABC

- a) $\frac{1}{2}bc \sin C$
- b) $\frac{1}{2}ab \sin C$
- c) $\frac{1}{2}ab \sin A$
- d) $\frac{1}{2}ab \sin B$


إذا كان اتجاه النقطة R من النقطة Z هو 070° , فإن

اتجاه النقطة Z من النقطة R هو:


- a) 070°
- b) 110°
- c) 250°
- d) 290°

أحد قيمة x في كل من المثلثات الآتية:


٦



٧



٨



اختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

١ يمكن حل المثلث إذا علمت جميع زواياه باستعمال:

- (a) قانون الجيب فقط.
- (b) قانون جيب التمام فقط.

(c) قانوني الجيب في هذه الحالة.

٢ يمكن حل المثلث إذا علمت جميع أضلاعه باستعمال:


- (a) قانون الجيب فقط.
- (b) قانون جيب التمام فقط.

(c) قانوني الجيب في هذه الحالة.

إذا كان اتجاه النقطة H من النقطة G في الشكل الآتي

هو 045° , واتجاه النقطة J من النقطة H هو 164° , فإن

قياس الزاوية GHJ هو:




- a) 16°
- b) 045°
- c) 29°
- d) 61°

اختبار نهاية الودعه


موانئ: أبحرت سفينة من الميناء P باتجاه الغرب مسافة 16 km، ثم تحولت إلى اتجاه الجنوب، وقطعـت مسافة 9 km حتى وصلـت الميناء S . أـجد اتجاه الميناء S من الميناء P .

17 رادار: رصد رادار شاحنة بعد ثانية من مرورها بمحاذاته، فصنع الخط الواصل بين الرادار والشاحنة وحافة الطريق زاوية مقدارها 15° كما في الشكل الآتي. أجد سرعة الشاحنة بوحدة km/h.




18 العواصفُ بحريةٌ: أبحرَتْ سفينةً منَ الميناءِ A بسرعةٍ 1100 km/h مُتجهةً إلى الميناءِ B على بُعدٍ 28 km . ولتجنبِ العواصفِ الشديدةِ التي هبَتْ شرقَ الميناءِ A . ولتجنبِ العواصفِ الشديدةِ التي هبَتْ عندَ انطلاقِ السفينةِ؛ فقد سلكَ القبطانُ مساراً ينحرفُ 20° جنوباً عنْ خطِ الملاحةِ المباشرِ بينَ الميناءينِ حتى هدأَتِ العواصفُ بعدَ إبحارٍ استمرَّ 10 ساعاتٍ. كم تبعدُ السفينةُ عنِ الميناءِ B بعدَ هذهِ المدةِ منَ الإبحارِ؟ ما قياسُ الزاويةِ الذي سيجعلُ السفينةَ تتوَجَّهُ مُباشرةً إلىِ الميناءِ B ؟

9 يبعد منزل نسرین عن المدرسة مسافة 400 m، ويبعد منزل هبة عن المدرسة نفسها مسافة 500 m، كما في الشكل الآتي. أجد المسافة بين منزليهما.



أَجِدْ قياسَ الزاوِيَّةِ بَيْنَ الْحَافَةِ XD وَقَاعِدَةِ الْهَرَمِ فِي
الشَّكَلِ الْأَتَيِّ .



إذا كانت مساحة المثلث PQR هي 68 cm^2 ، وكان $PQ = 18 \text{ cm}$, $RQ = 15 \text{ cm}$ ،
فما قياس الزاوية $\angle POR$ ؟ 11

مستعيناً بالشكل الآتي، أجد:

قياس الزاوية DBC 13 . طول \overline{DB} 12 .

14 طول \overline{CD} . 15 مساحة الشكل الرباعي.

.ABCD

23 ملاحة بحرية: تبعد سفينة عن قاعدة منارة واقعة غربها مسافة 80 km، وقد رصد قبطان السفينة قمة المنارة بزاوية ارتفاع مقدارها 60° ، ثم سارت السفينة بخط مستقيم في اتجاه الشرق، فوجد أن زاوية ارتفاع قمة المنارة هي 45° . أجد المسافة التي قطعتها السفينة.

تدريب على الاختبارات الدولية

ركب شخص طائرة عمودية ترتفع 700 m عن سطح البحر، فشاهد السفينتين A و B عند مرور الطائرة فوق نقطة بينهما. إذا كانت زاوية انخفاض السفينة A هي 45° ، وزاوية انخفاض السفينة B هي 40° ، فأجيب عن الأسئلة: 24، 25، 26.

24 اعتماداً على زوايا الانخفاض، اختار العبارة الصحيحة:

(a) موقع السفينة A بالنسبة إلى الطائرة أبعد منه من السفينة B.

(b) موقع السفينة B بالنسبة إلى الطائرة أبعد منه من السفينة A.

(c) بعدهما عن الطائرة متساو.

(d) لا يمكن معرفة أي السفينتين أبعد من زوايا الانخفاض.

25 المسافة بين السفينتين A و B مقدارها إلى أقرب متر هي:

a) 134


b) 700

c) 834

d) 1534

26 أوضح كيف أجبت عن السؤال 24.

برج بيزا: طول برج بيزا المائل نحو 55 m، وزاوية ارتفاع أعلى البرج من نقطة على بُعد 37 m هي 60° كما في الشكل المجاور. أجد:



19 قياس الزاوية RPQ .

20 ارتفاع قمة البرج R عن الأرض.

21 ملاحة بحرية: أطلق قارب من النقطة A من الميناء نحو سفينة متوقفة في عرض البحر باتجاه 030° ، وتبعه مسافة 2 km عن نقطة الانطلاق A، ثم تحرك القارب إلى النقطة B التي تقع باتجاه 000° عن نقطة الانطلاق A، وكانت المسافة بينهما 3 km. أجد بعد السفينة عن النقطة B.

22 زراعة: لتقدير مساحة حقل من القمح، رسم خالد مضلعًا خماسيًا حوله، ثم حدد قياساته المبينة في الشكل الآتي. ما مساحة الحقل التقريرية؟

